

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ЛѢЧЕБНИКЪ

Д-ра Л. Д. ФРЕНКЕЛЯ.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

къ

САМОПОМОЩИ ВЪ БОЛѢЗНЯХЪ

ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ ЛѢКАРСТВАМИ

и

ДОМАШНИМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ МѢРАМИ.

21-4

Въ 4 частяхъ.

Съ портретомъ основателя гомеопатіи С. ГАНЕМАННА

и съ 81 рисункомъ въ текстѣ.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ,


дополненное и переработанное.

ПЕТРОГРАДЪ. 116

Изданіе автора.

1916.





Hahnemann

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Часть первая. Введеніе въ область гомеопатическаго лѣченія.

Предисловіе	3—7
Главнѣйшіе моменты изъ жизни основателя гомеопатіи съ портретомъ его	8—12

ГЛАВА I. Приготовление гомеопатическ. лѣкарствъ. 13—16

Разныя формы лѣкарствъ (13).—Потенцированіе (13).—Дѣленіе лѣкарствъ, ихъ обозначеніе и приготовленіе (14).—Жидкія дѣленія (14).—Порошковые дѣленія — растиранія (15). — Лѣкарственное насыщеніе крупинокъ и пилюль (16).

ГЛАВА II. Опредѣленіе понятія „гомеопатія“ и основныя правила гомеопатическаго лѣченія 16—22

Законъ подобія (16). — Принципъ аллопатическаго лѣченія (17). —Принципъ серотерапіи; прививки (18).—Принципъ органотерапіи (18).—Отличіе гомеопатіи отъ другихъ способовъ лѣченія (19).—Два основныхъ правила гомеопатическаго лѣченія (19). — Цѣлебность малыхъ дозъ (20). — Динамизмъ безконечно-малыхъ дозъ (21). —Нѣсколько доводовъ въ пользу малыхъ дозъ (22).

ГЛАВА III. Правила дозировки и способы приемовъ гомеопатическ. лѣкарствъ въ болѣзняхъ 22—27

Дозы жидкихъ лѣкарствъ и способъ приемовъ (22).—„Питье“ (23). — Дозы порошковыхъ лѣкарствъ и способъ приемовъ (23).—Дозы крупинокъ и пилюль (23). — Дозы пастилокъ (23).—Идиосинкразія (24).

Правила повтореній приемовъ лѣкарствъ

ГЛАВА IV. О выборѣ лѣкарствъ и о продолжительности ихъ примѣненія

Гомеопатическій діагнозъ (27). — Главное не названіе болѣзни а ея проявленія (27).—Поперемѣнные или поочередные приемы лѣкарствъ (28). — Лѣкарства не совмѣстимыя (28). — Лѣкарства совмѣстимыя (29). — Одновременные приемы лѣкарствъ (29).—Данныя для выбора лѣкарствъ (29). —Продолжительность примѣненій лѣкарствъ (30).—Гомеопатическія лѣкарства излѣчиваютъ скорѣе, чѣмъ аллопатическія (30).

ГЛАВА V. Практическія указанія для составленія домашней гомеопатической аптечки

Приобрѣтеніе гомеопат. лѣкарствъ (31). — Приготовление лѣкарствъ въ дѣленіяхъ домашнимъ способомъ (32).—Сохраненіе гомеопат. лѣкарствъ (33). —Перечень гомеопатическихъ аптекъ имѣющихся въ Россіи Составъ домашней гомеопатической аптечки Аптечка изъ 24 лѣкарствъ (35). — Аптечка изъ 48 лѣкарствъ (36). —Аптечка изъ 100 лѣкарствъ (37). — Аптечка изъ 120 лѣкарствъ (39). — Аптечка изъ 200 лѣкарствъ (40).

ГЛАВА VI. Лѣкарства въ наружныхъ примѣненіяхъ.

ГЛАВА VII. О діетѣ и вѣсѣ, могательныхъ мѣрахъ при гомеопатическ. лѣченіи.

Часть вторая. Отдельные болезни и их лечение.

ведия ко второй части	52	а) Бессонница и лечение ее	102
ПЕРВЫЙ. Лихорадочные бо-		б) Бессонница у детей	103
лезни	53—69	в) Сонливость. Спячка	103
тельные замѣтки (53).—		г) Кошмаръ, тревожный сонъ	103
те о нормальномъ дыха-		Вспомогательныя мѣры и діѣта при	
тельномъ пульсѣ, о тем-		разстройствахъ сна	104
пературѣ тѣла, о термометрѣ		5) Обморокъ (Обмираніе. Мнимая	
особѣ его примѣненія (54).		смерть)	104
азные виды лихорадокъ		6. Многокровіе мозга, Мозговые	
преходящая инфекціонная		приливы	105
лихорадка. „Простудная лихо-		7. Мозговой ударъ	107
радка“	55	8. Малоокровіе мозга	109
Тифозныя лихорадки	57	9. Воспаленіе мозговыхъ оболо-	
Внутренній тифъ	62	чекъ (Менингитъ)	110
Межающаяся лихорадка.		10. Воспаленіе мозга (Энцефалитъ)	112
Лихорадка	62	11. Хроническая водянка головы	112
Правила діѣты при лихора-		12. Сotraсеніе мозга	112
дочныхъ болѣзняхъ	67	Б. Болѣзни спинного мозга 113—118	
Гриппозная гнилостная ли-		1. Спинальная боль. Раздражитель-	
хорадка	68	ность (ирритация) спинного	
ВТОРОЙ. Эпидемическія бо-		мозга	113
лезни	70—92	2. Воспаленіе спинного мозга	
Лихорадка	70	(Мѣллитъ)	115
Скарлатина (розовая сыпь, лож-		3. Спинальная сухотка (Табесъ дор-	
корь)	72	зались)	116
Лихорадка	73	4. Дѣтскій спинной параличъ и	
(натуральная)	75	исхуданіе мышцъ	118
Язвенная оспа	78	В. Болѣзни нервной систе-	
Лихорадка	78	мы 119—146	
Лихорадка	82	I. Невралгія. Нервная боль.	
Лихорадка	85	1. Лицевая боль (Болевой Тикъ)	119
Лихорадка	87	2. Бедренная боль (Ишиасъ)	120
Лихорадка	91	3. Поясничная боль (Лумбаго, По-	
ТРЕТИЙ. Зараженіе живот-		стрѣлъ)	120
ными животными	93	Характеристика главнѣйшихъ лѣ-	
Лихорадка	93	карствъ въ отношеніи неврал-	
Лихорадка	94	гій	122—124
Лихорадка	95	II. Судороги. Конвульсіи. Спазмы	125—143
Лихорадка	97	Общая руководящая указанія для	
ЧЕТВЕРТЫЙ. Болѣзни голо-		выбора лѣкарствъ противъ су-	
воваго мозга, спинного мозга, нер-		дорогъ съ краткой характери-	
вовъ и души	98—118	стикой главнѣйшихъ изъ нихъ	125—128
Лихорадка	98	Вспомогательныя мѣры при судо-	
Лихорадка	100	рогахъ	128
Лихорадка	102	Судороги въ отдѣльных формахъ	129—143
Лихорадка	102	1. Конвульсія у дѣтей, родимчикъ	129
Лихорадка	102	2. Эклампсія у беременныхъ	130
Лихорадка	102	3. Падучая болѣзнь (Эпилепсія)	131
Лихорадка	102	4. Столбнякъ	133
Лихорадка	102	Тризмъ и тетанусъ (133)—Ка-	
Лихорадка	102	талепсія (133).	
Лихорадка	102	5. Пляска Св. Вита (Хорея)	134

6. Спазмы внутренних органовъ	136—143
а) Спазмы желудка и живота	136
б) Спазмъ сердца. Грудная жаба	137
в) Спазмъ легкихъ. Астма	138
г) Спазмъ гортани	140
д) Спазмъ грудобрюшной перегородки. Нервная икота	142
е) Спазмъ смѣха и плача	142
ж) Спазмъ рѣчи, заиканіе	142
7) Профессиональные судороги	143

III. Параличи. Парезы 143—146

Лѣчение параличей 144

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи параличей 145

Г. Общія невроты 147—158

1. Нервозность, Нервная слабость (Неврастенія) 147
2. Ипохондрія 151
3. Истерія 152

Общее лѣчение невротовъ: неврастеніи, ипохондріи, истеріи . 153—158

Вспомогательныя мѣры при невротзахъ 157

Д. Душевные болѣзни 159

1. Идиотизмъ, кретинизмъ и врожденное слабоуміе 159
2. Манія (неистовство) 161
3. Меланхолія 162
4. Сумасшествіе (Параноія) 164
5. Прогрессивный параличъ. Паралитическое слабоуміе 167
6. Алкоголизмъ. Пьянство 168

ОТДѢЛЪ ПЯТЫЙ. Болѣзни пищеварительныхъ органовъ.

А. Болѣзни губъ и полости рта; болѣзни слюнныхъ железъ 170

I. Болѣзни губъ 170

- 1) Губной лишай, 2) Гипертрофія губъ, 3) Трещины губъ, слущиваніе верхней кожицы губъ 170—172

II. Болѣзни языка 172—175

Строеніе языка. Нормальный видъ языка. Ненормальный видъ языка. Осмотръ языка

- 1) Воспаленіе языка 174
2. Язвы языка 175

III. Болѣзни слизистой оболочки рта 175

1. Воспаленіе или катарръ слизи-

стой оболочки рта (Стоматитъ)

2. Афты
3. Плѣсневка. Грибковая образванія во рту
4. Гнилость рта и Гангрена щеки или нома

IV. Болѣзни слюнныхъ железъ

1. Слюнотеченіе
2. Свинка (Заушница. Паротитъ)
3. Лягушечья опухоль. Ранула
4. Воспаленіе подчелюстныхъ железъ и подъязычной кѣтчатъ (Ангина Людовици)

V. Дурной запахъ изъ рта и немощности влуса

VI. Болѣзни зубовъ.

1. Зубная боль
- Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи зубныхъ боли
2. Прорѣзываніе зубовъ и уходъ за зубами
 - Уходъ за зубами

Б. Болѣзни мягкаго нёба (зѣва) и глотки

Предварительныя замѣтки

1. Острая катарральная ангина и жаба
2. Флегмонозная (нарывная) ангина
3. Воспаленіе миндалевидныхъ железъ (тонзиллитъ или жаба миндалинъ)

Лѣченіе острыхъ воспаленій мягкаго нёба (ангинъ, жаба)

4. Хроническій катарръ мягкаго нёба (хроническая жаба)
5. Хроническое воспаленіе миндалинъ
6. Гипертрофія миндалинъ

Лѣченіе хроническаго катарра мягкаго нёба и глотки

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи хроническихъ пораженій мягкаго нёба и глотки

Б. Болѣзни пищевода, желудка и кишечника

I. Болѣзни пищевода

1. Воспаленіе пищевода
2. Суженіе пищевода

II. Болѣзни желудка

Предварительныя замѣтки

желудочные симптомы	205	Г. Болѣзни печени, селезенки и поджелудочной железы	266—281
стройство аппетита	205	Предварительныя замѣтки	266
шнота и рвота	206	1. Желтуха	267
рыжка, изжога, вздутие желудка	207	2. Желчные камни. Желчная колика	266
ажда	208	3. Набуханіе (Гиперемія) печени	271
ль подъ ложечкой	209	4. Острое воспаленіе печени	273
альгія или нервная боль	209	5. Хроническое воспаленіе печени	273
ика	211	Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи хроническаго воспаленія печени и хроническихъ ея болѣзней	277
поя. Несвареніе	211	6. Ракъ печени	279
рвная диспепсія	211	7. Воспаленіе селезенки	280
арческая диспепсія	211	8. Болѣзни поджелудочной железы	281
й катарръ желудка	211	ОТДѢЛЪ ШЕСТОЙ. Глистные болѣзни	281—294
ческой катарръ желудка	213	I. Ленточные глисты	282
спомогательныя мѣры при		II. Круглые глисты	289
ическомъ катарръ желудка	217	1. Аскарида крупная или струнецъ обыкновенный. (Ascaris lumbricoides)	289
ая язва желудка	219	2. Мелкая аскарида, острица. (Oxyuris vermicularis)	291
теченіе изъ желудка. Кро-		3. Трихина	293
рвота	222	III. Эхинококкъ печени	294
желудка	225	ОТДѢЛЪ СЕДЬМОЙ. Болѣзни дыха-	295—360
реніе желудка	226	Предварительныя замѣтки	295
и кишекъ	228	А. Болѣзни носа и носоглотки	297—308
ельныя замѣтки	228	1. Насморкъ. Катарръ носа и носоглотки	297
ьные кишечные симпто-	229	Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи хроническаго катарра носа и носоглотки	300
поръ	229	2. Суженіе и закрытіе носовой полости. Полипы носа	302
носъ	231	3. Кровотеченіе изъ носа	304
ль живота	233	Предварительное поясненіе къ нижеслѣдующимъ болѣзнямъ дыхательныхъ органовъ (под-отдѣлы: Б, В, Г, Д)	306
истика главнѣйшихъ лѣ-		Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи охриплости, безголосья, кашля и проч.	306
въ въ отношеніи боли	234		
а	234		
дутіе живота газами. Пу-			
ніе живота. Вѣтрная ко-	236		
жа	236		
ая боль кишекъ. Энтераль-	237		
олика	237		
пеніе или катарръ ки-	237		
.	237		
поръ причинъ и симпто-	238		
катарра кишекъ	238		
спаленіе или катарръ тон-	241		
ой кишки	241		
спаленіе или катарръ тол-	242		
й кишки	242		
спаленіе слѣпой кишки и			
овообразнаго отростка.			
ифлитъ и Аппендицитъ).	245		
спаленіе прямой кишки.	249		
роктитъ)	249		
еніе прямой кишки	251		
кишекъ	253		
кишекъ	254		
ное кровотеченіе	255		
ой. Почечуй	256		
іе кишечнаго канала	262		
.	264		

Б. Болѣзни гортани 309—320

1. Катарръ гортани. Ларингитъ 309
 - а) Острый катарръ гортани 309
 - б) Хроническій катарръ гортани 311
2. Крупъ (Перепопчатая жаба гортани) 315
3. Отекъ гортани 317
4. Туберкулезъ гортани. Гортанная (Горловая) чахотка 318
5. Опухоли гортани 319
6. Неврозы гортани 319

В. Болѣзни дыхательнаго горла и бронховъ 320—334

1. Катарръ дыхательнаго горла и бронховъ 320—334
 - а) Острый катарръ дыхательнаго горла и бронховъ 320
 - б) Хроническій катарръ дыхательнаго горла и бронховъ, хроническій бронхитъ 323

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи хроническихъ формъ бронхита 326

2. Гриппъ. Инфлуэнца 330
3. Конклюшъ 332

Г. Болѣзни легкихъ 335—357

1. Приливъ крови къ легкимъ. Гиперемія легкихъ 335
2. Кровотечение изъ легкихъ. Кровохарканіе 336
3. Воспален. легкихъ. Пневмонія 338—343
 - а) Катарральное воспаленіе легкихъ 338
 - б) Крупозное воспаленіе легкихъ 339
4. Эмфизема легкихъ. Расширеніе легкихъ 343
5. Астма. Спазмъ легкихъ см. стр. 138.
6. Легочная чахотка. Туберкулезъ легкихъ 346—357

Д. Болѣзни плевры 357—361

1. Воспаленіе плевры. (Плевритъ) 357
2. Водянка груди. (Гидротораксъ) 359
3. Пневмотораксъ 360

Добавленіе къ седьмому отдѣлу:

Болѣзни и щитовидной и зобной железы 361—364

1. Воспаленіе щитовидной и зобной железы 362

2. Зобъ. (Обыкновенный)
 3. Зобъ Базедовскій, Базедов болѣзнь
- Болѣзни грудныхъ (молочныхъ) жлезъ. См. стр. 445.

ОТДѢЛЪ ВОСЬМОЙ. Болѣзни сердца и сосудовъ

Предварительныя замѣтки

А. Болѣзни сердца

1. Воспаленіе сердца
- Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи сердечныхъ болѣзней вообще
2. Гипертрофія и расширеніе сердца
 3. Ожирѣніе сердца
 4. Пороки сердца
 5. Водянка сердца
 6. Нервное сердцебіеніе. Пальпитация сердца
 7. Спазмъ сердца. Грудная жаба см. стр. 137.

Б. Болѣзни артерій и венъ**I. Болѣзни артерій:**

1. Острое воспаленіе артерій. Атеритъ
2. Хроническое воспаленіе артерій. Атероматозъ артерій. Атеросклерозъ
3. Расширеніе артерій. Аневризмъ
4. Закупорка артерій. Эмболія Тромбъ

II. Болѣзни венъ:

1. Воспаленіе венъ. Флебитъ
2. Флегмазія альба доленсъ
3. Расширеніе венъ. Варикозъ

В. Болѣзни лимфатическихъ сосудовъ и лимфатическихъ железъ:

1. Воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ
2. Воспаленіе лимфатическихъ железъ

ОТДѢЛЪ ДЕВЯТЫЙ. Болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ

Предварительныя замѣтки

I. Болѣзни почекъ

1. Острое воспаленіе почекъ (Острый нефритъ)

ическое воспаление лег-	400
нка. Отеки	401
авая моча	402
чая колика. Почечные	403
и	403
рное мочеизнурение см. въ	
10-мъ,	
сонова (бронзовая) бо-	404
ь	404
бъзни мочевого пу-	404
я	404
ый катарръ мочевого пу-	404
и	404
ическій катарръ мочевого	406
ря	406
и мочевого пузыря	407
отеченіе изъ мочевого пу-	407
и	407
ничъ мочевого пузыря . .	407
бога мочевого пузыря . .	407
бжаніе мочи у дѣтей . . .	408
бъзни женскихъ поло-	
въ органовъ	409—436
ительныя замѣтки	409
груація и ея неправиль-	
ч	411
меноррея	413
аточныя кровотечения . .	414
енструальная колика . . .	415
альгія матки (Гистераль-	
нервная боль матки) . . .	417
аленіе слизистой оболочки	
и. (Катарръ матки. Эндо-	
итъ. Маточныя бѣли . . .	417
аленіе мышечной ткани	
и (Метритъ)	421
етритъ и параметритъ . .	424
ивильное положеніе, искри-	
е и опущеніе матки . . .	425
бразованія, опухоли матки	426
леніе яичника (Оофоритъ)	429
и (водянка) яичника . . .	429
бъзни влагалища:	
леніе влагалища. Коллитъ	
Загинитъ	430
зы влагалища, Вагинизмъ,	
оманія и Афродизія . . .	431
ни влагалища, не устраи-	
я лѣкарственнымъ пу-	433
бъзни наружныхъ по-	
ихъ частей у жен-	433—435

Д. Болѣзни грудныхъ же-

1. Воспаленіе грудной железы см. стр. 445.
2. Новообразованія и опухоли грудной железы 435
3. Нервная боль грудной железы (Мастодинія) 436

IV. Болѣзни беременныхъ и роже-

- ницъ 436—456
- Таблица беременности 437
- Гигіена беременности 438

I. Разстройства и болѣз-

- ни беременныхъ 439—443
1. Разстройства пищеваренія у беременныхъ 439
 2. Разстройства мочеотдѣленія у беременныхъ 440
 3. Головная боль у беременныхъ 440
 4. Зубная боль у беременныхъ 441
 5. Расширеніе венъ у беремен-

II. Разстройства и болѣз-

- ни во время и послѣ ро-
- довъ 443
- Діета и уходъ въ первое время по-
- слѣ родовъ 444
- Воспаленіе грудной железы. Груд-
- ница 445

Добавленіе къ этому под-отдѣлу:

- Болѣзни новорожден-
- ныхъ 446—456
- О кормленіи грудью, кормилица,
- искусственное вскармливаніе 448—450
- Мнимая смерть новорожденныхъ 450
- Воспаленіе глазъ у новорожден-
- ныхъ 451
- Желтуха у новорожденныхъ 451
- Опуханіе грудныхъ сосочковъ у но-
- ворожденныхъ 451
- Пупочная грыжа у новорожден-
- ныхъ 452
- Конвульсіи, Родимчикъ у новорож-
- денныхъ см. стр. 129.
- Судорожное сжатіе челюстей см.
- стр. 133.

Насморкъ у новорожденныхъ	452
Кашель "	452
Икота "	453
Лихорадка "	453
Рвота "	453
Запоръ "	454
Поносъ "	454

Быпадение заднепроходной кишки у новорожденныхъ см стр. 251.	
Разстройство мочеиспускания у новорожденныхъ	455
Обопрѣлость у новорожденныхъ	455
Приращеніе языка у новорожденныхъ	456
Опухоль на головѣ у новорожденныхъ	456

V. Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ 457—478

1 Перелой (трипперъ, гоноррея)	458
Осложненія триппера	461
Характеристика лѣкарствъ въ отношеніи конституціональнаго триппера	462
2. Мягкій шанкръ	464
3. Твердый шанкръ. Сифилисъ	466
4. Наслѣдственный (врожденный) сифилисъ	471
5. Незверическія болѣзни предстательной железы, яичекъ, и сѣменного канатика	473
6. Половыя разстройства у мужчинъ:	
Поллюціи. Онанизмъ	474
Импотенція. Половое слабо-силіе	477

ОТДѢЛЪ ДЕСЯТЫЙ. Болѣзни крови и лимф. 478—510

Предварительныя замѣтки 478

I. Болѣзни крови и крове-творящихъ органовъ 480—490

1. Малокровіе и блѣдная немочь (Анемія и Хлорозъ)	480
2. Кровоточивость. Гемофилія.	482
3. Кровепягистая болѣзнь Верлгофа	483
4. Цынга. Скорбутъ	484
5. Раковая болѣзнь	485
6. Способы лѣченія раковыхъ новообразованій	486
Характерист. главнѣйш. лѣкарствъ въ отношеніи рака и злокачествен. новообразованій вообще.	489

II. Болѣзни лимфы и обіѣна веществъ 490—510

1. Золотуха	490
-----------------------	-----

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи золотухи

2. Туберкулезъ. Бугорчатка
3. Проказа. Лепра
4. Волчанка. Лупусъ
5. Тучность. Ожирѣніе
6. Худощавость
7. Сахарная болѣзнь. Диабетъ сахарный
8. Англійская болѣзнь. Рахитъ
9. Размягченіе костей. Остеомалія
10. Артритъ. Ломотная болѣзнь. Подагра (мочекислый діатезъ)

ОТДѢЛЪ ОДИННАДЦАТЫЙ. Болѣзни суставовъ, костей и мышцъ

I. Болѣзни суставовъ:

1. Воспаленіе суставовъ
 2. Острый суставный ревматизмъ
- Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи остраго ревматизма суставовъ
3. Хроническій ревматизмъ суставовъ

II. Воспаленіе костей:

1. Воспаленіе надкостницы. Періоститъ
 2. Воспаленіе костнаго мозга. Стомелитъ
- Лѣченіе острыхъ воспаленій костей и надкостницы
3. Хроническое воспаленіе костей
 4. Туберкулезъ костей и суставовъ

III. Болѣзни мышцъ:

1. Мышечный ревматизмъ
2. Воспаленіе мышцъ
3. Атрофія мышцъ
4. Ожирѣніе или ложная гипертрофія мышцъ
5. Судороги и параличи мышцъ (см. стр. 125—140).

III. Болѣзни сухожильй, сухожильныя влагалища и слизистыхъ сумокъ

ОТДѢЛЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ. Болѣзни кожи

Характеристика ряда лѣкарствъ въ отношеніи болѣзней кожи

I Болѣзни верхней кожицы (эпидермиса):

1. Мозоли и ороговѣлости
2. Бородавки
3. Рыбная чешуя (ихтиозъ)

и			
• бевидный лишай (Питириазъ)	543	3. Парша (Фавусъ)	571
• нночные пятна (Питириазистъ)		4. Стригущий лишай, Кольцевъ	
• аиколоръ)	543	(Герпесъ тонзурансъ)	572
• чичатый лишай (Псоріазъ)	543		
• рзлость, ободранность (Ин-		VI. Кожные язвы	573
• рриго)	544		
• звы, ссадины, трещины	545	VII. Ожоги и отмороженія:	
• ентные пятна:		Ожоги	574
• Веснушки	545	Отмороженія	575
• Хлоазма:			
• а) Хлоазма маточная	546	VIII. Ненормальности со стороны жи-	
• б) Хлоазма кахектическая	546	ровых и потовых железокъ кожи:	
и ногтей:		1. Сальность кожи. Себоррея	576
• рсть, утолщенность, лом-		2. Жесткая кожа	578
• з ногтей	546	3. Потливость	580
• з	546	4. Сухая кожа	581
• ни волосъ:		IX. Кровотечение изъ наружныхъ ранъ	581
• е волосъ	547		
• еменное сѣдѣніе волосъ	547	ОТДѢЛЪ ТРИНАДЦАТЫЙ. Болѣзни	
• з	547	глазъ и ушей.	
• ни болѣе глубокихъ слоевъ		I. Болѣзни глазъ.	
• т:		I. Болѣзни вѣкъ:	
• гистое воспаленіе кожи	548	1. Воспаленіе кожи вѣкъ	583
• нное воспаленіе кожи:		а. Воспаленіе свободнаго края	
• новенный вередъ (Фурункулъ)	549	вѣкъ. Влефаритъ	584
• ункулъ	550	б. Ячмень или Песыакъ	585
• мона	550	2. Опухоли вѣкъ	585
• цоны	551	3. Паразиты на вѣкахъ	586
• (Красные угри. Прыщи).	552	4. Нервные разстройства вѣкъ:	
• чеватость бороды (Сикозъ).	554	а) Судорога вѣкъ	586
• окрасная угрватость	556	б) Параличъ вѣкъ	586
• зуха (Пруриго)	557	5. Заворотъ вѣкъ (Энтропіонъ)	586
• зковый лишай (Лихенъ)	558	6. Выворотъ вѣкъ (Эктропіонъ)	587
• ный зудъ кожи (Пруритъ).	559		
• авница (Уртикарія)	560	II. Болѣзни слезнаго аппарата:	
• рія (Потница)	562	1. Воспаленіе слезной железы (Да-	
• рьчатый лишай (Герпесъ):		кріоаденитъ)	588
• Лихорадочный или лицевой		2. Болѣзни слезопроводящихъ путей:	
• (губной) лишай (см. стр. 170)		1. Болѣзни слезныхъ каналъ-	
• Половой лихайд	562	цевъ	588
• Кольцевидный лишай	563	2. Воспаленіе слезнаго мѣшка	
• Опоясывающій лихайд (Гер-		и носового канала (Дакріо-	
• пельсъ Цостеръ)	563	циститъ)	589
• зущій лишай (Экзема)	565		
• зья формы экземы:		III Болѣзни соединительной (слизистой)	
• ическая экзема	566	оболочки глазъ (Конъюнктивиты):	
• ма головы	567	1. Гиперемія конъюнктивы	590
• ма лица. Молочная короста	567	2. Катарральное воспаленіе конъ-	
• ма голени	567	юнктивы	591
• ни лѣченія при экземѣ	568	3. Гнойное воспаленіе (Бленоррея).	592
• тныя пораженія кожи:		4. Трахома	593
• ка (Скабіесъ)	570	Лѣченіе воспаленій слизистой обо-	
• ость (Фтириазъ)	571	лочка глазъ, трахомы пр.	594

V. Болѣзни роговицы и внутреннихъ частей глаза:

Воспаленіе роговой оболочки (Кератитъ)	598
Страфилома	599
Катаракта	599
Зеленая вода. Глаукома	600
Темная вода. Амблиопія и Амаврозъ	601

II. Ушные болѣзни:

Ушная боль	603
Ушная течь	603
Шумъ и звонъ въ ушахъ. Ту-гошь слуха	604

ОТДѢЛЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. Отравленія:

Общее о ядахъ и противоядіяхъ	605
Животные яды	607
Распознаваніе отравленій	607

Общее лѣченіе отравленій, Противоя

1. Механическое лѣченіе
2. Антидотное лѣченіе:
 - а) Химическія противоядія
 - б) Физиологическія проти-
ядія
- О гомеопатическихъ антидотахъ
3. Симптоматическое лѣченіе от-
равленій

Отравленія въ отдѣльности:

Отравленіе угарнымъ газомъ (уга- " опіемъ или морфіемъ " кокаиномъ " мышьякомъ " ртутью " спиртомъ см. стр. 169 " кислотами " " 609 " щелочами " " " " колбаснымъ ядомъ . " рыбнымъ ядомъ . . " испорченными грибами	
--	--

**Часть третья. Общая основы діэты и способы примѣненій
вспомогательныхъ мѣръ**

Содержаніе третьей части см. на стр. 618-ой.

**Часть четвертая. Краткое гомеопатическое лѣкарство-
вѣдѣніе**

Содержаніе лѣкарствовѣдѣнія см. на стр. 662—664.

Замѣченныя опечатки и упущенія:

Стран.:	Строка:	Напечатано:	Должно быть:
16	20 сверху	рствора	раствора
22	25 "	и злученіе	излучение
36	2 "	ХЗ	З
39	въ спискѣ лѣкарствъ подѣ № 110	должно быть	не Дигиталисъ, а Діоскореа
40	" "	" "	№ 152 должно быть не Діоскореа, а Даміана
48	8 снизу	всяго	всякаго
52	6 "	18—21	35—39
78	19 "	пятый II	пятый Б.
133	10 сверху	челючстей	челюстей
188	5 снизу	12. Прорѣзываніе	Прорѣзываніе
233	22 "	подѣ 3)	подѣ 2)
249	3 снизу	клочкова то	клочковой
256	1 сверху	за	замѣ-
256	2 "	пе ерерождение	перерождение
261	7 "	прямая	прямая
261	3 "	подкислить	подкислить, наприм., яблоч- нымъ или клюквеннымъ сокомъ.
266	1 снизу	Роль этой железы	Роль патологическая этой железы
269	3 "	желчной	желчной
271	21 сверху	$1/10^0$	$1/100$
283	10 "	шириною	длиною
299	4 "	напоминающій	напоминающее
322	5 снизу	ножноподмышковыя	ножноподмышковая,
325	6 "	ея	ихъ
335	4 сверху	Эморизема	Эмфизема
347	14—15 "	яркокрасной каемкой	яркокрасная каемка
362	16 "	перепоясывающую	перепоясывающая
367	3 сверху	изъ	ихъ
395	1 "	1005—1030	1,005—1,030
"	2 "	1002	1,002
"	3 "	1040	1,040
"	6—7 снизу	не измѣняются въ цвѣтѣ	не измѣняются рѣзко въ цвѣтѣ
397	13 и 12 "	вслѣдствіе слизистой обо- лочки.	вслѣдствіе ненормальности слизистой оболочки
398	14 "	на нервную систему	на нервной системѣ
"	15 "	неукротимая	неукротимая
402	3 "	живота	живота)
408	7 "	еще,	еще:
409	19 "	Фаллотіевы	Фаллопьевы
410	6 "	преддверіи	преддверіи

Стр .:	Строка:	Напечатано:	Должно быть:
413	11 сверху	причина	причиною
457	2 "	сперма)	сперму)
462	14 "	к а н д и л о м ы	к о н д и л о м ы
466	10 "	желѣзь	железь
474	5 сверху	но, главнымъ образомъ, питание нервно-мозговой ткани.	но и служить особеннымъ образомъ для цѣлей пита- нія нервно-мозговой ткани.
481	8 "	отмѣтить	считать
486	19 "	пожилого	пожилого и
"	21 "	что заболѣвающие ракомъ въ молодости своей непе- реносили и т. д.	что тѣ, которые заболѣ- ваютъ ракомъ, въ моло- дости своей не перено- сили и т. д.
495	11 "	миллиметра	тысячныхъ миллиметра
496	24 снизу	репортѣ	ретортѣ
515	15 "	разгоряченнаго	разгоряченнаго
522	9 сверху	костнаго мозга	костнаго мозга и над- костницы
525	7—8 снизу	заклѣчается въ не удержи- момъ утолщеніи и уплот- неніи	сводится къ не удержи- мому утолщенію и уплот- ненію
525	5 "	глазницы	глазницъ
530	5 "	повязки;	повязки, именно на ко- нечности;
554	16 "	тукъ	туть
558	1 снизу	жара	лучистаго жара
"	12 "	Бугоровый	Бугорковый
560	18 "	<i>Мерзерумъ</i>	<i>Мезереумъ</i>
567	7 "	красно	красной и
590	2 сверху	(Конъюнктивы).	(Конъюнктивиты).
603	4, 1 "	Внутреннее	Среднее
607	3 снизу	вещества	веществъ
609	5 "	сѣрное	сѣрнистое
619	2 "	желѣзой	железой
622	въ таблицѣ	углероды	углеводы
"	тамъ-же	ржаного и пшеничнаго	ржаного или пшеничнaго
637	въ нумераціи абзацовъ	3) 4) 5) 6)	2) 3) 4) 5)
658	15 "	въ бокъ	въ бока
662	1 "	№ 35	стр. 798,
666	8 "	явления	дѣленія
675	4 сверху	разультатъ	результатѣ
677	4 "	предпотительны	предпочтителъны
"	10 снизу	лица	лица
691	22 "	сюрма	сурьма
693	3—4 сверху	опуханъ и разростаній	опуханіяхъ и разростаніяхъ
"	6 "	Длительныя	Длительность
"	13 снизу	недѣль	недѣль
799	8 "	194	550

въ поясненіе нѣкоторыхъ обозначеніи, встрѣчающихся въ этой книгѣ, приводятся нижеслѣдующія сопоставленія:

10% —то же, что 1 : 100 или 1 на 100, 1 часть на 100 частей;

10‰ „ „ „ 1 : 1000 „ 1 „ 1000, 1 „ „ 1000

наприм.: 1 часть какого нибудь лѣкарственнаго вещества на 100 или на 1000 частей воды.

Сравненіе стараго и новаго аптекарскаго вѣса

1 фунтъ—то же, что 12 унцій, или 96 драхмъ, или 288 скрупулъ, или 5760 гранъ, или 360 граммъ.

1 унція,	„	8	„	„	24	скрупула,	или	480	„	„	30
		1	драхма,	„	3	„	„	60	„	„	3,75 ($3\frac{3}{4}$)
					1	скрупуль	„	20	„	„	1,25 ($1\frac{1}{4}$)
								1	„	„	0,06 ($\frac{6}{100}$)

$\frac{6}{100}$ грамма—то же, что 6 сантиграммъ или 1 гранъ, или 0,06 грамма

$\frac{1}{100}$ „ „ „ 1 „ „ „ $\frac{1}{6}$ грана, „ 0,01 „

$\frac{1}{10}$ „ „ „ 1 дециграммъ „ $\frac{1}{10}$ „ „ 0,01 „

$\frac{1}{1000}$ „ „ „ 1 миллиграммъ „ $\frac{1}{60}$ „ „ 0,001 „

1 драхма равняется приблизительно 1 золотнику по вѣсу или 1 чайной ложкѣ по ёмкости.

1 унція „ „ 8 золотникамъ „ „ 2 столовымъ ложкамъ „

6 унцій „ „ $\frac{1}{2}$ фунта „ „ „ 1 чайн. стакану „

1 литръ вмѣщаетъ 1 килограммъ или 1000 граммъ или около $2\frac{1}{2}$ фунтовъ воды.

1 миллиметр—то же, что одна тысячная часть ($\frac{1}{1000}$) метра.

1 сантиметръ „ „ „ сотая „ ($\frac{1}{100}$) „

1 метръ равняется 22,51 вершка, т. е. около $12\frac{1}{5}$ аршина

1 капля воды или воднаго раствора равняется приблизительно 1 грану по вѣсу.

2 капли спирта или спиртнаго раствора равняются приблизительно 1 каплѣ воды или воднаго раствора по вѣсу; такимъ образомъ, одной драхмѣ по вѣсу соответствуютъ: 60 капель воды или около 120 капель спирта.

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ЛѢЧЕБНИКЪ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Введеніе въ область гомеопатическаго лѣченія.

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

дисловіе.

знѣйшіе моменты изъ жизни основателя гомеопатіи.

за I-я. Приготовленіе гомеопатическихъ лѣкарствъ.

II-я. Опредѣленіе понятія „гомеопатія“ и основныя правила гомеопатическаго лѣченія.

III-я. Правила дозировки и способы приемовъ гомеопатическихъ лѣкарствъ въ болѣзняхъ. Правила приемовъ гомеопатическихъ лѣкарствъ.

IV-я. О выборѣ лѣкарствъ и о продолжительности ихъ примѣненія.

V-я. Практическія указанія для составленія домашней гомеопатической аптечки. Перечень гомеопатическихъ аптекъ, имѣющихся въ Россіи. Составъ домашней гомеопатической аптечки.

VI-я. Лѣкарства въ наружныхъ примѣненіяхъ.

VII-я. Діета и вспомогательныя мѣры при гомеопатическомъ лѣченіи.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Самопомощь въ болѣзняхъ есть одна изъ насущнѣйшихъ потребностей населенія и выражается въ оказываніи себѣ или ближнему лѣчебной помощи въ болѣзни въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ возможности получить таковую отъ врача за отсутствіемъ ли такового вообще или въ данное время, или за отсутствіемъ, по какой-либо причинѣ, самой возможности обратиться къ нему.

Для примѣра можно представить себѣ хотя бы глухую мѣстность въ провинціи, отдаленную отъ всякихъ врачей и даже фельдшеровъ,—село, деревню, хуторъ,—и тамъ случай какого-либо остраго заболѣванія, да еще въ зимнюю пору, въ вьюгу и метель, или въ весеннюю или осеннюю распутицу; или, даже при прочихъ *благопріятныхъ условіяхъ, отсутствіе изъ дому врача или фельдшера и т. п.*; или продолженіе, а то и ухудшеніе въ ходѣ болѣзни, уже послѣ оказаннаго тѣмъ или другимъ медицинскаго пособія, и трудность или невозможность получить таковое опять въ достаточно скоромъ времени, и проч., и проч.; мало-ли можно себѣ представить вполнѣ возможныхъ препятствій къ полученію своевременной медицинской помощи, и не только въ глухихъ мѣстностяхъ, но и тамъ, гдѣ близко имѣются и врачи и аптеки.

Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ умѣлая самопомощь въ болѣзняхъ является несомнѣнно крайне важной для населенія.

Само собою разумѣется, что предѣлы, въ какихъ возможна самопомощь въ болѣзняхъ, довольно ограничены. Такъ, самопомощь затруднительна въ случаяхъ съ невыясненнымъ діагнозомъ болѣзни, также въ случаяхъ, особенно тяжело протекающихъ; она невозможна въ болѣзняхъ, неизбѣжно требующихъ помощи спеціалиста-врача (хирурга, акушера и проч.). Но въ такихъ случаяхъ много значитъ хотя бы ужъ то, что окружающіе больного имѣютъ представленіе о томъ, какая помощь должна, но ими не можетъ, быть оказана; и если еще допустить, что при этомъ, до полученія врачебной помощи, они имѣютъ какое-либо безвредное

средство и умѣють примѣнить его съ пользой къ больному, то что можно имѣть противъ самопомощи въ болѣзняхъ хотя бы и въ такихъ трудныхъ случаяхъ.

Самопомощь въ болѣзняхъ настолько естественна и прямо неизбѣжна, что потребностью въ ней объясняется существующая испоконъ вѣка „народная медицина“, также знахарство. Она настолько естественна и неизбѣжна, что въ виду уродливостей, встрѣчаемыхъ въ „народной медицинѣ“ и сплошного вреда отъ знахарскаго лѣченія, врачи всегда и всюду заботились и заботятся о возможно большей популяризаціи медицины, о томъ, чтобы научить народъ пользоваться въ болѣзняхъ не своими, въ большинствѣ случаевъ негодными средствами, а научнообоснованными способами лѣченія, насколько это доступно его пониманію и умѣнію.

Отсюда произошли популярныя медицинскіе журналы и лѣчебники, издававшіеся и издающіеся для народа врачами.

Вопросъ только въ томъ, какой способъ лѣченія предпочтителенъ для самопомощи въ болѣзняхъ, аллопатическій или гомеопатическій?

Даже не входя въ оцѣнку степени дѣйствительности въ болѣзняхъ того и другого способа лѣченія, можно во всякомъ случаѣ съ положительностью утверждать, что первый, аллопатическій, способъ съ его лѣкарствами, примѣняемыми въ сравнительно очень крупныхъ дозахъ, лѣкарствами при томъ же въ большемъ числѣ сильнодѣйствующими, ядовитыми, можетъ легко стать въ рукахъ не-врачей весьма опаснымъ орудіемъ борьбы противъ болѣзней. Гомеопатическій же способъ лѣченія производится лѣкарствами, примѣняемыми, какъ всѣмъ извѣстно, сплошь и безъ сравненія въ очень малыхъ дозахъ, столь малыхъ, что о вредѣ ихъ не можетъ быть и рѣчи. Правда, и въ гомеопатіи примѣняются между прочимъ лѣкарства, которыя, *по названію* своему, относятся къ сильнодѣйствующимъ или ядамъ, какъ, напримѣръ, *Арсеник*. (мышьякъ), *Меркурій* (ртуть) и другія, но надо помнить, что въ тѣхъ необычайно малыхъ дозахъ, въ какихъ они примѣняются для лѣченія, въ разведеніяхъ,

напримѣръ, 1 на миллионъ, билліонъ и еще болѣе слабыхъ, что въ такихъ разведеніяхъ веществъ, хотя бы они сами по себѣ и ядовиты были, нѣтъ никакого основанія предполагать хотя бы малѣйшее ядовитое дѣйствіе. Такого дѣйствія не то что опасаться, но и ожидать нельзя отъ какого бы то ни было лѣкарства въ гомеопатическихъ дозахъ.

На это, однако, можно часто слышать такое возраженіе: разъ, молъ, лѣкарство не можетъ повредить, какъ же оно можетъ принести пользу? Этимъ хотятъ сказать, что гомеопатическія лѣкарства безвредны, но вмѣстѣ съ тѣмъ и бесполезны?

Такъ ли это?

Теоретическій отвѣтъ на этотъ вопросъ читатель найдетъ въ первой части этой книги, въ краткомъ и сжатомъ, но достаточно подробномъ изложеніи. Практически же онъ можетъ убѣдиться въ громадной пользѣ гомеопатическаго лѣченія и несомнѣнномъ его превосходствѣ надъ аллопатическимъ, если приступитъ къ испытанію гомеопатическихъ лѣкарствъ въ подходящихъ случаяхъ болѣзней.

Этимъ не сказано, что нѣтъ того случая, гдѣ бы гомеопатическое лѣченіе не оправдало возлагаемой на него надежды. Случаи такіе несомнѣнно встрѣчаются, особенно—въ практикѣ не-врачей, тѣмъ болѣе—начинающихъ. Это—такіе случаи болѣзней, которые безнадёжны по своей ли сущности, или по запущенности, или которые мало или вообще не подходятъ для лѣкарственнаго лѣченія. Такіе случаи, впрочемъ, сравнительно рѣдки и въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ книги указываются. Въ громадномъ же большинствѣ случаевъ превосходство гомеопатическаго лѣченія надъ всякими другими способами является несомнѣннымъ, въ качествѣ же способа самопомощи въ болѣзняхъ въ полномъ смыслѣ слова незамѣнимымъ.

И дѣйствительно, насколько велика потребность провинціи въ самопомощи гомеопатическими лѣкарствами, доказываютъ поступающія оттуда ежедневно въ гомеопатическія аптеки, какъ столичныя, такъ и другихъ большихъ городовъ, многочисленныя требо-

ванія о высылкѣ гомеопатическихъ лѣкарствъ, также книгъ и заочныхъ совѣтовъ по лѣченію болѣзней.

Трудно назвать такое мѣсто въ Россіи, откуда бы такія требованія не поступали; они получаются даже изъ самыхъ глухихъ и отдаленныхъ мѣстъ Имперіи.

Этотъ не прерывающійся и все болѣе ушिरяющійся потокъ требованій изъ провинціи полонъ стона о безпомощности населенія въ надлежащемъ лѣченіи рядомъ съ восторженными восхваленіями благодѣтельнаго гомеопатическаго лѣченія.

Потребность провинціи въ гомеопатическомъ лѣченіи необычайно велика, а врачей гомеопатовъ тамъ очень мало, мало поэтому тамъ и гомеопатическихъ аптекъ; врачи же аллопаты продолжаютъ упорно закрывать глаза на эту насущную потребность населенія, не давая себѣ даже труда хотя бы ознакомиться, какъ слѣдуетъ, безпристрастно, съ гомеопатическимъ способомъ лѣченія и испытать его въ своей практикѣ; наоборотъ, многіе изъ нихъ въ подходящихъ случаяхъ выступаютъ съ глумленіями надъ гомеопатіей, которую знаютъ лишь по наслышкѣ, даже и не подозревая при этомъ, до какой степени неосновательными представляются ихъ сужденія о гомеопатіи тѣмъ изъ публики, которые уже успѣли убѣдиться въ благотворности этого способа лѣченія. Усилія аллопатовъ въ этомъ направленіи и въ такихъ случаяхъ совершенно тщетны, подчасъ и жалки...

Еще нѣсколько словъ относительно характера настоящаго „Руководства къ самопомощи въ болѣзняхъ“.

Книга эта является *вмѣсто* втораго изданія моего „Полнаго Практическаго Лѣчебника“, изданнаго 10 лѣтъ тому назадъ, т. е. этотъ „Полный Практическій Лѣчебникъ“ переработанъ мною совершенно заново, въ совершенно другомъ родѣ, и лишь немного изъ него вошло въ настоящую книгу, которая гораздо полнѣе и подробнѣе составлена.

Планъ, по которому составлено это „Руководство къ самопомощи“, виденъ изъ „Оглавленія“ его содержанія, цѣль же моя была та, чтобы способствовать этой книгой дѣйствительному осуществленію идеи самопомощи въ болѣзняхъ въ сколь возможно большей мѣрѣ.

Для достиженія этой цѣли я счелъ, между прочимъ, нужнымъ:

1) технически такъ размѣстить весь матеріалъ книги, чтобы читатель могъ въ ней легко и быстро разбираться; этому способствуютъ и „боковики“ на поляхъ текста, также „содержаніе“ передъ каждымъ изъ большихъ отдѣловъ и подробные указатели—порядковый и алфавитный, не говоря о нѣкоторыхъ другихъ болѣе мелкихъ техническихъ деталяхъ;

2) изложить подробно практическія руководящія правила, какія необходимо знать каждому, желающему лѣчиться гомеопатическими лѣкарствами, но почему-либо не имѣющему возможности пользоваться вообще или своевременно указаніями врача-гомеопата;

3) исключить финелловскій способъ лѣченія сложными гомеопатическими средствами, также средства д-ра Шюслера, какъ отдѣльный способъ лѣченія. Это сдѣлано мною потому, что, какъ я убѣдился въ послѣдніе годы, нецѣлесообразно предлагать въ книгѣ для публики, большей частью мало или вовсе незнакомой съ гомеопатіей, *три способа* примѣненія послѣдней, какъ это сдѣлано было мною въ „Полномъ Практическомъ Лѣчебникѣ“, и ей самой предоставлять выборъ того или другого способа. Цѣлесообразнѣе дать *одинъ* способъ лѣченія, но за то настолько подробно и обстоятельно изложенный, насколько только это возможно для домашняго руководства. Обычный же гомеопатическій способъ я предпочитаю остальнымъ двумъ въ громадномъ большинствѣ болѣзненныхъ случаевъ при условіи единовременнаго примѣненія, *въ случаѣ надобности*, двухъ или нѣсколькихъ лѣкарствъ.

Въ виду такихъ часто встрѣчающихся случаевъ болѣзней я ввелъ въ книгу нѣкоторыя указанія о *совмѣстимыхъ* и *несовмѣстимыхъ* лѣкарствахъ, также объ антидотахъ, о подобныхъ лѣкарствахъ и дополнительныхъ (въ „Лѣкарствовѣдѣніи“).

Природные способы лѣченія введены въ качествѣ „*вспомогательныхъ мѣръ*“ во 2-й части при лѣченіи отдѣльных болѣзней, въ 3-й же части они подробно описаны.

Главнѣйшіе моменты изъ жизни основателя гомеопатіи.

Болѣе ста лѣтъ прошло съ того времени, какъ безсмертный Ганеманъ возвѣстилъ міру свой способъ лѣченія „подобно-дѣйствующими“ лѣкарствами. Болѣе ста лѣтъ этотъ способъ лѣченія, названный Ганеманомъ гомеопатіей, привлекалъ и до сей поры привлекаетъ миллионы послѣдователей во всѣхъ частяхъ свѣта. Особенно широкаго распространения гомеопатія достигла въ Америкѣ, въ Англии, въ Германіи, и въ числѣ приверженцевъ ея имѣются десятки тысячъ врачей. Заграничная литература по гомеопатіи громадна. Во многихъ городахъ, особенно въ Америкѣ, имѣются уже и вновь возникаютъ лѣчебницы, больницы, аптеки—гомеопатическія... Ганеману въ разныхъ мѣстахъ воздвигнуты памятники. Послѣдній изъ этихъ памятниковъ сооруженъ недавно на кладбищѣ Père-Lachaise въ Парижѣ на очень видномъ мѣстѣ, послѣ торжественнаго перенесенія туда праха Ганемана съ Монмартрскаго кладбища, спустя 57 лѣтъ послѣ его смерти.

Значить, гомеопатія не преходящая „мода“, какъ вотъ уже сто лѣтъ ее окрещиваютъ врачи-аллопаты, все еще не теряющие надежды стереть ее съ лица земли. Тщетная надежда!..

Христіанъ-Фридрихъ-Самуилъ Ганеманъ родился 10 апрѣля 1755 года въ Мейссенѣ и уже съ раннихъ лѣтъ жизни обнаружилъ необычайную одаренность духа. Матеріальныя средства его родителей были очень ограничены, но, благодаря его необыкновеннымъ способностямъ и выдающимся успѣхамъ въ наукахъ, онъ, вопреки обычаю, былъ освобожденъ отъ платы за учение въ средней школѣ, а затѣмъ въ Лейпцигѣ, пробиваясь переводами и уроками, прошелъ и окончилъ блистательно медицинскій факультетъ, защитивъ 20 августа 1779 года свою диссертацию (на степень „доктора-медицины“) „о судорожныхъ болѣзняхъ“.

Врачебная практика, при тогдашнемъ состояніи медицины, очень скоро опротивѣла Ганеману, и онъ замѣнилъ ее несравненно менѣе доходными занятіями по фармаціи и химіи, въ которой, благодаря сдѣланнымъ имъ новымъ открытіямъ, онъ скоро сталъ знаменитымъ, а также переводами.

Въ 1790 году Ганеману впервые пришла мысль испытывать лѣкарственные вещества на здоровыхъ людяхъ, и онъ началъ съ хины, о дѣйстви которой въ то время имѣлись въ наукѣ очень противорѣчивыя свѣдѣнія, и испыталъ это средство на самомъ себѣ, принимая его въ большихъ дозахъ. Результатомъ испытанія явилось болѣзненное состояніе, очень похожее на перемежающуюся лихорадку, на ту, значить, болѣзнь которую это же средство въ извѣстныхъ случаяхъ излѣчиваетъ. Дальнѣйшія испытанія хины, какъ и другихъ лѣкарственныхъ веществъ, и не только на немъ самомъ, но и на другихъ здоровыхъ людяхъ, равно какъ данныя, какія Ганеманъ могъ найти по заинтересовавшему его вопросу въ медицинской литературѣ старыхъ временъ, все болѣе убѣждали его въ существованіи законосообразнаго соотношенія между лѣкарственнымъ веществомъ и болѣзнію.

Такимъ образомъ Ганеманомъ открытъ былъ „законъ подобія“, о которомъ подробнѣе сказано въ 2-ой главѣ 1-ой части этой книги.

Ганеманъ не поспѣшилъ, однако, съ обнародованіемъ открытаго имъ закона лѣченія, а прошло у него еще цѣлыхъ шесть лѣтъ упорнаго размышленія и опыта, пока въ 1796 году, въ медицинскомъ журналѣ профессора Гуфеланда, онъ выступилъ скромно, но твердо и съ полною убѣжденностію въ истинности сдѣланнаго имъ открытія. Но лишь немногіе признали правильность возвѣщеннаго Ганеманомъ новаго принципа, да и эти—лишь теоретически, не испытавши на практикѣ. Этотъ холодный приемъ, встрѣченный имъ со стороны ученыхъ коллегъ, не охладилъ нисколько его энергии, его стремленіе къ истинѣ и успѣхи лѣченія влекли его неудержимо впередъ. Ганеманъ отдался опять практикѣ, но уже не съ отвращеніемъ, а наоборотъ съ наслажденіемъ отъ достигавшихся имъ поразительно-благоприятныхъ результатовъ лѣченія, благодаря новому своему способу примѣненія лѣкарствъ.

Слава Ганемана, какъ необычайно искуснаго врача, пошла въ гору, и тогда начались противъ него преслѣдованія со стороны представителей старой медицины. Особенно вознегодовали аптекари, которые не могли примириться съ тѣмъ, что Ганеманъ самъ приготовлялъ для больныхъ свои лѣкарства, — иначе не могло и быть въ то время, — притомъ же ихъ пугала простота и краткость Ганемановыхъ прописей, сулившая имъ, въ лучшемъ случаѣ, гораздо меньше доходовъ, нежели прописывавшіеся тогда длинные рецепты врачей аллопатовъ..

Этими преслѣдованіями и гоненіями объясняются частые переѣзды Ганемана изъ города въ городъ.

Въ 1805 году появились впервые въ печати его „Лѣкарственныя испытанія“ на латинскомъ языкѣ, и вскорѣ затѣмъ объемистый печатный трудъ „Die Heilkunde der Erfahrung“ (опытное лѣчение), въ которомъ въ первый разъ приводится слово „гомеопатія“. Какъ малое обстоятельство вызываетъ иной разъ въ области духа и политики весьма большія послѣдствія, такъ это слово *гомеопатія* спасло новый возвѣщенный Ганеманомъ законъ лѣченія; оно стало знаменемъ для послѣдователей его, а врачи видѣли въ немъ систематическую оппозицію, и чѣмъ болѣе они выступали противъ этой реформы, тѣмъ болѣе способствовали они ея упрощенію и распространенію.

Смѣшное презрѣніе къ слову „гомеопатія“ существуетъ еще до сихъ поръ у противниковъ этого ученія, и извѣстно выраженіе одного именитаго врача-аллопата, д-ра Вагнера въ Лейпцигѣ, который при одномъ случаѣ въ судѣ сказалъ: „Это было вообще дерзостію со стороны Ганемана называть себя гомеопатомъ, а насъ аллопатами“. („Гомеопатія передъ судомъ“ д-ръ Heinigke 1882).

Главнѣйшимъ же сочиненіемъ Ганемана, послужившимъ краеугольнымъ камнемъ его ученія, явился его „Органонъ“ въ 1810 году (имѣется и въ русскомъ переводѣ). Въ этой книгѣ Ганеманъ проповѣдуетъ новый законъ лѣченія съ воодушевленіемъ, какого до тѣхъ поръ врачи и не слыхивали ни отъ кого; громадное большинство изъ нихъ и не выносило этого непривычнаго для ихъ слуха проповѣдническаго тона, и онъ ихъ только раздражалъ. Этому способствовало еще то, что въ своемъ „Органонѣ“ Ганеманъ между прочимъ беспощадно опрокидываетъ старые кумиры медицины, передъ которыми большинство врачей преклонялось, и разрушаетъ ведущій изъ прошедшаго мостъ, прокладывая на мѣсто его новый — свой. Въ этой капитальной книгѣ энтузіазмъ Ганемана достигъ самаго высшаго напряженія, переходящаго мѣстами дѣйствительно въ крайность; но крайность, до степени даже эксцентричности, какъ извѣстно, всегда въ большей или меньшей мѣрѣ свойственна каждому пророку и увлекаетъ его въ сторону отъ главнаго предмета проповѣди.

Противники Ганемана, однако, не понимали, да и не могли понимать того, что до крайностей выраженій они же сами доводили его своими невѣжественными отзывами о его законѣ лѣченія,

не испытывая такого, а лишь отрицая на основаніи ложныхъ и предвзятыхъ соображеній, точь въ точь какъ это дѣлаютъ и понынѣ въ отношеніи гомеопатіи врачи-аллопаты.

Вслѣдствіе такого упорства и враждебнаго отношенія со стороны врачей старой школы Ганеманъ перешелъ съ проповѣдью своего ученія на страницы общей прессы, и этотъ шагъ его былъ также весьма удачнымъ для охраненія его системы лѣченія отъ враждебныхъ нападокъ, обыкновенно очень злостныхъ: своими образцовыми популярными статьями онъ привлекъ вниманіе неврачебной публики къ новому способу лѣченія, восторгъ же послѣдней способствовалъ дальнѣйшему распространенію такого.

Въ то же время Ганеманъ не переставалъ писать и для специалистовъ. Онъ не только писалъ, а старался также и словомъ дѣйствовать на нихъ. Такъ, когда ему не удалось устроить въ Лейпцигѣ клинику, онъ сталъ читать врачамъ лекціи по гомеопатіи и изъ слушателей своихъ составилъ общество для испытанія лѣкарственныхъ веществъ. Результаты этихъ испытаній (62 вновь испытанныхъ средства) изложены въ его шеститомномъ лѣкарствовѣдѣніи, вышедшемъ въ свѣтъ въ теченіе 1811—1819 г.г. Третій большой печатный трудъ Ганемана „*Хроническія болѣзни*“ написанъ имъ въ 1828 — 1830 году. Ганеманъ въ то время, съ 1821 года, жилъ въ Кётенѣ и состоялъ лейбъ-медикомъ герцога Фридриха-Фердинанда.

Съ какимъ благоговѣніемъ относились къ Ганеману его ученики-врачи и, послѣдователи вообще, доказываетъ торжественное празднованіе его докторскаго юбилея 10 авг. 1829 года, когда было основано въ Лейпцигѣ центральное общество гомеопатовъ, и Ганеману, въ числѣ прочихъ подарковъ, предподнесенъ былъ фондъ для устройства лейпцигской гомеопатической клиники, благополучно существующей понынѣ.

На склонѣ своихъ лѣтъ Ганеману пришлось перенести тяжелыя семейныя несчастія: единственный его сынъ, выселившійся изъ Европы, пропалъ безъ вѣсти, а вскорѣ затѣмъ, въ 1830 году, Ганеманъ потерялъ и жену. За то судьба уготовила маститому старцу утѣшеніе въ томъ, что многочисленныя его писанія выходили въ свѣтъ въ повторныхъ изданіяхъ, наплывъ больныхъ къ нему и къ его ученикамъ увеличивался въ громаднхъ размѣрахъ, его гомеопатія все болѣе распространялась. До всего этого дожилъ Ганеманъ. На 80-мъ году своей жизни Ганеманъ переселился въ Парижъ, женившись на одной изъ поклонницъ

его врачебнаго генія, французенкѣ. До какой степени Ганеманъ и во Франціи пользовался уваженіемъ самыхъ разнородныхъ круговъ населенія, доказываетъ отпразднованный здѣсь 60-лѣтній юбилей его врачебной дѣятельности.

Въ 1843 году Ганеманъ скончался на 89 году жизни отъ бронхіальнаго катарра, осложнившагося параличемъ легкихъ.

Такова въ общихъ чертахъ жизнь этого геніальнаго чловѣка, этого реформатора и пророка медицины. Большая часть современниковъ его почитала, потомству же предстоитъ его постигнуть, понять. Поразительное предвидѣніе его духа подтверждается позднѣйшимъ развитіемъ медицины, которая разными окружными путями приходила ко многимъ изъ его ученій и сужденій. Не говоря уже о томъ, что, не будь Ганемана, медицинскія кровопролитія (кровопусканія) и другіе варварскіе способы лѣченія продолжались бы по сію пору, его вліяніе на медицину выразилось во многихъ другихъ еще отношеніяхъ. Такъ, напримѣръ, индивидуализированіе (обособленіе) въ болѣзняхъ; признаніе роли конституціи организма въ здоровомъ и болѣзненномъ состояніи; присущая организму способность самообороны противъ болѣзнетворныхъ агентовъ; гигиена и діететика и проч.; обо всемъ этомъ имѣются въ сочиненіяхъ Ганемана подробныя указанія, которыя только въ позднѣйшее время стали входить въ сознаніе врачебнаго міра. Даже лѣченіемъ модными сыворотками современные врачи обязаны вліянію гомеопатіи, неправильно, впрочемъ, понятой ими, такъ какъ лѣченіе подобнаго подобнымъ не то же самое, что лѣченіе равнаго равнымъ (см. главу 2-ю въ 1-ой части этой книги).

Вотъ почему не только гомеопаты, но и вообще всѣ, кому дороги здоровье и жизнь, должны воздать честь и славу великому генію покойнаго Ганемана, имя котораго можно смѣло поставить въ рядъ величайшихъ мыслителей и реформаторовъ чловѣчества *).

*) Для подробнаго ознакомленія съ жизнію и дѣятельностію Ганемана, какъ и вообще съ исторіей гомеопатіи, можно рекомендовать превосходную и, по своей строгой объективности, образцово составленную книгу д-ра Амеке *„Возникновеніе гомеопатіи и борьба противъ ея распространенія“* (переводъ съ нѣмецкаго, ц. 3 рубля).— Въ частности о *гомеопатіи въ Россіи* трактуетъ книга подъ этимъ заглавіемъ, составленная д-ромъ мед. К. Боянусомъ

ГЛАВА I.

Приготовление гомеопатических лѣкарствъ.

Гомеопатическія лѣкарства готовятся въ видѣ эссенцій, Раз-
тинктуръ, разведеній и растираній, также въ видѣ крупинокъ, лѣ-
пилюль, таблетокъ или пастилокъ, изъ веществъ растительнаго,
минеральнаго и животнаго царства, съ помощью виннаго спирта,
дистиллированной воды и молочнаго сахара. Для наружнаго упо-
требленія гомеопатическія лѣкарства готовятся въ видѣ опо-
дельдоковъ, мазей, супозиторій и проч.

Эссенціи суть соки, выжатые изъ свѣжихъ и сочныхъ растений
и, для лучшаго сохраненія, смѣшанные съ равными частями спирта.

Тинктуры суть настойки высушенныхъ растений на спирту.

Разведенія или разжиженія (лѣкарства въ „капляхъ“) при-
готавливаются изъ эссенцій или тинктуръ или изъ водныхъ раство-
ровъ минеральныхъ веществъ; если послѣднія нерастворимы въ
водѣ, то они подвергаются предварительному растиранію съ мо-
лочнымъ сахаромъ.

Растиранія („порошки“) готовятся изъ нераствори-
мыхъ или трудно-растворимыхъ веществъ (металловъ, минераловъ,
животныхъ веществъ) съ помощью молочнаго сахара. Къ такимъ
веществамъ относятся, напримѣръ, мѣлъ (калькареа карбоника),
кремень (силиція), уголь (карбо), плаунное сѣмя (ликоподій) и проч.

Крупинки или шарики, болѣе мелкіе или крупные (пилюли),
готовятся изъ сахара и насыщаются опредѣленнымъ обра-
зомъ жидкими лѣкарствами.

Пастилки (таблетки, лепешки) лѣкарственные готовятся
изъ растираній безъ всякой добавочной примѣси, путемъ
сдавливанія (въ особо устроенномъ для сего прессовальномъ
аппаратѣ) въ видѣ круглыхъ лепешекъ, изъ которыхъ каждая со-
держитъ въ себѣ обычную разовую дозу порошкового лѣкарства.

О формахъ лѣкарствъ для наружнаго употребленія см. ниже.

Посредствомъ послѣдовательныхъ разведеній или растираній, п-
о которыхъ сейчасъ будетъ сказано, достигается развитіе въ
веществахъ требуемой лѣкарственной силы. Процессъ развитія
лѣкарственной силы называется потенцированіемъ (потенція=сила),
и производится по опредѣленной системѣ или скѣлѣ, а именно—
по сотенной (центесимальной) или по десятичной (децимальной);
первая обозначается буквой *C* (centum—сто), вторая—буквой *D*

esim—десять) или римской цифрой X. Чистая неразведенная инктура или эссенция обозначается знаком Θ .

Получаемыя потенцированиемъ послѣдовательныя разведенія ти растиранія называются еще „дѣлениями“.

Такимъ образомъ, *Арника* Θ = арника тинктурная, неразведенная, *Аконитъ* D 6 или $\times 6$ или $6/x$ = *Аконитъ* 6-го десятичнаго (децимального) дѣленія или разведенія или 6-й десятичной степенци. *Аконитъ* C 3 или $3/c$ = *Аконитъ* 3-го сотеннаго (цессимальнаго) дѣленія или разведенія или 3-й сотенной потенци.

Въ Россіи принято обозначать сотенное дѣленіе лѣкарства ифрой безъ добавочнаго знака, а десятичное — со знакомъ $\times$. какъ *Аконитъ* 3 и *Аконитъ* $\times 3$ или *Аконитъ* $3/x$

Въ рецептахъ врачей-гомеопатовъ разведение обозначается повомъ guttae, сокращенно — gtt. (т. е. капли) или же dilutio—il. (т. е. растворъ, разведение), а растираніе словомъ pulvis—ulv. (т. е. порошокъ) или trituration—trnt. (т. е. растираніе).

Итакъ, по сотенной системѣ смѣшивается (крѣпко взбалтывается) 1 капля тинктуры или эссенци съ 99 каплями спирта, и получается 1-е сотенное дѣленіе. 1 капля этого 1-го дѣленія съ 99 каплями спирта даетъ 2-е сотенное дѣленіе; изъ 2-го дѣленія получается такимъ же образомъ 3-е дѣленіе и т. д.

По десятичной системѣ жидкія дѣленія приготовляются такимъ образомъ. 10 капель тинктуры смѣшиваются съ 90 каплями дистиллированной воды или болѣе или менѣе разведеннаго, иногда и крѣпкаго спирта (абсолютнаго алкоголя), смотря по характеру основнаго лѣкарственнаго вещества, и взбалтываются. Изъ этого 1-го десятичнаго дѣленія готовится 2-е десятичное дѣленіе путемъ смѣшенія и взбалтыванія 10 капель его съ 90 каплями спирта и т. д.

Такимъ образомъ:

- 1-е десятичн. дѣленіе заключаетъ въ себѣ $1/10$ ч. лѣкарств. вещества.
- 2-е десятичн. дѣленіе заключаетъ въ себѣ $1/100$ ч. лѣкарств. вещества и равняется 1-му сотенному дѣленію.
- 3-е десятичн. дѣленіе заключаетъ въ себѣ $1/1.000$ ч. лѣкарств. вещ.
- 4-е десятичн. дѣленіе заключаетъ въ себѣ $1/10.000$ ч. лѣкарств. вещества и равняется 2-му сотенному дѣленію.
- 5-е десятичн. дѣленіе заключаетъ въ себѣ $1/100.000$ ч. лѣкарств. вещ.
- 6-е десятичн. дѣленіе заключаетъ въ себѣ $1/1.000.000$ ч. лѣкарств. вещества и равняется 3-му сотенному дѣленію и т. д.

Иначе изображая, получимъ послѣдовательность дѣленій въ

такомъ видѣ: $\times 1$; $\times 2$ то же что 1 (безъ знака); $\times 3$; $\times 4$ то же что 2 (безъ знака); $\times 5$; $\times 6$ то же что 3 (безъ знака); $\times 12$ то же что 6 (безъ знака) и т. д.

Перечисленные дѣленія суть обычныя, примѣняемыя въ гомеопатической практикѣ. Дѣленія выше 6-го сотеннаго приготавливаются обыкновенно ужъ только по сотенной скалѣ, до 30-го, при чемъ надо сказать, что въ обычной практикѣ изъ высшихъ дѣленій (выше 6-го) примѣняются лишь еще 12-е, 15-е и 30-е, а не которое либо изъ промежуточныхъ.

Для получения тритураці (порошкового дѣленія) растираютъ Порошк дѣле 10 частей вещества съ 90 частями молочнаго сахара въ фарфоровой ступкѣ и получаютъ 1-е десятичное растираніе; 10 чч. этого 1-го растиранія съ 90 ч. молочнаго сахара даютъ 2-е десятичн. растираніе и т. д. до 30-го десятичнаго, или 15 сотеннаго. Каждое растираніе продолжается по меньшей мѣрѣ часть. Обыкновенно растиранія доводятъ лишь до 5-го или 6-го десятичнаго, дальнѣйшія же дѣленія приготавливаютъ уже въ жидкомъ видѣ, такимъ именно образомъ, что опредѣленную часть такого растиранія смѣшиваютъ съ равными частями спирта и воды, послѣ чего дальнѣйшее жидкое потенцированіе производится обыкновеннымъ способомъ. Растиранія могутъ производиться и по сотенной системѣ.

Въ порошковомъ видѣ могутъ приготавливаться лѣкарства во всѣхъ дѣленіяхъ (изъ предыдущаго жидкаго дѣленія слѣдующее, желаемое, но для послѣдняго, вмѣсто спирта, берется молочный сахаръ и растирается).

Изъ сказаннаго о способѣ приготовления гомеопатическихъ дѣленій не слѣдуетъ сдѣлать такого вывода, будто все равно, получить ли требуемое уменьшеніе количества лѣкарственнаго вещества послѣдовательнымъ разведеніемъ или растираніемъ или же сразу для этого смѣшать одну часть лѣкарственнаго вещества съ соотвѣтствующимъ дѣленію количествомъ жидкости или молочнаго сахара. Не говоря ужъ о томъ, что для послѣдняго способа, въ случаѣ даже лишь средняго дѣленія, потребовалось бы очень большое, а для 30-го и прямо невозможное въ дѣйствительности количество жидкости или сахара, при такомъ способѣ лѣкарственное вещество превратилось бы въ ничто, въ нуль, не только количественно, но и качественно, тогда какъ при указанномъ выше послѣдовательномъ размельченіи оно достигаетъ своей атомистической грани, отъ которой, въ сущности, и зависитъ качественность его, только и важная для лѣчебной цѣли (см. ниже о „динамизмѣ безконечно малыхъ дозъ“).

жен-
ище-
нокъ
иль.

Для насыщенія крупинокъ или пилюль лѣкарствами берется на 1000 крупинокъ (или на сто — пилюль) отъ 5 до 10 капель жидкаго лѣкарства (разведеніе), что соотвѣтствуетъ приблизительно сотенной скалѣ. Желаемое дѣленіе въ крупинкахъ или пилюляхъ получается такимъ образомъ изъ предшествующаго дѣленія жидкаго лѣкарства: напримѣръ, *Аконитъ* 3 въ крупинкахъ или пилюляхъ получается посредствомъ насыщенія крупинокъ *Аконитомъ* 2 въ разведеніи; *Аконитъ* $\times 3$ въ крупинкахъ — изъ *Аконита* $\times 1$ въ разведеніи (соотвѣтственно сотенному вычисленію) и проч.

Бутылочку наполняютъ при этомъ до $\frac{2}{3}$ ея объема крупинками или пилюлями, впускаютъ указанное количество капель, закупориваютъ ее пробкой и встряхиваютъ по нѣскольку разъ время отъ времени (черезъ $\frac{1}{2}$ часа или часъ), до полнаго ихъ насыщенія; послѣ встряхиваній бутылочку каждый разъ оставлять въ лежачемъ, а не стоячемъ, положеніи, для лучшаго разъединенія содержимаго при встряхиваніи. Если по истеченіи 2 — 3 часовъ крупинки (или пилюли) въ бутылочкѣ остаются влажными, то это признакъ того, что взято было болѣе капель, нежели требуется; тогда надо на нѣкоторое время открыть бутылочку для выпаренія излишне взятаго рствора.

Вообще приготовленіе гомеопатическихъ лѣкарствъ требуетъ крайней тщательности, чистоты и навѣя, главное же — знанія всѣхъ указанныхъ въ гомеопатической фармакопее правилъ. Отъ плохо или ненадлежащимъ образомъ приготовленнаго лѣкарства нельзя и ожидать хорошаго дѣйствія.

ГЛАВА II.

Опредѣленіе понятія „гомеопатія“ и основныя правила гомеопатическаго лѣченія.

Гомеопатія есть ученіе о наиболѣе согласномъ съ природою лѣченіи болѣзней лѣкарственными веществами, взятыми изъ растительнаго, минеральнаго и животнаго царствъ природы.

Согласно съ природою, лѣкарственное лѣченіе основывается на слѣдующемъ ея законѣ: каждое болѣзненное состояніе излѣчивается всего вѣрнѣе и скорѣе тѣмъ лѣкарственнымъ веществомъ, которое въ здоровомъ тѣлѣ вызываетъ явленія, возможно болѣе подобныя явленіямъ болѣзни, подлежащей лѣченію.

Именно: подобныя, а не равныя!

Это ясно выражаетъ и составъ слова гомеопатія изъ двухъ греческихъ словъ: *ὁμοιος* и *πάθος* (*hómoios* — подобный и *pathos* — болѣзнь, страданіе).

Этотъ законъ природнаго соотношенія между лѣкарствомъ и болѣзнію былъ замѣченъ или, точнѣе говоря, подозрѣвался уже въ глубокой древности „отцомъ медицины“ Гиппократомъ, а позднѣе—Парацельсомъ, Штѣркомъ и другими.

Научное обоснованіе и практическое примѣненіе законъ этотъ получилъ лишь 100 лѣтъ тому назадъ отъ врача Самуила Ганемана, родившагося въ гор. Мейссенѣ въ 1755 г. (10-го апрѣля) и умершаго въ Парижѣ въ 1843 г. (2-го іюля). Ганеманъ былъ первый, который доказалъ истинность закона подобія, выраженнаго имъ формулой—„лѣчи подобное подобнымъ“ (*Similia similibus curantur*), и на немъ построилъ самую прочную, какую когда либо зналъ міръ, лѣкарственную систему, названную имъ гомеопатіей, въ отличіе отъ господствовавшей и до сихъ поръ еще господствующей системы—аллопатіи (по гречески *ἄλλος πάθος* значить—иного рода страданіе, болѣзнь).

По принципу аллопатическому необходимо, для устраненія разстройства въ однѣхъ частяхъ тѣла, вызвать разстройство или усиленіе нормальной дѣятельности въ другихъ частяхъ тѣла, на-примѣръ—при приливахъ къ головѣ даютъ слабительныя средства, предполагая этимъ отвлечь упомянутое разстройство на кишечникъ; при воспаленіи легкихъ или плевры и проч. изъязвляютъ кожу (груды и проч.) мушками, предполагая этимъ дать выходъ болѣзненнымъ сокамъ или отвлечь воспаленіе изнутри наружу, и т. п.; на подобномъ же принципѣ основано лѣченіе пьвяками, разнаго рода прижиганіями и проч. И какъ гомеопатіи со-отвѣтствуетъ формула „*similia similibus curantur*“, такъ изъ аллопатическаго взгляда на лѣченіе вытекаетъ формула „лѣчи противное противнымъ“ (*contraria contrariis curantur*), т. е. принципъ противоположности (не подобія), предполагаемый между болѣзнію и способомъ борьбы противъ нея, на-примѣръ: гашеніе лихорадочнаго жара—противолихорадочными средствами (хининъ, антипиринъ, фенацетинъ и проч.), лѣченіе безсонницы—снотворными, лѣченіе возбужденнаго состоянія—угнетающими нервы средствами и проч. Ганеманъ доказалъ, что такое аллопатическо-антипатическое лѣченіе противоестественно, а потому вредно для организма; вмѣсто того, чтобъ способствовать стремленію послѣдняго поборо-ть постигшую его болѣзнь, иначе говоря—усилить его реакцію

До
мед
Саму
нем
осно
гоме

При
алло
снаго

(противодѣйствіе), такое лѣченіе, ослабляя организмъ, лишь парализуетъ его силы, естественную реакцію, въ борьбѣ съ болѣзнію.

Не лучше обстоитъ дѣло и съ позднѣйшими аллопатическими воздѣйствіями, лѣченіемъ противоболѣзненными сыворотками (серотерапія) и прививками, равно какъ и вытяжками изъ разнаго рода органовъ животныхъ (органотерапія), главнымъ образомъ—сперминомъ.

Сывороточное лѣченіе основано на примѣненіи противъ болѣзни того же яда, какой послѣднею вырабатывается, напиримѣръ: противъ дифтерита—дифтеритный ядъ, противъ скарлатины—скарлатинный ядъ, противъ холеры—холерный ядъ. Прививка основана на томъ же принципѣ: противъ собачьяго бѣшенства—ядъ бѣшенства, противъ оспы—оспенный ядъ. Цѣль въ томъ и другомъ случаѣ—побѣждать болѣзнь ея же собственнымъ орудіемъ. Такое лѣченіе является лѣченіемъ по принципу „равное равнымъ“ (*aequalia aequalibus*) или „изопатіей“ (отъ словъ *ἴσος* = равный, *πάθος* = болѣзнь), которая, правда, напоминаетъ гомеопатію, но далеко не есть то же самое.

ни- Предохранительныя прививки имѣютъ цѣлью развить въ организмъ невоспримчивость къ той или другой болѣзни, ставляя его продѣлать таковую, но въ значительно ослабленной формѣ. На практикѣ результаты далеко не оправдываютъ ожиданій отъ прививокъ, не только отъ такой, какъ противохолерная, безцѣльность и даже вредъ которой доказаны были въ холерную эпидемію послѣднихъ лѣтъ, но и отъ оспенной прививки, имѣющей за собою ужъ около ста лѣтъ примѣненія и тѣмъ не менѣе приобрѣтающей, по многимъ весьма вѣскимъ соображеніямъ, все больше и больше противниковъ въ ученомъ мірѣ. Послѣдствіемъ отрицательнаго взгляда на оспопрививаніе явилось то, что въ нѣкоторыхъ наиболѣе культурныхъ странахъ (Швейцарія, Бельгія, Америка, Англія) оно не является болѣе обязательнымъ для населенія.

ипъ рапіи. Принципъ органотерапіи основанъ также на усиленіи при сущей организму способности самообороны противъ болѣзней или на восстановленіи ея, когда она утрачена. Эту роль выполняетъ, молъ, въ организмъ вещество, выдѣляемое сѣменными железами (сперма), отсюда—сперминъ. Путемъ такой же логики введены въ практику въ новѣйшее время вытяжки и изъ другихъ железъ и органовъ: оваринъ—изъ яичниковъ, церебринъ—изъ мозга, ренинъ—изъ почекъ и проч. По утвержденію органотерапевтовъ, этими препа-

ратами, особенно же сперминомъ, можно излѣчивать рѣшительно всѣ болѣзни, также предупреждать ихъ появленіе и развитіе.

Отъ всѣхъ этихъ способовъ лѣченія существенно отличается гомеопатическій способъ.

Гомеопатическое лѣкарство дѣйствуетъ на корень болѣзни или на тѣ органы и ткани, которые больны, при чемъ лѣкарства выбираются такія, которыя, на основаніи уже имѣющихся испытаній ихъ на здоровомъ организмѣ, производятъ въ послѣднемъ болѣзненное состояніе, подобное тому, какое подлежитъ лѣченію въ данномъ случаѣ. Такимъ образомъ дѣйствіе лѣкарства имѣетъ направленіе, подобное данной болѣзни, не въ прямомъ однако смыслѣ, какъ при изопатіи, а въ томъ, что возбужденная послѣднею естественная реакція организма усиливается искусственнымъ образомъ, помощью подобнодѣйствующаго средства.

Такая искусственная поддержка со стороны послѣдняго окажется полезною для организма лишь при томъ условіи, если она не будетъ носить характера медвѣжьей услуги, т. е. будетъ дѣйствительно лишь поддерживать организмъ, а не опрокидывать его и тѣмъ лишать его фактической возможности борьбы съ болѣзнію. Опытъ подсказалъ Ганеману, что для избѣжанія подобной непріятности надо пользоваться не возможно большими, а, напротивъ того, возможно меньшими дозами лѣкарствъ, при которыхъ болѣзнь побѣждалась бы, а организмъ бы не страдалъ.

Правильность этого благодѣлнѣйшаго для человѣчества открытія основана на томъ установленномъ Ганеманомъ же фактѣ, что крайне малыя дозы производятъ въ больномъ организмѣ послѣдствія, обратныя тѣмъ, какія производятся большими дозами въ здоровомъ организмѣ; иначе говоря: физиологическому дѣйствію большихъ дозъ соотвѣтствуетъ динамическое (силовое) дѣйствіе малыхъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ есть и дѣйствіе цѣлебное.

Наконецъ, динамически-цѣлебное дѣйствіе лѣкарствъ обнаруживается лишь въ случаѣ гомеопатическаго подобія послѣдняго болѣзненному состоянію организма. Въ противномъ случаѣ оно не производитъ никакого дѣйствія.

Итакъ, основными принципами гомеопатическаго лѣченія являются:

- 1) Подобное лѣчи подобнымъ.
- 2) Лѣкарство, подобное болѣзни, давай въ возможно меньшей дозѣ.

Послѣ сказаннаго являются вполнѣ естественными и понят-

Отл
гоме
отъ д
спос
лѣч

Дв
основн
правила
лѣчен

ными слѣдующіе, на примѣръ, факты, признавать которые уже начинаютъ понемногу и противники гомеопатіи:

Вератрумъ альбумъ (Чемерица бѣлая) вызываетъ въ здоровомъ организмѣ, между прочимъ, холероподобныя явленія; имъ же излѣчиваются соотвѣтственные поносы; *Меркурій* (Ртуть), извѣстное противъ сифилиса средство, вызываетъ въ здоровомъ организмѣ явленія, чрезвычайно подобныя этой болѣзни; *Опій* производитъ спячку и запоръ, онъ же излѣчиваетъ болѣзни, сопровождающіяся спячкой и запоромъ, подобными тѣмъ, которыми характеризуется дѣйствіе опія на здоровомъ; *Белладонна* (Красавка) причиняетъ, между прочимъ, жестокіе приливы къ головѣ (мозгу) и излѣчиваетъ болѣзни, сопровождающіяся подобными явленіями, и т. д.

Что касается принципа малыхъ и такъ называемыхъ безконечно-малыхъ дозъ, то противъ него всего болѣе настроены противники гомеопатіи; онъ же служитъ въ сущности единственной причиной того, что гомеопатія по сіе время не только вызываетъ въ противникахъ сомнѣніе въ ея дѣйствительности, но и служитъ имъ постоянной мишенью для шутокъ и остротъ по отношенію къ гомеопатіи.

Такого отношенія къ гомеопатическимъ дозамъ не было бы, если бы противники ея хотя на время оставили свое, сложившееся на почвѣ вѣкового недоразумѣнія, предубѣжденіе и приступили бы къ клинической провѣркѣ гомеопатическихъ лѣкарствъ тѣмъ путемъ, какимъ шелъ въ этомъ вопросѣ Ганеманъ.

остъ
дозъ. Вначалѣ онъ испытывалъ выбиравшіяся имъ, согласно закону подобія, лѣкарства въ обыкновенныхъ, практиковавшихся въ его время, большихъ дозахъ, но, послѣ того какъ онъ наблюдалъ жестокія отъ такихъ дозъ ухудшенія болѣзни, онъ сталъ ихъ постепенно уменьшать, получая все лучшіе и лучшіе результаты. Изъ своихъ въ высшей степени добросовѣстныхъ, до мельчайшихъ подробностей прослѣженныхъ, наблюденій онъ вывелъ заключеніе, что сильно разведенныя или измельченныя лѣкарства не слабѣе дѣйствуютъ, а лишь лишены своихъ первичныхъ дѣйствій, тѣхъ, которыя до сихъ поръ еще наблюдаются отъ большихъ, аллопатическихъ дозъ и на языкѣ аллопатовъ называются „побочными“ дѣйствіями, отягощающими состояніе больного. Цѣлебное же (динамическое—силовое) дѣйствіе ихъ тѣмъ рѣзче и полнѣе выступаетъ, чѣмъ доза меньше. Пораженный своимъ открытіемъ, безпримѣрными результатами лѣченія все

меньшими и меньшими дозами, Ганеманъ дошелъ, уже на склонѣ своихъ лѣтъ, до самаго высокаго, 30-го дѣленія, которымъ онъ выражалъ предѣлъ безконечнаго разведенія или измелеченія лѣкарства. Для возможно большаго уменьшенія человѣческими способами дозы лѣкарства Ганеманъ же ввелъ крайне мелкія сахарныя крупинки, которыя онъ насыщалъ лѣкарствами 30-го разведенія, и съ тою же цѣлью давалъ очень рѣдкія дозы даже этихъ крупинокъ.

Такое увлеченіе Ганемана, въ стремленіи найти идеальную форму для лѣкарственныхъ веществъ, вполне понятно; онъ искалъ именно форму, а не—„дозу“, такъ какъ доза предполагаетъ нѣчто вѣсмое; количество же лѣкарственного вещества въ разведеніи 30-й степени безконечно мало, слѣдовательно и невѣсимо, неопредѣлимо доступными человѣку способами. Въ этомъ смыслѣ Ганеманъ и говоритъ о духовномъ дѣйствіи лѣкарствъ, о динамическомъ, о силовомъ, а не о матеріальномъ, дѣйствіи своихъ высшихъ разведеній.

И это силовое или динамическое дѣйствіе вызывало и вызываетъ не мало насмѣшекъ со стороны противниковъ гомеопатіи, равно какъ сомнѣніе у многихъ позднѣйшихъ и современныхъ послѣдователей ея, которые не могутъ отказатся отъ того чтобы не имѣть въ лѣкарствѣ и матеріальной, вещественной подкладки дѣйствія. Они придерживаются низшихъ и среднихъ разведеній и растираній, получая и съ ними благопріятные и даже блистательные результаты. Съ другой стороны имѣется также не мало врачей-гомеопатовъ, которые идутъ еще гораздо дальше Ганемана въ разведеніи и измелеченіи лѣкарствъ (получая, при помощи специальныхъ ротаціонныхъ аппаратовъ, сотыя и тысячныя дѣленія ихъ) и утверждаютъ, что также достигаютъ съ ними благопріятныхъ и даже блистательныхъ результатовъ.

Это разногласіе на счетъ дозъ гомеопатическихъ лѣкарствъ доказываетъ то, что либо вопросъ этотъ не существенъ для гомеопатіи, а существенно лишь примѣнять вообще возможно меньшія дозы, или что не настало еще время, чтобы каждый могъ съ несомнѣнной достовѣрностью убѣдиться въ правотѣ Ганемана, т. е. въ абсолютной предпочтительности высокихъ и наивысшихъ дѣленій передъ низшими и средними..

Въ этомъ руководствѣ указаны какъ дѣленія, такъ и дозы наиболѣе употребительныя, а именно—дѣленія, преимущественно низшія и среднія, рѣже высокія, дозы же — болѣе вещественныя (см. гл. 3).

Дин;
безк;
малых

но
въ
зв
ъ
Во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнiю, что даже без-
конечно-малыя количества вещества производятъ весьма замѣтныя
дѣйствiя. Это доказано физиками, химиками и физиологами. Въ
тѣхъ случаяхъ, гдѣ не можетъ быть и рѣчи о физическомъ вы-
численiи или химическомъ анализѣ, о существованiи вещества въ
пространствѣ даетъ намъ знать органъ обонянiя; мы говоримъ
о запахахъ веществъ. Если на одинъ моментъ открыть бутылочку
съ сильно пахучимъ веществомъ или лишь разъ потянуть въ себя
запахъ цвѣтка, то спрашивается, мыслимо ли хотя бы прибли-
зительно опредѣлить ту дозу вещества, какая подѣйствовала на
обонятельный нервъ; а вѣдь что нибудь же было, что подѣйстви-
вало на него, а подчасъ даже вызвало болѣзненное ощущение
(есть, напр., люди, у которыхъ даже мимолетное ощущение запаха
мускуса вызываетъ сильнѣйшую головную боль).

Но есть и масса другихъ еще болѣе вѣскихъ и очевидныхъ
и въ то-же время чисто научныхъ доказательствъ того, что даже
въ разведенiяхъ 1 на 1.000.000 и болѣе высокихъ имѣется еще
несомнѣнное присутствiе вещества. Такъ, физиологами доказано,
что $\frac{1}{1.000.000}$ часть стрихнина (т. е. 6-е десятичное гомеопатиче-
ское дѣленiе) дѣйствуетъ еще отравляющимъ образомъ на лягу-
шекъ и мышей. Помощью современныхъ микроскоповъ можно об-
наружить присутствiе мѣди въ 6-мъ дѣленiи желѣза—въ 8-мъ,
платины, золота, серебра и ртути—въ 10-мъ, осадочнаго олова
даже въ 14-мъ дѣленiи...

Наконецъ—радiй. Неуловимыя и злученiя этого вещества про-
изводятъ прямо разрушительное дѣйствiе на животныя ткани;
между тѣмъ извѣстно, что при этомъ оно нисколько отъ себя не
теряетъ; по крайней мѣрѣ никакими способами невозможно дока-
зать, чтобы излученiе радiя сопровождалось уменьшенiемъ его ко-
личества...

ГЛАВА III.

Правила дозировки и способы приѣмовъ гомеопати- ческихъ лѣкарствъ въ болѣзняхъ.

Жидкiя лѣкарства (разведенiя, „капли“) даются, смотря по
степени болѣзни и сложенiю (слабому или крѣпкому) больного,
взрослымъ отъ 3 до 5 капель, дѣтямъ, смотря по возрасту, отъ
1 до 3 капель на приемъ, 3—4 раза въ день или рѣже, въ сто-

ловой или чайной ложкѣ отварной воды или молока (дѣтямъ). Допускается брать лѣкарства и на сахарѣ, высасывать и глотать, не запивая водой.

При очень частыхъ приемахъ, черезъ 5—10—15 минутъ, какъ „П это необходимо бываетъ въ бурно протекающихъ болѣзняхъ (сильный жаръ, тифъ, сильныя боли, холера и проч.) даютъ взрослымъ по 1 или 2 капли на приемъ или и того меньше, что на практикѣ всего удобнѣе дѣлать такъ: 20—30 капель лѣкарства разводятъ въ стаканъ воды и даютъ больному въ указанные промежутки времени по чайной или по десертной ложкѣ или по большому или меньшему глотку. Такая форма приемовъ лѣкарствъ называется „питьемъ“.

Дѣтямъ отъ 2 до 6—7 лѣтъ „питье“ готовится изъ 5—10 капель въ стаканъ воды и дается въ указанные промежутки времени по чайной ложечкѣ.

Дѣтямъ же, которыя постарше, до 10—12 лѣтъ, „питье“ готовится изъ 10—15 капель на стаканъ воды.

Маленькимъ дѣтямъ, до 2-лѣтняго возраста, изъ раствора 3—5 кап. на полстакана воды даютъ по полчайной ложкѣ на приемъ.

Дѣтямъ, впрочемъ, цѣлесообразнѣе и удобнѣе давать лѣкарства въ крупинкахъ или въ видѣ порошка (растиранія).

Лѣкарства порошковые (растиранія): на каждый приемъ дается „Д количество, какое умѣщается на кончикъ перочиннаго ножа (въ порошкѣ приблизительно гороха или чечевичнаго зерна); въ го- лѣкар- меопатическихъ аптекахъ продаются рассчитанныя для такихъ сп- приемовъ костяныя лопаточки, вмѣстимостью въ одинъ гранъ, при также и большаго размѣра для большихъ приемовъ въ 2, 3 и 5 гр. Порошковое лѣкарство принимается либо въ сухомъ видѣ, высасывая и глотая (запивая или не запивая водой), или же размѣшанное въ нѣкоторомъ количествѣ воды.

Лѣкарства въ крупинкахъ и пилюляхъ: доза для взрослыхъ— „Д 5—10 крупинокъ или 1—3 пилюли, для дѣтей—1 до 3—5 крупинки, 1 пилюля. Крупинки или пилюли принимаются въ сухомъ видѣ, такъ же, какъ порошковыя лѣкарства. Для грудныхъ дѣтей—пилюли вообще не подходящая форма лѣкарства; для нихъ лучше будетъ развести 5 крупинокъ или 1 пилюлю въ 10—12 чайныхъ ложечкахъ воды и давать по ложечкѣ на приемъ. „Д

Лѣкарства въ пастилкахъ (таблеткахъ и лепешкахъ) введены въ практику въ недавнее время, какъ удобныя особенно „Д во время путешествія. Принимаются тѣмъ же способомъ, какъ паст-

крупинки или пилюли, но достаточно лишь по 1 на разъ, также дѣтямъ — по $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{4}$ пастилки. Взрослые могутъ брать и по 2, по 3 пастилки на разъ или пастилки большаго размѣра. Пастилки подходятъ больше для тѣхъ случаевъ, когда лѣкарство принимается въ рѣдкихъ приемахъ, отъ 1 до 2—3 разъ въ день.

Указанная выше дозировка имѣетъ лишь относительное значеніе, чисто практическое, и приведена именно въ томъ видѣ, въ какомъ она примѣняется въ обычной гомеопатической практикѣ. Уклоненія отъ тѣхъ правилъ встрѣчаются сплошь и рядомъ въ практикѣ врачей-гомеопатовъ, прописывающихъ лѣкарства въ такихъ формахъ и дозахъ, какія они считаютъ наиболѣе подходящими въ каждомъ случаѣ. Публика же должна имѣть опредѣленную руководящую нить въ дозировкѣ лѣкарствъ, когда ей приходится оказывать себѣ помощь самостоятельно, за отсутствіемъ врача, по лѣчебнику, и въ виду этого даны вышеупомянутыя правила.

Надо, однако, сказать, что, вообще говоря, начиная съ 3—4 дѣленія (×), величина дозы, т. е. cadaго приема лѣкарства, не играетъ безусловной, существенной роли при лѣченіи гомеопатическими лѣкарствами, такъ какъ, когда дѣло идетъ о тысячномъ или десяти тысячномъ или еще большемъ разведеніи лѣкарственного вещества, не можетъ быть разницы въ цѣлебности его, будутъ ли приняты 2, 5 или больше капель или крупинокъ, меньше или больше порошка (растиранія). Поэтому ошибаются тѣ, которые полагаютъ, что усилить дѣйствіе лѣкарства, если примутъ, наприм., не пять а пятнадцать капель на разъ. Въ гомеопатіи помогаетъ не величина дозы, а цѣлебное свойство лѣкарства, степень сродства послѣдняго, его гомеопатическаго подобія болѣзненному состоянію организма. Если лѣкарство, начиная съ 3—4 дѣленія, неправильно выбрано, т. е. если оно, по свойственнымъ ему признакамъ, въ отношеніи подобія, не соотвѣтствуетъ признакамъ данной болѣзни, то ни малое, ни большее его количество все равно не помогутъ. Если же выбранное лѣкарство вполне подходитъ для даннаго болѣзненнаго состоянія то, разсуждая теоретически, поможетъ и самое малѣйшее его количество, хотя бы даже 1 крупинка для взрослоаго.

Говорятъ, правда, объ ухудшеніяхъ въ болѣзни, которыя вызываются иногда гомеопатическими лѣкарствами, но и тутъ необходимо разбраться, въ чемъ собственно дѣло. Есть люди настолько чувствительные къ дѣйствію лѣкарствъ, что такая доза послѣднихъ, которая другими переносится хорошо, ими перено-

сится плохо. Невыносливость эта называется въ наукѣ идюсинкразией. Извѣстны поразительные факты идюсинкразии. Такъ есть люди, невыносящие дѣйствія лѣкарствъ даже на довольно значительномъ отдалении, напримѣръ—находясь въ одномъ помѣщеніи дома, получаютъ тошноту и сильно чихаютъ, когда въ другомъ растираютъ рвотный корень; или часто наблюдаются въ больницахъ случаи отравленія ртутью у тѣхъ больныхъ, которыхъ отдѣляютъ нѣсколько палатъ отъ больныхъ, получающихъ ртутныя втиранія противъ сифилиса. Дѣйствуетъ ли въ такихъ случаяхъ количество лѣкарства или же его качество, его свойство? Прежде всего во всякомъ случаѣ послѣднее; что же касается количества, то изъ упомянутаго случая съ рвотнымъ корнемъ (или тому подобнаго) надо заключить, что количество можетъ быть безконечно мало и все-таки въ подходящемъ случаѣ вызоветъ явленіе идюсинкразии; необходимо лишь, очевидно, присутствіе дѣйствующаго начала даннаго вещества; сколько же именно этого начала будетъ въ предѣлахъ не только безконечнаго, но даже лишь весьма значительнаго измельченія вещества, въ сущности безразлично. Поэтому, разъ идюсинкразія имѣется у человѣка къ какому либо гомеопатическому лѣкарству, то она на него подѣйствуетъ сильнѣе, чѣмъ необходимо, все равно—приметъ ли онъ 1 или 5 капель 3-го, 4-го или 30-го дѣленія. Есть факты изъ гомеопатической практики, подтверждающіе это заключеніе. Такъ, часто встрѣчаются лица, не переносящія, напримѣръ, лѣкарства нуксъ-вомика (рвотный орѣхъ) въ какихъ бы дѣленіяхъ и въ какихъ бы малыхъ количествахъ его ни давать; оно вызываетъ у нихъ именно рвоту.

Случаи эти, однако, столь рѣдки, что являются въ полномъ смыслѣ слова исключеніями, не могущими имѣть практическаго значенія. Но то бываетъ уже довольно часто, что низшее дѣленіе вызываетъ ухудшеніе болѣзни, а среднее — нѣтъ, или низшее и среднее не вызываютъ цѣлебнаго эффекта, а высшее, наоборотъ вызываетъ таковой. Поэтому часто цѣлесообразно бываетъ на практикѣ мѣнять дѣленія однихъ и тѣхъ же лѣкарствъ, какъ мѣняются, по надобностямъ, и сами лѣкарства. Въ этомъ смыслѣ надо понимать встрѣчающіяся въ лѣчебникахъ указанія двухъ дѣленій при одномъ лѣкарствѣ, напримѣръ *Арсеникъ* 3—6, *Сульфуръ* $\times$ 3—6 и т. д.

Итакъ вообще говоря, можно сказать о приемахъ гомеопатическихъ лѣкарствъ слѣдующее:

1) Начиная съ 3—4 десятичнаго дѣленія, можно принимать лѣкарство въ любомъ видѣ —въ капляхъ, порошкахъ, крупинкахъ и проч., притомъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ, но всегда полезнѣе принимать нѣсколько меньше, нежели нѣсколько больше.

2) Слѣдуетъ отдавать предпочтеніе, въ отношеніи одного и того же лѣкарства, сухой его формѣ передъ спиртной, такъ какъ спиртъ самъ по себѣ можетъ оказать вредное вліяніе на организмъ. Поэтому не слѣдуетъ давать, въ болѣе или менѣе крупныхъ дозахъ, спиртныхъ лѣкарствъ (хотя бы и разведенныхъ въ водѣ) дѣтямъ, женщинамъ нѣжнаго сложенія, а также слабымъ, слабонервнымъ и нервнымъ особамъ. Очень часто встрѣчаются больные, которымъ противенъ вкусъ спиртныхъ лѣкарствъ.

3) Растиранія и крупинки, особенно пилюли и пастилки, не слѣдуетъ давать въ большихъ количествахъ, особенно въ сухомъ видѣ, такъ какъ они, сами по себѣ, при частыхъ пріемахъ, пріѣдаются и дѣлаются приторными на вкусъ.

Правила повтореній пріемовъ лѣкарствъ.

Въ виду разнообразія случаевъ болѣзней невозможно дать и тутъ вполне точныхъ и опредѣленныхъ указаній. Вообще же можно сказать, что въ острыхъ случаяхъ, смотря по степени проявленій болѣзни, лѣкарства даются черезъ 2—3 часа, въ трудныхъ же случаяхъ —чаще, напримѣръ —при крупѣ, холерѣ, судорогахъ, рвотѣ, когда повторенія пріемовъ лѣкарствъ должны производиться черезъ каждый часъ или полчаса, даже черезъ 5—10 минутъ.

Въ хроническихъ случаяхъ, или во время выздоравливанія отъ острыхъ болѣзней, пріемы лѣкарствъ должны быть болѣе рѣдкіе. Въ большинствѣ случаевъ достаточно принимать черезъ каждые четыре часа и даже еще рѣже, лишь 2 или 1 разъ въ день. Наконецъ, полезно бываетъ день и другой пропустить, не давая никакихъ лѣкарствъ, продолживъ иной разъ перерывъ до нѣсколькихъ дней, съ той именно цѣлью, чтобы было использовано послѣдовательное дѣйствіе лѣкарства или чтобы не притупить чувствительность организма къ лѣкарству; въ послѣднемъ отношеніи цѣлесообразно бываетъ и измѣненное дѣленіе того же лѣкарства, именно слѣдующее высшее вмѣсто предшествовавшего низшаго.

Лѣкарства слѣдуетъ принимать только въ теченіе дня, за 20—30 минутъ до или не раньше 1—2 часовъ послѣ ѣды. Ночью лѣкарствъ не надо принимать, исключая лишь случаи особеннo

остро протекающіе и вообще экстренные, при томъ, если больной не спитъ. Будить больного для пріема лѣкарствъ вообще не слѣдуетъ, за исключеніемъ случаевъ ненормально глубокаго сна (спячка, обморокъ).

ГЛАВА IV.

О выборѣ лѣкарствъ и о продолжительности ихъ примѣненія.

Фактическими данными для выбора лѣкарства служатъ съ одной стороны симптомы (проявленія или признаки) имѣющейся болѣзни, съ другой же стороны симптомы соотвѣтствующаго лѣкарственнаго вещества. Соотвѣтствующимъ же лѣкарственнымъ веществомъ будетъ такое, о которомъ извѣстно изъ лѣкарствовѣдѣнія, что оно, испытанное на здоровомъ организмѣ въ большой дозѣ, вызываетъ въ послѣднемъ явленія, подобныя тѣмъ явленіямъ, какими выражается имѣющаяся болѣзнь.

Въ опредѣленіи этого подобія между болѣзнію и лѣкарствомъ и заключается главнымъ образомъ гомеопатическій діагнозъ, который въ то же время является и истиннымъ клинически-терапевтическимъ діагнозомъ. Не такъ—въ аллопатіи, гдѣ діагнозомъ считается лишь опредѣленіе названія болѣзни по его патологическимъ или патологоанатомическимъ признакамъ и гдѣ часто случается, что названіе болѣзни найдено, но неизвѣстно или сомнительно, что противъ нея предпринять, или же діагнозъ такой можетъ быть и ошибочный, и тогда предпринятое лѣченіе можетъ оказаться совсѣмъ неподходящимъ.

Въ гомеопатіи при выборѣ лѣкарства названіе болѣзни играетъ второстепенную роль, лишь болѣе или менѣе облегчающую процессъ выбора лѣкарства, главное же въ ней—клиническая картина болѣзни, картина болѣзни, наблюдаемая у постели больного, и знаніе гомеопатическаго лѣкарствовѣдѣнія. Въ гомеопатіи оба эти фактора неотдѣлимы другъ отъ друга, не мыслятся даже другъ безъ друга. Въ этомъ громадное преимущество, превосходство гомеопатіи надъ всякимъ другимъ способомъ лѣченія во всѣхъ случаяхъ, требующихъ примѣненія лѣкарствъ.

Каждое лѣкарство имѣетъ свойственныя лишь ему одному дѣйствія, какъ и каждая болѣзнь имѣетъ лишь ей одной свой-

ственные проявленія. Но такъ какъ проявленія при разныхъ болѣзняхъ бываютъ схожія или даже одинаковыя, то дѣйствія одного и того же лѣкарства могутъ соотвѣтствовать разнымъ болѣзнямъ, если только проявленія болѣзни схожи съ дѣйствіями лѣкарства. И наоборотъ, при одной и той же болѣзни проявленія могутъ выражаться различно; отсюда происходитъ, что въ одной и той же болѣзни, но у разныхъ субъектовъ, необходимо бываетъ прибѣгать къ разнымъ лѣкарствамъ. Все это опять-таки оттого, что объектомъ (предметомъ) лѣченія въ гомеопатіи является не болѣзнь, какъ таковая, не названіе ея, а больной организмъ, его индивидуальность, его обособленность.

Изя-
ли
иные
и въ.
Изъ этого же взаимоотношенія между болѣзнію и лѣкарствомъ въ гомеопатіи издавна выводится необходимость въ каждомъ болѣзненномъ случаѣ давать лишь одно лѣкарство, а не больше. Этотъ вопросъ является однимъ изъ спорныхъ въ гомеопатіи. Теоретически какъ будто и вѣрно, что для каждой болѣзни достаточно лишь одно лѣкарство, и на практикѣ встрѣчаются случаи, подтверждающіе такой взглядъ. Случаи эти, однако, не часты, если подъ ними не разумѣть лишь самыя простѣйшія болѣзненные формы. Большею же частію врачи-гомеопаты находятъ нужнымъ давать по 2 и по 3 и больше лѣкарствъ въ день одному и тому же больному, не по незнанію или неувѣренности, а потому, что, въ виду ли сложности болѣзненныхъ проявленій или вслѣдствіе сопутствующихъ болѣзненныхъ процессовъ, одно лишь лѣкарство считается недостаточнымъ. Отсюда и произошли попеременные или поочередные приемы лѣкарствъ, назначаемые большинствомъ гомеопатовъ; или, кромѣ главнаго и основнаго лѣкарства, даютъ другія еще, какъ добавочныя, при опредѣленныхъ болѣзненныхъ симптомахъ.

Попеременные или поочередные приемы лѣкарствъ не должны, однако, производиться безъ возможно болѣе правильнаго выбора послѣднихъ, для чего требуется возможно болѣе точное знаніе ихъ круговъ дѣйствія; знаніе же такое пріобрѣтается частыми справками въ лѣкарствовѣдѣніи (см. таковое въ 4-й части сей книги).

Здѣсь приводится лишь нѣсколько примѣровъ и общихъ правилъ.

гва
сти- Такъ, не слѣдуетъ брать попеременно или поочередно лѣкарствъ очень близкихъ другъ къ другу по характеру и по роду дѣйствія, во избѣжаніе чрезмѣрно сильной реакціи организма; такъ, напримѣръ: *Нуксъ вомика* и *Игнація* (въ томъ и другомъ

основное начало—стрихнинъ); *Нуксъ вомика* или *Игнація* и *Стрихнинъ*; *Белладонна* и *Гіосціамусъ* (по почти одинаковому дѣйствию на нервную систему); *Белладонна* и *Атропинъ* (основное начало беллад.); *Лазезисъ* и *Найя* (оба — змѣйные яды); *Нуксъ вомика* и *Ипеакауана* (основное дѣйствіе—рвота); *Ку-прумъ* и *Цинкъ* (судороги); вообще—металлы: *Платина* и *Аргентумъ* (серебро) и др. Такихъ совмѣщеній не слѣдуетъ дѣлать.

Несовмѣстимы также лѣкарства съ рѣзко-выраженными противоположными дѣйствіями, какъ на примѣръ: *Опій* и *Коффеа*; *Меркурій* и *Гепаръ сульфурисъ* (или *Ацид. нитрик.*); *Гепаръ сульф.* и *Силиція* и др.

Совмѣщаются же и дополняютъ другъ друга, вообще говоря, при наличности показаній, слѣдующаго рода лѣкарства:

1) лѣкарства, главное дѣйствіе которыхъ простирается не на одни и тѣ же, а на разные органы или ткани, на примѣръ: *Нуксъ вомика* и *Бріонія*, *Русъ* и *Пульсатилла*, *Игнація* и *Спигелія* и др.

2) лѣкарства, дѣйствующія разнo на одни и тѣ же органы или ткани, на примѣръ: *Бріонія* и *Русъ*, *Арника* и *Кактусъ*, *Сенія* и *Коніумъ* и др.

3) тѣ и другія—съ лѣкарствами, вліяющими главнымъ образомъ на обмѣнъ веществъ въ организмѣ, на составъ крови и соковъ его, на примѣръ: *Сульфуръ*, *Калькареа карбоника* или *фосфорика*, *Графитъ*, *Силиція*, *Фосфоръ*, *Феррумъ*, *Арсеникъ*.

Нѣкоторые врачи-гомеопаты, въ ихъ числѣ и авторъ сего руководства, считаютъ цѣлесообразнымъ не только попеременныя или поочередныя приемы лѣкарствъ, но и приемы ихъ одновременныя или въ смѣси, по той причинѣ, что принципиально не можетъ быть разницы въ дѣйствіи лѣкарствъ въ томъ или другомъ случаѣ. При этомъ надо имѣть въ виду, что когда даются 2—3 и болѣе лѣкарствъ, необходимо значительно уменьшить дозу каждого отдѣльнаго изъ этихъ лѣкарствъ, особенно когда они спиртныя и въ низкихъ дѣленіяхъ и принимаются въ короткіе промежутки времени (см. главу 3). Если этого не дѣлать, то рискуютъ получать не только безуспѣшные, но даже вредные результаты, вмѣсто хорошихъ, удачныхъ.

При выборѣ лѣкарства надо брать во вниманіе:

1) симптомы, какъ наружно проявляющіеся, такъ и внутренніе, субъективныя (чувствуемые больнымъ) и объективныя (наблюдаемые врачомъ), при чемъ надо различать болѣе важ-

Лѣка
совмѣ

Однов
ные
лѣка

Дан
для в
лѣка

ные, существенные, характеристичные, отъ менѣ важныхъ, случайныхъ;

2) какой органъ пораженъ, какія ткани, вообще мѣстоположеніе болѣзни (напримѣръ, легкія, печень, сердце, желудокъ, слизистыя оболочки и проч.),

3) болѣзненный процессъ (напримѣръ, воспаление, катарръ, язва, ракъ, ходъ болѣзни, продолжительность ея, періоды или стадіи ея и т. д.);

4) ближайшія или болѣе отдаленныя причины (напримѣръ, душевное волненіе, простуда, зараза, поврежденіе и т. д.),

5) такія особенности, какъ возрастъ, полъ, тѣлосложеніе, темпераментъ, жизненныя условія и проч.),

6) условія, видоизмѣняющія характеръ и теченіе болѣзни или отдѣльныя симптомы (воздухъ, погода, время года, движеніе, покой и т. д.).

Лѣкарство дается до тѣхъ поръ, пока не наступитъ улучшение или измѣненіе въ ходѣ болѣзни. Частота и величина приѣмовъ (дозы) указаны въ главѣ 3. При улучшеніи лѣкарство дается рѣже, но не оставляется совсѣмъ, пока улучшение продолжается. Если же, по истеченіи нѣкотораго времени (отъ 6 до 24 часовъ—въ острыхъ случаяхъ, нѣсколькихъ дней—въ хроническихъ), не замѣчается никакого улучшения, то должно выбрать другое или другія лѣкарства.

Въ заключеніе сей главы умѣстно указать на крайне ошибочное мнѣніе, какое можно часто слышать о гомеопатическихъ лѣкарствахъ даже отъ тѣхъ, которые вообще не отрицаютъ ихъ благотворнаго дѣйствія. Говорятъ именно, что лѣкарства эти дѣйствуютъ хотя и вѣрнѣе аллопатическихъ, но за то и гораздо медленнѣе; поэтому, молъ, въ острыхъ случаяхъ рисковано имъ довѣряться, въ хроническихъ же не бѣда, если лѣченіе и продолжится нѣсколько дольше. Въ этомъ мнѣніи кроется весьма прискорбное—въ интересахъ больныхъ—недоразумѣніе, которое ведетъ свое начало отъ того времени, когда гомеопатическое лѣченіе было еще мало распространено и къ нему прибѣгали лишь тѣ больные, которые долго и безуспѣшно лѣчились аллопатіей, словомъ—больные, страдавшіе хроническими или затянувшимися острыми болѣзнями. Удивительно-ли, что въ подобныхъ случаяхъ гомеопатія не сразу помогаетъ, а должна часто долгое время бороться противъ болѣзни, и не только противъ самой болѣзни, но и противъ оставшихся въ организмѣ послѣ предыдущаго лѣ-

ченія вредныхъ послѣдствій. Можно ли говорить о медленномъ лѣченіи тамъ, гдѣ аллопатія или другіе способы лѣченія совсѣмъ безсильны и не помогаютъ! Не по такимъ случаямъ надо судить о быстротѣ дѣйствія гомеопатическихъ лѣкарствъ, а по случаямъ свѣжихъ и острыхъ заболѣваній, сравнивая быстроту дѣйствія лѣкарства не въ отношеніи паллиативныхъ, лишь временно облегчающихъ, аллопатическихъ или иныхъ средствъ, а въ отношеніи теченія и продолжительности болѣзни. Если такъ сравнивать эти два способа лѣченія, то получится слѣдующій выводъ, сдѣланный Ганеманомъ, и затѣмъ, въ течение цѣлаго столѣтія безчисленное множество разъ подтверждавшійся и подтверждающійся (статистикой и житейскимъ опытомъ), что гомеопатическія лѣкарства излѣчиваютъ болѣзни быстрѣе, полнѣе и пріятнѣе (*cito, tuto et jucunde*), чѣмъ аллопатическія лѣкарства. Само собою разумѣется, что здѣсь идетъ рѣчь о такихъ болѣзняхъ, которыя вообще излѣчимы лѣкарственнымъ путемъ. Что же касается хирургіи и вообще не лѣкарственныхъ способовъ лѣченія, то таковыя, за нѣкоторыми исключениями, признаются одинаково гомеопатомъ и аллопатомъ.

ГЛАВА V.

Практическія указанія для составленія домашней гомеопатической аптечки.

Въ Россіи гомеопатическія лѣкарства возможно получать только изъ специальныхъ гомеопатическихъ аптекъ. Аллопатическія, т. е. обычнаго типа аптеки не готовятъ такихъ лѣкарствъ и не приобретаютъ ихъ для отпуска. Къ сожалѣнію, гомеопатическія аптеки имѣются пока лишь въ немногихъ городахъ Имперіи. Поэтому для лицъ, живущихъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ ни аптекъ гомеопатическихъ, ни даже врачей-гомеопатовъ, но желающихъ лѣчиться по гомеопатическому способу, нѣтъ другого выхода, какъ имѣть у себя подъ руками, кромѣ гомеопатическаго руководства (лѣчебника), также соответствующія гомеопатическія лѣкарства.

Гомеопатическія лѣкарства каждый можетъ приобретать, также выписывать по почтѣ, изъ любой гомеопатической аптеки, какъ отдѣльно каждое лѣкарство и въ любомъ количествѣ, такъ

Гомеоп
ческі
аптеки

Приобрѣ
гомеоп
лѣкарств

и въ видѣ домашней аптечки, составленной изъ меньшаго или большаго числа лѣкарствъ; при этомъ не требуется обязательно рецепта врача, если только дѣленіе, въ какомъ требуется лѣкарство, не ниже того дѣленія, какое установлено закономъ для розничнаго, безрецептнаго, отпуска; это относится, именно, къ тѣмъ лѣкарствамъ, которыя въ болѣе крѣпкомъ разведеніи, нежели 1-е сотенное, являются еще сильнодѣйствующими и поэтому могутъ вызывать въ организмѣ вредныя послѣдствія, ухудшенія болѣзни.

Только опытный врачъ-гомеопатъ можетъ знать, въ какихъ случаяхъ полезно назначить болѣе низкое дѣленіе и даже чистую тинктуру или эссенцію.

Въ цѣляхъ удешевленія гомеопатическихъ лѣкарствъ можно, руководствуясь указанными выше правилами (см. стр. 15 и 16-ю), приобретать лѣкарства въ дѣленіяхъ ближайше-низшихъ противъ тѣхъ, какія указаны въ лѣчебникѣ для примѣненія на практикѣ; на примѣръ, вмѣсто *Аконита* $\times 3$, т. е. 3-го десятичнаго дѣленія (разведенія), *Аконитъ* $\times 2$, и изъ этого 2-го десятичнаго дѣленія готовить *Аконитъ* $\times 3$; или вмѣсто *Меркур. солуб.* 3, т. е. 3-го сотеннаго дѣленія (растиранія) — *Меркур. солуб.* 2, и изъ него приготовить 3-ье. Это можетъ имѣть существенное значеніе для тѣхъ провинціальныхъ гомеопатовъ, которые, не будучи сами врачами, желали бы, однако, за отсутствіемъ въ ихъ мѣстности врача-гомеопата, по человѣколюбію и въ доступной для нихъ мѣрѣ, помогать своимъ ближнимъ въ болѣзняхъ гомеопатическими лѣкарствами, въ то же время соблюдая возможную экономію въ расходахъ на лѣкарства.

Для приготовления указаннымъ способомъ дѣленій лѣкарствъ, высшихъ изъ низшихъ, необходимо имѣть въ достаточномъ количествѣ крѣпкій винный спиртъ (этиловый алкоголь), молочный сахаръ, роговые вѣски съ разновѣсомъ (аптечные) и фарфоровую ступку (аптечную) для порошковыхъ лѣкарствъ; кромѣ того достаточный запасъ совершенно чистыхъ порожнихъ сткляночекъ емкостью въ одну—два драхмы и чистыхъ, неупотребленныхъ пробокъ. Приготовление жидкихъ дѣленій облегчается и болѣе точно производится посредствомъ специальной стеклянной мѣрочки съ отмѣтками на ней десятичныхъ и сотенныхъ дѣленій; такія мѣрочки продаются въ гомеопатическихъ аптекахъ.

Само собою разумѣется, что самостоятельное приготовленіе дѣленій болѣе высокихъ изъ болѣе низкихъ, жидкихъ, порошковыхъ и проч., требуетъ умѣлаго и крайне тщательнаго отношенія

къ этому дѣлу, иначе могутъ получаться совершенно недѣйствительныя, негодныя лѣкарства. Поэтому, когда лѣкарства требуются для собственнаго лишь употребленія въ сравнительно небольшихъ количествахъ, гораздо цѣлесообразнѣе получать таковыя изъ гомеопатической аптеки сряду же въ тѣхъ дѣленіяхъ, въ какихъ они должны быть употребляемы у постели больного, это относится особенно къ тѣмъ лѣкарствамъ (начиная хотя бы съ 25-го лѣкарства—см. ниже перечень лѣкарствъ домашней аптечки), которая рѣже или очень рѣдко приходится примѣнять на практикѣ.

Изъ каждой гомеопатической аптеки лѣкарство отпускается всегда съ наклеенной на его стеклянкѣ этикеткѣ, на которой напечатано название лѣкарства русскими буквами и по латыни. Стеклянка съ лѣкарствомъ отпускается обыкновенно въ картонномъ футляричкѣ, а если лѣкарствъ больше, то — въ коробкѣ, въ которой имѣются перегородки для каждаго изъ нихъ; это дѣлается для предохраненія лѣкарствъ отъ вліянія свѣта и для лучшаго сохраненія вообще. Для надлежащаго сохраненія лѣкарствъ важно еще не путать пробокъ, не переставлять ихъ изъ одной стеклянки въ другую; для этой цѣли въ гомеопатическихъ аптекахъ название лѣкарства проставлено не только на этикеткѣ, но и на пробкѣ; кромѣ того—держатъ лѣкарства подальше отъ пахучихъ веществъ, особенно отъ камфоры, и въ болѣе прохладномъ мѣстѣ. Разведенія изъ растительныхъ веществъ, также порошки и пастилки, сохраняются хорошо годами; разведенія изъ нѣкоторыхъ металловъ (*Аргент. нитр.*, *Платина*, *Аурумъ*), также *Іодъ* и *Бромъ* не такъ стойки, и ихъ слѣдуетъ каждыя нѣсколько мѣсяцевъ обновлять. Пилули и крупинки, ставшія отъ времени прозрачными, какъ бы остекленѣлыми, уже негодны къ употребленію. Негодны также капли, которыя отъ времени помутнѣли и въ которыхъ образовался осадокъ.

Для лучшаго и точнаго отсчитыванія капель отпускаемая изъ гомеопатическихъ аптекъ бутылочки снабжены обыкновенно носикомъ у отверстия; тамъ же можно приобрести для этой цѣли специальный „капельникъ“; каждый разъ послѣ употребленія капельникъ надо обмыть, насухо вытереть и сохранять въ закрытой коробочкѣ.

Сохраненіе
гомеопатическихъ
лѣкарствъ

Перечень гомеопатических аптекъ, имѣющихся въ Россіи.

(составл. по „Россійскому Медицинскому Списку“ на 1909 годъ, изданному Управленіемъ Главнаго Врачебнаго Инспектора Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, и по личн. свѣдѣніямъ автора):

Въ С.-Петербургѣ:

1) Центральная Гомеопатическая Аптека провизора Б. В. Бореля, бывш. Флемминга, Гороховая, 17.

2 и 3) Аптеки СПб-скаго Благотворительнаго Общества Послѣдователей Гомеопатіи: 1-я на Садовой улицѣ, 18; 2-я на Лицейской улицѣ, 6.

4 и 5) Аптеки Благотворительнаго Общества Врачей-гомеопатовъ: 1-я на Невск. просп., 82; 2-я на В. О., Кадетская линія, 13.

6) Гомеопатич. Аптека провиз. Е. Э. Фохта, Кузнечный пер. 2.

Въ Москвѣ:

1) Центральн. Гомеопатич. Аптека провиз. С. А. Форбрихера, Петровка, домъ Коровина.

2) Гом. Аптека пров. Ф. Л. Вагнера, Маросейка, д. Пушкина.

Въ Кіевѣ:

1) Гомеопат. Аптека пров. В. П. Лѣлковскаго, Прорѣзная, 16.

2) Гом. Аптека врача І. І. Березницкаго, Владимірская, 51.

Въ Харьковѣ: Гомеопатическая Аптека провизора С. Ф. Струбчевскаго, Николаевская площ., 25.

Въ Одессѣ:

1) Гомеопат. Аптека аптекаря Ю. А. Лѣви, Соборная площ.

2) Гом. Аптека Ганнемановскаго О-ва, Херсонск. ул., 25/5.

Въ Ростовѣ на Дону: Гомеопатическая Аптека врача В. К. Піотровскаго, Богатинскій пер., 37.

Въ Варшавѣ:

1) Гомеопатич. Аптека провиз. А. М. Францкаго, Чистая, 6.

2) Аптека Общ. Послѣдоват. Гомеопатіи, Новый Свѣтъ, 16.

Въ Вильнѣ:

1) Гомеопат. Апт. пров. В. К. Тарулевича, Благовѣщенская, 7.

2) Аптека Вил. Общ. Послѣдов. Гомеопатіи, Георгіевск., 19.

Въ Ригѣ:

1) Гомеоп. Аптека пров. И. Г. Штейна, Крѣпостная ул., 31.

2) Гом. Аптека пров. А. Э. Юнгера, Крѣпостная ул., 28.

Въ Посадѣ Руенѣ, Лифл. губ.: Гом. Апт. пров. К. А. Румента.

Въ Либавѣ: Гом. Апт. пров. И. З. Каттерфельда, Торговая, 17.

Въ Подзѣ: Гом. Апт. пров. І. І. Погоновскаго, Петровская, 115.

Въ Минскѣ: Гом. Апт. насл. вр. Павловича, Захарьевская, 97.

Въ Казани: Гом. Аптека пров. К. Иванова, уголъ Воскресенской и Петропавловской улицъ.

Въ Вяткѣ: Гом. Аптека пров. А. К. Маттеса.

Въ Саратовѣ: Гом. Апт. пров. А. Гурвича, Нѣмецкая ул.

Въ Тифлисѣ: Гом. Апт. г-жи Пржисѣцкой, Головинскій пр., 18/1.

Въ Житомирѣ: Гомеопат. Аптека провиз. М. Хржонстовскаго.

Въ Бѣлостокѣ: Гомеопат. Аптека провиз. Б. Ф. Яцыныча.

Въ Бердичевѣ: Гомеопат. Аптека провиз. Я. Б. Шиперовича.
Въ Екатеринославѣ: Гомеоп. Аптека провиз. А. М. Лемберга.
Въ Ковнѣ: Гомеопат. Отдѣленіе при Аптекѣ П. И. Ивенскаго.

Составъ домашней гомеопатической аптечки.

Для начала можно ограничиться такой аптечкой, которая состоитъ изъ небольшого числа лѣкарствъ, изъ такихъ именно, которыя подходятъ для наиболѣе часто встрѣчающихся болѣзненныхъ состояній. Сюда относятся слѣдующія лѣкарства:

I.

1. *Аконитъ* (Aconitum Napellus, Борецъ) $\times 3-3^*$.
2. *Аписъ* (Apis mellifica, Пчелиный ядъ) $\times 3-3$.
3. *Арника* (Arnica montana, Баранья трава) $\times 3-3$.
4. *Арсеникъ* (Arsenicum album, Мышьякъ бѣлый) $\times 3-3$.
5. *Белладонна* (Belladonna, Красавка) $\times 3-3$.
6. *Брионія* (Bryonia alba, Переступень бѣлая) $\times 3-3$.
7. *Вератрумъ альбумъ* (Veratrum album, Чемерица бѣлая) $\times 2-3$.
8. *Гепаръ сульфурисъ* (Hepar sulphuris, Сѣрная печень) $\times 3-3$ (порошковая)—6 (разведеніе).
9. *Игнація* (Ignatia amara, Челибуха) $\times 3-3$.
10. *Ипеакауана* (Ipecacuanhae radix, Рвотный корень) $\times 3-3$.
11. *Колоцинтъ* (Colocynthis, Колоквинтъ) $\times 3-3$.
12. *Меркурій солюбилисъ* (Mercurius solubilis Hahnemannii, ртутный препаратъ Ганеманна) $\times 3-3$ (порошковая)—6 (разведеніе).

Аптеч
изъ 24
карт

*) При требованіяхъ изъ аптеки лѣкарствъ достаточно называть такъ, какъ они напечатаны здѣсь курсивомъ, съ добавленіемъ цифры, означающей дѣленіе лѣкарства, напримѣръ—*Аконитъ* $\times 3$; также—въ какомъ видѣ желательно имѣть лѣкарство: въ разведеніи (т. е. въ „капляхъ“) или въ крупинкахъ, пилюляхъ и проч. и въ какомъ количествѣ (см. „цѣны гомеопатическимъ лѣкарствамъ“ въ концѣ книги). Въ прокъ всего практичнѣе и выгоднѣе имѣть лѣкарства въ разведеніяхъ, каковыя и подразумѣваются въ предлагаемомъ здѣсь спискѣ ихъ; всѣ эти лѣкарства можно имѣть и во всякой другой формѣ (крупинки, пилюли и проч.); при тѣхъ же лѣкарствахъ, которыя могутъ быть въ означенныхъ дѣленіяхъ только въ порошковой формѣ (или въ формѣ таблетокъ), напечатано слово „порошковое“. Изъ двухъ-трехъ цифръ, поставленныхъ при одномъ и томъ же лѣкарствѣ, болѣе жирно напечатанная означаетъ то дѣленіе, которое чаще употребляется въ практикѣ, болѣе же тонко напечатанная—то дѣленіе, которое употребляется рѣже. Болѣе подробныя указанія относительно дѣленій приводятся при каждомъ лѣкарствѣ въ 4-й части этой книги.

13. *Меркурій ціанатъ* (Mercurius cyanatus, Ціанистая ртуть) $\times 3-6$.
14. *Нуксъ вомика* (Nux vomica, Рвотный орѣхъ) $\times 3-3-6$.
15. *Пульсатилла* (Pulsatilla nigricans, Вѣтреница) $\times 3-3$.
16. *Русъ* (Rhus toxicodendron, Сумахъ ядовитый) $\times 3-3$.
17. *Силиція* (Silicia, Кремнеземъ) 3 (порошковое)—6 (разведеніе).
18. *Спонгія* (Spongia marina tosta, Губка морская жженная) $\times 3-3$.
19. *Сульфуръ* (Sulphur, Сѣра) $\times 3-3$ (порошковая)—6 (разведеніе).
20. *Тартар. эметик.* (Tartarus emeticus, Рвотный камень) 3—6.
21. *Фосфоръ* (Phosphor, Фосфоръ) $\times 3-3$.
22. *Хамомилла* (Chamomilla vulgaris, Ромашка обыкновенная, полевая) $\times 3-3$.
23. *Хина* (China, Хинная кора) $\times 1-\times 3-3$.
24. *Цина* (Cina, Цытварное сѣмя) $\times 2-\times 3$.

Эта аптечка изъ 24 лѣкарствъ можетъ, сряду же или постепенно, быть расширена до 48 лѣкарствъ, путемъ добавленія еще 24, также часто употребляемыхъ, а именно:

II.

аптека
48 лѣ-
карствъ.

1 по 24 — см. выше.

25. *Антимоніумъ крудумъ* (Antimonium crudum, Сурьма трехсѣрнистая) 3 (порошковое)—6 (разведеніе).
26. *Аурумъ муріатикумъ* (Aurum muriaticum natronatum, Хлорнатріевое золото) $\times 3-3$.
27. *Ацидумъ нитрикумъ* (Acidum nitricum, Азотная кислота) $\times 3-6$.
28. *Баптізія* (Baptisia tinctoria, Дикій индикъ) $\times 2-\times 3$.
29. *Барита карбоника* (Baryta carbonica, Углекислый баритъ) 3—6.
30. *Гамамелисъ* (Hamamelis virginica, Волшебный виргинскій орѣхъ) $\times 2-\times 3$.
31. *Гельземинъ* (Gelsemium, Желтый жасминъ) $\times 3-3$.
32. *Дрозера* (Drosera rotundifolia, Росянка круглолистная) $\times 3-3$.
33. *Дулькамара* (Dulcamara solanum, Пасленъ сладкогорный) $\times 3-3$.
34. *Іодумъ* (Iodum purum, Іодъ) $\times 3-3$.
35. *Калькареа карбоника* (Calcareea carbonica, Мѣлъ) 3 (порошковое)—6 (разведеніе).
36. *Каннабисъ индика* (Cannabis indica, Индійская конопля) $\times 2-3$.

37. *Кантарисъ* (Cantharis, Шпанская муха) 3—6.
38. *Карбо вегетабилисъ* (Carbo vegetabilis, Растительный уголь) 3 (порошковое)—6 (разведение).
39. *Коффеа* (Coffea, Кофе) × 3—3.
40. *Купрумъ ацетикумъ* (Cuprum aceticum, Уксуснокислая мѣдь) × 3—3.
41. *Ликсподиумъ* (Lycopodium semen, Плауновое сѣмя) 3 (порошковое)—6 (разведение).
42. *Меркуріусъ биодатусъ* (Mercurius bijodatus, двуіодистая ртуть) 3 (порошковое)—6 (разведение).
43. *Меркуріусъ коррозивусъ* (Mercurius corrosivus, Сулема) × 4—3.
44. *Опіумъ* (Opium, Опій) × 3—3.
45. *Серія* (Seria, Каракатица) 3—6.
46. *Спигелія* (Spigelia, Глистница) × 3 3.
47. *Фосфори ацидумъ* (Phosphori acidum, Фосфорная кислота) × 3—3.
48. *Эвфразія* (Euphrasia, Очанка) × 3—3.

Если желательно придать домашней аптечкѣ еще большую полноту, то увеличиваютъ ее до 100 лѣкарствъ, каковое число ихъ совершенно достаточно въ громадномъ большинствѣ болѣзненныхъ состояній. Для этой цѣли добавляются еще слѣдующія 52 лѣкарства:

III.

1 по 48 — см. выше.

49. *Аммоніумъ карбоникумъ* (Ammonium carbonicum, Углекислый аммоній) × 3.
50. *Анакардіумъ* (Anacardium orientale, Индѣйскій бобъ) × 3 (порошковое).
51. *Аргентумъ нитрикумъ* (Argentum nitricum, Азотно-кислое серебрѣ, ляписъ) × 3.
52. *Арсеник. іодат.* (Arsenic. iodat., Іодистый мышьякъ) 3.
53. *Ацидумъ бензоикумъ* (Acidum benzoicum, Бензойная кислота) × 3—6.
54. *Ацид. муріатик.* (Acid. muriatic., Соляная кислота) × 3.
55. *Бромумъ* (Bromum, Бромъ) × 4.
56. *Валеріана* (Valeriana officinalis, Валеріана) × 1.
57. *Гидрастисъ* (Hydrastis canadensis, Водолістъ канадскій) × 2.
58. *Гіосциамусъ* (Hyosciamus, Бѣлена) 3.
59. *Глоноинъ* (Glonoinum, Nitroglycerinum, Нитроглицеринъ) 3.
60. *Графитъ* (Graphites) 3 (порошковое)—6 (разведение).
61. *Дигиталисъ* (Digitalis purpurea, Наперстянка) × 3.
62. *Кактусъ* (Cactus grandiflorus, Кактусъ великоцвѣтн.) × 3.

Апте
изъ 16
карс

63. *Кали іодат.* (Kali jodatum, Іодистый Калій) $\times 3-1$.
64. *Кали карбоник.* (Kali carbonicum, Углекислый калій, поташъ) $\times 3$.
65. *Калькареа фосфорика* (Calcareo phosphorica, Фосфорно-кислая известь) $\times 3$ (порошковое)—6 (разведеніе).
66. *Камфора* (Camphora) $\times 1$ — насыщ. растворъ: *Камфора Рубини* (см. „Лѣкарствовѣдніе“, 66-е лѣкарство).
67. *Каустикумъ* (Causticum, см. „Лѣкарствовѣдніе“) $\times 3$.
68. *Капсикумъ* (Capsicum annuum, Стручковый перецъ) $\times 3$.
69. *Клематисъ* (Clematis erecta, Ломоносъ) $\times 3$.
70. *Коккулюсъ* (Cocculus, Кукольникъ) $\times 3$.
71. *Кольхикумъ* (Colchicum autumnale, Безвременникъ) $\times 2$.
72. *Коніумъ* (Conium maculatum, Болиголовъ) $\times 3$.
73. *Крокусъ* (Crocus, Шафранъ) $\times 3$.
74. *Лаксизъ* (Lachesis, Змѣиный ядъ) 6.
75. *Ледумъ* (Ledum palustre, Багульникъ) $\times 3$.
76. *Мезереумъ* (Mezereum Daphne, Волчье лыко) $\times 3$.
77. *Миллефоліумъ* (Millefolium, Тысячелистникъ) $\times 2$.
78. *Натрумъ муріатикумъ* (Natrium muriaticum, Соляно-кислый натръ) 3—6.
79. *Нуксъ мосхата* (Nux moschata, Мускатный орѣхъ) $\times 3$.
80. *Платина муріатика* (Platina muriatica, Солянокислая платина) 3.
81. *Плумбумъ* (Plumbum, Свинець) 3 (порошковое) — 6 (разведеніе).
82. *Ранункулюсъ* (Ranunculus bulbosus, Жабникъ луковичный) $\times 3$.
83. *Рододендронъ* (Rhododendron chrysanthum, Горная роза золотоцвѣтная) $\times 2$.
84. *Сабина* (Sabina, Казацкій можжевельникъ) 3.
85. *Сангвинарія* (Sanguinaria canadensis, Кровавикъ канадскій) $\times 3$.
86. *Селеніумъ* (Selenium, Селенъ) $\times 4$.
87. *Станнумъ* (Stannum, Олово) $\times 3-3$ (порошковая).
88. *Стафизагрія* (Staphisagria, Соколка) $\times 3$.
89. *Страмоніумъ* (Stramonium, Дурманъ) 3.
90. *Туя* (Thuja occidentalis, Древо жизни) $\times 3$.
91. *Ураніумъ нитрикумъ* (Uranium nitricum, Азотнокислый уранъ) $\times 3$.
92. *Феррумъ* (Ferrum, Желѣзо) 3 (порошковое)—6 (разведеніе).
93. *Филіксъ масъ* (Filix mas, Папоротникъ) $\times 1-3$.
94. *Фитолакка* (Phytolacca decandra, Лаконоска) $\times 3$.
95. *Хелидоніумъ* (Chelidonium majus, Чистотѣль) $\times 3$.
96. *Цикута* (Cicuta virosa, Вехъ ядовитый) $\times 3-3$.
97. *Цимицифуга* (Cimicifuga racemosa, Воронецъ выс.) $\times 3$.
98. *Цинкумъ* (Zincum) 3 (порошковое)—6 (разведеніе).
99. *Эскулусъ* (Aesculus hippocastanum, Лжекаштанъ конскій) $\times 3$.

100. *Этуза* (*Aethusa cynapium*, Собачья петрушка ядовитая) $\times 3$.

При большой отдаленности отъ гомеопатической аптеки можно бы увеличить домашнюю аптечку еще 20 лѣкарствами, болѣе или менѣе обычными въ практикѣ; къ нимъ можно отнести:

IV.

1 по 100—см. выше.

101. *Агарикусъ* (*Agaricus muscarius*, Мухоморъ) $\times 3$.
 102. *Алюмина* (*Alumina*, Глиноземъ) 3 (порошковое), — 6 (разведение).
 103. *Амбра* (*Ambra grisea*, Сѣрая амбра) 3.
 104. *Аммоніумъ броматумъ* (*Ammonium bromatum*, Бромистый аммоній) $\times 3$.
 105. *Аса фетида* (*Asa foetida*, Вонючая камедь) 3.
 106. *Берберисъ* (*Berberis vulgaris*, Барбарисъ обыкновен.) $\times 1$.
 107. *Бисмутумъ* (*Bismuthum*, Висмутъ) $\times 2$.
 108. *Вакцининъ* (*Vaccinium*, Оспенный ядъ) $\times 3$.
 109. *Геллеборусъ* (*Helleborus niger*, Зимняя роза) $\times 3$.
 110. *Дигиталисъ* (*Digitalis*, Наперстянка) $\times 1$.
 111. *Кардуусъ* (*Carduus marianus*, Марвинъ татарникъ) $\times 1$.
 112. *Кали броматумъ* (*Kalium bromatum*) $\times 1—3$.
 113. *Коллинсонія* (*Collinsonia canadensis*) $\times 2$.
 114. *Литіумъ карбоникумъ* (*Lithium carbonicum*) $\times 2$.
 115. *Пододифиллумъ* (*Podophillum*) $\times 2$.
 116. *Румексъ* (*Rumex crispus*, Щавель курчавый) $\times 3$.
 117. *Секале* (*Secale cornutum*, Спорынья) $\times 3$.
 118. *Сенеціо* (*Senecio aureus*, Крестовникъ) $\times 2$.
 119. *Теребинтина* (*Terebintina*, Скипидаръ) $\times 3$.
 120. *Элантусъ* (*Ailanthus glandulosa*, Китайскій ясень) $\times ..$

Апте
изъ 12
нарс

Этими 120 лѣкарствами далеко еще не ограничивается количество лѣкарственныхъ веществъ, примѣняемыхъ въ гомеопатіи, а число таковыхъ доходитъ до нѣсколькихъ сотъ. Надо, однако, сказать, что многія изъ послѣднихъ даже врачами-гомеопатами рѣдко прописываются, тѣмъ болѣе они излишни въ руководствѣ для домашняго лѣченія; это—потому, что большинство этихъ средствъ пока недостаточно еще испытано, и извѣстный до сей поры кругъ дѣйствія каждаго изъ нихъ сравнительно очень ограниченъ.

Впрочемъ, ради возможно большей полноты, можно привести здѣсь еще слѣдующія 80 лѣкарствъ, изъ которыхъ многія (напр., №№ 123, 127, 128, 133, 136, 140, 143, 151, 156, 158, 159, 164, 171, 173, 181, 183, 185, 188, 191, 194) примѣняются сравнительно еще довольно часто въ практикѣ, а именно:

V.

сечна 1 по 120—см. выше.

00 лѣ- 121. *Абіесъ*.—122. *Абсинтъ*.—123. *Агнусъ*.—124. *Аза-*
 125. *Акалифа*.—126 *Алоэ*.—127. *Алюминій*.—128. *Ам-*
 129. *Аммоній муріатикъ*.—130. *Аммоній*
 131. *Ангустура*.—132. *Аноморфинъ*.—133. *Апо-*
 134. *Аранеа*.—135. *Артемизія*.—136.
 137. *Ацид. пикриникъ*.—138. *Бовиста*.—139.
 140. *Бусфо*.—141. *Вератр. вириде*.—142. *Вербас-*
 143. *Вискумъ альбумъ*.—144. *Вибурумъ*.—145. *Винка*
 146 *Гваякумъ*.—147 *Гелантъ*.—148. *Гелоніасъ*.—149.
 150. *Гринделія*.—151. *Гвако* (наружно-употреб-
 152. *Диоскореа*.—153. *Ирисъ*.—154. *Кадмій*.—155.
 156. *Калькарея флуорика*.—157. *Кальмія*.—158.
 159. *Каулофиллумъ*.—160. *Коккусъ*
 161. *Кротонъ*.—162. *Копайба*.—163. *Калькарея аце-*
 164. *Калькарея іодата*.—165. *Лаписъ альбусъ*.—166.
 167. *Лептандра*.—168. *Лилиумъ тигринумъ*.—169.
 170. *Меніантесъ*.—171. *Мосхусъ*.—172. *Мурексъ*.—173.
 174. *Нуфаръ*.—175. *Олеандръ*.—176. *Палладіумъ*.—177.
 178. *Плантаго*.—179. *Реумъ*.—180. *Сабадилла*.—
 181. *Сабаль серулата*.—182. *Самбукусъ*.—183. *Сарраценія*.—184.
 185. *Сизигіумъ ямболанумъ*.—186. *Стикта пульма-*
 187. *Стиллингія*.—188. *Стронцій карбоникъ*.—189. *Та-*
 190. *Тевкріумъ*.—191. *Ува урси*.—192. *Фелландріумъ*.—
 193. *Фукусъ везикулозусъ*.—194. *Цепа*.—195. *Цикламенъ*.—196.
 197. *Эвкалиптъ*.—198. *Эвфорбій*.—199. *Эвпа-*
 200. *Юглансъ*.

Дѣленія лѣкарствъ этой группы и дополнительные дѣленія
 предыдущихъ лѣкарствъ—см. въ „Лѣкарствовѣдѣніи“.

Дѣйствія всѣхъ перечисленныхъ выше 200 лѣкарствъ изложены
 подробно въ 4-ой части этой книги („Лѣкарствовѣдѣніе“), и лѣкар-
 ства слѣдуютъ тамъ другъ за другомъ въ томъ же порядкѣ, отъ
 1-го до 200-го, что значительно ускоряетъ, въ случаѣ справки, на-
 хожденіе требуемаго лѣкарства.

Цѣны домашней гомеопатической аптечки разныхъ размѣ-
 ровъ, а также отдѣльныхъ гомеопатическихъ лѣкарствъ, по преис-
 курантамъ петербургскихъ гомеопатическихъ аптекъ, помѣщены
 въ концѣ этой книги.

ГЛАВА VI.

Лѣкарства въ наружныхъ примѣненіяхъ.

Нѣкоторыя лѣкарства примѣняются въ гомеопатіи не только внутрь, но и наружно, или же только наружно, въ видѣ тинктуръ, растворовъ, мазей, маслъ, опodelьдоковъ, суппозиторій и проч.

Главнѣйшія для наружнаго примѣненія лѣкарства, имѣтъ которыя рекомендуется уже при самомъ меньшемъ составѣ домашней гомеопатической аптечки, суть слѣдующія: *Арника* Θ , *Календула* Θ , *Гаммелисъ* Θ . По мѣрѣ же надобности или, по желанію, сряду при пріобрѣтеніи домашней аптечки, можно обзавестись и прочими приводимыми ниже лѣкарствами.

Арника Θ (*Arnica montana*, Баранья трава): при ранахъ примѣняется въ видѣ водныхъ растворовъ, обмываній и компрессовъ, масла или мази. При ушибахъ, ущемленіяхъ, вывихахъ, если кожа не повреждена, можно *Арника* Θ втирать въ чистомъ ея видѣ, неразведенную, но чаще также въ только что упомянутыхъ формахъ. Надо знать, что у нѣкоторыхъ людей кожа не выноситъ арники, что на ней образуется, отъ приложенія послѣдней, воспалительная краснота и даже рожеподобная припухлость. Поэтому, при первыхъ признакахъ раздраженія кожи, арника должна быть оставлена и замѣнена другимъ лѣкарствомъ, болѣе или менѣе однороднымъ по дѣйствію (*Беллисъ-перенисъ*, *Гиперикумъ*, *Календула*—см. ниже). Во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ употреблять слишкомъ крѣпкихъ растворовъ *арники*, а пользоваться приблизительно слѣдующими пропорціями:

1) При поврежденіяхъ кожи (раны): 1 часть Θ на 100 частей (напримѣръ, 1 чайная ложечка на 2 стакана) воды. Этотъ же растворъ для обмываній слизистыхъ оболочекъ (влагалища, глазъ; для полосканія рта и горла) въ подходящихъ случаяхъ.

2) При неповрежденной кожѣ (ушибъ, вывихъ, ущемленія); 1 часть Θ на 8—12 частей воды (для примочекъ и компрессовъ) или на столько же частей растительнаго масла, водки или спирта, для втираній въ тѣхъ же случаяхъ, когда острое, воспалительное, состояние прошло или уменьшилось отъ компрессовъ, также—при боли мышцъ послѣ чрезмѣрнаго или продолжительнаго напряженія, при трещинахъ кожи, при пролежняхъ съ неизлѣвленной, неповрежденной еще кожей. Также въ видѣ опodelьдока и мази.

Арника-масло, также **арника-помада**, полезны, между прочимъ, для втиранія въ кожу головы для лучшаго ращенія и укрѣпленія волосъ (при нежирной кожѣ головы). **Арника-спиртъ** для той же цѣли втирается въ кожу щеточкой (при жирной кожѣ головы).

Арника-пластырь—для соединенія краевъ порѣзныхъ ранъ, для мелкихъ ранъ, царапинъ, ссадинъ; ускоряетъ процессъ заживленія.

Арника-мыло—для обмыванія склонной къ сыпямъ и трещинамъ кожи, но не слишкомъ чувствительной, нѣжной; въ послѣднемъ случаѣ отъ арники можетъ получиться еще большее раздраженіе кожи.

Гиперикумъ Θ (*Hypericum*, Звѣробой) замѣняетъ арнику, когда послѣдняя плохо переносится. Особенно при очень болящихъ ранахъ, захватывающихъ нервную ткань, какъ на пальцахъ, на лицѣ, на ладони, на ступнѣ. Пропорція: 1 часть Θ на 20 частей теплой воды (или на 8 частей масла).

Календула Θ (*Calendula*, Ноготки). Весьма дѣйствительное лѣкарство при порѣзныхъ и разорванныхъ ранахъ, при ссадинахъ, царапинахъ и открытыхъ язвахъ, также при катаррахъ слизистыхъ оболочекъ. Пропорція какъ для арники. Для полосканія рта, при дурномъ запахѣ изъ него, достаточно брать 30—40 капель на стаканъ воды.—**Календула-мазь**—при гноящихся ранахъ и ожогахъ. **Календула-мыло** — при нездоровой кожѣ, склонной къ угрямъ и прыщамъ. **Календула-пластырь** употребляется для тѣхъ же цѣлей, какъ арника-пластырь.

Беллисъ-переннисъ (*Bellis perennis*) замѣняетъ арнику, когда она не переносится хорошо. Пропорція какъ для арники. Втираніе чистой тинктуры (Θ) уменьшаетъ часто красноту родимыхъ пятенъ.

Гамамелисъ Θ (*Hamamelis virginica*, Виргинскій волшебный орѣхъ): кровоостанавливающее средство при кровотеченіи изъ носа и десенъ (спринцеваніе или полосканіе растворомъ изъ 1 чайной ложки въ стаканъ воды); при наружныхъ кровотеченіяхъ (изъ открывшейся вены или геморроидальной шишки)—примочка изъ болѣе крѣпкаго раствора (столовая ложка на $\frac{1}{2}$ или 1 стаканъ воды), въ крайнемъ случаѣ—даже'пополамъ съ водой; при кровотеченіи изъ матки—спринцеваніе (1 чайная до 1 столовой ложки на 2 стакана воды).—**Гамамелисъ-вата** прикладывается къ кровоточащему мѣсту.—**Гамамелисъ-мазь** для смазыванія болѣзненныхъ геморроидальныхъ шишекъ, также при варикозныхъ язвахъ, при болящихъ грудныхъ соскахъ и проч.; при сильныхъ, дергающихъ геморроидальныхъ боляхъ у задняго прохода полезна

также **Эскулусъ-мазь**. Боли такія облегчаются и **Белладонна-мазью**. Средства эти можно получать изъ гомеопатическихъ аптекъ и въ формѣ вставляемыхъ въ задній проходъ суппозиторій (свѣчей). **Гаммелисъ-экстрактъ**: это — прозрачная какъ вода жидкость, съ пріятнымъ запахомъ; она получается путемъ перегонки водной или водно-спиртной изъ растенія; наружно примѣнять его можно въ неразведенномъ видѣ въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда кожа не повреждена, въ видѣ компресса, удерживаемаго на мѣстѣ помощью бинта, также въ растворѣ (въ двухъ — трехъ частяхъ воды) при воспалении, припухлости и боли, при кровотечении же въ особенностях. При кровотечении изъ носа вводятъ въ ноздрю вату, смоченную этимъ экстрактомъ. При кровотечении изъ десенъ приложить вату съ экстрактомъ къ кровоточащему мѣсту. При кровотечении изъ легкихъ, желудка, показаны внутренніе приемы этого экстракта (неразведеннаго, по 5 — 10 капель, даже до чайной ложки на приемъ).

Гидрастисъ Θ (*Hydrastis canadensis*, Водолистъ Канадскій); при катаррахъ слизистыхъ оболочекъ и при злокачественныхъ язвахъ; для примочекъ и обмываній 1 часть Θ на 10—12 частей воды; для мази—30 капель на столовую ложку вазелина или спермацетной мази.

Симфитумъ Θ (*Symphytum*, Живокость): при поврежденіяхъ и воспаленіяхъ костей, 1 часть Θ на 10 частей воды или 1 часть Θ на 8 частей мази.

Стафизагрія Θ (*Staphisagria*, Соколка): при глубокихъ, особенно колотыхъ ранахъ, при опухлости или воспалении отъ ущемленія или удара о тупой предметъ. При поражении костей (костюда), при гнющихъ зубахъ; 30—40 капель на стаканъ воды для полосканія рта, 1 чайная ложка на $\frac{1}{2}$ —1 стаканъ воды для примочекъ, обмываній, компрессовъ.

Уртика Θ (*Urtica urens*, Крапива): при ожогѣ или ошпарении, когда имѣется рожеподобное припухание безъ пузырей. Растворъ пополамъ съ водой для примочекъ. **Уртика-мазь**, 1 часть на 8 частей спермацетной мази, при ожогахъ и ошпареніяхъ, когда сошла верхняя кожа.

Абротанумъ Θ (*Abrotanum*) при ознобленіяхъ; мазь изъ 1 чайной ложки на унцію (2 столовые ложки) вазелина или сала, для примочекъ же—1 часть Θ на 9 частей воды.

Кантарисъ × 2: при ожогахъ и ошпареніяхъ предупреждается образованіе пузырей, если, не пропустивъ времени, приложить

компрессъ изъ 10—15 капель *Кантарисъ* $\times 2$ въ столовой ложкѣ воды, и по мѣрѣ высыханія увлажнять его, не снимая.

Каустикумъ $\times 2$ примѣняется при ожогахъ и ошпареніяхъ, если первое время упущено и уже успѣли образоваться пузыри, равно какъ и вообще въ болѣе серьезномъ поврежденіи кожи отъ этихъ причинъ. Пропорція та же, что для *Кантарисъ*, и тотъ же способъ примѣненія.

Какъ *Кантарисъ*, такъ и *Каустикумъ* можно примѣнять и въ видѣ мази или съ растительнымъ масломъ, въ пропорціи 1 къ 8 или 10.

При ознобленіяхъ примѣняются тѣ же средства, что и при ожогахъ.

Туя Θ (*Thuja occidentalis*, Древо жизни): при бородавчатыхъ наростахъ и бородавкахъ смазывать чистой тинктурой раза два въ день; при полипахъ. *Туя-мазь*: при застарѣлыхъ язвахъ, при ракѣ и сухихъ лишаихъ.

Фитолякка Θ (*Phytolacca decandra*, Лаконоска): при воспаленіи горла и зѣва (особенно—при дифтеритѣ, рядомъ съ гидрастисъ), при сифилитическомъ пораженіи слизистыхъ оболочекъ, при опуханіи железъ: грудныхъ, околоушной, сѣменныхъ и яичекъ; при раковыхъ образованіяхъ. Въ видѣ растворовъ, масла или мази. Пропорція какъ для *Гидрастисъ*.

Аписъ-масло: при опуханіи железъ и при водяночныхъ отекахъ, также ревматическихъ. *Аписъ* въ видѣ помады рекомендуется для укрѣпленія корней волосъ (какъ *Арника-масло* или—мазь) при жирной кожѣ головы, а *Аписъ-спиртъ*, для той же цѣли (какъ *Арника-спиртъ*) при нежирной кожѣ головы.

Эвфразія Θ (*Euphrasia*, Очанка): при болѣзняхъ глазъ; въ видѣ примочекъ (5 капель на столовую ложку воды) или глазныхъ ванночекъ (2 капли на глазную рюмочку воды), особенно при воспаленіи вѣкъ и краснотѣ глазъ.

Рута Θ (*Ruta graveolens*): при утомленіи глазъ отъ продолжительнаго напряженія, въ формѣ глазной ванночки или обмыванія глазъ, или примочками изъ 2 — 3 капель на столовую ложку воды. Употребляется также для обмываній и примочекъ при пролежняхъ (40—60 капель на стаканъ воды).

Весьма частое наружное примѣненіе имѣютъ въ гомеопатіи слѣдующія лѣкарства: *Белладонна*, *Бріонія*, *Русъ*, *Пульсатилла*, *Аконитъ*, *Ледумъ*, *Гвако*, преимущественно въ формѣ оподель-

дока, но часто также въ смѣси съ растительнымъ масломъ или вазелиномъ, спермацетомъ и т. п.

Показанія для наружнаго употребленія этихъ лѣкарствъ слѣдующія:

Белладонна Θ : при воспалительныхъ, болѣзненныхъ припуханіяхъ, при воспаленіяхъ железъ, при нервныхъ и мышечныхъ боляхъ; употребляется въ формѣ масла или мази (1 часть Θ на 8 частей того или другого); при боли, не сопровождающейся воспаленіемъ, также для втиранія въ наружные покровы; наружно при воспаленіи внутренняго органа болѣе подходитъ форма опodelьдока. Въ тинктурѣ (Θ) *Белладонна* выдается изъ аптекъ лишь по рецепту врача. Растворъ *Белладонна* Θ примѣняется иной разъ врачами для компрессовъ (30—40 капель на полстакана воды), также для втиранія, съ водкой или виннымъ спиртомъ, въ пропорціи 1 части на 20—30 частей того или другого. Назначается также въ видѣ суппозиторій (свѣчей).

Аконитъ Θ : наружное примѣненіе свое онъ имѣетъ, подобно белладоннѣ, при воспалительныхъ процессахъ, особенно же при спазматическихъ судорожныхъ страданіяхъ, также при невралгіяхъ и вообще при боляхъ, особенно—лицевыхъ; также при онѣмѣніяхъ въ членахъ, сопровождающихся или перемежающихся сильной болью; при ревматическихъ боляхъ. Пропорція, какъ для белладонны, тѣ же и формы примѣненія. Какъ и Белладонна, *Аконитъ* въ неразведенной (Θ) тинктурѣ не выдается изъ аптекъ безъ рецепта врача.

Бріонія Θ : при воспалении и боли въ груди (бронхитъ, плевроитъ), при остромъ воспаленіи и боли суставовъ или мышцъ (ревматизмъ суставный или мышечный); при хроническомъ ревматизмѣ, когда боль усиливается отъ движенія. Пропорція: 1 часть Θ на 4 или 8 частей растительнаго масла или вазелина и т. п., или водки, виннаго спирта; опodelьдокъ.

Русъ Θ : при пораженіи суставовъ, при боли въ нихъ, но безъ опуханія; въ противоположность бріоніи, боль ухудшается въ покоѣ и облегчается при движеніи; при подострыхъ и хроническихъ ревматическихъ страданіяхъ, особенно когда они происходятъ или ухудшаются отъ сырости, отъ промоканія (тогда какъ боль бріоніи или аконита происходитъ или ухудшается скорѣе отъ сухого холода); при пораженіи сухожилій, связокъ, нервныхъ сумокъ, менѣе—при пораженіи мышцъ; при нѣкоторыхъ поверхностныхъ пораженіяхъ кожи (пузырчатая сыпь, мокрые

лишай, особенно при пояскомъ лишай, экземѣ), сопровождающихся зудомъ съ жженіемъ. Пропорція: 1 часть Θ на 8—10 частей масла или вазелина, спермацета и т. п. или водки или спирта; оподельдокъ.

Пульсатилла Θ : при ревматическихъ и подагрическихъ боляхъ; боль переходитъ съ мѣста на мѣсто; особенно при поражении колѣнъ, лодыжекъ и мелкихъ суставовъ рукъ и ногъ; также въ свѣжихъ случаяхъ воспаленія этихъ суставовъ. При поражении венъ (рядомъ съ *Гаммелисѣ*), особенно бедренныхъ, послѣ родовъ, также при геморроидальныхъ шишкахъ и расширеніи сѣменного канатика; при воспалении яичекъ или предстательной железы; при боляхъ въ яичникахъ или грудныхъ железахъ; при ячменяхъ на вѣкахъ; при боли въ ушахъ. Пропорція: какъ для *Бріоніи*; при ревматическихъ и подаграческихъ боляхъ—оподельдокъ или втираніе съ водкой или спиртомъ, въ другихъ случаяхъ—*масло- или мазь-пульсатиллы*.

Ледумъ Θ : при невоспалительныхъ страданіяхъ суставовъ, особенно—мелкихъ, напимѣръ—пальцевъ; при ногтядѣ вслѣдствіе поврежденія, при подагрѣ. Для колотыхъ ранъ *Ледумъ* то же, что *Арника*—для ушибленныхъ. При зудѣ отъ ужаления комаровъ (въ Θ или болѣе крѣпкомъ растворѣ). Пропорція вообще какъ для *Бріоніи*.

Гвако Θ : при жженіи и боли позвоночника у особъ, страдающихъ приливами къ головѣ (у полнокровныхъ) или къ брюшнымъ органамъ (при геморроѣ); также при параличахъ конечностей апоплексического происхожденія. Примѣняется преимущественно въ формѣ оподельдока, но также съ масломъ или спиртомъ (1' на 10).

Наружно примѣняются еще и другія лѣкарства при соотвѣствующихъ имъ показаніяхъ, напимѣръ: **Нуксъ-вомика** Θ (въ тѣхъ же формахъ и пропорціяхъ, какъ Акониѣ, Беллад. и т. п.), особенно при геморроѣ, боли въ поясницѣ (какъ Гвако).—**Верба-скумъ** Θ (при нервныхъ лицевыхъ боляхъ и мигрени).—**Гельземинъ** Θ (въ такихъ же случаяхъ и при параличныхъ страданіяхъ).—**Геліантусъ** Θ (при боляхъ отъ прищемленія: 1 часть на 10 частей воды).—**Камфора** Θ (при судорогахъ икръ) и для нюханія при насморкѣ.—**Капсициъ** Θ (для втиранія при коликахъ въ животѣ и судорогахъ; втирать чистой Θ).—**Пинусъ** Θ (съ 3—5 частями воды или масла втирать въ суставы ногъ при англійской болѣзни).—**Стелларія** Θ (при ревматическихъ боляхъ съ опуханіемъ и туго-

подвижностію суставовъ и ухудшеніемъ отъ движенія (втирать неразведенной Θ); при гноящихъ ранахъ (примочка $\frac{1}{2}$ чайной ложки на стаканъ воды).—**Тевкріумъ** Θ (при полипахъ въ носу смазывать неразведенной Θ посредствомъ кисточки; при хроническомъ катаррѣ зѣва и глотки—полосканіе растворомъ 1 части Θ на $\frac{1}{2}$ —1 стаканъ воды).—**Хамомила** Θ (1 часть на 10 частей растительнаго масла, для втиранія въ животъ при коликахъ у дѣтей и во время болѣзненныхъ регулъ у женщинъ).—**Сульфуръ-спиртъ** или **Сульфуръ-мазь** (при сухихъ лишаяхъ, при чесоткѣ).—**Спонгія** Θ (для втиранія при зобѣ: 1 часть Θ на 10 частей спирта или мази) и др.

ГЛАВА VII.

О діетѣ и вспомогательныхъ мѣрахъ при гомеопатическомъ лѣченіи.

Общія основы діеты, способствующей сохраненію или укрѣпленію здоровья въ человѣкѣ, изложены въ 3-й части этой книги.

Діета для больныхъ указывается при отдѣльныхъ болѣзняхъ во 2-й части.

Здѣсь же приводятся тѣ частности діеты, которыя надо имѣть въ виду во всякомъ случаѣ при пользованіи гомеопатическими лѣкарствами, а именно—какія пищевыя, питьевыя и вкусовыя вещества не допускаются во время пріемовъ гомеопатическихъ лѣкарствъ, какія допускаются.

Во время пользованія гомеопатическими лѣкарствами особенно—изъ растительныхъ веществъ, какъ *Нуксъ-вомика*, *Игнація*, *Аконитъ*, *Белладонна*, *Хамомила* и проч., не слѣдуетъ пить кофе, крѣпкаго чаю, вина и крѣпкихъ напитковъ, какъ водка, ромъ, коньякъ. Дѣйствіе такихъ лѣкарствъ ослабляется или даже вовсе уничтожается отъ упомянутыхъ возбуждающихъ напитковъ.

При употребленіи лѣкарствъ изъ землистыхъ и минеральныхъ веществъ, какъ *Барита*, *Графитъ*, *Меркурій*, *Силиція*, *Сульфуръ* и проч., особенно—у стариковъ, и если имѣется уже давняя привычка къ кофе, можно таковой разрѣшать, но такъ, чтобы пить его (немного и не крѣпкій) не болѣе одного раза въ день (съ утра, а не къ вечеру), пріемы же лѣкарствъ начинать не ранѣе 1—2 часовъ спустя послѣ того.

Дѣйствію гомеопатическихъ лѣкарствъ мѣшаетъ также, въ большей или меньшей степени, курение табака. Къ сожалѣнію, привычка эта особенно трудно-одолима, и поэтому въ такихъ случаяхъ надо воздерживаться отъ курения по крайней мѣрѣ въ течение $\frac{1}{2}$ —1 часа до и послѣ приема лѣкарства, если вообще курение не противопоказано самой болѣзнію. То же надо сказать объ употребленіи нюхательнаго табака.

При гомеопатическомъ лѣченіи надо воздерживаться отъ употребленія въ пищу такихъ растительныхъ веществъ, которыя имѣютъ, между прочимъ, лѣкарственное дѣйствіе, а потому могутъ мѣшать дѣйствію гомеопатическихъ лѣкарствъ или видоизмѣнять таковое; сюда относятся: щавель, спаржа, горчица, хрѣнъ, петрушка, лукъ, чеснокъ, сельдерей, рѣдька, тминъ; особенно же—корица, шафранъ, имбирь, перецъ, мускатный орѣхъ, ваниль, лавровишневый листъ, горькій миндаль, гвоздика и тому подобныя пряности. Не допускаются также разнаго рода чаи изъ ромашки, шалфея, бузины, мяты и т. п., также кислоты — уксусъ, лимонъ. Могутъ мѣшать дѣйствію гомеопатическихъ лѣкарствъ, въ виду малости дозъ таковыхъ, и всякаго рода духи и вообще душистыя вещества парфюмеріи, особенно изъ мускуса, амбра и т. п. Для зубнаго порошка употреблять всего лучше чистый мѣлъ, въ порошокъ, безъ всякихъ пахучихъ добавленій.

Допускаются при гомеопатическомъ лѣченіи (насколько не противопоказаны самой болѣзнію).

1) Изъ мясныхъ продуктовъ. дичь, не жирная и не жесткая говядина и баранина, сырая, не жирная ветчина, куры, не слишкомъ молодая жареная телятина.

2) Изъ рыбъ форель, щука, сомъ, вымоченныя сельди, сардины, карпъ.

3) Масло, сыръ, творогъ, сметана, простокваша, вообще молочныя кушанья. — Растительныя масла. — Яйца въ смятку или вообще мягко приготовленныя (яичница). — Мучныя кушанья, крупа всяго рода.

4) Изъ растительныхъ продуктовъ. шпинатъ, стручки, зеленые бобы, морковь, цвѣтная капуста, бѣлая капуста, овощныя и салатныя травы, огурцы; рѣдика, картофель, сахарная свекла, кольраби; зернистые плоды — овесъ, маисъ, рисъ, просо (пшено), горохъ, чечевица, бобы, орѣхи; фрукты и ягоды.

5) Изъ напитковъ. вода въ своемъ чистомъ видѣ или подслащенная сахаромъ или сиропомъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ

прибавленіемъ небольшого количества вина; легкое бѣлое пиво, отвары изъ яблокъ, сушенныхъ плодовъ; или изъ овсяной крупы, ячменя, риса; ячменный или солодовый кофе, какао; молоко, пахтаніе; кефиръ, кумысъ, миндальное молоко, которое, однако, должно быть приготовлено безъ малѣйшаго добавленія горькаго миндаля, шоколадъ (безъ пряностей приготовленный).

Само собою разумѣется, что во время пользованія гомеопатическими лѣкарствами не должно принимать лѣкарствъ аллопатическихъ, особенно — сильно-дѣйствующихъ которыя могутъ свести на нуль дѣйствіе гомеопатическихъ лѣкарствъ; исключение можетъ быть сдѣлано, при настоятельной необходимости, развѣ лишь для какого-либо нѣжнаго слабительнаго или нераздражающаго наружнаго средства.

Къ мѣрамъ, неумѣстнымъ при гомеопатическомъ лѣченіи, относятся и всякаго рода прививки.

Минеральныя воды, какъ показываетъ опытъ, не мѣшаютъ, вообще говоря, дѣйствию гомеопатическихъ лѣкарствъ, подобно тому, какъ минеральныя вещества, находящіяся въ пищевыхъ продуктахъ, не мѣшаютъ, вообще говоря, своимъ физиологическимъ дѣйствіемъ динамическому дѣйствию высшихъ дѣлений нѣкоторыхъ изъ тѣхъ же веществъ, примѣняемыхъ, какъ лѣкарства, въ гомеопатіи, напримъ кремнеземъ (*Силиція*), фосфорнокислая известь (*Калькареа фосфорика*), хлористый натръ (*Натр. муриатик.*) и проч. Притомъ же почти всѣ минеральныя вещества, входящія въ составъ минеральныхъ водъ, находятся въ послѣднихъ въ очень небольшихъ количествахъ, нѣкоторыя даже въ очень малыхъ, какъ, напримѣръ, въ Левико мышьякъ (*Арсеникъ*) и желѣзо (*Феррумъ*) содержатся въ количествѣ, соответствующемъ 3—4-му гомеопатическому дѣленію. Во всякомъ случаѣ при гомеопатическомъ лѣченіи лишь очень рѣдко представляется надобность прибѣгать къ систематическому лѣченію минеральными водами.

Къ вспомогательнымъ мѣрамъ, могущимъ быть полезными и при гомеопатическомъ лѣченіи, относятся примѣненія воды (мѣстныя и общія ванны, обмыванія, компрессы, обертыванія и проч.), въ нѣкоторыхъ случаяхъ — массажъ, гимнастика. Способы выполнения этихъ вспомогательныхъ мѣръ подробно изложены въ 3-й части этой книги.

Электричество въ видѣ цѣлебной мѣры, въ подходящихъ случаяхъ можетъ также совмѣщаться съ гомеопатическимъ лѣченіемъ, если только оно примѣняется въ болѣе слабыхъ токахъ.

Прочіе не-лѣкарственные способы лѣченія, также свѣтолѣченіе, хирургія, ортопедія, акушерство въ соотвѣтствующихъ случаяхъ могутъ примѣняться рядомъ съ гомеопатическимъ лѣченіемъ; болѣе того, при послѣднемъ тѣ способы могутъ давать даже лучше результаты, нежели безъ такового; такъ, наприм., послѣоперационныя раны заживаютъ гораздо быстрѣе, если, вслѣдъ за сдѣланной операціей, давать внутрь *Аконитъ* и *Арника*, или переломы костей, послѣ оказанной хирургической помощи, срастаются скорѣе подъ влияніемъ *Силиція*, *Симфит.* и др.; родовой и послѣродовой періодъ протекають болѣе легко и благопріятно, если въ это время давать соотвѣтствующія гомеопатическія лѣкарства.

Гомеопатія не безусловно и не всецѣло противъ хирургіи, а утверждаетъ, что къ хирургическому вмѣшательству позволительно прибѣгать лишь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ никакой другой способъ лѣченія, именно же—гомеопатія, дѣйствительно не можетъ вести къ сохраненію больной части организма или къ сравнительно большому продолженію или облегченію его существованія въ тѣхъ случаяхъ, когда и операція является лишь паллиативной, а не радикальной мѣрой. Рѣшающимъ факторомъ должно всегда служить благо больного, а не лишь возможность произвести операцію.

Гомеопатія, именно, противъ того какъ бы массового хирургическаго гипноза, который охватилъ въ послѣднее десятилѣтіе не только врачебный міръ, но и публику, особенно въ болѣзни „аппендицитъ“ (воспаленіе слѣпого отростка), при которой, по убѣжденію гомеопатовъ, операція по меньшей мѣрѣ излишня въ большинствѣ случаевъ (см. 2-ю часть, болѣзни кишекъ). Впрочемъ, въ новѣйшее время начинаютъ раздаваться голоса противъ огульнаго оперированія аппендицита и изъ аллопатическаго лагерь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Отдѣльныя болѣзни и ихъ лѣченіе.

Поясненія къ нижеслѣдующей, второй, части книги.

Вторая часть по объѣму самая большая въ этой книгѣ. Отдѣльныя болѣзни изложены здѣсь не въ алфавитномъ порядкѣ, а по опредѣленной системѣ и именно: по группамъ, составленнымъ на основаніи ли какого либо общаго свойства, присущаго соотвѣтствующимъ болѣзнямъ (*„Лихорадочныя болѣзни“*, *„Эпидемическія болѣзни“*), или на основаніи принадлежности къ опредѣленной группѣ органовъ (*„Болѣзни головного мозга, спинного мозга, нервовъ и души“*, *„Болѣзни пищеварительныхъ органовъ“*, *„Болѣзни дыхательныхъ органовъ“*, *„Болѣзни сердца и сосудовъ“*, *„Болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ“*, *„Болѣзни глазъ и ушей“*), или на основаніи отдѣльной ткани или группы ихъ (*„Болѣзни кожи“*, *„Болѣзни суставовъ, мышцъ и костей“*, *„Болѣзни крови и лимфы“*), или по роду происхожденія (*„Зараженіе животными ядами“*, *„Глистныя болѣзни“* и, наконецъ, еще 2 отдѣла (*„Болѣзни новорожденныхъ“* и *„Отравленія“*).

Такой групповый характеръ размѣщенія болѣзней не только естественъ; онъ и весьма практиченъ по своей цѣлесообразности и въ возможнѣйшей мѣрѣ облегчаетъ читателю находить быстро и вполнѣ сознательно требуемую болѣзнь. Этому способствуетъ еще помѣщенное въ началѣ каждаго отдѣла и под-отдѣла „содержаніе“ въ видѣ краткаго перечня вошедшихъ въ него болѣзней, помимо болѣе подробнаго содержанія съ указаниемъ страницъ, помѣщеннаго въ общемъ оглавленіи (въ началѣ книги) также въ алфавитномъ указателѣ (въ концѣ книги).

Еще о дѣленіяхъ лѣкарствъ, приводимыхъ въ этой части: дѣленія при лѣкарствахъ во многихъ случаяхъ обозначены; въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ лѣкарства приводятся безъ обозначенія дѣленій, подразумѣваются тѣ именно дѣленія, которыя указаны на страницахъ 18—21 и еще подробнѣе въ 4-й части (въ „Лѣкарствовѣдѣніи“).

Наконецъ, о дозахъ и повтореніи пріемовъ лѣкарствъ, также о продолжительности примѣненія послѣднихъ: гдѣ во второй части таковыя не указаны, о нихъ надо справиться въ 1-й части, въ главѣ 3-ей и 4-ой.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Лихорадочныя болѣзни.

Содержаніе этого отдѣла: 1) Скоропреходящая инфекціонная лихорадка. Простудная лихорадка. 2) Тифъ: Тифозныя лихорадки. 3) Возвратная лихорадка. 4) Перемежающаяся лихорадка. 5) Послѣродовая лихорадка. Гниlostная лихорадка

Сю да относятся тѣ болѣзни, главнымъ симптомомъ которыхъ является болѣе или менѣе значительное повышение температуры тѣла (жаръ). При этомъ имѣется всегда учащенное дыханіе, также большее, чѣмъ обыкновенное, число ударовъ пульса въ минуту (ускоренная дѣятельность сердца). Жару часто предшествуетъ или его сопровождаетъ ознобъ, вмѣсто котораго иной разъ являются судороги, чаще всего—у дѣтей. Затѣмъ лихорадка сопровождается еще разстройствомъ нервной и душевной системы, головной болью или болью въ разныхъ мѣстахъ тѣла, бредомъ, безсонницей; въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, угнетеннымъ состояніемъ, спячкой; обыкновенно имѣются и расстройства въ обмѣнѣ веществъ: ослабленіе или отсутствіе аппетита, жажда, сухая кожа, ослабляюще поты, скудное отдѣленіе мочи—темной, темно-коричневой или мутной, часто съ осадкомъ; расстройства пищеваренія, обложенный языкъ, часто и сухой.

Общепринятымъ считается взглядъ, что повышенная температура тѣла, особенно въ заразныхъ болѣзняхъ, является для организма орудіемъ борьбы противъ внѣдрившихся въ него болѣзнетворныхъ бациллъ или всякаго рода бактерий, на которыхъ жаръ тѣла вліяетъ пагубнымъ образомъ.

Поэтому вредно дѣйствуютъ въ лихорадочныхъ болѣзняхъ сильныя противолихорадочныя или жаропонижающія средства, какъ, напримѣръ, хининъ, антипиринъ и т. п., ибо, даваемая въ обычныхъ, большихъ, дозахъ, они ослабляютъ организмъ (особенно — сердце) и тѣмъ уменьшаютъ способность присущей ему самообороны въ борьбѣ съ болѣзнію.

Между тѣмъ лѣченіе должно стремиться къ усиленію этой способности самообороны (реакци) организма; достигается же эта цѣль вѣрнѣе и быстрѣе, и безъ всякаго риска для больного,

Пре
те/
зам

только подобнодействующими, гомеопатическими, лѣкарствами (см. ч. 1, гл. 2 и 4-ю).

Дабы судить о степени лихорадочнаго жара у больного, необходимо имѣть понятіе о нормальномъ характерѣ дыханія, пульса и температуры тѣла у здороваго человѣка и слѣдить за ихъ измѣненіями у лихорадящаго больного.

Число	вдыханій (или выдыханій) въ здоровомъ и спокойномъ состояніи		у новорожденныхъ—около 44 въ 1 минуту	
	въ возрастѣ отъ 1 до 5 лѣтъ	„	26 „ 1 „	„
	„ „ „ 15 и 20 „	„	20 „ 1 „	„
	„ среднемъ возрастѣ	„	16 „ 1 „	„
Число	пульсовыхъ ударовъ (сердечныхъ толчковъ) въ здоровомъ и спокойномъ состояніи:			

		у новорожденныхъ—около 130 въ 1 минуту .	
у дѣтей до 1 года	„	120 „ 1 „	„
„ „ „ 2 лѣтъ	отъ 90 до 115 „ 1 „	„	„
„ „ „ 3 „	„ 80 „ 100 „ 1 „	„	„
„ „ „ 7 „	„ 72 „ 90 „ 1 „	„	„
„ „ „ 12 „	„ 70 „ — „ 1 „	„	„
въ періодѣ созрѣванія	„ 80 „ 85 „ 1 „	„	„
„ зрѣломъ возрастѣ	„ 70 „ 75 „ 1 „	„	„
„ старомъ „	„ 60 „ 65 „ 1 „	„	„

Температура тѣла:		
нормальная	отъ 37,0 до 37,5°	Цельсія *)
сверх-нормальная	„ 37,6 „ 38,8°	„
приближающаяся къ лихорадочной	„ 38,1 „ 38,5°	„
средне-лихорадочная	„ 38,6 „ 39,0°	„
лихорадочная	„ 39,1 „ 40,0°	„
сильно- или сверх-лихорадочная	„ 40,1 „ и выше	„

Уже 41,00 есть крайне опасная для жизни температура тѣла, которой сердце и кровь долго выдержать не могутъ, если не принять подлежащихъ мѣръ къ ея пониженію. 42,00 крайне рѣдко наблюдается и всегда кончается

*) Для измѣренія температуры тѣла употребляется специально приспособленный термометръ (градусникъ), рассчитанный по скалѣ Цельсія (а не Реомюра); продается во всякой аптекѣ или аптекарскомъ магазинѣ. Измѣреніе производится такъ: болѣе узкимъ (стекляннымъ) концомъ термометръ вставляется въ середину подмышки и удерживается прижатымъ къ груди плечемъ въ теченіе 8—10 минутъ; послѣ сего смотрятъ, до какой цифры и сколькихъ дѣлений (десятихъ частей градуса) поднялся ртутный столбикъ. Практически употребляютъ термометръ максимальный, въ которомъ ртутный столбикъ остается на той высотѣ, на которую онъ поднялся въ подмышкѣ, а не спадаетъ тотчасъ же по вынутіи его оттуда, какъ въ простыхъ термометрахъ. Встряхиваніями термометра, держа болѣе широкій конецъ двумя пальцами, опускаютъ столбикъ до нормальной высоты.

смертью. Еще большее, чѣмъ это, повышение наблюдается иногда какъ послѣдствіе смертнаго явленія; такъ, извѣстенъ случай, гдѣ температура, измѣренная часъ спустя послѣ смерти отъ столбняка, равнялась 45,3° Ц. (проф. Вундерлихъ).

Температура ниже 35° Ц. указываетъ на крайній упадокъ жизнедѣтельности (коллапсъ) и наблюдается лишь у умирающихъ. Ниже 33° температура до сихъ поръ не наблюдалась у челоѣка

Болезни, сопровождающіяся лихорадочнымъ состояніемъ, **Разны** бываютъ разнаго рода: 1) лихорадки самостоятельныя, не зависящія отъ какого-либо мѣстнаго воспаленія, разстройства или раздраженія, и 2) лихорадки, являющіяся послѣдствіемъ такихъ причинъ. **лихоре**

Къ первымъ, которыя приведены въ этомъ отдѣлѣ, относятся: лихорадка скоропреходящая инфекціонная (лихорадка „простудная“), лихорадки тифозныя и лихорадка перемежающаяся; изъ практическаго соображенія тутъ же приведена и послѣродовая гнилостная лихорадка въ виду того, что лихорадочное состояніе является и при ней главнымъ, преобладающимъ симптомомъ.

Ко вторымъ относятся лихорадки, приведенныя въ другихъ отдѣлахъ этой части книги, а именно: лихорадка при воспаленіи отдѣльныхъ органовъ (см. таковыя), лихорадка ревматическая (см. „Ревматизмъ“), катарральная (см. „Инфлуэнца, гриппъ“ и болезни дыхательныхъ органовъ), желчная (см. „Болезни печени“), глистная (см. „Глистные болезни“), сыпная (см. „Корь, скарлатина, оспа“), зубная (см. „Болезни зубовъ у дѣтей“), изнуряющая (см. „Чихотка“).

1. Скоропреходящая инфекціонная лихорадка. „Простудная“ лихорадка.

Такое заболѣваніе появляется внезапно подъ видомъ общаго лихорадочнаго разстройства, которому трудно бываетъ найти причину, и въ короткое время проходитъ, не оставивъ послѣ себя въ заболѣвшемъ никакихъ сколько нибудь серьезныхъ слѣдовъ.

Оно начинается потрясающимъ ознобомъ, или же больные жалуются нѣкоторое время на познабливаніе, общую усталость, апатію и имѣютъ часто — по счастію обманчивое — предчувствіе надвигающейся на нихъ тяжелой болезни. У дѣтей заболѣваніе это можетъ осложниться судорогами. Температура тѣла поднимается въ короткое время до 39—40° Цельсія и даже выше. При этомъ ускоряются пульсъ и дыханіе, появляется сильная жажда; отдѣленіе мочи уменьшается, аппетитъ пропадаетъ, дѣлается за-

Призна
ходъ бол

поръ. Языкъ покрывается толстымъ налетомъ сѣраго, желтаго или коричневаго цвѣта, и изо рта идетъ неприятный запахъ. Бываютъ нерѣдко отрыжка и рвота, также давление подъ ложечкой и вздутіе живота. Часто присоединяется пузырчатая сыпь на губахъ, иногда и на другихъ частяхъ тѣла, иной разъ показываются даже разсѣянные на животѣ пятнышки. Если при всемъ томъ появляется еще легкое помрачение сознания и бредъ, то положение больного можетъ показаться очень серьезнымъ, угрожающимъ.

Дальнѣйшее течение, однако, уже въ скоромъ времени выясняетъ характеръ болѣзни. Часто уже въ слѣдующую ночь появляется обильная испарина, и температура тѣла падаетъ до нормы или даже ниже нормы, больной чувствуетъ себя очень облегченнымъ; слабость, если она имѣется, проходитъ также скоро. Продолжительность болѣзни въ общемъ 12—24 часа, рѣже—нѣсколько дней, и лишь въ исключительныхъ случаяхъ дольше одной недѣли.

удная
адна.

Нѣкоторымъ людямъ свойственно несомнѣнное предрасположение къ подобнымъ болѣзненнымъ разстройствамъ, и имъ приходится неоднократно въ течение своей жизни переносить таковыя въ большей или меньшей степени. Въ отношеніи возраста надо сказать, что заболѣваютъ такимъ образомъ чаще люди среднихъ лѣтъ. Причиною считаютъ обыкновенно простуду, однако далеко не всегда удается выяснить, когда и при какихъ обстоятельствахъ произошла простуда. Во всякомъ случаѣ, такого рода лихорадку многие считаютъ и называютъ простудной лихорадкой. Другіе приводятъ, какъ причину, неумѣренность въ ѣдѣ и питьѣ, тѣлесное и умственное переутомленіе, вліяніе чрезмѣрно-сильной жары.

Въ пользу инфекционности (заразности) этой болѣзни говорить, однако, не только общая ея картина, но и то обстоятельство, что иной разъ одновременно заболѣваютъ ею, другъ за другомъ, нѣсколько лицъ одной и той же семьи или одной и той же среды вообще.

Диагнозъ болѣзни не представляетъ обыкновенно никакого затрудненія. Отсутствие серьезныхъ измѣненій въ отдѣльныхъ органахъ, а также быстрое и почти всегда благоприятное теченіе болѣзни служатъ достаточной гарантіей противъ смѣшенія ея съ брюшнымъ тифомъ или съ воспаленіемъ легкихъ или мозга и тому подобными заболѣваніями.

Главнымъ и въ большинствѣ случаевъ единственнымъ достаточнымъ средствомъ является тутъ *Аконитъ* $\times 3$, черезъ полчаса или часть (при облегчении — черезъ 2 часа) по 5 капель въ полрюмкѣ воды.

При сильной головной боли съ приливомъ крови къ головѣ, краснотой лица, стучаніемъ въ вискахъ, бредъ — *Аконитъ* попеременно съ *Белладонна* 3, черезъ такіе же промежутки времени.

Если появляющаяся испарина не приноситъ облегчения, если имѣются боли въ суставахъ и запоръ, то вмѣсто белладонны подходитъ *Нуксъ вомика* 3 попеременно съ *Бронія* $\times 3$, черезъ каждые 2 — 3 часа, причемъ *Аконитъ* брать въ видѣ питья: 20 капель въ стаканѣ воды, черезъ полчаса или часть по глоточку.

Другихъ мѣръ обыкновенно не требуется. Слѣдуетъ только впредь до выздоровления оставаться въ постели, пить теплое питье, пишу принимать лишь жидкую и въ небольшихъ количествахъ.

2. Тифъ. Тифозныя лихорадки.

Заболѣванію тифомъ предшествуетъ общее недомоганіе, которое продолжается нѣсколько дней, иногда — недѣль; больной чувствуетъ себя усталымъ, ноги тяжелѣютъ, аппетитъ портится, появляется часто тошнота, рвота, головная боль, кровотечение изъ носа, бессонница; ко всему этому присоединяется часто ознобъ. Затѣмъ больной начинаетъ лихорадить, не въ состояніи болѣе держаться на ногахъ и вынужденъ въ концѣ концовъ лечь въ постель; теперь аппетитъ уже совершенно отсутствуетъ, но за то появляется сильная жажда, иной разъ и кашель. Испражнения въ началѣ тверды, впослѣдствіи и жидки, имѣютъ видъ гороховаго отвара. Иногда испражненія произвольны, такъ что больной ихъ и не чувствуетъ. — Тифозный обыкновенно крайне безпокоенъ и днемъ и ночью, не можетъ спать и бредить. Или же онъ крайне угнетенъ, апатиченъ, безучастенъ ко всему, что около него происходитъ; онъ часто и совсѣмъ безъ сознания. Болѣзнь, съ начала появления лихорадки, продолжается 3 — 4 недѣли. Жаръ повышается лишь постепенно, достигая высшей степени около 10—20 дня, и затѣмъ такъ же постепенно понижается; это постепенное повышение и понижение температуры особенно характерно для тифа, и этимъ онъ главнымъ образомъ отличается отъ многихъ другихъ лихорадочныхъ болѣзней, напримѣръ, отъ воспаления легкихъ, гдѣ лихорадка сразу высокой степенью начи-

Призна
ходъ бс

нается и сразу же, при переломѣ болѣзни, обрывается (внезапное разрѣшеніе болѣзни обозначается словомъ кризисъ, медленное же или постепенное—лизисъ). Возстановленіе здоровья послѣ тифа идетъ медленно, мало по малу возвращается аппетитъ, доходящій часто до степени „волчьяго“ голода.

Причинами тифа считаютъ питьевую воду плохого качества, а также воздухъ, зараженный испареніями загрязненной нечистотами почвы.

Главнѣйшія органическія измѣненія при тифѣ происходятъ въ тонкихъ кишкахъ, слизистая оболочка которыхъ набухаетъ и въ отдѣльныхъ ограниченныхъ мѣстахъ изъязвляется, первоначально покрываясь какъ бы бляшками. Къ началу 3-й недѣли болѣзни язвы зарубцовываются, и тифозный процессъ начинается проходить. Случается однако, что такая язва даетъ кровотеченія, а иногда даже прободается: въ послѣднемъ случаѣ воздухъ и каловыя массы попадаютъ въ полость брюшины, что почти всегда кончается смертью больного.

Различаютъ нѣсколько видовъ тифа: брюшной, сыпной, мозговой, возвратный, равно какъ тифообразныя (тифондныя) состоянія при другихъ болѣзняхъ. Однако лѣченіе всѣхъ тифовъ одинаковое въ томъ смыслѣ, что лѣченію подлежитъ тифъ (отъ греческаго слова *typhos*, что значитъ оглушеніе, одуреніе) не какъ опредѣленная болѣзнь, а какъ вообще болѣзненное состояніе, имѣющееся въ каждомъ данномъ случаѣ и выражающееся совокупностію наблюдаемыхъ у больного симптомовъ, внѣшнихъ и внутреннихъ (объективныхъ и субъективныхъ). Только при возвратномъ тифѣ надо еще слѣдовать указаніямъ, приведеннымъ при перемежающейся лихорадкѣ (см. ниже). Воздѣйствіе же на предполагаемая причинныя бациллы или бактеріи тифозныя все еще остается пока лишь въ предѣлахъ благихъ мечтаній.

Заразительность тифа общеизвѣстна, и зараженіе происходитъ главнымъ образомъ черезъ посредство испражнений; поэтому каждое испраженіе больного надо обливать кипяткомъ (или дезинфекціонными веществами *), и всего лучше закапывать по возможности въ землю.

Гомеопатическое лѣченіе даетъ при этой болѣзни очень благоприятные результаты: болѣзнь протекаетъ слабѣе и скорѣе,

*) Надежнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дешевымъ дезинфекціоннымъ средствомъ является *известковое молоко*, приготовляемое изъ свѣже-гашеной извести и прибавляемое въ небольшихъ количествахъ къ изверженіямъ больного.

чѣмъ при всякомъ другомъ лѣченіи; особенно укорачивается реконвалесцентный періодъ, т. е. послѣ окончившейся болѣзни силы больного быстро восстанавливаются.

Въ первые дни болѣзни главными лѣкарствами являются: *Аконитъ* $\times 3$, въ видѣ питья, и *Бронія* $\times 3$ и *Бантизія* 1 черезъ 1—2 ч. попеременно. При преобладающихъ мозговыхъ явленіяхъ — *Белладона* $\times 3$, (вмѣсто *Бріоніи*). Въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни, и въ случаяхъ болѣе тяжелыхъ, всего чаще требуются: *Русъ* $\times 3$, *Фосфори ацид.* $\times 3$ и *Арсеникъ* 3, черезъ 1 ч. или 2 ч. поочередно. При особенно тяжеломъ теченіи болѣзни — *Карбо вегетабилисъ* 3 и *Фосфоръ* $\times 3$; показанія для *Карбо*: лихорадочный жаръ, малый, слабый, замедленный или, наоборотъ, быстрый неисчислимый пульсъ, крайняя слабость, особенно при холодной кожѣ, покрытой липкимъ потомъ, синева лица, спячка, кровотеченія и кровоподтеки, жидкія вонючія испражненія со вздутіемъ живота, часто произвольныя, словомъ — картина какъ бы угасающей жизни; характерные же для *Фосфора* симптомы при тифѣ суть слѣдующіе: большой упадокъ силъ съ жаромъ, приливы, малый пульсъ, разстройство дыханія при преобладающемъ пораженіи легкихъ (легочный тифъ) съ угрожающимъ параличемъ ихъ.

Во время выздоравливанія полезно давать *Хина* $\times 3$ попеременно съ *Сульфуръ* $\times 3$, по 2 приѣма въ день того и другого.

Въ отдѣльныхъ случаяхъ, какъ промежуточные или вставочныя средства, могутъ понадобиться при тифѣ нижеслѣдующія, если соотвѣтствующіе симптомы выражены въ сильной степени:

Меркур. солубилисъ 3: сильныя боли въ правой сторонѣ живота, въ первомъ періодѣ образования язвъ въ кишкахъ; зеленоватыя или кровянистыя испражненія, жестокий жаръ, приливы крови, поты безъ всякаго облегченія.

Камфора Рубини 1: сильный бредъ съ потерей сознанія, липкій потъ и холодная кожа при жарѣ въ головѣ, обильныя ослабляющіе поты.

Гіосціамусъ 3: буйный бредъ съ видѣніями, нервное возбужденіе съ бессонницей или же полная притупленность сознанія, сверкающіе глаза, налитые кровью лицо и глаза.

Мосхусъ $\times 3$: угрожающій параличъ мозга съ судорогами.

Страмоній 3: бредъ съ сильнымъ возбужденіемъ и метаніемъ въ разныя стороны и какъ бы придурковатыми жестами.

Цинкъ З: угрожающій параличъ мозга съ крайнимъ нервнымъ истощеніемъ, спячка, потеря сознания, расширенные зрачки, холодныя конечности.

Тартаръ эметикъ З: угрожающій параличъ легкихъ, обильные хрипы въ груди, сильная одышка, сонливость.

При тифѣ образуются часто пролежни. Пока имѣется только краснота кожи, втирать 1 или 2 раза въ день *Арника* Θ; когда же кожа уже изъязвилась, прикладывать на полотнѣ растворъ изъ 1 чайной ложечки *Арника* Θ или *Календула* Θ въ стаканѣ воды; если этого недостаточно, то прикладывать мазь изъ 10 капель одного изъ этихъ средствъ въ столовой ложкѣ жира (козьедкрема или спермацетной мази). Полезна также мазь изъ *Гидрастисъ* Θ или *Гамamelисъ* Θ (1 ч. на 30 чч. жира). Вънутрь при пролежняхъ показаны: *Арсен. З*, *Карбо З*, *Хина* × 3.

Дозы, повторенія лѣкарствъ и продолжительность примѣненія ихъ см. гл. 3 и 4.

помога-
ныя мѣры
эта при
ифѣ.
Чистый воздухъ въ комнатѣ больного, не слишкомъ теплый (не болѣе 15—16 градусовъ по Реомюру), опрятность бѣлья и постели и вообще соблюденіе наивозможной чистоты въ уходѣ за больнымъ, доставленіе ему наибольшаго спокойствія, душевнаго и тѣлеснаго, и соотвѣтствующая діета—всѣ эти условія очень важны для благопріятнаго теченія болѣзни.

Что касается діеты, то прежде всего надо быть крайне осторожнымъ въ кормленіи больного и не забывать, что въ кишечникѣ имѣются тифозныя язвы. Давать можно слизистые отвары изъ риса, ячменной и овсяной крупы, куриный бульонъ, затѣмъ молоко, также жидкую манную и рисовую кашку, особенно когда жаръ уменьшился, а больной чувствуетъ себя очень слабымъ; также въ періодѣ выздоравливанія.—Во время болѣзни не должно давать хлѣба, мяса, сыра. Запрещаются всѣ возбуждающіе напитки, напр., кофе, крѣпкій чай, крѣпкія вина. При большой слабости и упадкѣ сердечной дѣятельности показаны небольшія количества вина, разведеннаго водою или чаемъ, 1—2 столов. ложки на стаканъ, или коньяка въ молоко (1 чайн. ложку на стаканъ); того или другого попить по глоточку время отъ времени. Если же отъ этихъ напитковъ замѣчается ухудшеніе въ состояніи больного, то надо ихъ прекратить, ограничиваясь лишь соотвѣтствующими лѣкарствами.

лѣн. воды
и тифѣ. Примѣненіе воды при тифѣ, въ видѣ компрессовъ, обертываній и ваннъ, является весьма полезнымъ вспомогательнымъ

средствомъ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ температура больного превышаетъ 39° .

Простѣйшее примѣненіе воды, въ видѣ вытиранія всего тѣла влажнымъ полотенцемъ 1—2 раза въ день, полезно при тифѣ уже въ интересахъ чистоты и опрятности, но оно до нѣкоторой степени и понижаетъ температуру тѣла. Въ большей мѣрѣ противъ жара въ тѣлѣ дѣйствуютъ компрессы на животъ, смѣняемые черезъ каждые 1—2 часа, также холодныя примочки на лобъ, смѣняемая черезъ каждыя 10—15 минутъ. Этими примѣненіями можно ограничиваться при температурѣ 39° до $39,3^{\circ}$ по Реом. При болѣе высокой температурѣ, до $39,8$ — 40° , дѣлаютъ обертываніе туловища на полчаса или часъ, 1—3 раза въ день по мѣрѣ надобности.

Для обертыванія у лихорадящихъ больныхъ употребляютъ обыкновенно воду 18-градусную. Продолжительность обертыванія—полчаса. Послѣ того слѣдуетъ обмываніе или обливаніе такой же водой или, въ подходящемъ случаѣ, полуванна 22 — 25° Р., продолжительностію 5 минутъ.

Изъ обертываній наиболѣе дѣйствительны общія У дѣтей примѣняютъ обыкновенно обертываніе съ ногъ до подмышекъ (ножно-подмышковое). Если при этомъ примѣненіи ноги не согреваются, то надо обложить ихъ горячими бутылками или же, по снятіи обертыванія, согрѣть ихъ нагрѣтыми платками, бутылками и т. п. Простыня для обертыванія должна быть сложена 4—6-слойно, именно та часть, которая обнимаетъ туловище, ноги же могутъ быть обернуты однослойно.

О томъ, какъ производить эти примѣненія у постели больного, см. часть 3-ю, отд. II.

Если температура держится утромъ и вечеромъ на этихъ высотахъ, если она, тѣмъ болѣе, выше 40° , то лучше дѣлать больному полуванну, причемъ вода берется болѣе теплая (27 — 28°) для больныхъ слабого тѣлосложенія, для дѣтей и стариковъ, и болѣе прохладная (20 — 18°) для больныхъ болѣе крѣпкаго тѣлосложенія, возраста 20—40 лѣтъ. Продолжительность сидѣнія въ ваннѣ 5—10 минутъ.

Вообще говоря, температура полуванны должна быть отъ 22° до 25° Р., продолжительность 5—10 минутъ. Если послѣ ванны поставленный больному термометръ укажетъ недостаточное спаденіе жара, надо у сильнолихорадящихъ больныхъ слѣдующую полуванну (22 — 25° Р.) охладить, путемъ доливанія (при сидѣніи

больного въ ваннѣ) холодной воды, до температуры 18° Р. и, въ случаѣ надобности, подольше держать его въ ваннѣ. Помощью обливаній тѣла водой, при сидѣннѣ больного въ полуваннѣ, значительно уменьшается его температура; при этомъ дѣйствуетъ также температура окружающаго воздуха (14° Р.), которая гораздо ниже температуры лихорадящаго больного. Пониженію жара способствуетъ также растираніе тѣла, привлекающее кровь къ кожѣ и тѣмъ дѣлающее возможнымъ еще большее охлажденіе ея воздухомъ. Послѣ полуванны дѣлается общее обливаніе тѣла водою градуса на 4 холоднѣе, чѣмъ вода полуванны. Изъ жаропонижающихъ средствъ полуванна считается самымъ важнымъ по быстротѣ и благотворности дѣйствія.

**Противъ
южной.** Для предупрежденія образованія пролежней надо заботиться о томъ, чтобы постель была гладкая безъ складокъ; больного надо, кромѣ того, часто поворачивать, то на одинъ, то на другой бокъ, равно какъ подкладывать воздушную или водою наполненную гуттаперчевую подушку-кругъ, т. е. съ круглымъ отверстіемъ посрединѣ; за неимѣніемъ такой подушки-круга можно свернуть и скрутить въ видѣ круга какую-либо матерію или соорудить ее изъ соотвѣтствующаго чехла, набитаго овсяной выскѣвкой и т. п.

3. Возвратный тифъ

встрѣчается преимущественно въ болотистыхъ мѣстахъ, какъ и перемежающаяся лихорадка. Первый приступъ продолжается 5—11 дней, и послѣ него слѣдуетъ безлихорадочный періодъ, продолжающійся дней 14, и является новый взрывъ болѣзни, длящійся 48 часовъ. Температура тѣла достигаетъ самыхъ высокихъ степеней, до $41,2$ градусовъ, а въ этомъ заключается ея громадная для жизни опасность. Какъ при перемежающейся лихорадкѣ, такъ и тутъ, большія дозы хинина не даютъ ожидаемаго отъ нихъ результата.

Лѣчение то же, что при перемежающейся лихорадкѣ (см. ниже).

4. Перемежающаяся лихорадка. Малярія.

Эта болѣзнь не передается съ одного человѣка на другого, но все же проявляется въ видѣ постоянной эпидеміи (эндеміи), именно лѣтомъ, въ болотистыхъ мѣстахъ, при чемъ заболѣваютъ эту болѣзнь преимущественно тѣ, кто уже разъ перенесъ ее,

равно какъ вновь прибывшие и вообще обладающие слабымъ здоровьемъ.--Картина болѣзни при малярии не всегда одинаковая:

1) Обыкновенная малярия. Характеристичныя ея проявления— **Разны**
болѣе или менѣе сильный ознобъ, послѣ котораго слѣдуетъ жаръ **мал**,
и затѣмъ потъ; при этомъ имѣются боли головы, позывы на
рвоту, общая усталость и боль въ членахъ. Послѣ приступа,
продолжавшагося нѣсколько часовъ, больной чувствуетъ себя
здоровымъ, пока не наступитъ черезъ день или два новый при-
ступъ (двух-или трехдневный типъ малярии, но лихорадка бы-
ваетъ, иногда, и каждый день—однодневный типъ—или черезъ
три дня въ 4-й—четырёхдневный типъ). Очень рѣдко случается,
чтобы лихорадка повторялась 2 раза въ сутки.

2) Скрытая малярия. Ознобъ, жаръ и потъ отступаютъ на
задній планъ, а вмѣсто нихъ выступаютъ больше невралгическія
боли, особенно—въ нервахъ лица, менѣе часто—въ нервахъ ниж-
нихъ или верхнихъ конечностей или желудка (въ послѣднемъ
случаѣ имѣются, кромѣ болей, еще отрыжка и рвота).

3) Возвратная малярия. Лихорадочные припадки не имѣютъ
рѣзкихъ перерывовъ, и въ промежуточное время особенно пре-
обладаютъ желудочныя расстройства.

4) Злокачественная малярия. Всѣ симптомы проявляются въ
сильнѣйшей степени, продолжаются долго и вслѣдствіе этого
угрожаютъ опасностью жизни.

5) Малярійная кахексія. Болѣзнь сопровождается исхуданіемъ
тѣла и истощеніемъ силъ, вслѣдствіе упадка пищеваренія; моча
отдѣляется въ меньшемъ количествѣ и содержитъ бѣлокъ;
мало-по-малу развиваются отеки, впослѣдствіи—и общая водянка.

При всѣхъ формахъ малярии селезенка увеличена.

Во всѣхъ случаяхъ малярии аллопатія примѣняетъ, главнымъ **Лѣче**
образомъ, хининъ въ большихъ дозахъ, которая въ острыхъ, **малыѣ**
свѣжихъ случаяхъ этой болѣзни дѣйствуютъ часто быстро,
чѣмъ малыя, гомеопатическія дозы, предупреждая повтореніе
припаdkовъ; но во многихъ случаяхъ хининъ этого дѣйствія не
производитъ, притомъ же онъ часто, заглушая въ организмъ острый
процессъ болѣзни, дѣлаетъ ее скрытой и ведетъ къ развитію
малярійной кахексіи. Поэтому въ свѣжихъ случаяхъ цѣлесооб-
разнѣ давать хининъ въ малыхъ дозахъ, напริมѣръ— въ пер-
вомъ десятичномъ растираніи ($\times 1$) на кончикъ перочиннаго ножа
черезъ каждыя 2 часа въ промежуточное между приступами время.

Симптомы, указывающіе на *Хининъ*, суть слѣдующіе: сильно увеличенная селезенка; большая слабость; больной съ трудомъ оправляется даже при хорошемъ аппетитѣ; ознобъ сильный, чередуясь иной разъ съ жаромъ; жажда является лишь во время жара или во время потѣнія; ознобъ сопровождается сердцебіеніемъ; во время приступа головная боль, страхъ, тоска, иной разъ волчій голодъ. Приступы не отличаются правильностію, типичностію, но потъ во всѣхъ случаяхъ преобладаетъ.

Кромѣ того полезно давать во время жара питье изъ раствора *Гельземинъ* $\times 3$ (20—30 капель въ стаканѣ воды), во время потѣнія—*Ацид. фосфорик.* $\times 3$, во время озноба—*Вератрумъ альб.* 1, въ такихъ же растворахъ.

Въ случаяхъ маляріи, не уступающихъ хинину, особенно когда онъ употреблялся уже долго и въ большихъ дозахъ, показаны другія средства, чаще всего,—*Арсеникъ*, *Ипекакуана*, *Бріонія*, *Натр. муриатик.*, *Нуксъ вомика* и другія.

Ипекакуана $\times 3$. Въ болѣе легкихъ случаяхъ, и въ недавнихъ, въ которыхъ разстройства чувствуются больнымъ, хотя наружно мало выражены. Приступы не сильны, часто поражая лишь отдѣльныя части тѣла. Ознобъ преобладаетъ. Жажда во время жара. Обложенный языкъ, ощущеніе полноты въ желудкѣ, тошнота, рвота, поносъ. Стѣсненіе въ груди, одышка, судорожный кашель съ трудно-отхаркиваемой мокротой.

Тартар. эметик. $\times 3$. Симптомы какъ при Ипек., но болѣе сильно выражены, и притомъ еще жестокая головная боль, также сонливое состояніе.

Арсеникъ 3: особенно въ одно- и четырехдневной лихорадкѣ; приступы очень продолжительны и сильны; промежуточное время не свободно отъ разстройствъ всевозможнаго рода: жаръ тѣла при ощущении озноба, сильное сердцебіеніе во время жара и послѣ него; тоска, безпокойство, приливы къ головѣ, біеніе во всѣхъ сосудахъ. Стѣсненіе въ груди, упадокъ силъ, водяночные отеки, особенно ногъ и живота. Сильное увеличеніе печени и селезенки. Исхуданіе, изъязвленіе угловъ рта, горечь во рту, тошнота, вонючія жидкія испражненія, неутолимая жажда. Восковидный или землистый цвѣтъ лица, кровоподтеки, просовидная сыпь, наклонность къ образованію пролежней.

Бріонія $\times 3$: при одновременномъ пораженіи грудныхъ и пищеварительныхъ органовъ, особенно въ случаяхъ болѣе желчныхъ. Запоръ перемежается съ поносомъ. Селезенка не сильно

увеличена. Ознобъ и жаръ не продолжительны и не сильны, потъ длительный; во время озноба сильная жажда. Сильный сухой кашель во время озноба съ давленіемъ и колотьемъ въ груди, въ бокахъ. Горькій вкусъ во рту, отрыжка; запоръ—одинъ или перемежку съ поносомъ, давленіе въ головѣ, головокруженіе.

Намф. муріатик. З. Въ давнихъ случаяхъ съ расстройствами пищеваренія; чувствительность подъ ложечкой и желтый, землистый цвѣтъ кожи; изъязвленность угловъ рта; боли въ костяхъ: головная боль, боль въ спинѣ; большая слабость, запоръ; горькій вкусъ во рту; сухость языка, отсутствие аппетита. Во время приступа ознобъ преобладаетъ, съ зѣвотой, затрудненнымъ дыханіемъ, сонливостью; въ обоихъ же періодахъ—жажда.

Нуксъ вомика З. Ознобъ менѣе рѣзко выраженъ, чѣмъ при Ипекакуанѣ, но болѣе длителенъ и смѣняется часто жаромъ или ощущается на ощупь при горячей кожѣ; поэтому и во время жара больной требуетъ потеплѣе укрывать себя. Преобладаютъ симптомы расстройства желудка, печени, кишечника, не прекращающіеся и во время промежуточное между приступами. Запоръ, геморройное состояніе, явленія раздраженія спинного мозга: подергиванія мышцъ, дрожаніе, боли поясицы, чувствительность позвоночнаго хребта при надавливаніи; ощущеніе онѣмѣнія въ членахъ.

Капсикумъ З. Ознобъ и жажда преобладаютъ; болѣзненные натуги на испражненіе, геморроидальное состояніе; поносъ со слизистыми и жгучими испражненіями; еще симптомы, подобные Ипекакуанѣ.

Пульсатилла З. Особенно для женщинъ, отличающихся нервною, плаксивостью, малыми регулами или запаздываніемъ послѣднихъ. Желудочно-кишечныя расстройства разнаго рода. Приступы преимущественно по вечерамъ и ночью. Ознобъ больше внутренній, чѣмъ наружно видимый; отсутствіе жажды; обильная моча. Умѣренность всѣхъ симптомовъ.

При маляріи могутъ быть показаны еще слѣдующія лѣкарства при наличности соотвѣтствующихъ симптомовъ:

Русъ. Ознобъ одновременно съ внутреннимъ жаромъ и отсутствіемъ жажды; потъ всего тѣла, за исключеніемъ лица; пузырчатая сыпь, особенно на губахъ; сухой, мучительный кашель.

Игнація. Жажда во время озноба; ознобъ отъ искусственнаго согрѣванія облегчается (въ отличіе отъ Нуксъ вом.. при которомъ такое согрѣваніе не облегчаетъ).

Сульфуръ. Для усиленія дѣйствія правильно противъ озноба подобранныхъ, но недостаточно скоро дѣйствующихъ лѣкарствъ Подходить особенно для малярии типа не такъ перемежающагося, какъ возвратнаго, и для маляріиной невралгіи (подобно Хинъ и Арсенику)

Бантизия. При малярии тифознаго характера

Лазезисъ. Лихорадка сопровождается жгучимъ колотьемъ, стѣсненіемъ въ груди и сердцѣ; во время озноба, являющагося вскорѣ послѣ полудня, больной укутывается въ одѣяло не такъ для согрѣванія, какъ для успокоенія себя (то же наблюдается при Гельземинѣ), при явленіяхъ слабости и холода, также послѣ злоупотребленія хининомъ.

Карбо вегетабилисъ. Отсутствие жажды во время лихорадки, большая слабость отъ болѣзни и отъ злоупотребленія хининомъ Холодное дыханіе и холодныя конечности, даже при согрѣваніи въ постели. Вздутіе живота газами.

Мениантесъ. Также при большой слабости съ преобладаніемъ озноба, какъ при Карбо.

При состояніяхъ слабости съ похолодѣніемъ тѣла подходятъ еще *Камфора*, *Ацид. гидроциан.*, *Секале*, *Лакхантесъ*, *Ликоподій*, *Дигиталисъ*, *Геллеборъ*, *Гюсциам.*, *Купрумъ*, послѣднія три лѣкарства—при судорожныхъ явленіяхъ, сопровождающихъ состояніе слабости и явленія холода (см. ч. 4-ю)

Аписъ подобно Лазезису, но отличается отъ послѣдняго тѣмъ, что согрѣваніе ухудшаетъ, а не облегчаетъ, и давленіе въ груди гораздо сильнѣе; жажда во время, а не раньше озноба; пузырчатая сыпь.

Противъ хроническихъ формъ малярии рекомендуются еще *Аранеа*, *Цедрумъ*, *Эватори* и *Эвкалиптъ* (см. ч. 4-ю).

Лучшее средство уберечь себя отъ заболѣванія маляріей—оставить мѣстность, гдѣ она эндемична; если же это невозможно, то выбрать по крайней мѣрѣ наиболѣе высокія мѣстоположенія для житія, не спать на открытомъ воздухѣ, беречься простуды и погрѣшностей въ діетѣ Страдающіе уже маляріей должны въ свободное отъ припадковъ время принимать ежедневно паровую ванну, таковая полезна и во время припадка (при ознобѣ). Въ послѣднемъ случаѣ можно сдѣлать, вмѣсто ванны, теплое (30° R) обтираніе или теплую ванну для укороченія продолжительности припадка. Во время жара—полуванна (22—25° R.), втеченіе 10 минутъ, съ пониженіемъ температуры воды путемъ доливаній до

18⁰ Р. Послѣ ванны общее обертываніе на 2—3 часа для ускоренія наступленія пота.—*Діета*: избѣгать особенно сырыхъ фруктовъ и молока, также сырой воды; во время озноба—теплое питье (рекомендуется настой липоваго цвѣта), во время жара—прохладительныя напитки, слизистыя отвары и вареные фрукты (компоты). Слабымъ можно давать понемногу разведеннаго горячаго вина (1 часть на 8 частей воды)

Общая правила діеты при лихорадочныхъ болѣзняхъ.

Пища должна быть больше жидкая. Негустыя отвары изъ крупы (овсяной, ячменной, рисовой и т. п.) теплыя, особенно при боли въ животѣ, поносѣ. Теплое питье часто лучше утоляетъ жажду у лихорадочныхъ больныхъ, нежели холодное питье или глотаніе льда. Для питья—молоко, цѣльное или, еще лучше, разбавленное отварной водой. Крѣпкихъ напитковъ вообще не давать; только слабымъ больнымъ разрѣшается виноградное вино, разбавленное водою (1—2 столовыя ложки на стаканъ воды). Или коньякъ (1 чайная ложка на стаканъ воды). Кофе и крѣпкаго чаю не давать. Слабый настой чая, также ячменный или солодовый кофе разрѣшаются, можно пить и негустой отваръ какао. Очень утоляетъ жажду и освѣжаетъ вообще яблочный чай, для приготовления котораго обливають кипяткомъ нѣсколько кусочковъ разрѣзаннаго яблока (съ кожицей) и даютъ настаиваться, пока остынетъ, въ остывшемъ же видѣ и пить. Кромѣ яблока можно прибавить въ это питье пару хорошо прожаренныхъ и истолченныхъ сухарей. Также цѣлесообразна хлѣбная вода прожаренныхъ корки чернаго или бѣлаго хлѣба (бѣлаго—особенно при разстройствахъ пищеваренія) обливаются кипяткомъ и остужаются. Избѣгать сладкихъ напитковъ (изъ фруктовыхъ соковъ и т. п.), которые только усиливаютъ жажду. Можно давать и простую отварную воду. Допускаются и фруктовыя воды, если онѣ пріятны больному.

Выздоровливающимъ даютъ молоко, молочныя каши, простоквашу, бульонъ, уху изъ свѣжихъ рыбъ, яйца въ смятку, кисель, легкія пуддинги и т. п.; вообще давать пищу въ очень умеренныхъ за разъ количествахъ, отнюдь не до чрезмѣрнаго насыщенія, хотя и часто, часа черезъ 2—3 понемногу.

Въ этотъ же отдѣлъ цѣлесообразно включить еще и послѣ-
родовую гнилостную лихорадку, въ виду преобладающаго и при
этой болѣзни лихорадочнаго состоянія.

5. Послѣродовая гнилостная лихорадка.

ичины.

Послѣродовая гнилостная лихорадка (горячка) очень опас-
ная болѣзнь, и о самопомощи при ней можетъ идти рѣчь развѣ
лишь какъ о первой помощи до прибытія врача. Болѣзнь эта
происходитъ отъ попадания заразныхъ (инфекціонныхъ) веществъ
извнѣ— чаще всего черезъ руки (инструменты) окружающихъ ро-
дильницу лицъ—рѣзъ матку, внутренняя поверхность которой пред-
ставляетъ собою по окончаніи родовъ сплошную рану. Возможно
однако и самозаражение, если послѣ родовъ въ маткѣ застряли
и подверглись гніенію остатки послѣда. Слѣдствиемъ зараженія
является во всякомъ случаѣ воспаление матки и покрывающей
ее брюшины.

ризнани
ходъ
олѣзни

Болѣзнь начинается потрясающимъ ознобомъ съ послѣду-
ющимъ сильнымъ жаромъ и зависящими отъ послѣдняго явлені-
ями (нестерпимая жажда, бредъ и проч., сухость губъ и языка,
иногда сухая кожа, чаще обильный, необлегчающій потъ). Въ
дальнѣйшемъ теченіи, часто очень скоро, или уже съ самага
начала, развиваются признаки общаго воспаления брюшины:
боль, вздутіе живота газами (метеоризмъ), рвота, слабый ус-
коренный пульсъ, крайній упадокъ силъ; или же изъ этихъ
явленій имѣются лишь слабый ускоренный пульсъ и упадокъ
силъ, т. е. признаки ослабленія (начинающагося паралича)
сердца. Въ томъ и другомъ случаѣ крайне рѣдко удается спасти
больную отъ смерти, такъ какъ болѣзнь заключается въ общемъ
и глубокомъ зараженіи крови и всего организма.

Необходи-
мость спеці-
альной лечеб-
ной помощи.

Мѣры предупрежденія болѣзни: соблюденіе крайней чистоты
передъ родами, во время и послѣ родовъ, а также правильное
веденіе послѣднихъ (врачемъ или акушеркой).

На одно лишь внутреннее лѣченіе нельзя полагаться при
столь серьезной болѣзни; необходимо принять всѣ мѣры для по-
лученія спеціальной врачебной помощи.

Лѣченіе.

Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ показана *Белладонна* × 3
какъ питье (30 капель на стаканъ воды), черезъ полчаса или

часть по глотку. Кромѣ того, при боляхъ въ животѣ, *Ламомилла* $\times 3$ попеременно (черезъ 1—2 часа) съ *Брюнія* $\times 3$.

Черезъ день, если не замѣтно улучшения, особенно при не-облегчающихъ потахъ, *Меркурій корроз.* $\times 3$, попеременно съ *Секале* $\times 1$.

При сильной боли и вздути живота, въ промежуткахъ между прочими приемами лѣкарствъ. *Карбо вегетабилис* 3 , при запорѣ попеременно съ *Нукс вомика* 3 .

При усиленіи нервныхъ и гнилостныхъ симптомовъ (бредъ упадокъ силъ, бессонница, сухость языка, малый пульсъ), примѣняются средства, указанныя при тифѣ, особенно *Русь* $\times 3$, *Арсеникъ* 3 , *Фосфор* 3 или *Фосфори ацид.* $\times 3$, черезъ часъ поочередіи.

Поворотъ къ выздоровленію даетъ себя знать черезъ облегчающую испарину, влажность языка и появленіе послѣродовыхъ очищеній, тогда какъ плохой исходъ предвѣщается появленіемъ просовидной сыпи на тѣлѣ.

При счастливомъ исходѣ можетъ наступить сразу полное выздоровленіе, или же выздоровленіе можетъ затянуться на болѣе или менѣе долгое время изъ-за ограничившагося воспалительнаго процесса въ животѣ (выпотъ—экссудатъ—нарывъ); въ такихъ случаяхъ, для рассасыванія, рекомендуется *Гепарь сульфурис* 3 и *Апис* $\times 3$ (черезъ 2—3 часа попеременно втеченіе 2—3 недѣль, послѣ чего могутъ еще понадобиться *Іод.*, *Кали іодат.*, *Калькареа карбон.*, *Сенія*, *Сульфуръ* и др.

Частыя, 2—6 разъ въ день, влагалищныя промыванія (22—25 Р.) растворомъ *Календула* Θ , изъ столовой ложки на 3—4 стакана отварной воды. Противъ жара общія обертыванія, 2—3 раза въ день, 4—8-слойныя, изъ 15—18-градусной воды, каждый разъ на полъ-часа; противъ боли въ животѣ—набрюшный согревающий компрессъ на ночь. Такие-же компрессы, смѣняемые каждые 1—2 часа, при сильной головной боли и бредѣ; также обертыванія нижнихъ конечностей, небольшіе прохладные клистиры, прохладные компрессы на голову, часто смѣняемые. Діета: см. стр. 67.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Эпидемическія болѣзни.

Содержаніе этого отдѣла: Корь (и Краснуха), Скарлатина, Оспа натуральная, Оспа вѣтряная, Дифтеритъ, Холера азіатская, Холерина, Дизентерія, Чума.

1. Корь.

нани и болѣзни. Во время эпидеміи кори можно ожидать развитія ея у ребенка, если онъ становится вялымъ, невеселымъ, по вечерамъ лихорадить, покашливаетъ, имѣетъ насморкъ съ слезотеченіемъ и свѣтобоязню и сильнымъ чиханіемъ. Все это предвѣстники вѣроятнаго обнаруженія, дня черезъ 3—4, коревой сыпи. Послѣдняя начинается на лицѣ въ видѣ красныхъ неправильной формы пятенъ. Сыпь держится 3—4 дня, и болѣзнь заканчивается отрубевиднымъ шелушеніемъ кожи, которое продолжается дней семь. Въ періодъ высыпанія температура значительно повышается. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ, однако, болѣзнь оканчивается выздоровленіемъ, хотя часто неполнымъ, что большей частію зависитъ отъ ненадлежащаго лѣченія или неправильнаго ухода. Довольно часто также бываютъ при кори болѣе или менѣе серьезныя и даже опасныя для жизни осложненія, какъ, наприм., крупъ, воспаленіе легкихъ, мозга и проч. Наконецъ возможны и послѣдовательныя послѣ кори болѣзни, всего чаще непрекращающійся съ болѣзнію катарръ (хроническій) дыхательныхъ путей, который можетъ перейти даже въ чахотку; часто наблюдается послѣдовательный хроническій катарръ глазъ, ушей и проч.

ліе отъ ихъ сып- болѣзней Корь отличается отъ скарлатины тѣмъ, что при первой сыпь разсѣяна по тѣлу ограниченными участками, красными пятнами, и появляется первоначально на лицѣ; при скарлатинѣ же она начинается съ шеи и груди и сплошной краснотой распространяется по всему тѣлу, за исключеніемъ носа и губъ. При скарлатинѣ почти всегда пораженъ зѣвъ, часто имѣется и воспаленіе почекъ, при кори же этого не бываетъ. При скарлатинѣ, въ началѣ болѣзни, почти всегда бываетъ рвота, при кори — нѣтъ.

Оспу, въ ея началѣ, можно смѣшать съ корью; отличіе: на первоначальныхъ оспенныхъ пятнахъ вскорѣ образуются гнойнички; кромѣ того сильная боль въ поясницѣ, при наличности прочихъ признаковъ, указываетъ на оспенный характеръ болѣзни.

При сыпномъ тифѣ лицо свободно отъ сыпи: при брюшномъ тифѣ сыпь слишкомъ ничтожна, чтобы ее смѣшать съ коревой.

Розовая сыпь (краснуха) и сыпь отъ нѣкоторыхъ лѣкарствъ (значительныя дозы бромистыхъ препаратовъ, антипирина и др.) не сопровождаются лихорадочными и катарральными явленіями.

При крапивницѣ имѣется зудъ, который при кори весьма рѣдко наблюдается.

Въ легкихъ случаяхъ достаточенъ одинъ *Аконитъ* $\times 3$ Лѣченіе или попеременно съ *Пульсатилла* $\times 3$, черезъ 2—3 часа.

При сильномъ насморкѣ, краснотѣ глазъ и свѣтобоязни, если эти явленія не уменьшаются въ первые $1\frac{1}{2}$ —2 дня, давать *Меркур. солуб.* 3 попеременно съ *Эвфразія* $\times 3$.

При высокой же лихорадкѣ съ головной болью, приливомъ крови къ лицу, тѣмъ болѣе—бредомъ: *Белладонна* 3 въ питъѣ, въ теченіи нѣсколькихъ часовъ; если не лучше, то, вмѣсто Белл., давать *Гельземинъ* 3 тѣмъ же способомъ.

Преобладающій или безпокоющій кашель требуетъ: если онъ глухой и сухой—*Спонгія* $\times 3$, черезъ 1—2 ч.; если послѣ нѣсколькихъ пріемовъ не лучше, то, вмѣсто Спонг., *Іод.* $\times 3$ попеременно съ *Гепаръ сульф.* 3; при охриплости—вмѣсто этихъ лѣкарствъ, *Бромъ* $\times 3$ и *Гепаръ сульф.* 3; если кашель сухой и судорожный—*Гіосціам.* $\times 3$.

При влажномъ, но удушливомъ кашлѣ, при слышныхъ въ груди хрипахъ—*Ипекакуана* $\times 3$ попеременно съ *Ацид. фосфорик.* $\times 3$; давать въ теченіи 1—2 дней, послѣ чего, если хрипы обильны, *Тартар. эметик.* 3 вмѣсто Ипекакуаны.

Арсеникъ 3 дается, когда сыпь быстро блѣднѣетъ и больной становится крайне слабымъ.

При нервномъ возбужденіи давать 1 или 2 раза въ день, въ промежуткахъ между прочими пріемами, *Игнація*; при бессонницѣ—*Коффеа* $\times 3$.

Въ случаяхъ осложненій со стороны глазъ, ушей, мозга легкихъ, пищеварительныхъ органовъ и проч. надо справиться въ другихъ соотвѣствующихъ главахъ этой книги.

О дозахъ и повтореніи пріемовъ см. гл. 3 и 4.

При благоприятномъ теченіи болѣзни больной долженъ Всп оставаться въ постели не менѣе 10—14 дней, изъ дому же не Тельн долженъ выходить раньше 3—4 недѣль, зимой—не раньше 4—5 недѣль, считая съ начала заболѣванія.

Больной долженъ находиться въ равномерномъ тепломъ помѣщеніи (14—15° по Реом.); пока температура тѣла не превышаетъ 39° по Цельсію и не имѣется никакихъ осложненій, надо огра-

ничиваться гомеопатическимъ лѣченіемъ и соблюденіемъ лихорадочной діеты (см. стр. 67). Чистоты ради можно обтирать больного 2—3 раза въ день влажнымъ полотенцемъ или чѣмъ либо подобнымъ (мокрой губкой), послѣ чего обсушить и покрыть легкимъ одѣяломъ. Такія втиранія вліяютъ нѣсколько и на жаръ тѣла, уменьшая его. Почаще мѣнять бѣлье.—Если сыпь очень красная и густая, если кожа очень чувствительна и чешется, въ такихъ случаяхъ очень цѣлесообразно, какъ и при скарлатинѣ, втираніе во все тѣло свѣжетоппеннаго свиного сала, разъ въ сутки.—При температурѣ выше 39,3—39,5° прикладывать отвлекающіе компрессы на животъ, мѣняя черезъ каждыя 1—2 часа; если нѣсколько такихъ компрессовъ не достигаютъ цѣли, то сдѣлать ножно-подмышковое обертываніе продолжительностью полчаса или часъ съ послѣдующимъ обтираніемъ комнатной водой. Такое обертываніе можно повторить, въ случаѣ надобности, 2—3 раза подрядъ, 1 или 2 раза въ сутки. При мозговыхъ явленіяхъ, кромѣ того, класть холодные компрессы на темя головы, мѣняя черезъ каждыя 15—20 минутъ, или пузырь, наполненный на треть холодной водой. При сильномъ и упорномъ жарѣ не слѣдуетъ упускать ставить отъ 1 до 3 разъ въ день небольшой (удерживаемый) клистиръ изъ комнатной воды.

При наступившемъ шелушеніи кожи—теплая ванна (25° R.).—Реконвалесценто́въ (т. е. лицъ, оправляющихся отъ болѣзни) надо беречь отъ сквозняковъ и быстрыхъ смѣнъ температуръ. — При воспаленіи глазъ обмывать ихъ раза 3 въ день водою 22—25° R. (или примочки, смѣняемая черезъ каждыя 2—3 минуты), гомеопатически прибавленіе къ водѣ для глазъ *Эвфразія* Θ, 5 капель на столовую ложку. Ротъ полоскать 2—3 раза въ день теплою водою, къ которой полезно прибавить *Календула* Θ (10 капель на рюмку воды).—Для укрѣпленія груди вытирать ее утромъ и вечеромъ 22—25° R. водою.—Наконецъ, свѣжій воздухъ и частая смѣна бѣлья.

Краснуха (розовая сыпь, ложная корь).

Похожа на корь, но не сопровождается ни лихорадкой, ни другими сколько нибудь тягостными симптомами. Проходитъ скоро безъ всякаго лѣченія. (Можно, впрочемъ, давать *Аконитъ* и *Пульсатилла*).

2. Скарлатина.

Скарлатина начинается сильным жаромъ, головной болью, общимъ недомоганіемъ и почти всегда рвотой. Затѣмъ является боль при глотаніи, которая постепенно усиливается, вслѣдствіе воспаления зѣва. Послѣдній оказывается сильно покраснѣвшимъ, миндалевидныя железы часто припухаютъ и покрываются сѣровато-бѣлымъ налетомъ. Послѣ того какъ это состояніе продолжалось 1—2 дня, начинаютъ появляться на шеѣ (а не на лицѣ, какъ при кори) красныя пятнышки, постепенно сливающіяся и образующія характерную скарлатинную (пурпуровую) красноту, которая переходитъ на грудь, на лицо (исключая носа и губъ) и, наконецъ, распространяется по всему тѣлу. Съ появленіемъ сыпи всѣ симптомы усиливаются, въ томъ числѣ и жаръ, который доходитъ часто до 41° Ц. Такъ продолжается отъ 2 до 4 дней, послѣ чего жаръ спадаетъ, кожа блѣднѣетъ, улучшается и все прочее состояніе больного; спустя еще 4—8 дней послѣдній чувствуетъ себя здоровымъ, при чемъ кожа начинаетъ шелушиться. Въ этомъ періодѣ болѣзни больной очень подверженъ простудѣ, главнымъ образомъ—заболѣванію почекъ; поэтому раньше 4—5 недѣль съ начала болѣзни его не слѣдуетъ выпускать въ холодную и сырую погоду.

Описанный благополучный ходъ болѣзни однако часто нарушается осложненіями, болѣе или менѣе затягивающими выздоровленіе или даже весьма опасными для жизни. Въ этомъ отношеніи скарлатина—самая коварная изъ болѣзней: когда все, казалось бы, идетъ благополучно, подкрадется вдругъ злокачественный дифтеритъ слизистыхъ оболочекъ или опасное воспаленіе почекъ съ водянкой и проч. Въ началѣ болѣзни возможны тяжелыя тифозныя состоянія при недостаточномъ высыпаніи или скрытіи сыпи; въ такихъ случаяхъ смерть можетъ наступить въ первые дни и даже первые часы болѣзни. Осложненная скарлатина оставляетъ послѣ себя часто весьма тяжелыя болѣзненныя состоянія, какъ хроническое воспаленіе ушей съ течью и глухотой, воспаленіе сочлененій и проч. При надлежащемъ гомеопатическомъ лѣченіи, однако, и при цѣлесообразномъ уходѣ за больнымъ крайне рѣдко наблюдаются осложненія скарлатины и еще того рѣже—послѣдовательныя болѣзненныя состоянія.

Скарлатина весьма заразна; поэтому, и въ виду ея опасности,

прочія дѣти, живущія въ одной съ больнымъ квартирѣ, должны быть по возможности отдѣлены отъ него на все время болѣзни; во всякомъ же случаѣ ихъ не должно посылать въ школы и вообще въ мѣста скопления дѣтей, дабы не распространять заразы. Квартиру, въ которой находится скарлатинный больной, надо часто и основательно провѣтривать, бѣлье его вываривать, всякія выдѣлення (слизь, мокроты, испражнения, обливать кипяткомъ и, по возможности, закапывать въ землю.

ение
тины . При такой серьезной болѣзни, какъ скарлатина, лѣчение гомеопатическими лѣкарствами особенно важно и, гдѣ только возможно, должно вестись подъ наблюдениемъ и руководствомъ врача-гомеопата.

Основнымъ цѣлебнымъ средствомъ является *Белладонна*, которая оказывается вмѣстѣ съ тѣмъ и предохранительнымъ противъ скарлатины средствомъ во время эпидемии, и какъ таковое дается 1 разъ въ день въ 3-мъ десятичномъ или, еще лучше, въ 3-мъ сотенномъ дѣленіи.

При первыхъ признакахъ заболѣванія, выражающихся въ лихорадочномъ состояніи и воспалении зѣва, даютъ *Белладонна* $\times 3$ и *Меркур. солюб.* 3, черезъ два часа попеременно, и кромѣ того *Аконитъ* $\times 3$ въ видѣ питья, по глоточку тѣмъ чаще, чѣмъ выше температура тѣла, каждый часъ, полчаса и еще чаще. При этомъ нѣсколько разъ въ день полоскать ротъ и горло растворомъ изъ 10 капель *Календула* Θ въ рюмкѣ воды (или 30—40 капель въ стаканѣ воды).

При умѣренномъ теченіи болѣзни и при отсутствіи осложнений это лѣчение достаточно, причемъ *Меркурій* дается до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ воспаление зѣва, *Белладонна* же, пока не понизится температура тѣла (*Аконитъ* при дальнѣйшемъ теченіи болѣзни безцѣльно давать).

Въ случаяхъ болѣе тяжелыхъ, равно какъ тогда, когда въ началѣ лѣченія гомеопатическія средства были упущены, приходится прибѣгать еще къ другимъ средствамъ. Начать надо во всякомъ случаѣ съ тѣхъ же только что указанныхъ средствъ, причемъ, если въ горлѣ подозрѣвается дифтеритообразное поражение, если тамъ видны бѣловатые или сѣроватые налеты, то, вмѣсто Меркур. солюб., даютъ *Меркур. цианат.* 3.

Если зѣвъ припухшій или на шеѣ увеличенныя железы, то даютъ *Меркур.* попеременно съ *Аписъ* $\times 3$, черезъ 1—2 часа; вмѣсто же Аконита—*Белладонна* $\times 3$ въ видѣ питья. Наружно къ шеѣ при-

кладывать два раза въ день *анисное масло* на чистой тряпочкѣ и слегка обвязывать.

Если въ $1\frac{1}{2}$ —2 дня улучшение не замѣчается, то, вмѣсто этихъ двухъ лѣкарствъ, давать *Ацид. нитрик.* $\times 3$ и *Лакзисъ 6* попеременно черезъ 1—2 часа, при улучшении—рѣже.

Въ случаѣ нагноения железы—*Гепаръ-сульфурисъ 3*, которое дается черезъ каждыя 2—3 часа до тѣхъ поръ, пока опухоль размягчится и вскрыется; послѣ же него—*Силиция 3*—до тѣхъ поръ, пока имѣется затвердѣние на мѣстѣ опухоли, въ последнемъ случаѣ подходитъ также *Барита карбоника 3*.

При температурѣ, упорно державшейся въ началѣ болѣзни на высшихъ градусахъ, выше 39,5, давать, послѣ Белладонны, *Русъ* $\times 3$, при медленномъ же высыпаніи—*Брионія* $\times 3$; при сильной слабости—то или другое попеременно съ *Арсеникъ 3*. Эти лѣкарства—при отсутствіи мозговыхъ явленій. Если же появляется бредъ, грубое забытѣ, упадокъ силъ, подходятъ больше *Фосфоръ* $\times 3$ и *Вератр.* $\times 3$, особенно при слабомъ, маломъ и частомъ пульсѣ; въ такомъ случаѣ можетъ понадобится *Дигиталисъ* $\times 2$ и *Камфора* $\times 1$.

При scarlatinѣ, начиная съ 3-й недѣли, есть опасность заболѣванія почекъ, поэтому съ этого времени и до 4—5 недѣли надо каждый день кипятить мочу, какъ сказано при воспалении почекъ, дабы убѣдиться, чиста ли она или въ ней появился бѣлокъ. Лѣчение должно быть тогда какъ при воспалении почекъ (см. последнее).

При умѣренномъ теченіи болѣзни можно ограничиваться, кромѣ соблюденія обычныхъ правилъ діеты для лихорадочныхъ (см. стр. 67), однимъ гомеопатическимъ лѣченіемъ. При чрезмерно-высокой температурѣ—примѣненія воды такія же, какія указаны при кори (см. стр. 72). При scarlatinѣ еще болѣе, чѣмъ при кори, цѣлесообразно втирание (разъ въ день) въ кожу свиного сала, по возможности—свѣжетоппеннаго.

3. Оспа (натуральная).

Въ большинствѣ случаевъ болѣзнь начинается ознобомъ, го- Признаки
ловокруженіемъ, болью въ крестцѣ, тяжестью головы, разбито- ходъ болѣз
стью, тошнотою и рвотою. Температура тѣла сразу же, съ самаго начала болѣзни, высоко поднимается и такой же остается до оспеннаго высыпанія. При этомъ бываетъ часто бредъ, или спячка, судорожныя и обморочныя состоянія, тянущія боли въ

суставахъ и во всемъ тѣлѣ. Въ большей или меньшей мѣрѣ поражаются и слизистыя оболочки—полости рта и зѣва, носа, глазъ, также желудка и кишекъ. Въ общемъ болѣзнь можетъ продолжаться до 5—6 недѣль. Сыпь эта появляется обыкновенно уже на 3-й день послѣ первоначальнаго заболѣванія, прежде всего на лицѣ, и втечение 3—4 дней распространяется по всему тѣлу въ видѣ твердыхъ, глубоко въ кожѣ сидящихъ узелковъ. Въ слѣдующіе 4—6 дней узелки увеличиваются, наполняются гнойной матеріей и образуютъ въ серединѣ своей углубленіе въ видѣ чашечки. Затѣмъ они мало-по-малу высыхаютъ, образуя темнокоричневыя корки, которыя постепенно отдѣляются отъ кожи, опадаютъ, оставляя послѣ себя темно-красныя пятна; послѣднія блѣднѣютъ и мало-по-малу исчезаютъ или же остаются въ видѣ оспенныхъ рубцовъ.

ая оспа

Болѣе рѣдкой, но и наиболѣе тяжелой и опасной формой болѣзни является такъ назыв. черная оспа, при которой въ оспенныхъ прыщахъ, кромѣ гноя, содержится и кровь; являются и кровоподтеки, кровотечения, признаки разложенія крови, тифоподобныя состоянія.

Оспа оставляетъ нерѣдко, но не такъ часто, какъ скарлатина, послѣ себя на всю жизнь серьезныя болѣзненныя состоянія органовъ, какъ напримѣръ глазъ, ушей, костей, железъ и проч.

ение оспы

Вакцининъ 3 (гомеоп. растираніе коровьей оспенной лимфы) рекомендуется какъ лучшее основное средство для излѣченія оспы. Оно же считается наиболѣе надежнымъ предохранительнымъ противъ этой болѣзни средствомъ. Съ предохранительной цѣлью принимать таковое разъ въ день; во время же наступившей болѣзни—помимо прочихъ показанныхъ лѣкарствъ—утромъ и вечеромъ по приему. Какъ предохранительное средство и для начала болѣзни рекомендуется также *Туя* Θ по 1 каплѣ ежедневно; во время же болѣзни 10—20 капель на стаканъ воды, черезъ 2 часа по столовой ложкѣ *).

Искусственная прививка оспенной лимфы, сдѣланная въ то время, когда зараженіе настоящей оспой уже произошло, хотя бы

*) *Вакцининъ* и *Туя* рекомендуются, кстати сказать, какъ средства для предупрежденія возможныхъ вредныхъ послѣдствій отъ предохранительной прививки оспы, что очень важно знать, разъ прививка оспы является въ Россіи все еще обязательной для населенія. Для указанной цѣли эти лѣкарства даются въ течение 3—4 недѣль, до имѣющейся въ виду прививки, 2 раза въ день въ 6-омъ сотенномъ дѣленіи. Если это упущено было, то принимать эти лѣкарства такимъ же образомъ послѣ сдѣланной прививки.

не проявилось еще никакими признаками, не только бесполезна, но, принявшись, она причиняет даже большой вред тѣмъ, что усугубляетъ и безъ того уже тяжелую болѣзнь.

Въ самомъ началѣ *Аконитъ* $\times$ *З* какъ питье. Въ дальнѣйшемъ же теченіи болѣзни отъ Аконита ужъ мало можно ожидать пользы. Кромѣ того, въ періодѣ образования оспенныхъ п у стулъ, наиболѣе умѣстны *Белладонна* $\times$ *З* и *Меркур. солуб.* *З* черезъ 2 ч. попеременно; когда же нагноение уже наступило— *Гепаръ сульфурисъ* *З*.

Въ болѣе бурно протекающихъ случаяхъ, съ тифоподобными явлениями, подходитъ *Бріонія* $\times$ *З*, въ теченіи 1—2 дней, затѣмъ *Русъ* $\times$ *З*, и кромѣ того—*Антимоній круд.* *З* или *Тартар. эметик.* $\times$ *З*; въ особенно же тяжелыхъ случаяхъ, какъ и при черной оспѣ,—*Арсеник.* *З* и *Секале корнут.* $\times$ *З*; въ этихъ случаяхъ надо имѣть въ виду также *Ацид. муріатик.* $\times$ *З* и *Креозотъ* *З*, также *Фосфоръ* $\times$ *З*.

Воздухъ въ комнатѣ, гдѣ помѣщается больной, долженъ быть умѣренно-теплый, лучше—болѣе прохладный, чѣмъ болѣе теплый; онъ долженъ быть и чистый, для чего надо почаще провѣтривать комнату, предохраняя въ то же время больного, отъ сквозняковъ. Бѣлье, постельное и тѣльное, должно быть чистое и, до надѣванія на больного, согрѣваемо. Противъ зуда оспенныхъ прыщей можно смазывать таковые раза три въ день вазелиномъ или еще цѣлесообразнѣе *мазью сѣрной* (съ сѣрнымъ цвѣтомъ) или камфорной. Отъ расчесовъ зудящихъ прыщей необходимо воздерживаться, такъ какъ они ведутъ къ болѣе глубокому изъязвленію послѣднихъ и тѣмъ самымъ къ образованію болѣе замѣтныхъ рубцовъ. Маленькимъ дѣтямъ, не могущимъ удержаться отъ расчесовъ при зудѣ, приходится обматывать ручки матеріей на подобіе рукавицъ.

Противъ жара тѣла очень полезны общія обертыванія, прохладныя обмыванія и полуванны (25 — 26° R.), а на вскрывшіеся гнойные узелки—теплыя (28°) примочки помощью ваты; къ водѣ для примочекъ цѣлесообразно добавить *Календула* Θ , чайную ложечку на стаканъ. При поражении глазъ—примочки прохладныя, смѣняемые черезъ каждыя 2 — 3 минуты, изъ раствора *Эвфразія* Θ , 30 капель на стаканъ воды. Отвлекающіе набрюшные компрессы и обертыванія нижнихъ конечностей; отвлекающіе холодные клистиры. Діету см. стр. 67.

4. Вѣтряная оспа.

Похожа на натуральную оспу, но протекаетъ въ несравненно слабѣйшей формѣ. Сыпь состоитъ изъ пузырьковъ, которые, достигая величины горошины, мутнѣютъ, затѣмъ подсыхаютъ и опадаютъ; остающіеся отъ этого розовые слѣды также скоро исчезаютъ. Вся болѣзнь продолжается 8—10 дней и всегда кончается выздоровленіемъ. Многіе ее считаютъ родственной натуральной оспѣ и предохраняющей отъ заболѣванія послѣднею; теченіе ея благоприятно и безъ лѣченія; при лихорадочномъ состояніи развѣ лишь нѣсколько приѣмовъ Аконита.

5. Дифтеритъ.

нани и болѣзни Болѣзнь начинается обыкновенно въ видѣ простого воспаления гортани съ болью при глотаніи, часто даже и безъ боли, и поэтому производитъ впечатлѣніе легкаго простуднаго состоянія. При всякомъ лихорадочномъ состояніи слѣдуетъ поэтому, особенно у дѣтей, всегда посмотрѣть въ горло (способъ осмотра гортани см. ниже: Отдѣлъ пятый, II). Если оно поражено дифтеритомъ, то уже съ самаго начала болѣзни весь зѣвъ, а именно миндалины, небныя дужки и язычекъ принимаютъ пурпурно-красный цвѣтъ и вскорѣ покрываются тонкимъ бѣловато-сѣрымъ налетомъ, который постепенно утолщается, образуя молочно-бѣлую пленку. Зараза дифтеритическая не ограничивается однимъ горломъ, но поражаетъ, весь организмъ, вызывая въ немъ цѣлый рядъ болѣе или менѣе рѣзкихъ измѣненій. Вѣроятнѣе даже, что раньше заражается кровь, а затѣмъ ужъ только болѣзнь обнаруживается въ горлѣ.

Дифтеритное пораженіе сопровождается жаромъ и общей слабостью, а также опуханіемъ подчелюстныхъ железъ. Въ благополучно протекающихъ случаяхъ пленки отдѣляются, оставляя послѣ себя поверхностныя изъязвленія, которыя скоро заживаютъ.

ложненія и дифтеритъ Случается, однако, при болѣе сильномъ зараженіи организма или при ненадлежащемъ лѣченіи, что образованіе пленокъ идетъ дальше, какъ въширь, такъ и въ глубь; окраска ихъ становится болѣе грязной, боли вообще и при глотаніи, равно какъ жаръ и упадокъ силъ увеличиваются; дыханіе и выдѣленіе изъ носа, въ

случаѣ перехода на послѣдній дифтерическаго яда, вонючія и, наконецъ, больной умираетъ отъ слабости и истощенія.—Въ рѣдкихъ случаяхъ уже съ самаго начала появляется сильная тоска, слабость и помраченіе сознанія, и съ образованіемъ пленокъ, распространяющихъ вокругъ крайне противный, трупный запахъ, болѣзнь кончается смертію, или, что еще рѣже бываетъ, болѣзненный процессъ поражаетъ также гортань (крупозный дифтеритъ), теряется голосъ, а кашель становится жесткимъ; словомъ, являются симптомы, подобные тѣмъ, какіе описаны при крупѣ; дифтерическія пораженія гортани въ большинствѣ случаевъ кончаются смертію

Дифтеритъ — болѣзнь очень заразная, поэтому здоровые должны быть отдѣлены отъ больного.

Дифтеритъ влечетъ за собою нерѣдко послѣдовательныя **Послѣдствія дифтерита.** болѣзни: сильное малокровіе и параличи. Чаше всего парализуется горло и гортань; больной говоритъ въ носъ, затрудняется проглатываніе пищи и питья, голосъ становится беззвучнымъ, рѣчь — непонятной; при разслабленіи глазныхъ мышцъ больной плохо различаетъ предметы вблизи или видитъ предметы въ двойномъ видѣ, или жалуется на мерцаніе передъ глазами; при разслабленіи двигательныхъ нервовъ конечностей, рукъ или ногъ, движеніе послѣднихъ значительно ограничивается до степени даже полного невладенія; при разслабленіи ушныхъ нервовъ является тугоухость слуха до полной глухоты; при разслабленіи мочевого пузыря или кишечника — задержаніе мочи и упорный запоръ. Дифтеритическіе параличи въ большинствѣ случаевъ проходятъ при своевременномъ и надлежащемъ лѣченіи.

Главное средство при дифтеритѣ — *Меркурій цианатъ* 3, **Лѣченіе дифтерита.** которое даютъ попеременно съ *Белладонна* $\times 3$, черезъ 2 часа. Въ легкихъ случаяхъ предпочитается *Меркур. солюбилисъ* $\times 3$, въ болѣе же тяжелыхъ, если черезъ день или два процессъ болѣзни не улучшается, даютъ *Меркур. коррозив.* $\times 3$ попеременно съ *Анисъ* $\times 3$.

При такомъ лѣченіи, примѣненномъ съ самаго начала болѣзни, послѣдняя, если форма ея не тяжелая, принимаетъ обыкновенно благоприятный оборотъ и кончается полнымъ и скорымъ выздоровленіемъ. Тяжелые же случаи могутъ потребовать и другихъ еще средствъ, выборъ которыхъ надо предоставить врачу, при малѣйшей къ тому возможности, да и вообще лѣченіе такой болѣзни какъ дифтеритъ, никогда не-врачъ не долженъ

брать на себя, даже съ самаго начала болѣзни, далѣе первыхъ означенныхъ выше средствъ.

Другія средства, какія могутъ понадобиться, суть слѣдующія:

Меркур. биодат. $\times 3$ —при сильномъ опуханіи шейныхъ железъ. Наружно въ этихъ случаяхъ прикладывать *аписное масло*.

Ацид. муриатик. $\times 1$ (раствора соляной кислоты изъ 1 части на 10 частей воды), по 5 капель черезъ 1—2 часа, при очень сильномъ жарѣ и явленіяхъ возбужденія. Сѣрыя изъязвленія въ горлѣ, зловонное дыханіе.

Ацид. нитрик. $\times 2$ —въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ, сопровождающихся очень большой слабостью и кровотеченіемъ изъ носа.

Арсеникъ 3 въ такихъ же случаяхъ, можно попеременно съ *Ацид. нитрик.* или съ *Креозотъ 3*.

При переходѣ болѣзни на гортань (охриплость, жесткій, пилящій кашель): *Бромъ* $\times 2$ или *Кали бромат.* $\times 1$; если въ теченіи нѣсколькихъ часовъ не лучше, то—попеременно съ *Гепаръ сульфур.* $\times 3$, черезъ часъ. Наружно смазываютъ переднюю часть шеи 2 раза въ день растворомъ изъ 1 части Брома въ 20 частяхъ глицерина.

При накопленіи мокроты въ гортани, затрудняющемъ дыханіе—*Тартар эметик.* $\times 2$ (вмѣсто Гепаръ) черезъ 10—15 минутъ по приему.

Для возстановленія силъ послѣ болѣзни—*Хина* $\times 3$.

Противъ послѣдовательнаго паралича первыми средствами являются: *Нуксъ вомика 3* и *Фосфоръ 3*, также *Кали фосфорик.* 3 , черезъ 2 часа попеременно. См. еще „Параличи“.

Вспомогательныя мѣры при дифтеритѣ.

Заботиться о чистомъ содержаніи полости рта. Для этой цѣли вычищать утромъ и вечеромъ зубы мягкой зубной щеткой, омачиваемой растворомъ, всего лучше, *марганцево-кислаго калия*, изъ нѣсколькихъ кристалликовъ на стаканъ воды. Этимъ же растворомъ можно и полоскать горло нѣсколько разъ въ день. Для той же цѣли годится и растворъ *алкоголя* изъ 1 части его въ 4 частяхъ воды. У маленькихъ дѣтей, не умѣющихъ полоскать рта и горла, приходится ограничиваться вытираніемъ рта (но не зѣва) мягкой тряпочкой или губкой, смоченной тѣмъ или другимъ растворомъ. По назначенію врача могутъ примѣняться и пульверизация и распыливаніе изъ лѣкарственныхъ веществъ. Всякаго же рода прижиганія и смазыванія въ горлѣ могутъ причинить большой вредъ при дифтеритѣ, такъ какъ растрavляютъ больное мѣсто и тѣмъ способствуютъ углубленію болѣзни.

наго процесса и скорѣйшему всасыванію въ кровь болѣзнетворнаго яда.

Для чистки рта и полосканія горла полезенъ при дифтеритѣ также растворъ *карболовой кислоты*, для чего берутъ 1—2 капли этой кислоты на стаканъ воды, каковой растворъ многие больные находятъ даже пріятнымъ на вкусъ.

Растворы эти примѣняются тепловатыми. Ими же можно, въ случаѣ надобности, промывать и носовую полость, втягиваніемъ ли въ носъ или промываніемъ посредствомъ резинового шприца или черезъ носовой душъ, разъ или два раза въ день.

Примѣненія воды, въ качествѣ вспомогательныхъ мѣръ, имѣютъ своей цѣлью пониженіе температуры тѣла, если она очень высока, устраненіе приливовъ къ органамъ шеи и уменьшеніе воспаления послѣднихъ. Для этого всего служатъ:

1) холодныя обмыванія (15—18° P.), 2—3 раза въ день; если температура достигаетъ 39° Ц., то дѣлаютъ ножноподмышковыя обертыванія (22—25° P.), 2—3 раза въ день, съ послѣдующими обмываніями; при температурѣ 40° Ц. полуванны (22—25° P.), продолжительностью 5 минутъ, 2—3 раза въ день, съ послѣдующими также обмываніями.—2) холодныя (15—18° P.), компрессы на шею и лобъ—смѣняемые черезъ каждыя 3—5 минутъ, позднѣе—обертыванія шеи (18—22° P.), продолжительностью 3 часа. 3) набрюшныя компрессы (22° P.), обертыванія ногъ (на 3 часа); также теплыя ручныя и ножныя ванны и теплыя компрессы на животъ, руки и ноги. Небольше прохладныя клистиры (удерживаемые) 1—2 раза въ день для уменьшенія жара.

При явленіяхъ удушенія (дифтеритическій крупъ) раздражать зѣвъ намасленнымъ птичьимъ перомъ, чтобы вызвать рвоту; если всѣ эти мѣры не помогаютъ, остается еще только оперативное вскрытіе дыхательнаго горла. (трахеотомія), которое, впрочемъ, при крупозномъ дифтеритѣ очень рѣдко спасаетъ отъ смерти.

Діета: тепловатое молоко, чайными и столовыми ложками, также простокваша (кислое молоко), слизистые супы, вареные фрукты; противъ жажды—свѣжая вода и прохладительные лимонады (см. еще общ. правила діеты на стр. 67 и „крупъ“—отд. 5).

Что касается противодифтеритной сыворотки, то при своевременномъ и надлежащемъ лѣченіи гомеопатическими лѣкарствами не имѣется обыкновенно надобности и думать о ней. Въ случаяхъ же тяжелыхъ, особенно—въ дифтерическомъ крупѣ, не слѣдуетъ, конечно, пренебречь и этимъ изопатическимъ (см. стр. 18) сред-

Примѣне
воды п
дифтери

Мѣры пр
дифт. кру

Діета пр
дифтерит

Противо-
дифтеритн
сыворотка

ствомъ, какъ послѣднимъ якоремъ спасенія, но при этомъ надо знать, что малая доза и этого средства болѣе надежна, нежели обычная большая доза, какъ автору сего руководства случалось убѣждаться на практикѣ.

6. Холера (азиатская).

Холера отличается отъ обыкновенной холерины (см. ниже) своимъ рѣзко-выраженнымъ эпидемическимъ проявленіемъ и несравненно большей опасностію, сопряженной съ быстро наступающимъ разложеніемъ крови и угасаніемъ жизнедѣятельности. Опасность заболѣть этой болѣзнію, однако, далеко не такъ велика, какъ кажется, и паника, испытываемая публикой во время холерной эпидеміи, не имѣетъ достаточнаго основанія. Въ пользу такого утвержденія говоритъ прежде всего сравнительно незначительный всегда процентъ заболѣванія относительно общаго количества населенія. Это доказываетъ, что громадное большинство людей не предрасположено къ заболѣванію холерой, и только исключительныя обстоятельства могутъ вести къ этому. Къ такимъ обстоятельствамъ относится прямое зараженіе отъ холернаго больного при недостаточномъ соблюденіи всѣхъ мѣръ предосторожности, а также—несоблюденіе мѣръ предосторожности вообще во время холерной эпидеміи.

Мѣры предосторожности заключаются прежде всего въ соблюденіи личной относительно себя чистоты, въ веденіи нормальнаго образа жизни и въ употребленіи въ пищу и питье неиспорченныхъ продуктовъ (см. ниже).

Малѣйшее расстройство пищеваренія во время холерной эпидеміи не должно оставлять безъ вниманія, такъ какъ извѣстно, что заболѣванію холерой часто, въ видѣ предвѣстниковъ, предшествуютъ расстройства пищеваренія. Въ этой ранней стадіи болѣзни достаточно урегулировать діету и принять нѣсколько разъ *Камфора Рубини* (см. ниже), чтобы уничтожить болѣзнь въ самомъ зачаткѣ ея.

Внезапно и безъ всякихъ предвѣстниковъ являющееся заболѣваніе, такъ называемая молніеносная холера, является очень большою рѣдкостью. И то, надо полагать, это тѣ случаи, въ которыхъ предвѣстники просто не обращали на себя вниманія.

Взрывъ болѣзни характеризуется рвотой и обильными водянистыми, похожими на рисовый отваръ, испражнениями, сопро-

знаки и
болѣзни.

вождающимися сильными болями въ животѣ, стѣсненіемъ въ груди, отчаянной тоской, задержаніемъ мочи, неутолимой жаждой. Если болѣзнь не останавливается, то является посинѣніе лица, тѣло холодѣетъ, кожа сморщивается, собранная въ складку она не разглаживается вновь; выдохъ дѣлается холоднымъ какъ ледъ, пульсъ становится слабымъ, нитевиднымъ, животъ западаетъ, западаютъ и мышцы лица, голосъ хрипнеть и совсѣмъ теряетъ звучность, въ икрахъ являются судороги, общая слабость доходитъ до крайней степени.

При поворотѣ къ выздоровленію всѣ эти явленія постепенно ослабѣваютъ, и на мѣсто прежняго альгиднаго періода является періодъ реакціи: прежде всего увеличивается выдѣленіе мочи и является обильный потъ. Въ этихъ явленіяхъ—спасеніе больного, иначе неминуемъ еще и тифоидный періодъ, въ продолженіе котораго больной все время находится между жизнью и смертью. Изрѣдка во время эпидеміи бываютъ случаи такъ называемой сухой холеры, при которой обильныхъ поносовъ нѣтъ, но послѣ смерти при вскрытіи, весь кишечникъ оказывается полнымъ жидкости.

Гомеопатическое лѣченіе холеры въ высшей степени дѣйствительно, и смертность отъ нея при этомъ лѣченіи исчисляется, самое большее, въ немногихъ единицахъ, а не въ нѣсколькихъ десяткахъ на сто, какъ это сплошь и рядомъ бываетъ при другихъ способахъ лѣченія. Гомеопатія излѣчиваетъ холеру немногими лѣкарствами, что объясняется рѣзкой типичностью болѣзни, всегда одинаковою, въ общихъ чертахъ, картиною болѣзни, а потому требующей всегда однихъ и тѣхъ же лѣкарствъ, вполне соотвѣтствующихъ болѣзни своимъ подобіемъ. И дѣйствительно, лѣкарства эти безчисленное множество разъ уже оправдывали себя на практикѣ, за все время существованія этого способа лѣченія, во всѣ бывшія эпидеміи холеры и въ послѣднюю также, въ рукахъ тѣхъ, кто желалъ и умѣлъ примѣнять ихъ.

Какъ бы дѣйствительны ни были гомеопатическія лѣкарства во время самаго заболѣванія холерой, безпечность не должна, однако, заходить такъ далеко, чтобы пренебрегать предохранительнымъ отъ возможности заболѣванія средствомъ.

Средство это—Камфора въ видѣ предложеннаго д-ромъ Рубини насыщеннаго спиртнаго раствора ея (*Камфора Рубини*), который можно достать въ любой гомеопатической аптекѣ или даже самому приготовить изъ равныхъ частей камфоры и крѣпкаго виннаго спирта. Какъ предохранительное средство *Камфора*

Лѣче
холеѣ

Рубини принимаютъ утромъ натощакъ и вечеромъ, ложась спать, по 1 или 2 капли на кусочкѣ сахара *), разгрызаютъ или всасываютъ и глотаютъ, ничѣмъ непосредственно не запивая. Еще удобнѣе принимать *Камфора Рубини* на мелко-истолченномъ сахарѣ. Горькій вкусъ этого лѣкарства нѣсколько рѣзко ощущается на языкѣ, но при дальнѣйшемъ употребленіи оно принимается легко, а многіе считаютъ ощущение отъ камфоры даже приятнымъ. Дѣтямъ, до 10—12 лѣтъ, вмѣсто цѣльной тинктуры Камфоры достаточно давать такимъ же способомъ и столько же капель перваго десятичнаго разведенія—*Камфора Рубини* $\times 1$.

Этимъ же средствомъ начинаютъ лѣчение и наступившей уже болѣзни и даютъ черезъ 5—10—15 минутъ по 3—5 капель, указаннымъ выше способомъ, до улучшения, которое выражается прежде всего въ выступающей на тѣлѣ теплой испаринѣ.

Если послѣ нѣсколькихъ приемовъ Камфоры не лучше становится, если имѣется рвота, тошнота, поносъ, то даютъ *Арсеник. 3* попеременно съ *Ипекакуана* $\times 3$, черезъ полчаса, а при улучшеніи все рѣже, по 3—6 капель въ полрюмкѣ воды.

Къ этимъ лѣкарствамъ прибавляется еще *Вератрумъ 1*, по очереди съ ними, если имѣется сильная рѣзъ въ животѣ, холодный потъ, холодныя конечности, судорога икръ.

Если послѣднія явленія преобладаютъ, то, оставивъ *Ипекакуана*, давать поочередно *Арсеник.*, *Вератрумъ* и *Купрумъ ацетик.* $\times 3$.

Карбо вегетабилисъ 3. въ случаѣ неблагоприятнаго хода болѣзни, когда жизнь какъ бы угасаетъ, когда пульсъ и дыханіе исчезаютъ, жаръ съ большой слабостію, приливъ къ груди и головѣ, липкій потъ.

Фосфоръ $\times 3$, при тѣхъ же симптомахъ, какъ и *Карбо*.

Сульфуръ $\times 3$, какъ промежуточное лѣкарство для усиленія дѣйствія другихъ лѣкарствъ, когда дѣйствіе ихъ кажется недостаточнымъ, отъ 1 до 3 разъ въ день.

Зспомага-
тельныя
мѣры при
холерѣ.

Противъ нестерпимой жажды и рвоты—питье холодной воды въ любомъ количествѣ, по 2—3 столовыхъ ложки черезъ каждыя нѣсколько минутъ, въ альгидномъ періодѣ горячее питье предпочтительнѣе. Пища, если вообще можетъ быть о ней рѣчь, можетъ

*) Не въ водѣ, такъ какъ въ таковой камфора выпадаетъ въ видѣ бѣлыхъ хлопьевъ, которые трудно всасываются; поэтому же нецѣлесообразна камфора въ пастилкахъ.

состоять изъ слизистыхъ отваровъ; боли въ конечностяхъ облегчаются отъ холодныхъ растираний, также отъ растираний обыкновеннымъ камфорнымъ спиртомъ; противъ болѣзненныхъ натугъ небольшіе прохладительные клистиры послѣ каждого испражнения; противъ болѣй въ животѣ и ногахъ: набрюшные согрѣвающие компрессы, горячіе влажные компрессы, постельныя паровыя ванны, обертыванія конечностей. Полный покой необходимъ съ самаго начала болѣзни при умѣренной температурѣ комнаты и тепломъ содержаніи больного. При выздоровленіи необходимо соблюдать большую постепенность въ переходѣ къ обычной пищѣ.

Обычныя правила дезинфекціи должны соблюдаться самымъ строгимъ образомъ. Надо заботиться о томъ, чтобы жилища были основательно провѣтриваемы и содержались въ наибольшей чистотѣ. Чистота и здоровая пища суть главныя предохранительныя мѣры противъ холеры. Здоровымъ людямъ не слѣдуетъ во время холерной эпидеміи измѣнять своего пищевого уклада, они могутъ кушать все, что хорошо переносится ихъ желудкомъ, въ томъ числѣ также неиспорченные спѣлые фрукты, сырые или вареные, также овощи, зелень. Важно при всемъ этомъ одно. не кушать черезъ мѣру, не больше того, сколько требуется для утоленія голода. При малѣйшемъ сомнѣніи въ чистотѣ питьевой воды, ее необходимо употреблять въ кипяченномъ видѣ. Вода для питья должна быть безукоризненной чистоты. Злоупотребленіе спиртными напитками—самый опасный врагъ здоровья вообще, тѣмъ болѣе въ холерную эпидемію.

О предохранительномъ влияніи Камфоры Рубини сказано выше. Предохранительной мѣрой считается также мѣдь, въ видѣ мѣдной пластинки, носимой на груди, непосредственно на тѣлѣ. Польза отъ этой пластинки объясняется тѣмъ, что, отъ соприкосновенія ея съ тѣломъ и подъ влияніемъ испарины послѣдняго, образуется окись мѣди, которая всасывается черезъ кожу и дѣйствуетъ на организмъ подобно *Кунфумъ* (мѣди) въ гомеопатической дозѣ.

7. Холерина. Дѣтская холера.

Болѣзнь эта представляетъ собою острый катарръ желудка, осложненный одновременнымъ воспаленіемъ кишечнаго канала и Приходъ представляющій картину, очень похожую по симптомамъ на азиатскую холеру. Внезапно или послѣ предшествовавшихъ нѣкоторое

время общаго недомоганія, слабости, тошноты, поносовъ, является, по большей части ночью, страхъ, тоска, давленіе подъ ложечкой и безпрестанная рвота, сначала съѣденной пищей, а затѣмъ желтоватыми, водянистыми массаами. Одновременно имѣется поносъ съ обильными и частыми водянисто-слизистыми испражнениями; кромѣ того—неутолимая жажда, малый пульсъ, впалость лица, потеря голоса; часто болѣзнь доходитъ до судорогъ икрѣныхъ мышцъ, сильнаго охлажденія кожи и полнаго упадка силъ. Смертельный исходъ особенно часто бываетъ у дѣтей и стариковъ, у людей же молодыхъ и средняго возраста исходъ болѣзни всегда благоприятный, если только они не слишкомъ ослаблены или истощены какой либо другой болѣзнію.

причины
холерины.

Холерина особенно часто наблюдается въ срединѣ лѣта и первые осенніе мѣсяцы, т. е. ко времени созрѣванія плодовъ, и имѣетъ характеръ эпидемии. Но употребленіе незрѣлыхъ или испорченныхъ плодовъ отнюдь не является единственной причиной появленія холерины, которая часто бываетъ и въ началѣ лѣта, и притомъ, чаще всего какъ разъ у маленькихъ дѣтей. Тутъ причину заболѣванія надо видѣть въ томъ, что пищевые продукты въ лѣтнее время очень легко портятся и разлагаются.

Отъ дѣтской холеры, особенно въ деревняхъ, умираетъ гораздо больше дѣтей, нежели отъ всѣхъ прочихъ болѣзней, вмѣстѣ взятыхъ. Между тѣмъ, гомеопатическое лѣченіе при этой болѣзни настолько успѣшно дѣйствуетъ, что, если бы весь народъ былъ освѣдомленъ о гомеопатическихъ лѣкарствахъ хотя бы только противъ этой болѣзни и имѣлъ бы ихъ повсюду подъ руками, смертность дѣтей уменьшилась бы болѣе чѣмъ вдвое. Несомнѣнно, что нужда и неблагопріятныя условія жизни въ значительной мѣрѣ способствуютъ появленію и развитію болѣзни, но тѣмъ болѣе важно особенно въ такихъ случаяхъ имѣть надежныя лѣкарственныя средства.

лѣченіе
холерины.

Въ самомъ началѣ болѣзни дальнѣйшее развитіе ея часто предупреждается ужъ однимъ *Аконитомъ*, нѣсколькими приѣмами его. Дается *Аконитъ* $\times 3$ или, еще лучше, $\times 2$, черезъ полчаса по приѣму. Если болѣзнь уже развилась, то даютъ слѣдующія лѣкарства. *Ипекакуана* $\times 3$: при преобладающей рвотѣ слизистыми зеленоватыми массаами; *Фосфоръ* $\times 3$: при преобладающемъ поносѣ, съ сильной рѣзью въ животѣ и водянистыми, но еще содержащими каловыя массы испражнениями; *Вератрумъ альбумъ* $\times 2$: главное лѣкарство, которое слѣдуетъ предпочесть

всѣмъ прочимъ, если болѣзнь начинается одновременно рвотой и поносомъ и если испражненія безцвѣтны. Дополнительными показаніями служить: особенно малый, рѣдкій пульсъ, сильная жажда, упадокъ силъ, судорога икръ и похолодѣніе кожи.

Когда послѣ *Ипекакуана* и *Вератрумъ* рвота остановилась, но еще продолжается поносъ, то давать *Фосфоръ* $\times 3$.

Арсеникъ $\times 3$: при внезапно наступившемъ поносѣ съ жжениемъ въ животѣ и очень сильной жаждой, позывами на рвоту, сильнымъ сердцебіеніемъ при мягкомъ слабомъ пульсѣ; при этомъ стѣсненіе въ груди, необычайная тоска, задержанное мочеотдѣленіе.

Въ дальнѣйшемъ—лѣченіе, какъ при холерѣ (стр. 84).

Впредь до выздоровленія больной долженъ оставаться въ постели. Въ началѣ, пока имѣется рвота, пищи никакой не давать, а мучительную жажду утолять небольшими на разѣ, но частыми глотками остуженной на льду отварной воды; къ ней можно прибавить чего-нибудь кисленькаго, на примѣръ, нѣсколько ломтиковъ яблока или лимона, клюкву и т. п. или краснаго вина, гдѣ возможно—шампанскаго.

Когда рвота уменьшилась или, тѣмъ болѣе, совсѣмъ остановилась, то даютъ овсяный кисель (овсяная крупа, вываренная въ водѣ до густоты слизи и остуженная), который можно давать и груднымъ дѣтямъ въ рожкѣ; такой кисель переносится послѣдними очень хорошо, часто даже въ такихъ случаяхъ, когда всякая другая пища вызываетъ или усиливаетъ поносъ. Къ киселю можно прибавить немного краснаго вина или т. п. Когда болѣзнь прекратилась, переходятъ осторожно и постепенно къ обычной пищѣ. Полезны во время болѣзни теплыя обертыванія и теплыя ванны.

8. Дизентерія. Натужный кровавый поносъ.

Дизентерія встрѣчается какъ въ видѣ отдѣльнаго, случайнаго заболѣванія (спорадически), такъ и въ видѣ эпидемической болѣзни. Спорадическая дизентерія отличается отъ эпидемической—въ смыслѣ степени заболѣванія—настолько же, насколько холерина отъ азиатской холеры. Въ первомъ случаѣ форма болѣзни болѣе легкая, катарральная, во второмъ же болѣе тяжелая, язвенная.

Болѣзнь начинается простымъ поносомъ, продолжающимся **Приз** въ теченіе одного, двухъ или нѣсколькихъ дней, сопровождаясь **ходъ**

небольшими болями живота. Аппетитъ въ большей или меньшей степени нарушенъ и больной чувствуетъ нѣкоторую слабость. Общее состояніе здоровья, однако, еще настолько удовлетвори-тельно, что больной продолжаетъ свои обычные занятія.

Ухудшеніе въ болѣзни наступаетъ вдругъ, по большей части ночью; появляется лихорадочное состояніе, общее недомоганіе; боль живота усиливается, позывы на испражненіе учащаются и становятся все болѣе болѣзненными и вмѣстѣ съ тѣмъ безре-зультатными. Въ началѣ испражненія хотя и скудны, но содер-жать въ себѣ еще каловыя массы; затѣмъ они становятся все болѣе слизистыми съ примѣсью крови. Въ худшихъ случаяхъ выдѣляется уже только кровавистая слизь или даже чистая кровь; непреодолимые позывы на низъ, мучительно-болѣзненные (тенезмы), учащаются до такой степени, что не даютъ больному ни днемъ, ни ночью покою. Больной вслѣдствіе этого, да и отъ большой потери крови и бѣлка, теряетъ все больше силы; лицо его блѣднѣетъ; въ нѣкоторыхъ же случаяхъ оно пріобрѣтаетъ желто-ватый цвѣтъ (желчная дизентерія); головная боль, головокруженіе, звонъ въ ушахъ, бессонница, полное отсутствіе аппетита и не-утолимая жажда дополняютъ картину болѣзни.

Въ случаѣ дальнѣйшаго ухудшенія слабость и истощеніе все болѣе усиливаются, пульсъ становится малымъ, конечности холо-дѣютъ; глаза западаютъ; языкъ, покрытый раньше бѣлымъ налетомъ, пріобрѣтаетъ гладкій и блестящій видъ, животъ вздувается и мѣстами очень болѣзненъ; моча задерживается, выдѣляясь лишь малыми количествами и съ сильной рѣзью. Испражненія крова-висто-гнойныя.

Въ очень тяжелыхъ случаяхъ испражненія становятся гни-лостными, зеленовато-черноватыми, невыносимо-вонючими; являются пролежни, прямая кишка разслаблена и выпадаетъ, задній про-ходъ изъязвляется, слабость достигаетъ крайняго предѣла, и больной умираетъ.

Въ болѣе легкихъ случаяхъ болѣзнь проходитъ въ 1—2 не-дѣли, оканчиваясь полнымъ выздоровленіемъ. Выздоровленіе достигается, при надлежащемъ лѣченіи, и въ болѣе трудныхъ слу-чаяхъ, если только болѣзнь не дошла до крайней степени, но выздо-ровленіе бываетъ тутъ и не полное съ переходомъ въ хроническую дизентерію, характеризующуюся временными улучшеніями и ухуд-шеніями и тянущуюся мѣсяцами и даже годами. Но и такіе боль-ные могутъ еще выздороветь; у нихъ остается только на всю

жизнь чувствительность кишек и неправильность пищеваренія въслѣдствіе рубцового суженія послѣднихъ въ мѣстахъ бывшихъ тамъ дизентерическихъ изъязвленій.

Въ началѣ болѣзни, когда жидкія испражненія заключаютъ въ себѣ еще каловыя массы и имѣются сильный жаръ, жажда, боль въ животѣ и потуги (тенезмы), даютъ *Белладонна* $\times 3$, черезъ каждыя 20—30 минутъ, при улучшеніи—болѣе рѣдкіе приемы.—*Нуксъ-вомика*: испражненія скудныя, слизистыя, но съ сильными натугами; коликообразная боль въ области пупка, тошнота съ позывами на рвоту.—Это средство давать попеременно съ *Колоцинт.* $\times 3$, если боль въ животѣ очень сильная, особенно если притомъ имѣются еще частые и болѣзненные позывы на мочеиспусканіе.—При отсутствіи такихъ признаковъ со стороны мочевого пузыря, подходитъ при сильной коликѣ, распространяющейся тѣмъ болѣе на весь животъ, *Діоскорѣа* $\times 3$, унимающая боль часто еще скорѣе, нежели *Колоцинтъ*.

Въ начальной стадіи болѣзни надо имѣть въ виду еще слѣдующія средства:

Кольхик. $\times 3$: при осенней дизентеріи, сопровождающейся слизистой или желчной рвотой, особенно у дѣтей послѣ съѣданія незрѣлыхъ, кислыхъ фруктовъ; при вздутіи живота съ коликой и натугами; испражненія жидки, вонючи, или они слизисты съ примѣсью крови; большая слабость, холодная кожа, холодный потъ на лбу.

Капсик. $\times 3$: при подобныхъ же симптомахъ; испражненія скудныя и очень часты съ жжениемъ въ заднемъ проходѣ.

Ипекакуана $\times 3$: при сильной рѣзѣ въ животѣ и преобладающей тошнотѣ и рвотѣ.

Въ началѣ этой болѣзни и для менѣе трудныхъ случаевъ ея этихъ средствъ бываетъ обыкновенно достаточно для выздоровленія.

Въ случаяхъ же болѣе трудныхъ главнымъ средствомъ является *Меркур. солюбилисъ* $\times 3$; если послѣ нѣсколькихъ приемовъ таковаго, т. е. по истеченіи 10—12 часовъ не наступитъ замѣтнаго улучшенія, то, вмѣсто него, давать *Меркур. коррозивъ 2 или 3*.

Показанія для *Меркуріа*: кровавыя или кроваво-слизистыя испражненія съ жестокими тенезмами, сильное жженіе въ заднемъ проходѣ послѣ каждаго испражненія, сильное безпокойство и тоска съ выступленіемъ холоднаго пота на лицѣ.

Лѣчен
дизенте

Въ отношеніи дизентеріи *Меркурій* въ высшей степени гомеопатиченъ, такъ какъ болѣзненные измѣненія въ кишкахъ при этой болѣзни очень схожи съ измѣненіями въ горлѣ при дифтеритѣ, при которомъ *Меркурій* является также главнѣйшимъ цѣлебнымъ средствомъ.

Если бы дѣйствіе Меркурія не оказалось достаточно быстрымъ, то дають въ промежуткахъ между приемами его 2—3 раза *Сульфуръ* $\times 3$ или 3.

Противъ слабости и истощенія, развившихся при этой болѣзни отъ большихъ потерь крови и бѣлка, подходитъ *Хина* 1, также *Арсеник.* 3.

Арсеникъ 2 или 3 показанъ также въ худшихъ случаяхъ дизентеріи съ гнилостными испражнениями, одинъ или попеременно съ *Карбо вегетабилисъ* 3 (или даже высшія дѣленія—6—12, отъ которыхъ можно ожидать болѣе сильнаго дѣйствія въ такихъ случаяхъ), также *Русъ* $\times 3$, *Баттизия* $\times 1$.

При сильномъ кровотеченіи *Ацид. мургатик.* $\times 3$ или *Фосфоръ ацид.* $\times 3$.

При хронической формѣ дизентеріи, кромѣ указанныхъ выше средствъ, показаны также *Силиція*, *Натр. мургатик.*, то и другое—въ высшихъ дѣленіяхъ.

О дозахъ и повторахъ приемовъ см. ч. 1., гл. 3.

Испражнения дизентеричныхъ больныхъ заразительны, поэтому ихъ слѣдуетъ безотлагательно каждый разъ удалять, обливши предварительно кипяткомъ или, лучше, растворомъ дезинфекціоннаго средства, и, по возможности, закапывать въ землю. Бѣлье, снимаемое съ больного, также съ его постели, слѣдуетъ также погружать немедленно въ горячую воду или дезинфекціонный растворъ. Здоровые должны по возможности отдѣляться отъ больного.

бры предо-
храненія.

Заболѣванія дизентеріей являются обыкновенно позднимъ лѣтомъ или осенью, и предрасполагающими моментами считаются простуда, загрязненная вода, испорченные пищевые продукты, особенно же незрѣлые фрукты.

Поэтому въ дизентерійное время надо оберегать себя отъ простуды, особенно живота и ногъ, что достигается между прочимъ ношеніемъ теплаго нижняго бѣлья, фланелевымъ набрюшникомъ, частой перемѣной чулокъ и т. п. Надо избѣгать въ пищѣ не только завѣдомо вредныхъ веществъ, какъ незрѣлые плоды и т. п., но и всего того, что влечетъ за собою неправильности пищеваренія, поносъ или запоръ и скопленіе газовъ въ кишкахъ;

сюда относится обильная крахмалистая пища, густыя каши, тѣсто, картофель; также молоко, если оно плохо переносится, не должно употребляться. Избѣгать также сильныхъ слабительныхъ средствъ и соблюдать большую умѣренность въ ѣдѣ и питьѣ.

Больной долженъ уже съ самаго начала лечь въ постель. Температура комнаты должна быть нѣсколько выше обычной, именно 15—16° Р., воздухъ въ комнатѣ долженъ часто провѣтриваться, причемъ больного надо оберегать отъ охлаждения.

Къ вспомогательнымъ средствамъ относятся согревающие компрессы на животъ; при очень сильной боли—паровые компрессы. Противъ жара—влажныя обертыванія, также полуванны. Противъ тенезмовъ—удерживаемый клистирь изъ 2 или 3 столовыхъ ложекъ холодной воды послѣ каждого испражнения, къ этому количеству воды, при очень сильной боли, цѣлесообразно прибавить 2—3 капли *Белладонна* Ө. Жажду можно утолять глотками остуженнаго отвара изъ овсяной крупы или риса съ прибавленіемъ къ нему яичнаго бѣлка (на 2 стакана). Если прохладное питье усиливаетъ боль въ животѣ, то даютъ теплое. Вообще же это зависитъ отъ того, въ какомъ состояніи находится желудокъ и верхній отдѣлъ кишечнаго канала. Если состояние этихъ частей удовлетворительное, то можно давать молоко, крѣпкіе супы, яйца, мясной сокъ. Плотныя же пищевыя вещества должны быть строго запрещены; сюда относятся мясо, овощи, картофель и т. п. Если аппетитъ потерянъ, если имѣется тошнота, рвота и вообще несваренія, діета должна быть очень воздержанной; давать лишь жидкій ячменный отваръ или овсяный кисель, теплое миндальное молоко и т. п. Спиртныхъ напитковъ во всякомъ случаѣ не давать.

Во время выздоравливанія надо быть очень осторожнымъ въ діетѣ и лишь постепенно перейти къ обычной пищѣ, начиная съ жидкихъ кашъ, яицъ, бѣлаго мяса, легкой рыбы.

9. Чума у людей

Чума—болѣзнь крайне заразная и въ прежнія времена носила название „Черной Смерти“. Лишь въ срединѣ прошлаго столѣтія эта ужасающая болѣзнь покинула Европу и сосредоточилась опять въ мѣстѣ своей родины—Индіи и передней части Ази. Но вскорѣ, спустя нѣсколько лѣтъ, она опять появляется въ Россіи, въ Астраханской губ. (Ветлянская чума), и съ тѣхъ поръ почти ужъ и не переводится у насъ, временами то затихая,

Вспомогательные
ры и д
при де
тери

то вновь вспыхивая въ видѣ—если не настоящей эпидеміи, то не большихъ групповыхъ заболѣваній.

Болѣзнь проявляется въ двухъ различныхъ формахъ: какъ легочная и какъ бубонная чума. Третья форма—гнилокровная—встрѣчается очень рѣдко, и поэтому ей не придается особеннаго значенія. Легочная форма чумы гораздо опаснѣе бубонной и даетъ болѣе 90⁰/о смертности; продолжительность ея—отъ нѣсколькихъ часовъ до 2—3 дней; у больного появляется сильный жаръ, бредъ, сыпь и кровавая мокрота. Заразительность этой формы также очень велика, и жертвами ея становятся обыкновенно всѣ окружающіе больного. Бубонная же чума протекаетъ гораздо благоприятнѣе и, при надлежащемъ лѣченіи и уходѣ, не превышаетъ 20⁰/о. Симптомы бубонной чумы въ началѣ сходны съ симптомами тифа, но затѣмъ начинается образованіе бубоновъ, обыкновенно въ пахахъ, но также ниже по бедру или въ подмышковой области и на шеѣ. При благоприятномъ теченіи болѣзни бубоны переходятъ въ нагноеніе, вскрываются, температура падаетъ, и начинается періодъ выздоровленія. Часто, однако, образуется гангрена (антоновъ огонь), при чемъ лихорадка опять сильно повышается, и больной, при явленіяхъ удушья и паралича сердца, умираетъ. Случаются и столь жестокіе случаи бубонной чумы, въ которыхъ опуханіе железъ не успѣваетъ даже появиться, и больной погибаетъ въ первые 24—48 часовъ.

До вскрытія бубоновъ показаны *Арсеникъ* × 3 или *Хинин*. *арсеникоз.* × 3 рядомъ съ *Белладонна* × 3, *Бантизія* × 1, давать попеременно или поочереді черезъ полчаса или часъ, а затѣмъ—*Ацид. муратик.* 1 или *Ацид. нитрик.* 1; *Лахезисъ* 6, *Карбо вегеталисъ* 3 или *Карбо анималисъ* 3. Впрочемъ, чума настолько серьезная болѣзнь, что, собственно говоря, не можетъ быть рѣчи о домашнемъ лѣченіи ея безъ содѣйствія врача и санитаровъ.

Вспомогательныя мѣры: противъ сильнаго жара—примѣненія воды, какъ при тифѣ. Созрѣвшіе нарывы цѣлесообразно своевременно вскрыть и дѣлать перевязки съ карболовымъ (2⁰/о) растворомъ и присыпкой іодоформа. Діета—какъ при тифѣ. При большой слабости уместна тутъ *Камфора* *Рубини*, также вино.

Въ виду большой заразительности этой болѣзни понятны и вполне цѣлесообразны всѣ тѣ мѣры, какія принимаются правильствомъ каждый разъ при появленіи чумы. Особенно важно истребленіе крысъ, которыя, какъ показали многократныя наблюденія, служатъ разносителями чумной заразы.

ОТДѢЛЪ III.

Зараженіе животными ядами.

Содержаніе этого отдѣла: 1) Сибирская язва у людей. 2) Сапъ у людей.
3) Водобоязнь (собачье бѣшенство). 4) Ужаленіе насѣкомыхъ.

Сибирская язва у людей (Злокачественный карбункулъ).

Сибирская язва у людей—слѣдствіе зараженія отъ животныхъ. Она можетъ быть занесена въ кровь черезъ открытую на кожѣ рану при обработкѣ кожи, волосъ, шерсти, костей и жира павшаго отъ сибирской язвы животного. Нерѣдко зараженіе передается и насѣкомыми, особенно слѣпнями и комарами. Ядъ сибирской язвы передается и съ человѣка на человѣка и можетъ быть перенесенъ отъ человѣка на животное. Болѣзнь начинается съ того, что въ мѣстѣ кожи, гдѣ произошло зараженіе, больной начинаетъ чувствовать сильное покалываніе или зудъ; затѣмъ появляется, напоминающее укусъ блохи, красное пятнышко, которое быстро переходитъ въ маленькій, буровато-краснаго или розовато-краснаго цвѣта узелокъ, надъ которымъ, при постоянномъ усиленіи зуда, образуется волдырь. Содержимое послѣдняго прозрачно свѣтло-желтаго цвѣта, но скоро принимаетъ красноватую или голубоватую окраску. Подъ волдыремъ оказывается буроватое или багровое пятно (гангренозный струпъ). Пятно это постепенно превращается въ черную нечувствительную массу; окружающая его красная кайма увеличивается и покрывается на своей внутренней поверхности вѣнчикомъ изъ гангренозныхъ пузырей.

Причин
признак
ходъ бол

Гангрена идетъ также и въ глубь, является отекъ на соотвѣтствующей части тѣла; лимфатическіе сосуды воспаляются, железы припухаютъ и становятся болѣзненными. Больные жалуются на жаръ въ пораженной части, но скоро жаръ этотъ проходитъ, пораженная часть становится не чувствительной, и въ ней замѣчается ощущеніе холода, тяжести и околѣнія.

Бываютъ случаи, что болѣзнь ограничивается чисто мѣстными явленіями, и тогда исходъ благополучный, но нерѣдко вслѣдъ за мѣстными явленіями являются симптомы общаго заболѣванія: развивается тифозная лихорадка, кожа становится горячей, языкъ—бурымъ и сухимъ, пульсъ—малымъ и частымъ, дыханіе—учащеннымъ и затрудненнымъ, появляется тоска; начинаются обмороки, рвота, поносы, бредъ, и больной погибаетъ при явленіяхъ истощенія или судорогъ.

Бываютъ также зараженія вслѣдствіе употребленія въ пищу недостаточно вывареннаго мяса больныхъ животныхъ. Въ такомъ случаѣ болѣзнь является внезапно и начинается сильными рвотами, поносами, посинѣніемъ кожи, и больной погибаетъ раньше, чѣмъ являются наружные признаки. Въ виду возможности смѣшенія сибирской язвы съ другими болѣзнями, нужно разузнать отъ больного, приходилъ ли онъ въ соприкосновение съ сибироязвенными животными или вообще таковы ли его занятія, что допускаютъ возможность зараженія.

чение си-
ской язвы

Въ первое время послѣ зараженія могутъ оказаться полезными энергичныя прижиганія раны раскаленнымъ желѣзомъ или 10 проц. растворомъ карболовой кислоты, а также мѣстные и общія паровыя ванны и обертыванія. Изъ внутреннихъ гомеопатическихъ лѣкарствъ на первомъ планѣ стоятъ *Апизин.* $\times 3$ и *Меркур.-корроз.* $\vee 3$; затѣмъ *Ацид. нитрик.* $\times 2$ и *Арсен.-альб.* $\times 3$. Какъ только язва приняла доброкачественный характеръ, ее лѣчатъ по общимъ правиламъ (см. „Нарывныя воспаления кожи“).

2. Сапъ у людей.

ичины

Сапомъ люди заражаются отъ животныхъ, большею частью отъ лошадей. Ядъ болѣзни содержится въ слизистыхъ отдѣленіяхъ носа, въ крови, мочѣ, слюнкѣ и потѣ больного животного; испаренія кожи и легкихъ тоже могутъ служить поводомъ къ зараженію. Зараженіе происходитъ либо черезъ открытыя раны на кожѣ или слизистыхъ оболочкахъ, либо прямо черезъ легкія. Въ первомъ случаѣ инкубационный періодъ продолжается 3—5 дней, во второмъ—недѣли, даже мѣсяцы. Перенесеніе яда съ одного чловѣка на другого, даже при вскрытияхъ, наблюдается очень рѣдко.

знани и
болѣзни.

Если зараженіе произошло черезъ рану, то болѣзнь начинается мѣстными явлениями: рана воспаляется, становится болѣзненной, края припухаютъ. Развивается лимфангоитъ, распознаваемый по краснымъ, болѣзненнымъ и горячимъ линіямъ и шнурамъ, ведущимъ къ лимфатическимъ железамъ, которыя тоже дѣлаются болѣзненными и припухаютъ. Воспаленіе въ окружности раны принимаетъ рожистый характеръ, а часть тѣла, гдѣ находится рана, отекаетъ и припухаетъ, появляются пузырьки и пустулы съ гнойнымъ содержимымъ или гангренозные пузыри. Бываютъ случаи, что болѣзнь ограничивается этими мѣстными явлениями и, послѣ нѣсколькихъ болѣе или менѣе продолжитель-

ныхъ лихорадочныхъ приступовъ, больной выздоравливаетъ; но большею частью уже на 7-й день являются признаки общаго разстройства, и больной погибаетъ.

Если зараженіе произошло черезъ дыхательные органы, то болѣзнь начинается съ явленій общаго разстройства: больного охватываетъ ознобъ; онъ жалуется на головную боль, жажду, бессонницу и отсутствіе аппетита; чувствуетъ себя слабымъ и утомленнымъ; кожа горяча и суха, и пульсъ учащенъ. Являются боли въ мышцахъ и сочлененіяхъ, преимущественно нижнихъ конечностей. При изслѣдованіи болѣзненные мѣста оказываются припухшими, а въ мышцахъ замѣчаются твердые узлы. Затѣмъ начинается второй періодъ болѣзни. Начинаютъ образовываться септические узлы въ различныхъ мѣстахъ тѣла. Большею частью поражается полость носа. На носу или щекахъ является рожа; кожа покрывается пузырями и появляются синеватые пятна—предвѣстники гангрены. То же самое происходитъ внутри носа, онъ заложенъ какъ при насморкѣ, и изъ него выдѣляется зловонная кровянисто-гнойная жидкость. Септические узлы располагаются также на кожѣ, которая покрывается гнойничками; являются они также въ гортани и легкихъ. Общее состояніе больного все больше ухудшается: является тифозная лихорадка, сознаніе помрачается, пульсъ становится малымъ и частымъ; являются зловонные поносы, и больной умираетъ.

Лѣченіе

Мѣстное лѣченіе, какъ при сибирской язвѣ, можетъ оказаться успѣшнымъ лишь въ томъ случаѣ, если не прошло еще часа съ момента зараженія. И развившаяся уже болѣзнь требуетъ прежде всего соотвѣтственнаго хирургическаго лѣченія, а также энергичнаго примѣненія мѣстныхъ и общихъ паровыхъ ваннъ и другихъ природолѣчебныхъ отвлекающихъ способовъ. Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ даются внутрь главнымъ образомъ арсеникальные лѣкарства (*Арсен.-альб.*, *Калькар.-арсеникоза*, *Арсен.-іодат.*), также *Лазезисъ* и другія соотвѣтствующія лѣкарства.

3. Водобоязнь (собачье бѣшенство).

Ядъ собачьяго бѣшенства развивается въ слюнныхъ железахъ возбѣсившейся собаки или животныхъ, укушенныхъ послѣднею. Въ человѣка этотъ ядъ переходитъ лишь при укушеніи его бѣшеннымъ животнымъ. Нерѣдко однако случается, что ядъ при этомъ задерживается одеждой, и тогда человѣкъ остается совершенно здоровымъ.

Признаки
и ходъ
водобоязни.

Между моментомъ укушенія и наступленіемъ первыхъ признаковъ болѣзни проходитъ время отъ 8 до 180 дней. Страданія начинаются тѣмъ, что рана или рубецъ, если рана уже зажила, начинаетъ гноиться и покрываться злокачественнымъ гноемъ. Подъ языкомъ, по обѣ стороны уздечки, являются пузырьки, которые держатся всего около 30 часовъ. Своевременнымъ уничтоженіемъ помощью ланцета этихъ пузырьковъ можно предотвратить болѣзнь. Вслѣдъ за первыми признаками больной впадаетъ въ грустное настроеніе, ищетъ уединенія, становится пугливымъ и беспокойнымъ, и сонъ его нарушается тревожными сновидѣніями; онъ жалуется на усталость и давленіе подъ ложечкой, на чувство напряженія и одеревенѣлости въ шеѣ, на жженіе въ глоткѣ и желудкѣ; являются глубокія, сопровождающіяся стономъ дыханія, при которыхъ плечи поднимаются и надчревная область выпячивается. Начинаются тоническія судороги въ области дыхательныхъ мышцъ и причиняютъ больнымъ ужасныя страданія при попыткѣ проглотить что нибудь. Впослѣдствіи страданія эти доходятъ до того, что уже одинъ видъ напитка приводитъ больного въ бѣшенство: онъ кричитъ, бьетъ вокругъ себя, кусается и, случается, налагаетъ на себя руки. Подобные приступы продолжаются $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ часа. Въ свободное отъ приступовъ время больной находится въ полномъ сознании. Смерть наступаетъ во время жестокаго приступа отъ удушенія или кровавнго удара, но бываютъ случаи, что больной, ослабленный приступами судорогъ и бѣшенства, умираетъ при явленіяхъ общаго паралича.

Предупре-
дительныя мѣ-
ры леченія.

Непосредственно послѣ укушенія слѣдуетъ перевязать руку или ногу, если на нихъ произошло поврежденіе, выше мѣста укуса, и высосать рану либо ртомъ, если послѣдній у высасывающаго не имѣетъ ссадинъ, либо кровососной банкой, что еще дѣйствительнѣе. Затѣмъ хорошимъ предупреждающимъ болѣзнь средствомъ считается прижиганіе раны жаромъ. Смазывая окружность раны масломъ или саломъ, чтобы кожа не высыхала, подносятъ къ ней близко, однако такъ, чтобы не обжечь кожи и не вызвать слишкомъ острой боли, раскаленный уголь, желѣзо или что нибудь подобное и подвергаютъ рану дѣйствію этого жара непрерывно, пока больной не начнетъ дрожать и потягиваться. Повторять эту операцію слѣдуетъ раза 3 въ день до заживленія раны, при чемъ послѣднюю слѣдуетъ тщательно очищать отъ отдѣленій. Если появляются пузырьки подъ языкомъ, то ихъ слѣдуетъ вскрыть ланцетомъ и полоскать ротъ соленою водою. Изъ дру-

гихъ пріемовъ весьма умѣстны, и не должны быть упущены уже съ самаго начала, мѣстныя и полныя паровыя ванны и другіе отвлекающіе способы.

Изъ гомеопатическихъ средствъ, какъ предупреждающія, можно давать *Беллад.* и *Купрумъ ацет.* Затѣмъ, противъ самой болѣзни, рекомендуются, кромѣ упомянутыхъ, еще: *Гельземинъ*, *Гіосціамусъ*, *Страмоній*.

4. Ужаленіе насѣкомыхъ.

Ужаленіе насѣкомыхъ (осы, пчелы, шершня, комаровъ, москитовъ и т. п.) узнается по маленькой желтоватой точкѣ, находящейся на верху маленькаго узелка. Это единственный признакъ, отличающій простое ужаленіе насѣкомыхъ отъ начальнаго проявленія злокачественнаго карбункула, при которомъ подобной точки не существуетъ. Ужаленіе глаза можетъ повлечь за собою серьезныя послѣдствія, точно такъ же ужаленіе рта и зѣва, на примѣръ пчелою, скрытою въ сотахъ.

Лучшее наружное средство *Ледумъ* (чистая тинктура или примочка изъ 20 капель на ложку воды); полезны также *Нашатырный спиртъ*, *Анисъ спиртъ*, *Камфора Рубини*. Народное средство—прикладываніе куска свѣжаго лука, который быстро унимаетъ боль. При жестокихъ боляхъ и лихорадочномъ возбужденіи помогаетъ также нюханіе *камфоры*. При значительномъ воспаленіи съ припуханіемъ слѣдуетъ принимать внутрь *Белладонна* $\times 3$ и *Анисъ* $\times 3$, попеременно. Для предупрежденія и облегченія послѣдствій отъ укушеній москитовъ, комаровъ, мухъ и клоповъ хорошо употреблять, въ видѣ примочки (или полосканія рта), *Пиретрумъ* (2 чайныя ложечки чистой тинктуры на бутылку воды).—Если въ ранкѣ видно жало насѣкомаго, то его слѣдуетъ, конечно, вынуть, что удастся иногда, если прижать ее отверстіемъ небольшого часового ключика; затѣмъ, можно еще ранку высосать. При сильной боли и воспаленіи благотворно дѣйствуетъ также мѣстная паровая ванна или припарка.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Болѣзни головного мозга, спинного мозга, нервовъ и души.

А. Болѣзни головного мозга.

Содержание этого (А) под-отдѣла: 1) Головная боль, мигрень; 2) Головокружение; 3) Бредъ, фантазирование, помрачение, 4) Разстройства сна: безсонница, безсонница у дѣтей, сонливость; спячка, кошмаръ; 5) Обморокъ, (обмиране, мнимая смерть), 6) Многокровие мозга, мозговые приливы; 7) Мозговой ударъ (апоплексія мозга), 8) Малокровие (анемія) мозга; 9) Воспаление мозговыхъ оболочекъ (менингитъ), острая водянка головы, 10) Воспаление мозга (энцефалитъ), 11) Хроническая водянка головы, 12) Сотрясение мозга

І. Головная боль. Мигрень.

Головная боль въ разной степени и въ разной формѣ бываетъ при всѣхъ болѣзняхъ мозга, а также при насморкѣ и простудныхъ заболѣваніяхъ головныхъ нервовъ, равно какъ при всѣхъ острыхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ, при разстройствахъ пищеварительнаго канала, желудочныхъ страданіяхъ, при нервныхъ состояніяхъ (нервная слабость, истерія, ипохондрія) и разстройствахъ кровообращенія (избытокъ или недостатокъ крови въ мозгу).

Въ независимой, самостоятельной формѣ головная боль является въ видѣ такъ называемой мигрени. Мигрень поражаетъ обыкновенно лишь одну половину головы, иногда, особенно у женщинъ, и всю голову, въ послѣднемъ случаѣ, однако, можно большею частію найти связь съ какимъ либо разстройствомъ въ организмѣ (болѣзнъ печени, неправильность регулъ и проч.).

Мигрень является приступами, которые длятся часто двѣнадцать и болѣе часовъ и сопровождаются или оканчиваются рвотой и сонливостью.

лѣченіе

При головной боли съ приливомъ крови къ головѣ, также при простудной головной боли—*Аконитъ* $\times 3$; это средство показано особенно въ томъ случаѣ, когда чувствуется жаръ въ тѣлѣ; тогда *Аконитъ* подходит не только при красномъ лицѣ (приливѣ), но и при блѣдномъ. Показания для *Аконита* еще слѣдующія: шумъ въ ушахъ, головокруженіе, ухудшеніе боли отъ движенія и отъ всякаго напряженія.—*Белладонна* 3: также при приливахъ къ головѣ, если чувствуется въ ней біеніе (пульса-

ция); ощущение какъ бы распиранія черепныхъ костей, особенно во лбу и вискахъ; рѣзкій свѣтъ усиливаетъ боль, особенно если она односторонняя; она сильнѣе ночью, въ постельной теплотѣ, и при наклоненіи головы.—*Нуксъ вомика* 3: головная боль у предрасположенныхъ къ геморрою, тѣмъ болѣе — страдающихъ дѣйствительно таковымъ; также у злоупотребляющихъ спиртными напитками или привычныхъ къ кофе (въ этихъ случаяхъ—*Нуксъ вом.* $\times 3$ или даже $\times 2$), при боли вслѣдствие умственного переутомления; позывы на рвоту, запоръ; боль усиливается ночью и въ утренніе часы; боль рвущая, распирающая.

Бріонія $\times 3$: боль сжимающая или колющая или тянущая, особенно во лбу или вискѣ; боль преимущественно односторонняя; давление во лбу, какъ отъ положенной доски; ощущение жара, тошнота и запоръ; хуже отъ ѣды и движенія.

Хамомила $\times 3$: у очень чувствительныхъ, нервныхъ особъ, особенно у дѣтей; расстройства пищеваренія; рвущая, дергающая боль; одна щека красная, другая блѣдная; ощущение жара въ головѣ; испарина на головѣ; невыносимость боли.

Колоцинтъ 3: у нервныхъ, подагрическихъ особъ; неистово-сильная боль, односторонняя, рвущая, дергающая, или стискивающая во лбу, хуже при наклоненіи головы и при лежаніи; испарина мочевого запаха; моча свѣтлая, какъ вода.

Игнація 3: главное лѣкарство при головной боли у нервныхъ, истеричныхъ особъ; давление въ переноси; распирающая глубоко въ мозгу боль; ощущение какъ бы вбитого въ мозгъ гвоздя; блѣдное лицо; свѣтлая моча; свѣтобоязнь; тошнота.

Пульсатилла $\times 3$: малокровіе, расстройство пищеваренія, ревматическія головныя боли. Подходитъ особенно для флегматичныхъ особъ, съ тихимъ нравомъ, блѣднонемочныхъ; плаксивость; зябкость; колотье въ ушахъ. Ухудшеніе по вечерамъ, въ покоѣ; улучшеніе на свѣжемъ воздухѣ; облегчаетъ также теплое укутываніе, сдавливаніе.

Русъ $\times 3$: ревматическая нервная боль, простирается часто на все лицо; хуже въ покоѣ; теплота облегчаетъ.

Гельземинъ 3 дѣйствуетъ подобно *Белладоннѣ*; боль часто нервного характера (мигрень); часто въ высшемъ дѣленіи ($\times 30$) дѣйствуетъ лучше, нежели въ болѣе низкихъ.

Сангвинарія $\times 2$ или $\times 1$ —также при чисто нервной головной боли (мигрень), особенно при правосторонней, надъ глазомъ; тошнота, рвота; тянетъ лежать.

Сеня 3 преимущественно при мигрени и особенно у женщин; неправильности регулъ; разстройство пищеваренія.

Хина × 2: нервная головная боль, особенно у малокровныхъ; періодически являющіеся приступы, съ ознобомъ и потомъ; болѣзненность кожи головы; ухудшеніе отъ прикосновенія къ головѣ, отъ напряженія, отъ холода, на свѣжемъ воздухѣ.

Арника × 3: боль послѣ механическихъ поврежденій, удара, сотрясенія; но и въ другихъ случаяхъ, при приливахъ, съ головокруженіемъ; кровотечение изъ носа.

Всѣ перечисленныя средства подходятъ для примѣненія во время самыхъ приступовъ головной боли, и въ такихъ случаяхъ брать 10 капель въ полустаканъ воды, черезъ 10—15 минутъ по чайной ложечкѣ, а затѣмъ еще въ теченіи нѣсколькихъ дней три раза въ день по 3—5 капель лѣкарства.

Сравнить еще въ „Лѣкарствовѣдѣніи“: *Цимицифуга*, *Ирисъ*, *Кактусъ*, *Каулофиллумъ*.

Быстрое облегченіе во время приступа боли, именно — при мигрени, приноситъ часто *Кофеинъ* × 1, черезъ 15—20 минутъ по приему (обыкновенно достаточно отъ 1 до 3 приемовъ), но только у тѣхъ, которые не привычны къ кофе.

Для болѣе радикальнаго излѣченія мигрени служатъ такія средства, какъ *Сеня*, *Калькарея карбоника*, *Фосфоръ*, *Арсеникъ*, *Сульфуръ*, *Силиція*.

При боляхъ сифилитическаго происхожденія. — *Меркурій*, *Іодъ*, *Туя*, *Мезереумъ*, *Аурумъ муріат.*, *Ацид. нитрик.*

Во всѣхъ случаяхъ необходимо выяснитъ основное страданіе, отъ котораго можетъ зависѣть головная боль и противъ котораго собственно и должно быть направлено лѣченіе.

Вспомогательныя мѣры и діета зависятъ отъ основной болѣзни. Оидѣльно же можно указать таковыя при мигрени: покой, воздержаніе во время боли отъ пищи, горизонтальное положеніе тѣла съ вышележащей головой (при горячемъ лбѣ) или съ нижележащей головой (при холодномъ); также полезно бываетъ тѣсное стягиваніе головы, успокаивающее обвертываніе ея и головныя ванны (при холодной головѣ—паровая, при горячей—холодная, въ видѣ обливанія).

2) Головокруженіе

есть всегда лишь выраженіе какого либо другого страданія, обыкновенно—приливовъ къ головѣ или недостаточнаго наполне-

Вспомогат.
мѣры при
головной
боли.

ня ея кровью, которые съ своей стороны происходятъ отъ разныхъ причинъ, органическихъ, нервныхъ и душевныхъ. Часто головокружение бываетъ при болѣзняхъ носа, глазъ, ушей, также при болѣзняхъ желудка и кишокъ, легкихъ, сердца.

При приливахъ—*Белладонна* 3, также—*Аконитъ* 3; въ затяжныхъ случаяхъ—*Сульфуръ* 6, *Феррумъ фосфорик.* 6. Лѣчен

При расстройствахъ пищеваренія—*Нуксъ вомика* 3, въ болѣе затяжныхъ случаяхъ—*Антимон. крудумъ* 6 или *Сульфуръ* 6.

При нервной слабости, малокровіи—*Пульсатилла* 3, *Фосфоръ* 3, также *Феррумъ* 6 (послѣднее особенно при приливахъ), *Калькарса фосфорика* 3, *Хинин. арсеникоз.* 3.

Если причина головокруженія—сотрясеніе мозга отъ паденія или ушиба, то даютъ *Арника* × 3.

При ревматическомъ головокруженіи, особенно у нервныхъ людей или у стариковъ, съ ухудшеніемъ при лежаніи въ постели—*Русъ* 3, также *Барита карбоника* 6, *Фосфоръ*.

Головокружение во время ѣзды въ экипажѣ—*Коккулусъ* 3.

У слабыхъ, раздражительныхъ особъ, у женщинъ и дѣтей часто подходятъ *Хамомилла* × 3 и *Коффеа* × 3. При пугливости—*Опій* 3.

Для исправленія предрасположенія къ головокруженію обыкновенно требуется продолжительное употребленіе (по 1 или 2 приема въ день): *Калькарса карбоника* (у малокровныхъ, золотушныхъ), *Силиція* 6 (у предрасположенныхъ къ испаринѣ и при скрытіи ножного пота), *Намф. муриатик.* 3 (при расстройствахъ пищеваренія), *Сенія* 3 (при брюшныхъ приливахъ, особенно у женщинъ, страдающихъ расстройствами регуль или мигренью), *Ацид. нитрик.* 3 (при рѣдкихъ явленіяхъ приливовъ къ головѣ, какъ біеніе или давленіе въ мозгу, при пораженіяхъ сердца или легкихъ); *Арсеник.* 3.

Головокружение у беременныхъ требуетъ обыкновенно *Белладонна* 3 (при приливахъ къ головѣ), *Арника* 3 (при ощущеніи тяжести въ животѣ), *Нуксъ вомика* 3 (при сопровождающей тошнотѣ), *Сенія* 3 (если головокружение постоянно).

Если имѣются глисты, то даются соотвѣтствующія средства (см. „глисты“ Отдѣлъ 6-й).

Во всѣхъ случаяхъ необходимо выяснить основную причину головокруженія и соотвѣтственно выбрать также вспомогательныя мѣры и діету, для чего надо справляться въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этой книги.

3) Бредъ, фантазированіе, помраченіе.

Являются преимущественно въ лихорадочныхъ болѣзняхъ и зависятъ отъ расстройства мозгового кровообращенія, также — какъ симптомы душевной болѣзни, бѣлой горячки. Лѣченіе—согласно основной причинѣ. Пьяницъ нельзя сразу лишить алкоголя.—*Акон.*, *Беллад.* или *Гіосціам.*, *Арника*, *Нуксъ-вом.*

4) Расстройства сна.

Бессонница, сонливость, спячка, тревожный сонъ, кошмаръ— всѣ подобныя расстройства являются всегда слѣдствіемъ какого либо другого болѣзненного состоянія, основного, противъ котораго и должно быть направлено лѣченіе. Поэтому не можетъ быть рѣчи о какомъ либо одномъ, опредѣленномъ лѣкарствѣ противъ того или другого растройства сна, какъ, напримѣръ, примѣняемые въ аллопатіи противъ бессонницы или безпокойнаго сна морфій или хлоралгидратъ, бромистый кали, сульфоналъ, тріоналъ и т. п., все средства, которыя непосредственно вліяютъ на мозгъ и нервную систему, вызывая болѣе или менѣе продолжительный сонъ или временно успокаивая нервы. Общеизвѣстно, что частое употребленіе подобныхъ средствъ весьма пагубно вліяетъ на организмъ, поэтому къ нимъ почти никогда не прибѣгаетъ для упомянутыхъ цѣлей врачъ-гомеопатъ, развѣ лишь въ крайнихъ случаяхъ, когда отъ бессонницы, напримѣръ, грозитъ больному истощеніе и въ то же время нѣтъ никакой возможности къ устраненію основной болѣзни.

Лѣченіе
бессонницы

а) **Бессонница.** Бессонница можетъ быть слѣдствіемъ сильнаго нервного возбужденія (душевное волненіе, страхъ, гнѣвъ, умственное переутомленіе, всякаго рода излишества и проч.). Въ такихъ случаяхъ подходящи: *Коффеа* $\times$ 3 (при радостномъ настроеніи, чрезмѣрной оживленности) особенно у дѣтей и женщинъ, *Игнація* 3 (при нервномъ раздраженіи, истеріи), *Нуксъ-вомика* 3 (при умственномъ переутомленіи, продолжительномъ бодрствованіи, при злоупотребленіи виномъ), *Опій* (при испугѣ).

Бессонница вслѣдствіе сильнаго прилива крови къ мозгу: *Аконитъ* 3, *Белладонна* 3.

Бессонница вслѣдствіе пищеварительныхъ расстройствъ, скопленія газовъ и проч.—*Нуксъ вомика* 3, *Сульфуръ* 3, *Бріонія* 3, *Карбо вегетабилисъ* 3, *Ликоподій* 3 и проч. (см. Болѣзни желудка и кишекъ).

При бессонницѣ у старыхъ людей часто подходятъ *Кониумъ* $\times$ *З*, *Опій* $\times$ *З*.

При склонности къ слишкомъ короткому сну: *Бріонія*, *Калькарея карбоника*, *Нуксъ вомика*.

б) Бессонница у дѣтей. Какъ и у взрослыхъ, необходимо прежде всего позаботиться о выясненіи причины бессонницы и противъ таковой направить лѣченіе. Вообще же подходятъ:

Во время прорѣзыванія зубовъ—*Аконитъ* *З*, если имѣется лихорадочное состояніе; *Хамамилла* *З* — при нервномъ безпокойствѣ и раздраженіи; при вспухшей деснѣ или зубной боли—*Меркурій солюб.* *З* и *Белладонна* *З*. — При чрезмѣрной оживленности и при отсутствіи какихъ либо особыхъ внутреннихъ разстройствъ—*Коффеа* *З*; при нервномъ безпокойствѣ — *Гіосціам.* *З*.—При глистахъ—*Цина* $\times$ *З*.

Во всѣхъ случаяхъ бессонницы у маленькихъ дѣтей надо имѣть въ виду, что таковая можетъ быть вслѣдствіе неудобнаго лежанія, лежанія въ мокромъ, или зуда нездоровой кожи, или кусанія насѣкомыхъ, или голода и проч.; въ такихъ случаяхъ необходимо прежде всего устранить причину.

То или другое средство противъ бессонницы дается не только незадолго до сна вечеромъ, но раза два и въ теченіе дня.

в) Сонливость. Спячка. Эти состоянія зависятъ, какъ и бессонница, отъ болѣзненнаго состоянія мозга, которое въ свою очередь зависитъ отъ различнѣйшихъ органическихъ и нервныхъ причинъ; чаще всего наблюдается при острыхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ съ тифознымъ характеромъ и при всякаго рода истощеніяхъ организма, а также при апоплексическомъ ударѣ и послѣ сотрясенія мозга вслѣдствіе механическихъ поврежденій. Лѣченіе—сообразно съ основной причиной. Во всякомъ случаѣ надо имѣть въ виду, между прочимъ, *Опій* *З* при спячкѣ вообще, и *Арника* — при переутомленіи и послѣ механическихъ поврежденій; при приливахъ крови къ головѣ—*Белладонна* и др.

При склонности къ слишкомъ продолжительному сну: *Анакардій*, *Гепаръ сульфур.*, *Кали карбоник.*, *Лазезисъ*, *Фосфоръ*.

г) Кошмаръ, тревожный сонъ. Своеобразное, крайне непріятное ощущеніе во снѣ, точно что то тяжелое сдавливаетъ грудь и не даетъ дышать; часто также тягостныя ощущенія находятся въ связи съ страшнымъ сновидѣніемъ. Подобныя явленія объясняются сильнымъ возбужденіемъ мозга вслѣдствіе разстройствъ кровообращенія, которыя въ свою очередь зависятъ отъ какихъ либо

ненормальных органических, нервных или душевных причинъ. Лѣченіе, какъ и при другихъ расстройствахъ сна, должно быть причинное.

Руководящими указаніями могутъ служить слѣдующія:

при тревожномъ снѣ вообще: *Аконитъ, Белладонна, Бріонія, Русъ;—Арсен., Кали карбоник., Сульфуръ;*

при обильныхъ сновидѣніяхъ: *Белладонна, Нуксъ-вомика—*оба при страшныхъ сновидѣніяхъ; *Пульсатилла, Сенія, Оній,—*при пріятныхъ; при сновидѣніяхъ же огорчающихъ или раздражающихъ—*Бріонія, Хаомилла;*

при нервныхъ явленіяхъ, какъ вздрагиваніе и испугъ во время сна: *Гюсціам., Оній, Кунфумъ, Игнація, Страмоній.*

при говорѣ и вскрикиваніи: *Игнація или Нуксъ-вомика, Страмоній, Белладонна, Хаомилла;*

при блужданіи въ сонномъ состояніи: *Фосфоръ, Силиція, Натр. муріат., Оній;*

при стѣсненіи дыханія во время сна: *Фосфоръ, Инекакуана, Генар. сульфур., Бріонія;* при храпѣніи: *Оній.*

Тепловатая ванна на ночь; послѣ ванны не пить ничего теплаго въ виду могущей послѣдовать затѣмъ неумѣстной испарины; или же—влажное обтираніе тѣла; или прохладная сидячая (22⁰) ванна, продолжительностію 1—2 минуты. Эти примѣненія воды дѣйствуютъ часто успокаивающе—При приливахъ къ головѣ способствуетъ лучшему сну набрюшный согрѣвающий компрессъ, который можно оставить на всю ночь или лишь часа на три, смотря по самочувствію больного.—Ужинать не слишкомъ плотно и не поздно, какъ часа за 2 или 3 до отхода ко сну. Къ ночи не пить много жидкостей, особенно чаю.—Часто благотворно вліяетъ стаканъ простокваши, выпитый незадолго до отхода ко сну.

5) Обморокъ (Обмираніе, Мнимая смерть).

Обморокъ.

Подъ обморокомъ разумѣютъ потерю сознанія, полную или частичную, съ неподвижностію тѣла и нечувствительностію его, при чемъ дыханіе и сердечная дѣятельность (пульсъ) ослабѣваютъ и кожа холодѣетъ. Обморокъ можетъ быть слѣдствіемъ: мозговой болѣзни или же задержки кровообращенія въ сердцѣ и легкихъ отъ слишкомъ тѣснаго платья, вдыханія вредныхъ газовъ, сердечныхъ болѣзней, грудной жабы), или острого малокровія (потеря

крови, голоданіе), или онъ можетъ произойти отъ чрезмѣрнаго нервнаго или душевнаго возбужденія, какъ сильная боль, пораненіе, душевное волненіе, усталость и проч.

Высшая степень обморока имѣетъ видъ смерти и называется „мнимой смертью“. Мнимая смерть отличается отъ дѣйствительно наступившей смерти тѣмъ, что при дѣйствительной смерти имѣется полная вялость роговицы (глаза), такъ что при надавливаніи пальцемъ на ней остается уплощенность или углубленіе; затѣмъ полное отсутствіе реагированія кожи на всякія раздраженія, наконецъ—трупное окоченѣніе и проч. Если же кожа послѣ раздраженій, напримѣръ—послѣ растиранія раздражающимъ веществомъ или накапыванія кипятка, топленого воска или сургуча, на нѣжныя мѣста тѣла, краснѣетъ, то можно положительно допускать теплющуюся еще въ тѣлѣ жизнь; въ послѣднемъ случаѣ на крѣпко стянутой конечности мѣсто, находящееся впереди перевязки, набухаетъ и краснѣетъ (и синѣетъ).

Лѣченіе: Во время самаго припадка надо позаботиться прежде всего о томъ, чтобы освободить больного отъ тѣснаго платья, впустить въ комнату свѣжій воздухъ; кромѣ того примѣняютъ возбуждающія средства, какъ то: холодныя обрызгиванія и обливанія холодной водой; нашатырный спиртъ, уксусъ, камфорный спиртъ или одеколонъ для нюханія, растираніе груди, въ крайнихъ случаяхъ—искусственное дыханіе (см. ниже). При приливѣ (красномъ лицѣ) голову надо класть высоко, и на нее—холодныя примочки; наоборотъ, когда лицо блѣдное, голову должно помѣстить пониже и класть на нее горячіе компрессы.

Искусственное дыханіе примѣняется въ трудныхъ случаяхъ обморока, при такъ наз. обмираніи или мнимой смерти: придавши обмершему полусидячее положеніе и ставши у его изголовья, берутъ его руки повые локтей, отводятъ ихъ одновременно и равномерно въ стороны и вверхъ и затѣмъ приводятъ обратно въ прежнее положеніе, къ бокамъ груди, къ которымъ еще ихъ прижимаютъ; этимъ достигается вдыханіе и выдыханіе; такія движенія повторяютъ до 15—20 разъ въ минуту. Въ тотъ моментъ, когда руки прижимаются къ груди, кто либо другой нажимаетъ на животъ плашмя ладонями рукъ, для усиленія выдыханія изъ легкихъ, и прекращаетъ этотъ приемъ въ тотъ моментъ, когда руки обмершаго опять отводятся въ стороны и кверху.

Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ даютъ во время самаго припадка, при блѣдности лица, холодной кожѣ—*Камфора* × 1,

Нѣ
см

Лѣ
обм

Искус
дых

Мосхусъ × 3; если больной не глотаетъ, то можно эти же лѣкарства, но только въ чистыхъ тинктурахъ, подносить къ его ноздрямъ для вдыханія; можно ихъ также втирать въ виски. Лѣкарство даютъ часто—черезъ каждыя 3—5 минутъ.

Для предупрежденія припадковъ и вообще у лицъ склонныхъ къ таковымъ:

— *Аконитъ* и *Белладонна*—при приливахъ къ головѣ, также—*Гельземинъ*, *Феррумъ фосфорикъ*.

Ипекакуана, *Пульсатилла*, *Нуксъ вомика* — при расстройствахъ пищеваренія;

Хина—при истощеніи отъ потери крови и соковъ организма (кровотеченія, поносы), также *Фосфоръ*;

Игнація, *Валеріана*—главные средства у истеричныхъ.

Весьма важно во всѣхъ случаяхъ разобратъя возможно подробнѣе и основательнѣе въ общемъ состояніи организма для того, чтобы провести надлежащее коренное лѣченіе.

6. Многокровіе мозга, Мозговые приливы.

Причины и
признаки
болѣзни.

Усиленная дѣятельность сердца вслѣдствіе душевныхъ волненій, нервозности, лихорадки, употребленія спиртныхъ напитковъ, также чая и кофе; болѣзни сердца, легкихъ и печени. Кромѣ того, ношеніе тѣсныхъ воротниковъ на шеѣ, зобъ, запоры; вліяніе жара (также солнечнаго) и сильнаго холода на голову; воспаленія въ другихъ частяхъ тѣла, также трудное прорѣзываніе зубовъ у маленькихъ дѣтей. Многокровіе мозга (приливъ крови къ мозгу) выражается слѣдующими симптомами: головная боль, покраснѣніе лица, стучаніе въ вискахъ, головокруженіе, мельканіе въ глазахъ; ухудшеніе всѣхъ симптомовъ отъ нагибанія и въ лежачемъ положеніи; шумъ и звонъ въ ушахъ; чувствительность къ свѣту и звукамъ; разстроенное состояніе духа; возбужденіе и раздражительность; бессонница, бредъ, потеря сознанія и т. п.

Лѣченіе

Аконитъ: въ случаяхъ простуды; ощущение жара въ головѣ, усиленное сердцебіеніе. — *Белладонна*: красное, вздутое лицо, давящая боль во лбу, мерцаніе передъ глазами, шумъ въ ушахъ, тоска и потъ.—*Глоноинъ*. 3: большая чувствительность къ свѣту и звукамъ; при солнечномъ ударѣ. — *Страмоній*: бессонница и бредъ.—*Нуксъ вомика*: послѣ умственнаго переутомленія; у пьющихъ.—*Арника*: отъ механическихъ причинъ (паденіе, сотрясеніе и пр.). — *Опій* 3: оглушенное состояніе съ храпящимъ

дыханіемъ, вздутымъ, багрово-краснымъ лицомъ, съ выступленіемъ на немъ холоднаго пота.

При болѣзняхъ сердца, легкихъ и пр., обусловливающихъ многокровіе мозга, соотвѣтствующее лѣченіе (см. эти болѣзни).

Устраненіе основныхъ причинъ, высокое положеніе головы, нераздражающая пища, воздержаніе отъ кофе, чая, спиртныхъ напитковъ, мяса. Пища преимущественно молочная и растительная и въ очень умѣренныхъ вообще на разъ количествахъ. Избѣгать острыхъ и кислыхъ кушаній и не пить много жидкостей. Для отвлеченія крови отъ головы служатъ холодные компрессы на голову и шею, ножныя паровыя ванны, влажныя обертыванія туловища и ногъ.

7) Мозговой ударъ.

Мозговой или апоплексическій ударъ происходитъ отъ кровоизліянія въ ткань головного мозга, вслѣдствіе разрыва въ немъ кровеноснаго сосуда, и случается преимущественно у людей пожилого возраста, у которыхъ кровеносные сосуды менѣе податливы напору крови (известковое и атероматозное перерожденіе ихъ, артеріосклерозъ). Ближайшей причиной служитъ переполненіе мозга кровью, поводомъ же—какія либо изъ тѣхъ причинъ, какія перечислены выше при „многокровіи мозга“. Предвѣстниками мозгового удара часто служатъ при такихъ условіяхъ: головная боль или головокруженіе, шумъ въ ушахъ, слабость ногъ, забывчивость, неясное произношеніе словъ, апатія, засыпаніе членовъ. Ударъ является часто внезапно. Больной падаетъ безъ сознанія, лежитъ недвижимый; лицо вздутое, красное, багровое или блѣдное, хрипѣніе въ носоглоткѣ, щеки при выдыханіи вздуваются, воздухъ выходитъ изо рта дующимъ шумомъ, моча и испраженія отходятъ непроизвольно; пульсъ замедленъ и полонъ, зрачки сужены. Одна половина тѣла, лицо и конечности, парализованы, притомъ всегда перекрестно: на одной сторонѣ—лицо, на другой конечности. Въ однихъ случаяхъ больной погибаетъ уже во время приступа, не приходя въ сознаніе. Въ другихъ случаяхъ сознаніе возвращается лишь на короткое время, наступаетъ рвота, бредъ и судороги, наконецъ—смерть. Смертельнаго исхода можно ожидать въ томъ случаѣ, если въ теченіи 2 или 3 дней больной не приходитъ въ себя, находясь въ одномъ положеніи. Надежда же на выздоровленіе является по мѣрѣ исчезновенія угрожающихъ

симптомовъ, что часто совершается лишь постепенно. Параличи держатся дольше всего. О параличахъ см. ниже.

едохрани-
тельное
лѣчение

Лѣчение необходимо уже при предвѣстникахъ удара и тогда оно можетъ предупредить таковой. Для этой цѣли, кромѣ регулированія образа жизни и діеты, служатъ: *Аконитъ*, при головной боли—попеременно съ *Гельземин*. При сильномъ приливѣ къ головѣ (краснота глазъ и лица, стучаніе въ вискахъ, расширенные зрачки)—*Белладонна*, также попеременно съ *Гельземин*.—При запорѣ, или у страдающихъ геморроемъ, или при умственномъ переутомленіи—*Нуксъ вомика*, попеременно съ *Сульфуръ*. При чрезмѣрной тѣлесной усталости—*Арника*.

Сравнить еще статьи: „Головная боль“, „Головокруженіе“ и проч.

Лѣченіе
мозгового
удара.

Во время самаго приступа удара надо придать больному полусидячее положеніе въ постели, разстегнуть его одежду, на голову класть холодныя примочки; ноги, если онѣ холодныя, растирать водкой или спиртомъ посредствомъ какой нибудь жесткой матеріи. Прикладываніе горячихъ компрессовъ или бутылокъ для согрѣванія ногъ нецѣлесообразно, такъ какъ, нагрѣвая ноги, они нагрѣваютъ и всю кровь организма. Полезно вызвать обильныя испражненія посредствомъ клистировъ изъ воды комнатной температуры пополамъ съ виннымъ уксусомъ.

Мозговой ударъ есть единственная болѣзнь, при которой не слѣдуетъ безусловно отрицать цѣлесообразность кровопусканія, но только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣется полнокровное сырое тѣлосложеніе со вздутымъ, налитымъ кровью лицомъ и когда удастся сдѣлать его въ періодѣ предвѣстниковъ болѣзни или въ самомъ началѣ ея. Нужно или нѣтъ кровопусканіе, можетъ опредѣлить, конечно, только врачъ, и только ему можно довѣрить произвести такое.

Вообще же лучшимъ ланцетомъ служить гомеопатическій *Аконитъ* 2, который въ указанныхъ случаяхъ надо давать черезъ каждыя 5—10 минутъ по 3 капли, одинъ или попеременно съ *Гельземинъ*. Если черезъ 1—2 часа не замѣчается улучшенія, то, вмѣсто *Аконита*, давать *Белладонна* × 2.

Опій × 3 при судорогахъ въ членахъ съ пѣной у рта, при судорожномъ сжатіи челюстей, или при сильномъ бредѣ или спячкѣ; при горячей головѣ, красныхъ глазахъ съ расширенными зрачками, набрякломъ лицъ, сильномъ храпѣ. У больныхъ, злоупотреблявшихъ спиртными напитками.

Фосфоръ × 3. особенно у старыхъ людей съ полнымъ упадкомъ силъ, также—*Тартар. эметик.* × 3 при обильныхъ хрипахъ въ груди и опасности удущенія.

Противъ паралича, остающагося послѣ апоплексическаго удара главными лѣкарствами являються: *Арника, Русъ, Каустик. Коккулус., Фосфоръ* (см. еще „параличи“). Съ примѣненіемъ электричества надо быть очень осторожнымъ, а въ первыя нѣсколько недѣль оно и совсѣмъ не подходитъ и можетъ принести больному большой вредъ.

Когда мозговой ударъ окончился благополучно, оправившійся отъ него больной долженъ помнить, что болѣзнь эта можетъ въ любое время повториться, если онъ не будетъ вести вполне нормальный образъ жизни, не подвергая себя никакимъ излишества. О діетѣ см. при „Многокровіе мозга“.

8) Малокровіе мозга.

Малокровіе мозга, или отливъ крови изъ мозговыхъ полушарій, можетъ имѣть различныя причины; къ таковымъ относятся, напримѣръ, сильное сотрясеніе тѣла, толчокъ въ область желудка, разнаго рода непріятныя ощущенія, сильная боль, сильное душевное волненіе, обильныя потери крови, сильныя поносы, пребываніе въ помѣщеніи съ большимъ скопленіемъ людей и духотой воздуха, тѣлесная слабость вообще и послѣ истощившей болѣзни.

Причин

Явленія малокровія мозга бываютъ въ разной степени. Въ легкихъ формахъ больной чувствуетъ незначительное головокруженіе, мерцаніе передъ глазами и шумъ въ ушахъ: лицо становится блѣднымъ, пульсъ слабый, дыханіе замедленное; можетъ быть еще тошнота, рвота, упадокъ силъ, но сознаніе не теряется. Въ тяжелыхъ случаяхъ сознаніе теряется, является обморокъ (см. стр. 104), который можетъ продолжаться отъ нѣсколькихъ секундъ или минутъ до нѣсколькихъ часовъ. Смертію это рѣдко кончается, обыкновенно же больной оправляется, хотя и жалуются нѣкоторое время на слабость, головную боль, тошноту, на тоскливое чувство подъ ложечкой.

Признаки
болѣзни

Отъ другихъ болѣзней головного мозга малокровіе мозга отличается тѣмъ, что при немъ лицо всегда блѣдное, дыханіе замедленное, тихое, параличи отсутствуютъ.

„Мнимая смерть“—см. стр. 105.

Въ болѣе легкихъ случаяхъ достаточно лечь больному, освобожденному отъ тѣсныхъ платьевъ, горизонтально съ низко

положенной головой, понюхать *нашатырного спирта*, *одеколона* или *камфорного спирта*.

Въ болѣе трудныхъ случаяхъ вспрыскиваютъ лицо и грудь больного *холодной водой*, растираютъ тѣло *камфорнымъ спиртомъ*, въ крайнихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ *искусственному дыханію* (см. стр. 105).

Если способность глотанія сохранилась или во всякомъ случаѣ вводятъ въ ротъ повторно по 3—4 капли камфорного спирта (всего лучше въ видѣ *Камфора Рубини*). Цѣлесообразно также 1—2 раза дать 2—3 капли *Глоноинъ 1*.

9) Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ (Менингитъ).

Эта болѣзнь встрѣчается преимущественно у маленькихъ дѣтей и носитъ названіе „туберкулезнаго воспаленія мозга“, такъ какъ она чаще всего развивается именно у дѣтей золотушныхъ и туберкулезныхъ, особенно при глубокихъ гнойныхъ катаррахъ ушей и костоедѣ ушныхъ костей. Затѣмъ причиной воспаленія мозговыхъ оболочекъ являются сотрясенія мозга и механическія поврежденія черепа. Иногда эта болѣзнь сопровождается тифъ, воспаленіе легкихъ и, наконецъ, очень рѣдко является въ видѣ эпидемической болѣзни, сопровождающейся судорогой затылка и гитъ. (эпидемическій менингитъ головного и спинного мозга). Последняя форма менингита начинается внезапно, протекаетъ очень бурно и быстро, начинается ознобомъ, головной болью, рвотой, высокимъ жаромъ, сильнымъ безпокойствомъ. Уже въ первыя сутки голова загнута кзади, боли головы и спинного хребта видимо очень сильны. На 3-й—4-ый день является столбнякъ затылка и спины, которая вся изогнута, сжатіе челюстей, задержаніе мочи, потеря сознанія, спячка, хрипѣніе въ груди; запоръ и впалость живота; зрачки глазъ сужены. Кончается въ большинствѣ случаевъ смертію. Часто вся продолжительность болѣзни ограничивается однѣми лишь сутками, иной же разъ теченіе болѣзни и того быстрѣе.

Обычно же и именно у дѣтей наблюдаются предвѣстники: упадокъ питанія, плохое настроеніе, пугливостъ, невѣрная походка, быстрая утомляемость, потѣніе, особенно—затылка, кровотечение изъ носа, катарры. Въ первомъ періодѣ, въ которомъ выступаютъ уже явленія раздраженія мозга, наблюдается повышенная температура тѣла, ощущение жара въ головѣ, головная боль, эрываніе

затылка въ подушку, потѣніе головы, внезапныя вскрикиванія, скрежетаніе зубами, рвота, запоръ, западаніе живота, косоглазіе или неподвижно устремленный взглядъ съ сѣуженными, часто неравномѣрными зрачками, крайняя чувствительность къ свѣту и звукамъ, бредъ, судорожныя подергиванія конечностей и лица, задерживаніе мочи, безпокойный, тревожный сонъ или полное отсутствіе сна. Спустя 2—3 или больше дней начинается второй періодъ болѣзни, періодъ скопленія жидкости между мозговыми оболочками и въ полости мозга (острая водянка головы), и тогда являются признаки давленія на мозгъ: спячка при открытыхъ или кверху скошенныхъ глазахъ, произвольное выдѣленіе мочи и кала, параличъ одной половины тѣла, съ судорожными подергиваніями въ конечностяхъ другой половины, или же полный параличъ, расширенныя зрачки, все болѣе замедляющійся и уменьшающійся пульсъ, поверхностное или временами прекращающееся или храпящее дыханіе, холодный липкій потъ, судороги и смерть.— Выздоровленіе крайне рѣдко.

**Острая
водянка
головы.**

Съ самаго начала давать *Белладонна* $\times 3$ попеременно съ *Меркур. солюбилисъ* 3, каждый часъ. Если черезъ 12—24 часа не замѣчается улучшенія, то—вмѣсто *Беллад.* — *Атропинъ сульф.* $\times 3$. при улучшеніи же—первыя 2 лѣкарства, но рѣже, черезъ 2 часа. Если къ третьему дню болѣзнь имѣетъ еще угрожающій характеръ, то вмѣсто *Меркурія*—*Аписъ* $\times 3$.

**Лѣченіе
менингита.**

При сильномъ бредѣ—2 или 3 раза въ день, въ промежуткахъ между прочими лѣкарствами—*Гюсциам.* $\times 3$; если же имѣются сильное безпокойство, подергиванія членовъ, неподвижно устремленный взглядъ, сильный жаръ съ стѣсненнымъ дыханіемъ — *Страмоній* $\times 3$, попеременно съ *Цинк.* 3. При спячкѣ съ полуоткрытыми вѣками и потерей всякой чувствительности—*Опій* 3 и для пробужденія жизнедѣятельности—*Фосфоръ* $\times 3$, при совершенно отсутствующемъ сознаниі, произвольныхъ выдѣленій и проч.

При благоприятномъ оборотѣ въ болѣзни, для скорѣйшаго всасыванія образовавшагося выпота, давать *Геллебор.* $\times 2$ попеременно съ *Сульфуръ*, затѣмъ—*Арсеник.* 3, *Іод* 3 или *Арсеникъ-іодат.* $\times 3$, или *Кали іодат.*—въ болѣе вещественныхъ дозахъ—1 или $\times 1$.

При воспаленіи мозговыхъ оболочекъ рекомендуется еще *Гельземин.* 3, который можно давать въ промежуткахъ между другими приемами, также *Сангвинарія* 3; при предвѣстникахъ и въ началѣ при головокруженіи, головной боли и другихъ явле-

ніяхъ раздраженія мозга—*Вератр. вириде* 1, особенно во время прорѣзыванія зубовъ у дѣтей, когда оно лучше, нежели *Беллад.* или *Аконитъ*.

При судорогѣ затылка—еще *Цимицифуга* × 3 и *Баттизія* 1, также *Гельземинъ* и *Вератр. вириде*.

Вспомогат.
мѣры и
дѣта.

Компрессы на голову и шею (12—15° Р.), 2—3 ножноподмышковыхъ обертываній (22° Р.), продолжительностью 1—2 часа, съ послѣдующимъ общимъ обмываніемъ, При недостаточномъ согрѣваніи ногъ—прикладываніе теплыхъ бутылокъ съ влажнымъ обертываніемъ ногъ. Отвлекающимъ образомъ дѣйствуетъ также набрюшный согрѣвающий компрессъ, также небольшіе (удерживаемые) клистиры (ложки три, 18° Р., раза 3 въ день). Высокое положеніе головы, по возможности — на матрацной (кожаной) подушкѣ, а не на мягкой, перинной; забота о чистомъ, свѣжемъ воздухѣ (открываніе оконъ); температура комнаты — не болѣе 13—14° Р.—Дѣта: молоко, также кислое (простокваша), компоты. Устранить все возбуждающее: вино, кофе, чай и проч. Если пища не проглатывается, то, для поддержанія силъ, ставить 2 раза въ день питательный клистирь.

10. Воспаленіе мозга (Энцефалитъ).

Воспаленіе мозговой ткани встрѣчается гораздо рѣже воспаления оболочекъ мозга и появляется послѣ поврежденій, а также послѣ апоплексического удара. Эта болѣзнь ведетъ часто къ размягченію мозга съ ослабленіемъ умственной дѣятельности, къ отупѣнію и къ душевнымъ болѣзнямъ и, въ концѣ концовъ, послѣ 3—6 лѣтъ продолжительности, къ смерти.—Такъ какъ при этой болѣзни дѣло идетъ о разрушеніи мозговой ткани, то лѣчение можетъ быть не коренное, а лишь симптоматическое. Въ этомъ смыслѣ получались удовлетворительные результаты отъ *Арника*, рядомъ съ *Фосфоръ*, *Арсен.*, *Беллад.*, *Глоноинъ*, *Кали-йодат.*, *Барита-карб.* и друг.

Вообще же воспаленіе мозга, размягченіе мозга и проистекающія изъ нихъ душевныя состоянія лѣчатся такъ, какъ воспаление мозговыхъ оболочекъ, мозговой ударъ и многокровоіе мозга.

11. Хроническая водянка головы.

Хроническая водянка головы можетъ быть врожденной, но также послѣдствіемъ неправильнаго питанія въ первые годы

жизни, вреднаго, сырого жилища, при чемъ болѣзнь развивается на почвѣ золотухи или туберкулеза. Острая водянка головы является, часто внезапно, при туберкулезномъ воспаленіи мозговыхъ оболочекъ (см. стр. 111), и вначалѣ симптомы ея тѣ же, что и основной болѣзни. Затѣмъ, если ребенокъ остается живъ, голова увеличивается въ объемѣ, становится тяжелой и западаетъ назадъ. Дѣти дѣлаются апатичными и не могутъ сосредоточивать своихъ глазъ на указываемомъ имъ предметѣ. Слюна течетъ изо рта, языкъ съ трудомъ поворачивается. Развитіе ребенка останавливается во всѣхъ отношеніяхъ или идетъ крайне туго впередъ, и онъ остается на всю жизнь тупоумнымъ или полнымъ идиотомъ. Въ большинствѣ случаевъ, когда ребенокъ не начинаетъ говорить, недостатокъ этотъ зависитъ отъ скопленія воды въ головѣ, а не отъ приращенія языка, какъ думаютъ въ народѣ.

Лѣченіе при острой водянкѣ сводится къ лѣченію основного страданія (воспал. мозгов. оболоч.). При хронической водянкѣ: *Арсен.-іодат.*, *Кали-іодат.*, $\times 2$, *Ферр.-іодат.*, *Калькар.-іодата*, *Арника*, *Сульфур.*, *Геллебор.* $\times 1$.

См. „золотуха“, „малокровіе“, „англійская болѣзнь“.

12. Сотрясеніе мозга.

Причины: удары въ голову, паденіе на нее и вообще паденіе съ высоты. Первые симптомы: тошнота, рвота, головная боль, оглушеніе. (Дальнѣйшіе симптомы являются выраженіемъ послѣдующаго воспаленія мозга или мозговыхъ оболочекъ—см. эти болѣзни).—*Арника*, внутренне и наружно.—*Акон.* и *Беллад.*

Холодные компрессы на голову и шею и проч. (см. Приливы къ мозгу и остр. восп. мозгов. обол.).

Б. Болѣзни спинного мозга.

Содержаніе этого (Б) под-отдѣла: 1) Спинная боль, раздражительность (ирритация) спинного мозга; 2) Воспаленіе спинного мозга и его оболочекъ; 3) Сухотка спинного мозга, табесъ дорзалисъ; 4) Дѣтскій спинной параличъ и исхуданіе мышцъ.

1. Спинная боль. Раздражительность (ирритация) спинного мозга.

Причины спинной боли весьма разнообразны; къ нимъ относятся: ревматизмъ, подагра, приливъ крови, бывающій особенно при геморроѣ, брюшномъ полнокровіи или лихорадочныхъ состоя-

Причи

ніяхъ, какъ перемежающаяся лихорадка, тифъ и проч.; рѣже встрѣчается боль вслѣдствіе костоѣды и тому подобныхъ разрушительныхъ процессовъ.

Наиболѣе часто встрѣчающаяся боль спины есть нервная боль, такъ называемая ирритациа спинная, раздражительное состояніе спинного мозга. Это страданіе является обыкновенно спутникомъ неврастеніи и истеріи, т. е. болѣзней чисто нервныхъ (о нихъ см. слѣдующій под-отдѣлъ) и не имѣетъ въ своей основѣ видимыхъ измѣненій въ веществѣ спинного мозга или его оболочекъ.

Въ большинствѣ случаевъ спинная ирритациа является слѣдствіемъ чрезмѣрнаго раздраженія нервовъ душевными волненіями, напряженными умственными занятіями, ночными бдѣніями, половыми излишествами всякаго рода; она нерѣдка также у кормящихъ женщинъ и у людей, ведущихъ постоянный сидячій образъ жизни, равно какъ и при чрезмѣрной работѣ на ручной швейной машинѣ и у много играющихъ на рояли, и проч.; въ послѣднихъ случаяхъ боль особенно сильна между лопатками.

Признаки
нервной
спинной
боли.

Спинная боль часто сопровождается общей раздражительностью кожи и другихъ органовъ чувствъ, сердцебіеніемъ, головокруженіемъ, спазмами желудка, тошнотой или рвотой, кашлемъ, одышкой (астмой), частыми позывами на мочу или, наоборотъ, задержанностью ея, запорами, коликами въ животѣ. Или имѣются другія разстройства, какъ чрезмѣрная раздражительность половой системы или недостаточность ея или даже полная слабость; или же болевые ощущенія разнаго рода и въ разныхъ частяхъ тѣла, подергиванія мышцъ, разнаго рода разстройства въ нервно-душевной системѣ, какъ раздражительное или угнетенное состояніе духа, умственная вялость, слабая память, забывчивость, тоска и т. п.

И наоборотъ, мѣстныя страданія въ разныхъ органахъ, особенно со стороны матки, могутъ вызывать раздражительное состояніе спинного мозга.

Во всѣхъ случаяхъ страданіе это—хроническое и хотя не опасное, но запускать его не слѣдуетъ: помимо устраненія причинъ должно быть и соотвѣтствующее лѣченіе.

Лѣченіе.

Что касается причиннаго лѣченія, то надо справляться въ другихъ мѣстахъ этой книги. Руководящей же нитью въ выборѣ лѣкарствъ можетъ служить особенно характеръ боли:

Боль жгучая: *Фосфоръ*, *Каустикъ*., также *Арсеникъ*., *Аписъ*., *Бріонія*, *Карбо анималисъ*.

Боль давящая: *Нуксъ вомика, Сепія, Платина, Рута.*

Боль рвущая: *Русъ, или Бріон., Силиц., Сульфур.*

Боль рѣжущая: *Аурумъ муріатик., Сепія.*

Боль колющая: *Кали карбоник., Ацид. нитрик., также Спигелія, Касикумъ, Стронцій карбоник., Аписъ.*

Боль тянущая: *Русъ, Нуксъ вомика, Хамомилла, Коккулусъ, Коніумъ, Сульфур., Натр. муріатик.*

Боль какъ бы разбитость: *Арника, Нуксъ вомика, Хинин., Платина, Рута, Цинк.*

Боль какъ бы раневая: *Ацид. нитрик., Сульфур.*

Боль какъ бы отъ вывиха: *Сульфуръ, Агарикусъ.*

Когда болятъ преимущественно мышцы спины, то подходятъ особенно: *Меркур. солуб., Русъ, Спигелія.*

Когда боль преимущественно въ костяхъ: *Стафизагрія, Азафетида 3, также Калькар. фосфорика.*—При искривленіи позвоночника: *Калькар. карбон. и Фосфоръ, Силиція.*

Во многихъ случаяхъ подходятъ: *Аргент. нитрик., Цимицифуга, Колоцинт., Апоцидумъ,* а при ощущеніи жара въ спинѣ съ повышенной половой возбудимостью—*Беллад. (или Атропин. сульф.), Кантарисъ, Каннабисъ.*

Въ особенно упорныхъ случаяхъ, въ которыхъ Нуксъ вомика показана, но мало помогаетъ, часто очень дѣйствительнымъ оказывается *Стрихнин. 3.*

Дозы, дѣленія и способъ пріемовъ лѣкарствъ см. ч. I, гл. 3 и 4.

Вспомогательныя мѣры и діета—соотвѣтственно причинному, основному разстройству: см. выше въ началѣ этой статьи и затѣмъ въ алфавитномъ указателѣ.

Для наружнаго примѣненія особенно цѣлесообразны опodelьдоки: *Арника Ө, Русъ Ө, Белладонна Ө,* (см. ч. I, гл. VI).

2) Воспаленіе спинного мозга (Міэлитъ).

Болѣзнь заключается въ воспаленіи спинного мозга или его оболочекъ, что на практикѣ трудно разграничить, и обнаруживается болью или колотьемъ въ спинѣ, а также отраженными болями или, напротивъ, онѣмѣніемъ или же какъ бы ползаніемъ мурашекъ въ обѣихъ рукахъ или ногахъ, ощущеніемъ опоясанія въ области желудка. Болѣзни предшествуетъ обыкновенно лихорадочное состояніе, жаръ и ознобъ. Боль глубокая, колющая, рвущая, жгучая, по большей части ограниченная однимъ мѣстомъ, которое можно

опредѣлить ошупываніемъ позвоночнаго хребта. Въ теченіи болѣзни появляются судороги конечностей, чаще, однако, параличи (въ большей или меньшей степени), а именно обѣихъ ногъ, иногда и рукъ (а не параличъ одной ноги или одной руки, какъ при мозговыхъ страданіяхъ); вмѣстѣ съ тѣмъ ослабляется или совершенно пропадаетъ и чувствительность парализованныхъ частей. Къ этому одновременно или съ теченіемъ времени присоединяется разслабленіе мочевого пузыря и кишечника, а также затрудненія дыханія и глотанія. Симптомы эти могутъ продолжаться годами, но конецъ жизни можетъ наступить и раньше, вслѣдствіе разстройствъ дыханія и мочеотдѣленія.

Причиною болѣзни рѣдко бываетъ простуда, обыкновенно же—страданія позвонковъ (костоѣда), сифились, или механическое поврежденіе: паденіе, переломъ позвоночника и т. п.

Въ началѣ заболѣванія, когда имѣется лихорадочное состояніе, подходит *Аконит.* $\times 3$, какъ питье, и *Белладонна* 3 съ *Меркур.* *солуб.* 3 попеременно, черезъ 1—2 часа.

Спустя 2—3 дня, если жаръ еще не прошелъ, давать *Аконит.*, и кромѣ того *Русь* 3 и *Дулькамара* $\times 3$ попеременно.

Если причиной было механическое поврежденіе, главнымъ лѣкарствомъ является *Арника* $\times 3$ внутрь и *Арника* Θ —наружно въ видѣ компрессовъ (см. стр. 41).

Когда острое состояніе болѣзни прошло, также въ хроническихъ случаяхъ, подходятъ *Бріонія* $\times 3$, *Нуксъ вомика* 3 , *Фосфоръ* 3 , также—*Арсеник.* *іодат.* 3 , *Силиція* 6 , *Калькареа карбонина* 6 , *Сульфур.* 3 , *Аргент. нитр.* 3 , *Калькареа фосфорика* 3 , *Туя* 3 .

При судорожныхъ состояніяхъ—*Игнація* $\times 3$ или *Нуксъ вом.* 3 , *Цинк.* 6 , *Купрум.* 6 , *Стрихнинъ* 6 , особенно же—*Секале корн.* 3 и *Коккулусъ* 3 ; послѣднія два лѣкарства—при параличахъ. (См. еще „Параличи“ и „Судороги“).

Ванны (25° Р.) съ обливаніями спины (22° Р.). Общія обертыванія (22° Р.), втеченіе часа; обмыванія (22° Р.), особенно спины, утромъ прямо изъ кровати; вечеромъ набрюшный согрѣвающій компрессъ и обертыванія голеней. Нераздражающая пища, молоко, каши, фрукты, зелень, яичныя блюда.

3) Спинномозговая сухотка (Табесъ дорзались).

Табесъ очень частая болѣзнь и развивается вслѣдствіе простуды, чрезмѣрныхъ напряженій, также половыхъ излишествъ, но

всего чаще вслѣдствіе сифилиса. Вначалѣ являются жестокія боли въ области желудка, въ спинѣ, какъ бы отъ опоясывающаго кольца, въ рукахъ и ногахъ, и онѣ могутъ быть приняты за ревматическія. Затѣмъ все болѣе развивается ощущеніе усталости въ ногахъ, неловкость при ходьбѣ, ощущеніе мягкости подъ ногами и какъ будто мурашки ползаютъ на нихъ и на рукахъ. Неловкость при ходьбѣ переходитъ мало по малу въ неувѣренность, такъ что больной съ усиленнымъ вниманіемъ долженъ слѣдить, куда ставить ногу, при чемъ, прежде чѣмъ это сдѣлать, онъ забрасываетъ ногу впередъ, полукругомъ. Походка эта настолько характерна, своеобразна, что по ней одной можно безошибочно опредѣлить основную болѣзнь. Въ темнотѣ, равно съ закрытыми глазами, больной не въ состояніи ходить, не держась стѣнъ или какихъ либо предметовъ. Въ дальнѣйшемъ теченіи чувствительность ногъ и способность владѣть ими все болѣе пропадаютъ, и наконецъ образуется полное параличное состояніе; парализуются не только конечности, но и мочевого пузыря (недержание мочи), зрѣніе и проч. Болѣзнь можетъ тянуться очень долго, лѣтъ 20—30. Обыкновенно больные умираютъ не такъ отъ этой, какъ отъ другой случайно присоединившейся болѣзни, которой они, при общей своей слабости, не въ состояніи перенести.

При:
спи
сух

Лѣченіе спинной сухотки представляетъ задачу не легкую и требуетъ большой выдержки со стороны пациента и врача, и результаты получаются тѣмъ лучшіе, чѣмъ раньше приступлено къ гомеопатическому лѣченію.

Лѣчи

Въ случаяхъ сифилитическаго происхожденія болѣзни, если не предшествовало чрезмѣрное примѣненіе ртути и іода, давать меркуріальныя и іодистыя лѣкарства: *Меркур. солуб.* $\times 3$ или; *Меркур. дульцис* 1 или *Меркурій биодат.* $\times 3$, *Кали іодат.* 1 если же эти средства давались уже раньше въ аллопатическихъ дозахъ, то больше подходятъ: *Гепаръ сульфур.* 3, *Аурум. муриатик.* $\times 3$, *Ацид. нитрик.* 3.

Рядомъ съ этими лѣкарствами, также вообще въ случаяхъ не сифилитическаго происхожденія, примѣняются еще *Русъ 3.* *Каустик.* 3,—при сильныхъ боляхъ, также *Аргент. нитрик.* 3, особенно при сильныхъ желудочныхъ боляхъ, и *Нуксъ вомика 3.*

Секале корнут. 3, особенно при разстройствѣ зрѣнія.

Противъ усиленнаго полового возбужденія, бывающаго въ начальной стадіи болѣзни: *Дигиталинь 3*, *Камфора бромата* $\times 3$,

При разстройствах мочеотдѣленія: *Ацид. бензоик. З, Каннабисъ сатива* × *З, Капсик. × З.*

Хорошіе результаты при спинной сухоткѣ получались отъ *Алюминій З* (или *6*), также отъ *Кали фосфорик. З* и *Магnezія фосфорика З, Фосфоръ З* и *Фосфоръ ацид. З.*

Вспомогат.
мѣры и
діета.

Втиранія въ позвоночный хребетъ утромъ и вечеромъ *Русъ Θ* и *Белладонна Θ* въ видѣ оподельдока того или другого, или въ видѣ мази или масла, или въ смѣси со спиртомъ или водкой. Кромѣ того обмыванія или обтиранія водою 18—20° Р., 1—2 раза въ день; при сильныхъ боляхъ—теплыя ванны, 27—28°, разъ въ день или черезъ день. Для мѣстнаго успокоенія болей—согрѣвающие компрессы или же паровые. Солнечныя ванны. Легкій общій массажъ тѣла, также легкія, не утомительныя гимнастическія упражненія. Діета: легкая, нераздражающая пища, преимущественно молочная и растительная изъ овощей, зелени, фруктовъ. Спиртныя напитки и куреніе табаку вредны.

4) Дѣтскій спинной параличъ и исхуданіе мышцъ.

Дѣтскій параличъ и исхуданіе мышцъ (мышечная атрофія) суть послѣдствія болѣзненныхъ измѣненій спинного мозга, но тогда какъ первая болѣзнь является внезапно, начинаясь симптомами воспаленія мозга, продолжающимися дня 3—4, послѣ чего члены оказываются парализованными, вторая, напротивъ, развивается лишь медленно. Первая болѣзнь у взрослыхъ рѣдко встрѣчается, и то не позже 30-лѣтняго возраста, или же, въ хронической формѣ, у старыхъ людей и вслѣдствіе свинцоваго отравленія; мышечная же атрофія сопровождаетъ дѣтскій параличъ, а у взрослыхъ она развивается, какъ самостоятельная болѣзнь, начинающаяся рѣдко раньше 30-лѣтняго возраста и бывающая либо спинномозгового происхожденія, либо въ видѣ мѣстнаго страданія (какъ, напр., у работающихъ преимущественно одной рукой—у столяровъ, кузнецовъ, слесарей).

Лѣченіе.

Плумб.-іодат., Русъ, Каустик., Нуксъ-вом.; затѣмъ: *Кали-іодат., Ферр.-іодат., Аргент.-нитр., Фосфор., Арсеник.* (см. еще „Параличи“).

Вспомогат.
мѣры

Полуванны; затѣмъ общія обертыванія, солнечныя, также электрическія ванны; ежедневный общій массажъ. Діета та-же, что и при другихъ спинномозговыхъ страданіяхъ.

В. Болѣзни нервной системы.

І. Невральгія. Нервная боль.

Содержаніе этого (В) под-отдѣла: І. Невральгія, Нервная боль:—1) Лицевая боль. Болевой тикъ. 2) Бедренная боль, Ишіасъ. 3) Поясничная боль, Лумбаго, Пострѣлъ.—ІІ. Судороги, конвульсіи, спазмы: 1) Конвульсіи у дѣтей, Родимчикъ. 2) Эклампсія у беременныхъ. 3) Падучая болѣзнь, Эпилепсія. 4) Столбнякъ. 5) Пляска св. Вита. 6) Спазмы внутреннихъ органовъ: желудка, живота, сердца (грудная жаба), легкихъ (астма), гортани, Милларова астма у дѣтей, нервная икота, спазмъ смѣха и плача, заиканіе. 7) Профессиональныя судороги: писчий спазмъ и др.—ІІІ. Параличи. Парезы.

Подъ невральгіей разумѣютъ чрезвычайно сильную жгучую или колющую боль, являющуюся приступами, съ большими или меньшими перерывами, вдоль или въ области одного какого либо нерва. Въ послѣднемъ отношеніи невральгіи отличаются отъ ревматическихъ болей, которыя переходятъ съ мѣста на мѣсто безъ опредѣленнаго направленія. Невральгическія боли сопровождаются часто судорожными стягиваніями мышцъ, особенно—въ лицѣ, которое чаще другихъ частей тѣла поражается этой болѣзнію (невральгіи тройничнаго нерва); затѣмъ невральгія бываетъ часто затылочная, заушная, въ рукѣ, груди, поясничная, бедренная (по срединѣ или на нижнемъ концѣ бедра), тазобедренная (ишіасъ).

1) Лицевая боль (Болевой Тикъ).

Боль эта у людей, предрасположенныхъ къ ней, вызывается простудой, душевными волненіями, разговоромъ, смѣхомъ, жеваніемъ, чиханіемъ, прикосновеніемъ и проч. и бываетъ, такимъ образомъ, приступами большей или меньшей продолжительности. Иной разъ она ограничивается однимъ небольшимъ мѣстомъ на губѣ, на носу и проч., или же распространяется на всю половину лица. Причиною тика можетъ быть либо ревматическое состояніе, либо воспаленіе подлежащихъ частей, также зубныя болѣзни, либо нервная слабость, малокровіе, расстройства брюшныхъ органовъ, геморрой, истерія, ипохондрія, подагра, сифились.

Лѣченіе должно быть не только болеутоляющее, но оно должно быть направлено и на прочія сопутствующія расстройства или на основную причину, какую можно въ каждомъ случаѣ предположить. Выборъ лѣкарствъ—см. ниже.

2) Бедренная боль (Ишіасъ).

Боль эта поражаетъ сѣдалищный или бедренной нервъ. О чисто нервной боли можетъ быть рѣчь лишь въ томъ случаѣ, если исключена возможность воспаленія или другого болѣзненнаго состоянія, сопряженнаго съ подобной болью. Какъ всякая нервная боль, и эта является приступами, съ большими или меньшими промежутками времени, причемъ не наблюдается никакихъ видимыхъ измѣненій наружныхъ частей; вызывается чаще всего простудными моментами, въ другихъ же случаяхъ трудно бываетъ опредѣлить ближайшую причину приступа: послѣднюю можетъ быть душевное волненіе, разстройство брюшныхъ органовъ, чрезмѣрное движеніе, ѣзда верхомъ или въ тряскомъ экипажѣ и проч. Ишіасъ обыкновенно бываетъ въ одной конечности, рѣдко въ обѣихъ одновременно. Боль идетъ отъ таза внизъ до колѣна и до ступни. Лѣченіе—ниже.

3) Поясничная боль (Лумбаго, Пострѣлъ).

Эта боль у людей, страдающихъ ею, вызывается или усиливается каждый разъ при наклоненіи туловища впередъ, при надѣваніи обуви, отъ рѣзкаго движенія или продолжительнаго хожденія, или же отъ простудныхъ моментовъ, или же отъ приливовъ къ брюшнымъ органамъ, при геморроѣ, запорѣ и проч. Боль не постоянна, а является приступами, и этимъ отличается, между прочимъ, отъ ревматизма мышцъ спины. Лѣченіе—ниже.

Для выбора соответствующихъ лѣкарствъ противъ нервной боли приводятся тутъ слѣдующія общія руководящія указанія съ отдѣльной еще характеристикой нѣсколькихъ наиболѣе употребительныхъ лѣкарствъ:

лѣкарства
противъ
лицевой
боли.

При лицевой боли, если она происходитъ или усиливается отъ прилива крови къ головѣ: *Акон.*, *Беллад.*, *Нуксъ вом.*, *Меркур. солуб.*; при чисто нервной лицевой боли: *Платина*, *Хина*, *Фосфоръ*, *Русъ*, *Спигелія*, *Станнум.*, *Мезереум.*; при ревматической лицевой боли: *Хина*, *Беллад.*, *Колоцинт.*, *Русъ*, *Пульсат.*, *Нуксъ вом.*, *Меркур.*, *Рододендрон.*, *Спигелія*; при воспалительной лицевой боли: *Беллад.*, *Меркур.*; при болѣзняхъ костей: *Меркур.*, *Силиція*, *Мезереум.*; при малокровіи: *Хина*, *Пульсатилла*, *Феррумъ*, *Арсеник.*

При бедреной боли или ишіасѣ примѣняются: *Лѣн*
въ острыхъ случаяхъ преимущественно: *Беллад.*, *Русъ*, *пр*
Колоцинт., *Пульсатилла*, также—*Бріонія*, *Ликопод.*, *Родо- иш*
дендронъ; въ хроническихъ случаяхъ: *Арсеник.*, *Сульфур.*, *Ковъ-*
хик., *Феррум.*

При бедреной боли помогаетъ часто еще: *Тартар. эметик.*,
Каустик., *Ирисъ*, *Гнафаллій.*

При поясничной боли, пострѣлъ или лумбаго: *Арника*, *при*
(внутр. и наруж.), *Русъ* (внутр. и наруж.), *Ледумъ* (внутр. и на- лу
руж.), *Секале*; при запорѣ, геморроѣ—*Нуксъ вом.*, *Сульф.*, *Гвако*
(внутр и наруж.).

При нервной боли въ другихъ частяхъ тѣла: въ груди— *при*
Бріонія, *Арника*, *Акон.*, *Арсен.*, *Цимицифуга*, *Ранункулусъ*; *дру*
въ желудкѣ и животѣ—*Нуксъ вом.*, *Арсен.*, *Колоцинт.*; въ серд *невр*
цѣ—*Беллад.*, *Кальмія*, *Спигелія*, *Вератрумъ вириде.*

Въ болѣе упорныхъ случаяхъ невралгій, когда приведен-
ныя выше средства, не достаточно помогаютъ, надо имѣть въ
виду еще другія, изъ которыхъ главныя суть слѣдующія:

Коніумъ (колющія и рвущія боли), *Купрумъ* (ударяющія); *пре*
Лазезисъ, *Страмоній* (рвущія, подергивающія, судорожныя, въ *упо*
мышцахъ), *Цинк.* (судорожныя); *Цедронъ* (при надглазничной *невр*
невралгии, особенно—лѣвосторонней), *Гельземинъ* (лицевая боль
приливнаго характера), также *Винка миноръ*; *Фитолакка* (боли
давящія, колющія, тянущія, хуже отъ движенія и надавливанія);
Кактусъ (хронич.; отъ напряженія боль усиливается, также отъ
вина, музыки, свѣта, голода).

При вещественныхъ измѣненіяхъ въ тканяхъ: *Барита карб.*
при хронич. опухоли), *Калькареа-карбон.* (золотуха, блѣдная не-
мочь), *Калькареа-флуорика* (особенно на сифилитич. почвѣ), *Ге-*
партъ-сульф. (рвущія, тянущія боли въ костяхъ), *Кали бихромик.*
(сифились), *Сенія* (особенно у беременныхъ и истеричныхъ, так-
же при мигрени).

Наружно примѣняются согрѣвающие, горячіе или паровые *Вспом*
компрессы; иногда скорѣе облегчаютъ холодныя примочки или *мѣрь*
компрессы; примѣняются и лѣкарственные втиранія въ формѣ ли *неврал*
масла, мази, оподельдока или спиртнаго раствора. (См. наружныя
примѣненія лѣкарствъ, стр. 41). Всего чаще употребляется *ма-*
сдо или *оподельдокъ Белладонны*, также *Русъ*,—*Ледумъ*,—*Бріо-*
нія,—*Пульсатилла*,—*Арника*; рекомендуется еще *Вербаскумъ*

(особенно при лицевой боли, втирать цѣльной тинктурой), также мазь изъ *Вератрина* (2 или 3 грана на унцію жира).

Иной разъ помогаетъ электричество, именно—гальваническое, также массажъ и шведская гимнастика. Въ случаяхъ особенно упорныхъ можно испытать паровыя ванны (камерныя, постельныя) или паровыя компрессы. Вообще же показаны общія или частичныя обертыванія.

Діета должна быть легкая. Беречься холода и сырости

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи невральгій.

Аконитъ × 3: приливы крови къ головѣ или лихорадочное состояніе; сильное сердцебіеніе; боль колющая или рвущая или дергающая; ухудшается ночью или отъ душевныхъ волненій, отъ движеній, отъ спиртныхъ напитковъ.

Арника × 3: боль какъ бы отъ прищемленія; чувство какъ бы разбитости въ пораженномъ мѣстѣ; или ощущение онѣмѣлости или какъ бы ползанія мурашекъ; безпокойное состояніе, вынуждающее мѣнять положеніе.

Арсеник. 3: боль очень сильная, жгучая, рвущая, особенно ночью; холодъ усиливаетъ боль, теплота—облегчаетъ.

Белладонна 3: рѣжущая или жгучая или давящая или рвущая или колющая боль, хуже ночью и отъ движенія; подергиваніе, какъ отъ электрическаго тока; боль бываетъ и блуждающая, съ мѣста на мѣсто; ощущеніе жара; приливы; ощущеніе постукиванія въ пораженномъ мѣстѣ.

Бріонія × 3: тянущая, рвущая боль съ колотьемъ при движеніи, особенно въ груди; разстройство пищеваренія; давленіе въ области печени и подъ ложечкой; лихорадочное безпокойство, раздражительность, кислый потъ. При давленіи, движеніи и ночью хуже.

Кодоцинтъ 3: боль большей частію ревматическая, весьма жестокая, стискивающая, или рвущая, съ жженіемъ или колотьемъ, усиливается отъ прикосновенія и отъ движенія и облегчается въ покоѣ и отъ наружной теплоты; ощущеніе онѣмѣлости или одеревенѣлости.

Колѣхик. 1 или 0: боль въ суставахъ, преимущественно большихъ (колѣно, бедро, плечо, локоть); боль вызывается или ухудшается отъ сырого холода; боль односторонняя; проникаю-

щая какъ бы въ самыя кости, особенно въ теплую погоду; въ холодную же погоду: колотье въ пораженныхъ частяхъ, ощущение онѣмѣлости; ухудшение по вечерамъ, отъ движенія или прикосновенія; боль ночью особенно невыносима; моча темная съ осадкомъ; ночью жаръ съ жаждой; неправильное пищевареніе; желтизна кожи. Общая раздражительность, наклонность къ потѣнью.

Меркур. (солуб. 3 или корроз. 3): боль, чаще колющая, особенно ночью; поты безъ облегченія; боль усиливается или вызывается переменъной погоды; ухудшеніе въ постельной теплотѣ и отъ наружнаго холода; при ишіасѣ (особенно *Меркур.* корроз.); слюнотечение.

Мезереумъ × 3: при костныхъ страданіяхъ, послѣдствіяхъ сифилиса, послѣ злоупотребленія ртутью, но и въ чисто нервныхъ случаяхъ. Рѣзко ограниченная мѣстомъ боль, или начинающаяся всегда въ опредѣленномъ мѣстѣ и распространяющаяся—въ лицѣ, наприм.,—до глаза, виска, затылка и проч.; начинается подъ вліяніемъ теплоты, при движеніи на вольномъ воздухѣ, въ комнатѣ; слюнотечение.

Нуксъ вомика 3: особенно при поясничной боли; отвращеніе къ вольному воздуху; разстройство пищеваренія; геморрой, запоръ. Боль, ночная, или періодическая, особенно по утрамъ.

Платина 3—6: боль ухудшается вечеромъ и въ покоѣ; ощущеніе холода и онѣмѣнія, съ тоской, сердцебіеніемъ, плаксивостью. У истеричныхъ.

Пульсатилла × 3: ревматическія и нервныя боли, болѣе легкой формы, особенно у женщинъ, у блѣдно-немочныхъ и у дѣтей. Ухудшеніе въ постели, въ комнатной теплотѣ, при переменънѣ положенія; боли въ такихъ случаяхъ тянущія, рвущія, держающія.—Колющія боли съ похолодѣніемъ при переменънѣ погоды. Облегченіе на вольномъ воздухѣ, усиленіе боли при возвращеніи въ комнату. Вообще прохлада облегчаетъ, поэтому, раздѣвшись, больной чувствуетъ себя лучше. Зябкость, отсутствіе жажды, блѣдность лица, слабонервность.

Рододендронъ × 3: боль поясницы; усиливается или вызывается сырымъ воздухомъ, при всякой переменънѣ погоды, особенно когда вѣтренно; боль потягивающая; ночью и въ покоѣ хуже; тугость и ощущеніе одеревенѣлости въ членахъ, съ ощущеніемъ ползанія мурашекъ. Ревматическая лицевая боль.

Русъ 3: бедреная боль; послѣ промоканія и при переменънѣ погоды; теплота и движеніе облегчаютъ, въ покоѣ хуже. Также

при чисто нервной боли, при лихорадочномъ состояніи и слабо-нервности.

Спигелія $\times 3$: при нервной и ревматической лицевой боли; боль молніеносная, дергающая, жгучая, съ ухудшеніемъ отъ прикосновенія, жеванія или вообще мышечныхъ движеній, отъ лежанія на больной сторонѣ, отъ сырой погоды. Приступы являются періодически и быстро проходятъ. Сердечная тоска.

Станнумъ 3 : чисто нервная (лицевая, желудочная) боль, начинается слабо, постепенно нарастаетъ и также постепенно уменьшается; боль давящая, стсскивающая, особенно ночью.

Стафизагрія $\times 3$: при пораженіи костей или при ревматической лицевой боли. Давленіе, біеніе въ зубахъ, въ скулѣ; боль разнаго характера; хуже отъ дотрагиванія; ощущеніе припухлости; холодныя руки и потѣніе лица.

Сульфуръ 3 : главное лѣкарство въ хроническихъ случаяхъ, для искорененія предрасположенія къ болѣзни. Геморройное или золотушное состояніе. Полнокровіе.

Феррумъ 6 : нервныя боли въ плечѣ; ухудшеніе отъ движенія, ночью и въ постельной теплотѣ; блѣдность лица, худоба, общая испорченность крови; у старыхъ людей. *Феррумъ фосфорикъ*. $3-6$ —при поясничной боли, также при лицевой,

Фосфоръ 3 : ревматическая боль, особенно лицевая; сопровождается зудомъ; колющая, какъ бы отъ гвоздя; всякое движеніе мышцъ лица усиливаетъ боль; то же производитъ дотрагиваніе и малѣйшій сквознякъ; приливъ крови, головокруженіе со слабостію.

Хамомила $\times 3$: въ нервныхъ приступахъ, особенно ночныхъ; крайнее безпокойство, раздражительность. Улучшеніе при вставаніи и движеніи.

Хина $\times 3$: нервная, ревматическая боль; у малокровныхъ съ кажущимся приливомъ крови; боль является періодически въ опредѣленные часы или ночью; или возобновляется каждый разъ, какъ больной ляжетъ (чаще—*Хининъ* 1).

Цимицифуга $\times 3$: ревматическая боль, съ ощущеніемъ онѣмѣнія, особенно въ мышцахъ, въ связи часто съ маточными разстройствами. Невралгія яичника.

О дозахъ и способахъ приемовъ, также о дѣленіяхъ
см. ч. I, гл. 3 и 4.

II. Судороги. Конвульсії. Спазмы.

Подъ судорогами или корчами разумѣютъ неестественныя, произвольныя мышечныя движенія въ видѣ подергиваній или сведеній и корчей. Судороги бываютъ общія, всѣхъ мышцъ тѣла, и тогда онѣ называются конвульсіями, если характеръ ихъ подергивающій, и столбнячными, если имѣютъ характеръ окоченѣлости, оцѣпенѣлости, или же онѣ частичныя, въ мышцахъ отдѣльныхъ органовъ, и тогда называются спазмами, если сопровождаются сильной болью, или просто—произвольнымъ сокращеніемъ мышцъ, какъ, напримѣръ, профессиональныя судороги (у писцовъ, скрипачей, піанистовъ и проч.), подергиваніе отдѣльныхъ мышцъ, какъ при пляскѣ св. Вита, или судорожный тикъ лица и проч. Къ судорогамъ относится также дрожаніе тѣла—подъ вліяніемъ ли сильнаго душевнаго волненія или какъ самостоятельная болѣзнь. Судорожный характеръ имѣетъ также ознобъ въ лихорадочной болѣзни, который у дѣтей часто выражается въ видѣ настоящихъ конвульсій.

Итакъ, къ общимъ судорогамъ относятся:

1) Конвульсії вслѣдствіе воспаленія или водянки мозга, конвульсії вслѣдствіе отравленія крови мочею (уремія) при воспаленіи почекъ, конвульсії вслѣдствіе глистовъ (у дѣтей), конвульсії въ теченіи острыхъ лихорадочныхъ болѣзней (наблюдаются лишь у дѣтей), конвульсії у дѣтей во время труднаго прорѣзыванія зубовъ, конвульсії у беременных и роженицъ (эклампсія)—см. соотвѣтствующія статьи. 2) Конвульсії чисто нервнаго происхожденія, какъ при эпилепсіи (падучей болѣзни). — Во всѣхъ этихъ случаяхъ сознаніе теряется.

Къ прочимъ формамъ судорогъ относятся:

1) Столбнякъ, общій и частичный, судорожное оцѣпенѣніе. 2) Пляска св. Вита. 3) Судорожныя состоянія при истеріи, неврастеніи и т. п. (см. общіе неврозы). 4) Профессиональныя судороги (писчій спазмъ, музыкальный спазмъ, спазмъ рукъ у портныхъ, сапожниковъ, кузнецовъ и проч.). 5) Спазмы внутреннихъ органовъ: желудка, кишечника, сердца, гортани, матки и проч.

Общія руководящія указанія для выдора лѣкарствъ противъ судорогъ съ краткой характеристикой главнѣйшихъ изъ нихъ:

Белладонна 3. Судороги у дѣтей при трудномъ прорѣзываніи зубовъ. Въ свѣжихъ случаяхъ падучей болѣзни. Во всѣхъ фор-

махъ судорогъ съ приливомъ крови къ головѣ, головокруженіемъ, расширенными зрачками, разстройствомъ глотанія, пѣной у рта, стѣсненіемъ въ груди. Судороги возобновляются или усиливаются при дотрагиваніи. Спячка и помраченіе сознанія съ сильной краснотой лица и искаженіемъ его чертъ; припадки бѣшенства, вскрикиваніе. Страхъ. Какъ Белладонна, но часто скорѣе дѣйствуетъ *Атропин. сульфурик. 3.*

Гіосціамусъ 3. Судорожное сжатіе челюстей, падучая, пляска св. Вита; особенно при пораженіи мозга, бредъ, пустая болтливость, видѣнія; страхъ съ крикомъ, въ промежуткахъ — помраченіе; лицо красное или багровокрасное, безпокойное метаніе въ разныя стороны, скрежетаніе зубами. Стѣсненіе въ груди, сухой кашель (сродственно *Беллад.* и *Опію*).

Игнація 3. Во всѣхъ формахъ судорогъ, особенно послѣ испуга. Страхъ, душевныя волненія. Подходить особенно для крайне впечатлительныхъ, раздражительныхъ субъектовъ, для истеричныхъ женщинъ и дѣтей. Мигрень. Давящая боль въ позвоночнѣ, какъ бы отъ гвоздя. Тошнота. Цвѣтъ лица часто мѣняется. При эпилепсіи въ свѣжихъ случаяхъ, припадки вызываются душевными волненіями. Судороги или подергиванія отдѣльныхъ членовъ.

Нуксъ вомика 3. Судороги, исходящія изъ спинного мозга, боль затылка и крестца, чувствительность позвонковъ. Особенно при окоченѣлости суставовъ, при судорогахъ икръ. Давленіе подъ ложечкой, желудочныя страданія, тяжесть въ головѣ, запоръ, скверное настроеніе, ипохондрія. Припадки вызываются досадой или огорченіемъ.

Цинкъ 3. Главное средство при конвульсіяхъ мозгового происхожденія у дѣтей. При конвульсіяхъ вслѣдствіе раздраженія отъ зубовъ или отъ глисть или при пляскѣ св. Вита. И у взрослыхъ вслѣдствіе нервнаго раздраженія мозга, съ потерей сознанія, съ расширенными и не суживающимися отъ свѣта зрачками; мышечныя подергиванія, пѣна у рта; особенно при одностороннемъ параличѣ, при холодныхъ конечностяхъ.

Купрумъ 3. Главное средство при хронической пляскѣ св. Вита и падучей, особенно съ ночными припадками; судороги начинаются съ конечностей. Потеря сознанія, потеря рѣчи, слюнотѣченіе, припадки удушья (послѣ плача), краснота лица и глазъ вслѣдствіе прилива крови; частое мочеиспусканіе.

Страмоній 3. Главное средство при конвульсіяхъ, особенно при падучей, но и въ другихъ формахъ, съ пораженіемъ преимуще-

ственно верхней половины тѣла; видѣнія, вскрикиванія, смѣхъ; въ движеніяхъ имѣется какъ бы цѣлесообразность; нелѣпая болтовня, заиканіе, глотательныя судороги. Припадки являются часто въ крестообразномъ порядкѣ, напримѣръ—правая верхняя и нижняя лѣвая конечность или наоборотъ; судорожныя движенія въ отдѣльныхъ мышечныхъ группахъ. Припадки появляются или усиливаются отъ дотрагиванія, или отъ возбужденія фантазіи, или отъ рѣзкаго свѣта и т. п.

Опій 3. Судороги, особенно послѣ испуга (подобно *Игнаци*), съ глубокимъ сномъ; напоръ крови къ головѣ, хрипѣніе и удушье, потеря чувствительности; метаніе въ разныя стороны и вскрикиваніе; припадки преимущественно ночные.

Хамомила 3. Судороги, особенно у дѣтей и у роженицъ; судороги послѣ чрезмѣрнаго раздраженія, досады, простуды; чрезмѣрная раздражимость нервной системы, душевное безпокойство, подергиванія во время сна: краснота одной щеки и блѣдность другой, лобъ горячій; во время пота жажда.—При этомъ поносы, колики, бессонница, громкое вскрикиваніе. Наклонность къ обмороку.

Коккулусъ 3. Судороги, особенно во время регулъ, у истеричныхъ и слабыхъ. Наклонность къ головокруженію съ тошнотой и шатаніемъ.

Арника 3. При судорогахъ, особенно при столбнякѣ, вслѣдствіе механическаго поврежденія или раненія.

Платина 3. Судороги, особенно столбнячныя, по утрамъ, при сохраненномъ сознаніи, у истеричныхъ; зависимость отъ разстройства регулъ. При судорогахъ отдѣльныхъ мышцъ. Припадки судорожнаго смѣха или плача. Особенно при судорожномъ сжатіи челюстей.

Вератрумъ 3. Судороги всѣхъ формъ, съ потерей сознанія, рѣчи, съ задержкой дыханія; сильная тоска; холодная кожа; поносы.

Мосхусъ × 3. У истеричныхъ особъ, также у страдающихъ нервнымъ сердцебіеніемъ; у дѣтей или женщинъ, страдающихъ припадками нервной астмы, также икотой; сильное охлажденіе тѣла. Внутренніе приемы можно замѣнить нюханіемъ 1-го или 2-го десятичнаго дѣленія.

Для излѣченія судорожной болѣзни приведенныя лѣкарства обыкновенно не достаточны бывають, а приходится еще обратить вниманіе на причину болѣзни, на нервно-душевное предрасположеніе, также на состояніе крови и соковъ организма, на его жизнеспособность вообще; на то, имѣется ли полнокровіе или

малокровіе, чрезмѣрное раздраженіе или истощеніе, золотуха, блѣдная немочь; засореніе или отравленіе крови; острые или хроническія сыпи; лихорадка, душевные аффекты или мѣстныхъ болѣзней головного или спинного мозга или какихъ нибудь нервныхъ участковъ и проч. Поэтому необходимо въ каждомъ случаѣ возможно подробнѣе разобраться и выбирать соотвѣтствующія средства. Всего чаще показанными являются: *Арсеникъ*, *Калькареа карбоника*, *Фосфоръ* (при вещественныхъ измѣненіяхъ мозга, при размягченіи).—*Плумбумъ* (при страданіяхъ спинного мозга).—*Силиція* (при эпилепсіи, являющейся въ опредѣленные сроки, съ переменной луны, и ночами).—*Станнумъ* (при эпилепсіи съ вечерними припадками; блѣдность лица, глисты).—*Сульфуръ* (когда болѣзнь развивается медленно, послѣ скрывшейся сыпи и ревматизма).—*Аргент. нитр.* (при столбнячныхъ судорогахъ).—*Камафора* (во всѣхъ формахъ судорогъ съ пораженіемъ мозга, вздутымъ и краснымъ лицомъ, хрипѣніемъ, оглушеніемъ, липкимъ потомъ и холодной кожей).—*Каустик.* (въ хроническихъ случаяхъ).—*Цина* (при легкихъ подергиваніяхъ у дѣтей въ зависимости отъ глистъ).—*Цикута* (также при глистахъ, съ блѣдностію, коликой, судорогой челюстей).—*Лазезисъ* (безсознательное состояніе, головокруженіе, сильное сердцебіеніе, нервная слабость, обмороки).—*Фосфоръ* (очевидная слабость, угрожающій параличъ мозга и легкихъ).—*Секале* (во всѣхъ случаяхъ пораженія спинного мозга, съ параличемъ мочевого пузыря и прямой кишки).—*Стрихнинъ* (столбнякъ); *Валеріана* (при истерическихъ судорогахъ съ глистными страданіями).

Вспомогат.
мѣры при
судорогахъ.

Больного надо привести въ наиболѣе удобное положеніе, разстегнуть платье, позаботиться о чистомъ воздухѣ помѣщенія; слѣдить затѣмъ, чтобы онъ не ударился о что либо, не упалъ съ постели, не прикусилъ себѣ языка или губы. Отъ холодныхъ или ледяныхъ компрессовъ на голову, равно какъ отъ горчичниковъ на спину и проч. не получается обыкновенно никакой пользы. При приливахъ къ головѣ всего лучше дѣйствуетъ туловищное обертываніе или обертываніе голеней; при малокровіи—согрѣваніе ногъ и туловища горячими бутылками. При запорѣ — опорожняющій клистиръ.

О дозахъ и повтореніи пріемовъ, также о дѣленіяхъ
см. ч. 1, гл. 3 и 4.

Судороги въ отдѣльных формахъ.

1) Конвульсіи у дѣтей, родимчикъ.

Конвульсіи у дѣтей начинаются обыкновенно подергиваніями отдѣльных мышечныхъ группъ и очень часто переходятъ въ дѣйствительныя судороги всего тѣла съ полной потерей сознанія. Состояніе это далеко не всегда безопасно, какъ принято думать въ народѣ, поэтому всегда требуетъ самаго серьезнаго вниманія. Въ большинствѣ случаевъ причиною является ненадлежащее кормленіе ребенка; затѣмъ простуда, душевныя волненія матери, также испугъ или внезапное прерваніе сна ребенка; играетъ также роль врожденное нервное предрасположеніе. Дальнѣйшими причинами служатъ: трудное прорѣзываніе зубовъ, раздраженіе отъ глисть и заболѣванія, сопровождающіяся приливами къ мозгу и высокой температурой тѣла.

Признаки
болѣзн

Во время самыхъ судорогъ обыкновенно не удастся давать внутрь лѣкарства и приходится ограничиваться примѣненіемъ наружныхъ вспомогательныхъ мѣръ и по возможности **наружнымъ примѣненіемъ лѣкарствъ**.

Лѣченіе

Главнымъ лѣкарствомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется приливъ крови къ головѣ или жаръ (повышенная температура) тѣла, является *Белладонна*. Если введеніе лѣкарства черезъ ротъ возможно, то дають черезъ 5—10 минутъ по 1—2 капли (*Беллад. 3*) съ нѣсколькими каплями воды; въ противномъ же случаѣ, втирають въ грудь и спину *оподельдокъ Беллад.* или смѣсь изъ 10 капель *Беллад.* 0 въ столовой ложкѣ водки или спирта. Умѣстно еще въ такихъ случаяхъ введеніе лѣкарства черезъ заднепроходную кишку (3—5 капель низкаго дѣленія въ столовой ложкѣ воды) посредствомъ маленькаго клистирнаго приспособленія.

Подобно Белладонѣ дѣйствуетъ *Гіосціамусъ*, также *Страмоній*.—*Опій* показанъ въ случаяхъ судорогъ, явившихся вслѣдствіе испуга.—Добавочными лѣкарствами являются: *Игнація*, *Нуксъ-вом.*, *Хамомилла*.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда судороги сопряжены съ малокровіемъ мозга, показаны: *Купрумъ*, *Вератрум.*, *Камфора*, также *Цинк.*, *Платина*, *Ипекакуана*.

Характеристики этихъ и еще другихъ противосудорожныхъ лѣкарствъ см. стр. 126—128.

Больного необходимо освободить отъ всякаго платья, или отъ пеленокъ, придать ему наиболѣе удобное положеніе въ по-

Вспомогательныя
мѣры

стели; поставить опорожняющій клистирь. При приливѣ крови къ головѣ, также при жарѣ—холодные компрессы на голову, отвлекающее обертываніе туловища. При блѣдномъ же лицѣ и отсутствіи жара — теплый компрессъ на голову и согрѣваніе ногъ; втираніе въ туловище камфорнаго спирта.

Предохран.
мѣры.

Къ предохранительнымъ мѣрамъ относятся: правильный уходъ за ребенкомъ и правильное его питаніе; кормящая грудью мать или кормилица должна избѣгать всякихъ вредныхъ вліяній, между прочимъ—спиртныхъ напитковъ и наркотическихъ веществъ.

Важное предохранительное значеніе имѣтъ и лѣкарственное лѣченіе, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда судорогамъ предшествуютъ предвѣстники, какъ плохое настроеніе, плаксивость, капризность, нерасположеніе къ играмъ; внезапное вздрагиваніе при неожиданномъ прикосновеніи, бессонница или безпокойный сонъ съ неполнѣ закрытыми вѣками, или скашиваніемъ рта, или скрежетаніемъ зубовъ; частая смѣна цвѣта лица; синеватая окраска вокругъ рта и глазъ, безпричинное вскрикиваніе, неравномѣрное дыханіе; какъ бы заостреніе носа и подбородка. При подобныхъ симптомахъ показаны: *Игнація* или *Нуксъ-вомика*, *Хамомила*, *Коффеа*. — При повышенной температурѣ тѣла: *Аконитъ*, *Белладонна*.—При трудномъ прорѣзываніи зубовъ: *Беллад.*, *Калькарея-карбоника*, *Калькарея-фосфорика*.—При поносѣ: *Ипекакуана*, *Меркурій*, *Вератр.*, *Арсеникъ*.—При глистахъ: *Цина*, *Меркур.* солуб. и проч. (см. соотвѣств. болѣзни въ другихъ мѣстахъ этой книги).

О дозахъ и повтореніи пріемовъ, также о дѣленіяхъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.

2) Эклампсія у беременныхъ.

Судороги у беременныхъ встрѣчаются въ послѣдніе мѣсяцы беременности, или во время родовъ. Въ мочѣ въ такихъ случаяхъ оказывается бѣлокъ, свидѣтельствующій о заболѣваніи почекъ. Это обстоятельство надо имѣть въ виду, такъ какъ болѣзнь, во время распознанная, можетъ быть соотвѣтствующимъ лѣченіемъ устранена. Во время беременности надо, слѣдовательно, время отъ времени изслѣдовать мочу на бѣлокъ, и при первомъ его появленіи примѣнить *Аписъ* $\times 3$ и другія средства, указанныя при воспаленіи почекъ. Когда судороги уже наступили, то лѣчить какъ судороги вообще (см. выше). Эклампсія можетъ служить

поводомъ къ ускоренію родовъ или къ искусственному прерванію беременности, но объ этомъ надо ужъ совѣтоваться съ врачомъ.

3) Падучая болѣзнь (Эпилепсія).

Въ легкихъ формахъ существеннымъ явленіемъ оказывается исключительно нарушеніе сознанія (душевная эпилепсія) въ видѣ припадковъ головокруженія, внезапнаго засыпанія или кратковременнаго помраченія сознанія, при легкомъ закатываніи глазъ, скоро переходящемъ оцѣпенѣніи и нѣкоторыхъ своеобразныхъ подергиваніяхъ.

Въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ къ потерѣ сознанія присоединяются судороги во всемъ тѣлѣ, причемъ больной внезапно падаетъ куда ни попало, часто метаясь, барахтаясь и кувыркаясь на землѣ (или на полу); большой палецъ руки судорожно загибается обыкновенно во внутрь кулака, а изо рта выдѣляется пѣна. Тяжесть и частота, равно какъ продолжительность этихъ припадковъ, зависятъ отъ степени душевнаго расстройства, имѣющаго часто характеръ настоящаго умственнаго помѣшательства.

Главная причина падучей — наслѣдственное нервнодушевное предрасположеніе; способствующими же моментами могутъ быть: плохое питаніе, нервныя и душевныя потрясенія, половыя излишества, спиртные напитки; также зарубцеваніе оконечностей нервовъ (вслѣдствіе ранъ), или давленіе на нихъ или на мозгъ (опухолями) и проч.

Излѣченіе обыкновенно удается лишь до нѣкоторой степени, но бываютъ случаи и полнаго излѣченія, особенно при благопріятствующихъ тому условіяхъ жизни. Если болѣзнь дошла до степени умственнаго помѣшательства или идіотизма, тогда уже нѣтъ никакой надежды на улучшеніе.

Для предотвращенія припадковъ въ томъ случаѣ, когда больной предчувствуетъ его приближеніе, совѣтуется: проглотить полъ-чайной ложки поваренной соли при непріятномъ ощущеніи въ подложечной ямкѣ, каковымъ обыкновенно начинается припадокъ падучей; если онъ начинается подергиваніемъ руки или ноги—туго обвязать ту или другую; если начинается приливомъ крови къ головѣ, то приложить къ ней холодный компрессъ, при блѣдности лица—завернуть голову шерстянымъ платкомъ или, какъ еще рекомендуютъ, чернымъ шелковымъ платкомъ, ноги же согрѣть чѣмъ-либо теплымъ. При запорѣ позаботиться

о своевременномъ опорожненіи кишечника. Въ тѣ дни, когда больной чувствуетъ себя неладно, ему слѣдуетъ воздерживаться отъ ѣды и питья, принимая таковыя лишь въ самыхъ малыхъ количествахъ, но и вообще подверженнымъ падучей болѣзни необходимо нормальный образъ жизни, лишенный всякаго рода излишествъ. Спиртные напитки, кофе и крѣпкій чай вредны.

Вспомогат.
мѣры.

Во время припадка—принять прежде всего мѣры къ тому, чтобы больной себя какъ-нибудь не повредилъ; если языкъ ущемленъ между зубами, надо раздвинуть челюсти и освободить его; голову помѣстить повыше, платье разстегнуть.

Лѣчение
падучей.

Лѣкарственное лѣчение во время самаго припадка можетъ быть развѣ только наружное въ видѣ втиранія соотвѣтствующаго средства въ кожу или путемъ введенія раствора такового въ прямую кишку посредствомъ маленькихъ клистировъ, какъ указано выше при „конвульсіи у дѣтей“. Главнымъ же образомъ лѣкарства приниматься должны въ свободное отъ припадковъ время.

Что же касается выбора лѣкарствъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, то таковой не долженъ быть шаблоннымъ. При выборѣ лѣкарствъ надо руководствоваться не только характеромъ самаго припадка, но и общимъ состояніемъ здоровья больного. Если имѣются какія-либо расстройства въ дѣятельности отдѣльныхъ органовъ, то ихъ необходимо лѣчить соотвѣтствующими лѣкарствами, хотя бы расстройства эти и не имѣли прямого отношенія къ припадкамъ.

Очень часто, рядомъ съ противосудорожными лѣкарствами, полезнымъ оказывается *Аконитъ*, благодаря, должно быть, его благотворному вліянію на сердце. Изъ противосудорожныхъ лѣкарствъ на первомъ планѣ стоятъ *Белладонна* и *Нуксъ-вомика* или *Игнація*. Дѣленія этихъ лѣкарствъ выбираются отъ 3 до 6 и 30-го; чѣмъ болѣе нервенъ темпераментъ больного, тѣмъ болѣе высокое дѣленіе показано, и чѣмъ выше дѣленіе лѣкарства, тѣмъ рѣже должны быть приемы такового.

Изъ прочихъ лѣкарствъ часто показаны при эпилепсіи: *Купрумъ*, *Цикута* ($\times 3$ — 3), *Опій*, *Страмоній*, *Гіосціам*. *Цинк.*, *Агарик.*, *Артемизія*, *Рана буфо*.

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ болѣзнь находится въ нѣкоторой зависимости или связи съ половыми излишествами, онанизмомъ, поллюціями, показаны: *Фосфоръ*, *Фосфори ацид.*, *Хина*, *Нуксъ вом.*, также *Дигиталисъ* (въ низкихъ дѣленіяхъ или *Дигиталинъ* $\times 3$ — растир.).

Калькареа карбон., *Барита карбон.*, *Силиція*, *Арсеник*, и т. п. могутъ служить полезными дополнительными лѣкарствами, дѣйствующими на общее состояніе организма (золотуха, малокровіе и проч.).

4) Столбнякъ.

Обозначаетъ не подергивающую судорогу, а непрерывное сокращеніе, очоженіе отдѣльныхъ группъ или всѣхъ мышцъ тѣла. Въ первомъ случаѣ, когда обыкновенно поражаются мышцы челюстныхъ, получается такъ называемый тризмусъ (судорожное сжатіе челюстей), во второмъ случаѣ—общій столбнякъ тѣла, тетанусъ. Сознаніе при этой болѣзни не подавлено. Самая частая причина—поврежденіе нервовъ (ущемленіе, раненіе или разрывъ), затѣмъ—сильная простуда при вспотѣвшемъ тѣлѣ, также отравленіе. Тенанусъ очень опасенъ и въ большинствѣ случаевъ кончается смертью.

Тризмъ и
Тенанусъ

Къ этому роду судорогъ относится и такъ назыв. каталепсія, полустолбнякъ: произвольныя движенія мышцъ вдругъ прекращаются, больной остается въ томъ положеніи, въ которомъ его постигла судорога, и мышцы пріобрѣтаютъ воскообразную гибкость, благодаря которой членамъ можно придавать любое положеніе, котораго больной не въ состояніи произвольно измѣнить.

Каталепс

У дѣтей вслѣдствіе столбняка остаются иной разъ на всю жизнь контрактуры (сведенія) членовъ, по большей части въ пальцахъ рукъ или ногъ, или въ ступняхъ, локтяхъ. Причинами болѣзни являются у дѣтей: трудное прорѣзываніе зубовъ, простуда, мозговые страданія. Поражаются такимъ образомъ чаще всего дѣти, страдающія англійской болѣзнію.

Главное лѣкарство вообще—*Нуксъ вомика* (или *Стрихнинъ*) въ болѣе высокихъ дѣленіяхъ. Кромѣ того—*Арника*—послѣ поврежденія или раненія (также *Гиперик.*); въ случаяхъ же простуднаго происхожденія—*Аконит.*, *Дулькамара*, *Русъ*. Надо имѣть въ виду также *Цикута*, *Вератр.*, *Цинк. ціанат*, *Лазезисъ*, *Секале*.

Лѣченіе

Противъ судорожнаго сжатія челюстей: *Камфора*, *Гіосціам.*, *Белладонна*.

Изъ вспомогательныхъ мѣръ цѣлесообразны влажныя обертыванія, теплыя ванны, втиранія теплымъ масломъ съ *Акон.*, *Белл.*, *Русъ*, также камфорнымъ масломъ.

5) Пляска св. Вита (Хорея).

Признаки.

Пляска св. Вита характеризуется произвольными движениями мышц, при сохранении сознания, и лишь усиленной нервно-душевной раздражимостью, и поражает преимущественно детей, очень редко—взрослых, и то—женщин гораздо чаще, чем мужчин. Она начинается неуверенностью в движениях, прежде всего—в руках, затем в ногах и прочих частях тела. Больной производит руками нецелесообразные движения, при чем последние не соответствуют намерениям его; так, он не в состоянии подносить правильно ложку ко рту, равно как ему невозможно удержать свои руки в покое; ногами постоянно двигает, несмотря на желание не делать этого. Мало по малу являются произвольные движения в лице, гримасничанье, внезапные поворачивания и закидывания головы; при еще большем развитии болезни больной не может даже в кровати лежать спокойно, но его бросает в разные стороны. Только во сне да в темноте все судорожные явления прекращаются, с тем, чтобы по пробуждении опять возобновиться. Таким образом, в большей или меньшей степени, болезнь продолжается недѣль 10—12 (и больше), затем постепенно проходит совсем, или же остаются подергивания отдельных мышц.

Причины.

Ближайшая причина болезни—раздражительное состояние мозга, но не всегда можно определить с точностью, чем собственно в каждом случае оно вызывается: ненадлежащим ли питанием, душевными волнениями (испугом, страхом), глистами и проч. Для проявления этой болезни необходима во всяком случае врожденная раздражительность нервной системы; удостоверена также возможность, так сказать, заражения этой болезнью путем невольного подражания со стороны других детей, среди которых находится больной или больная.

Лѣчение.

В случаях более легких можно начать лечение с *Купрумъ*, которое одно достаточно бывает для излечения, в более же трудных случаях лучше будет давать это средство поздное, после того как сильные судорожные явления замѣтно уменьшились.—Когда все мышцы тела поражены судорогой, и больной то и дѣло находится в непрерывном произвольном движении, главным лѣкарством является *Страмоній*, который тут больше подходит, чем *Беллад.* или *Гюсциам.* (при „конвульсиях“—см. выше—отношение обратное).—Подходящим лѣкарством при хо-

реѣ надо считать и *Игнація*, особенно если причина болѣзни— испугъ или сильное душевное потрясеніе.—Очень важное лѣкарство при хорѣ—также *Цинк.*, который умѣстенъ особенно тогда, когда общее состояніе здоровья больного значительно ухудшается вслѣдствіе судорогъ. Въ такихъ случаяхъ показанъ и съ большой пользой примѣняется *Арсеник.* $\times 4$ — $\times 3$ предпочтительно въ порошковомъ видѣ (въ растираніи), 3 приема въ день (непосредственно передъ кушаньемъ), сначала, въ теченіе 8—10 дней, въ $\times 4$ дѣленіи, затѣмъ—въ $\times 3$ -мъ.

Смотря по теченію болѣзни, надо имѣть еще въ виду; *Асафетида*, *Цина*, *Русь*, *Пульсат.*, *Сульфуръ*, *Хина*. Эти средства, а также *Каустик.*, *Коккул.*, особенно же указанное уже выше *Купрум.*, примѣняются, именно, противъ остатковъ болѣзни, когда всѣ рѣзкія явленія ея уже прошли.

Для предохраненія отъ заболѣванія пляской св. Вита очень важно надлежащее, нормальное воспитаніе ребенка, особенно— въ періодъ второго прорѣзыванія зубовъ и при имѣющемся нервномъ предрасположеніи. Необходимо устранять всѣ поводы къ душевнымъ волненіямъ и чрезмѣрныя тѣлесныя и умственные напряженія. Уже при первыхъ признакахъ болѣзни ребенокъ долженъ оставаться дома и не дѣлать никакой тѣлесной и умственной работы. Всякаго рода чрезмѣрныя развлеченія, оживленные игры и смѣны новыхъ впечатлѣній вредно отражаются на психику больного. Полезно пребываніе въ деревнѣ или на берегу моря. Правильный сонъ для больного очень благотворенъ, поэтому онъ долженъ оберегаться отъ всякаго шума; не слѣдуетъ будить ребенка и ради очередныхъ приемовъ лѣкарствъ.—Полезны теплыя ванны (28—29° Р., втеченіе 15—20 минутъ) съ послѣдующимъ лежаніемъ въ постели. Въ болѣе легкихъ случаяхъ, когда нижнія конечности и туловище не поражены судорогами, больной можетъ дѣлать днемъ умѣренные движенія и вообще подолгу находится внѣ постели; въ противномъ же случаѣ, когда о ходьбѣ не можетъ быть рѣчи, онъ долженъ лежать въ постели въ затемненной и почаще провѣтриваемой комнатѣ. Лѣтомъ онъ можетъ лежать большую часть дня и на вольномъ воздухѣ, также передвигаться, лежа въ телѣжкѣ. Діета должна быть легкая, вмѣстѣ съ тѣмъ простая и питательная. Пищу давать часто въ малыхъ количествахъ. Вечерняя ѣда должна быть не слишкомъ поздняя.— Въ случаяхъ, гдѣ можно подозрѣвать наклонность къ онанизму, необходимъ надлежащій надзоръ для предотвращенія этого пагубнаго порока.

6) Спазмы внутреннихъ органовъ.

Спазмы или судорожныя боли бывають въ тѣхъ внутреннихъ органахъ, которые состоятъ между прочимъ изъ мышечной ткани, какъ наприм., желудокъ, кишечникъ, сердце, мочевой пузырь, женскіе половые органы; часто встрѣчается и спазмъ гортани. Спазмы могутъ быть и чисто нервнаго характера, причемъ они или самостоятельны или сопутствуютъ другимъ заболѣваніямъ органовъ, наприм.—печени (желчная колика вслѣдствіе судороги выводного протока при прохожденіи желчнаго камня), почекъ (почечная колика), желудка (гастралгія, кардіалгія). Спазмы обусловливаются часто приливами къ органамъ или вещественными въ нихъ измѣненіями (катарръ, воспаленіе, язвы, ракъ и проч.).

Лѣченіе должно быть преимущественно причинное. Тутъ же приводятся лишь тѣ лѣкарства, которыя показаны въ чисто нервныхъ спазмахъ, или во время самаго приступа, помимо основныхъ лѣкарствъ, соотвѣствующихъ причинѣ болѣзни.

а. Спазмы желудка и живота.

Лѣченіе.

При спазмѣ желудка примѣняются: *Бисмут*. 1—боль подъ ложечкой, ощущается насквозь до спины, пищевареніе же не нарушено. При симптомахъ же несваренія, запорѣ, геморроѣ показана *Нуксѣ вомика* $\times 3$, особенно у раздражительныхъ субъектовъ и привычныхъ къ вину.—*Игнація* $\times 3$: при нервномъ спазмѣ, особенно у женщинъ и дѣтей.—*Кококкулусъ* $\times 3$: у истеричныхъ и слабыхъ особъ; боль чаще послѣ ѣды; скопленіе газовъ въ животѣ и облегченіе послѣ ихъ отхожденія.—*Хамомила* $\times 3$: при спазмѣ послѣ огорченія, досады, при склонности къ поносамъ.—*Белладонна* $\times 3$: боль очень сильная, съ приливомъ къ головѣ, особенно у женщинъ, дѣтей и у особъ вообще очень чувствительныхъ.

При спазмѣ въ животѣ: при чисто нервномъ спазмѣ главными лѣкарствами являются *Беллад.*, *Хамомила*, *Асафетида* $\times 3$; при спазмѣ отъ прилива къ брюшнымъ органамъ, какъ это бываетъ пригеморроѣ, обильныхъ регулахъ, показаны: *Нуксѣ вомика*, также *Беллад.*, *Хамомил.*, *Гвако*; при сопутствующемъ воспаленіи: *Акон.* $\times 3$, *Бріонія* $\times 3$, *Беллад.* 3, *Меркур. солуб.* 3.—У ревматиковъ или подагриковъ: *Колоцинтъ* 3.—При спазмѣ отъ прохожденія камней: *Беллад.* $\times 3$ или *Атропин. сульф.* $\times 4$, *Вератр.* $\times 2$,

Колоцинтъ, Хамомила. — При спазмѣ мочевого пузыря: *Кантарисъ 3, Каннабисъ 1, Беллад.* или *Гіосціам. × 3.*

Изъ вспомогательныхъ мѣръ при приведенныхъ формахъ спазмъ главною является примѣненіе теплоты къ болящему мѣсту въ видѣ паровыхъ компрессовъ. Облегчаетъ также наружное примѣненіе *Белладонна* Θ и т. п.

б. Спазмъ сердца. Грудная жаба.

Приступы грудной жабы сопровождають иногда пороки или ожирѣніе сердца или болѣзни аорты или вѣнечныхъ (въ самомъ сердцѣ) артерій сердца, но чаще наблюдаются въ видѣ самостоятельной нервной болѣзни сердца. Они состоятъ изъ внезапно наступающихъ, время отъ времени, болѣе въ области сердца, устремляющихся въ лѣвое, рѣже и въ правое плечо; при этомъ имѣется крайне тягостное ощущеніе тоски и стѣсненія (такъ наз. предсердечная тоска), дыханіе большей частію неправильно, либо ускорено, либо замедлено, точно также дѣятельность сердца; кожа блѣдная и холодная, тогда какъ къ концу припадка она становится теплой и покрывается обильнымъ потомъ. Продолжительность припадковъ иной разъ лишь нѣсколько минутъ, иной разъ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ часа и еще бѣдшая.

Признаки
теченіе.

Во время самаго приступа часто получается быстрое облегченіе отъ вдыханія камфоры, въ видѣ, именно, *Каифора Рубини*, которой можно и внутрь принять 2 или 3 капли на сахарѣ, измельченномъ въ порошокъ. При сильномъ сердцебіеніи и стѣсненіи въ груди и если лицо при этомъ блѣдное, даютъ *Глоноинъ 3* (или 6); если, наоборотъ, лицо красное, тогда — *Глоноинъ 1*. Въ 3—6-мъ дѣленіи *Глоноинъ* берется въ обычныхъ и частыхъ приѣмахъ, въ первомъ же дѣленіи 1—2 приѣма по 1—2 капли на сахарѣ. Часто еще скорѣе кончается приступъ, если принять *Арника × 3* попеременно съ *Глоноинъ × 3* или 3 съ 2—3-минутными промежутками. Страдающимъ грудной жабой рекомендуется носить съ собою, на случай надобности, эти два лѣкарства въ видѣ крупинокъ или пилюль (для удобства приѣмовъ).

Лѣченіе

При сердцебіеніи съ полнымъ пульсомъ и приливомъ къ головѣ очень полезенъ и часто предупреждаетъ приступъ грудной жабы *Аконитъ × 3*, который цѣлесообразно примѣнять и наружно въ видѣ оподельдока, втирая въ область сердца и вообще въ грудь. — При стучаніи въ вискахъ, нервномъ безпокойствѣ и не-

обычайно быстромъ и неравномѣрномъ дыханіи показана *Белладонна* $\times 3$ внутрь и *Беллад.* Θ наружно.—При сильной слабости—*Мосхусъ* $\times 3$, также *Вератрум. альб.* $\times 2$.—При порокѣ сердца—*Спигелія* $\times 3$, *Кактусъ* $\times 3$, *Дигиталисъ*, *Кальмія*.

Въ свободное отъ приступовъ время подходить, кромѣ уже приведенныхъ средствъ, еще *Арсеник.*, *Аурумъ муриат.*, *Каликарбон.* и др., смотря по общему состоянію организма и по основной болѣзни.

Вспомогат.
мѣры.

Во время приступа грудной жабы необходимо прежде всего разстегнуть платье, особенно—тѣсные воротники, придать больному наиболѣе удобное положеніе и впустить въ помѣщеніе свѣжій чистый воздухъ. На область сердца класть, часто смѣняя, холодные компрессы въ томъ случаѣ, если сердцебіеніе бурное, пульсъ полный и быстрый или имѣется приливъ къ головѣ. Наоборотъ, при слабомъ пульсѣ, т. е. при ослабленной дѣятельности сердца, у малокровныхъ, при похолодѣніи тѣла—горячій или паровой компрессъ.—Больные, страдающіе грудной жабой, должны вести возможно болѣе нормальный и спокойный образъ жизни; не употреблять никакихъ спиртныхъ напитковъ и не курить табака; не пить кофе и крѣпкаго чаю. Не предаваться никакому спорту.

в. Спазмъ легкихъ. Астма.

Опредѣленіе
понятія
„астма“.

Подъ астмой разумѣютъ собственно одышку, имѣющую больше характеръ нервно-спазматического страданія, чѣмъ органическаго; это происходитъ отъ того, что съ одной стороны не всегда очевидна причина, ее вызывающая, съ другой—страданіе это, является припадками, отдѣляющимися другъ отъ друга часто довольно продолжительными промежутками времени, въ которые больной чувствуетъ себя вообще здоровымъ. Такимъ образомъ, когда причина неопредѣлима, говорятъ о нервной астмѣ; насколько же она зависитъ отъ состоянія другихъ органовъ, различаютъ астму диспепсическую (вслѣдствіе расстройства пищеваренія, на примѣръ—скопленія газовъ въ кишечномъ каналѣ), астму сердечную (при порокахъ или ожирѣніи сердца), астму бронхіальную, (при катаррѣ бронховъ), астму половую (особенно у женщинъ, вслѣдствіе разстройствъ въ половой сферѣ).

Лѣченіе.

Во время самаго припадка примѣняются:

Каннаб. сатив. $\times 2$ черезъ каждыя 5 минутъ по 3 — 5 ка-

пель: при одышкѣ, доходящей до степени удушья. — *Беллад.* × 3: при свистящемъ дыханіи, сопровождаемомъ щекочущимъ кашлемъ. — *Ипекак.* × 3: при тошнотѣ, позывѣ на рвоту, при судорожномъ стягиваніи въ гортани. — *Арсен.* × 3: когда это судорожное стягиваніе достигаетъ высшей степени; при этомъ: вздутіе живота, сердцебіеніе, произвольное мочеиспусканіе. Ночные припадки. — *Мосхусъ* × 3: ощущеніе какъ при вдыханіи сѣрныхъ паровъ, подергиваніе рукъ и ногъ или оцѣпенѣніе тѣла. — *Нафталин.* × 3: если имѣется эмфизема легкихъ (см. эту болѣзнь). — При бронхіальной астмѣ (см. эту болѣзнь): *Стибіумъ арсеникозумъ* × 3, которое полезно принимать еще нѣкоторое время послѣ припадка. — *Карбо-вегет.*: при вздутіи газами.

Кромѣ того надо еще имѣть въ виду слѣдующія лѣкарства:

Бріонія × 3: при брюшныхъ приливахъ; припадки преимущественно ночью или раннимъ утромъ съ коликой въ животѣ и запоромъ; колотье въ груди или давленіе, съ ухудшеніемъ отъ разговора или движенія; животъ напряженъ, твердъ; облегченіе отъ кашля.

Нуксъ вомика × 3: подобно Бріоніи и кромѣ того: короткое, медленное, свистящее дыханіе съ ощущеніемъ стягиванія, понуждающаго къ сидячему положенію; ухудшеніе отъ холоднаго воздуха; облегченіе при лежаніи на спинѣ.

Аконитъ × 3: особенно при сильномъ сердцебіеніи, при приливахъ, жарѣ, безпокойствѣ, полномъ пульсѣ (рядомъ съ другими лѣкарствами, въ видѣ питья).

Фосфоръ × 3: при органическихъ измѣненіяхъ въ легкихъ, въ сердцѣ; стѣсненіе въ груди, тоска, внезапные ночные приступы удушья, какъ бы отъ паралича легкихъ; судорожное стягиваніе въ груди.

Тартар. эметик. × 3 — 3: при обильномъ скопленіи мокротъ въ легкихъ; при расширеніи (эмфиземѣ) легкихъ, особенно у старыхъ людей; ухудшеніе отъ движенія; лучше въ сидячемъ положеніи.

Вератр. альб. × 3: въ случаяхъ, подобныхъ Ипекакуанѣ, но болѣе сильныхъ; припадки удушья со стягиваніемъ въ горлѣ и обморочнымъ состояніемъ; холодный потъ, холодныя конечности, дорожный кашель, сердцебіеніе, тоска.

Страмоній × 3: при сопутствующемъ пораженіи спинного мозга и при мозговыхъ страданіяхъ.

Аммоній карбоник. × 3 и *Игнація* × 3 въ болѣе легкихъ фармахъ астмы, особенно у нервныхъ, истеричныхъ особъ.

Лобелія 1: при туберкулезѣ, при эмфиземѣ, при хроническомъ катаррѣ дыхательныхъ органовъ.

Дигиталисъ 1: при сердцебіеніи съ расширеніемъ венъ; головная боль послѣ или вслѣдствіе половыхъ излишествъ.

Аурумъ 3 или *Аурумъ муріатик. × 3:* при осложненіи со стороны сердца, неврозъ сердца у ипохондриковъ.

Особенное вниманіе должно удѣлять систематическому и выдержанному лѣченію основной болѣзни и общаго состоянія организма вообще.

Вспомогат
мѣры.

Освободить отъ всякой тѣсной одежды, придать больному наиболѣе удобное положеніе, освѣжить комнатный воздухъ. Мало помогаютъ раздражающія средства, вродѣ горчичниковъ, равно какъ горячія ножныя ванны. Временно облегчаютъ *страмониумъ-сигаретки*, примѣняемыя въ аллопатіи, также сжиганіе селитряной бумаги и вдыханіе выдѣляющихся при этомъ паровъ. При запорѣ или вздутіи живота газами опорожняющій клистирь изъ воды комнатной температуры.

г. Спазмъ гортани.

Опредѣленіе
болѣзни.

Спазмъ гортани или, вѣрнѣе сказать, голосовыхъ связокъ выражается моментальной задержкой дыханія, имѣетъ чисто нервное происхожденіе и обусловливается судорожнымъ сжатіемъ голосовой щели. Чаще всего поражаются малокровныя и рахитичныя дѣти. Въ легкой степени онъ замѣчается очень часто у дѣтей при сильномъ плачѣ или смѣхѣ (ребенокъ „заходится“) или при внезапномъ вдыханіи холоднаго воздуха, но также иногда у взрослыхъ при тѣхъ же условіяхъ. Въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ, именно у дѣтей, въ первые три года жизни, задержка дыханія гораздо продолжительнѣе и сопровождается часто судорогами, посинѣніемъ лица, или же, чаще, крайней блѣдностью лица, при отсутствіи всякаго движенія и потерю сознанія, такъ что ребенокъ лежитъ, какъ мертвый. Припадокъ такой крайне опасенъ для жизни и можетъ окончиться смертію ребенка, если не придти ему немедленно на помощь. Послѣдняя заключается въ томъ, чтобы, не теряя ни секунды времени, брызнуть зашедшемуся ребенку въ лицо пригоршней холодной воды, разъ—другой, и если это не помогаетъ, или же въ то же время, производить искусственное дыханіе подниманіемъ вверхъ и опусканіемъ (прижатіемъ къ груди) его локтей, при положеніи его на спинѣ, нѣ-

сколько разъ—до тѣхъ поръ, пока онъ очнется. Цѣлесообразно поднести къ носу губку или ватку съ нѣсколькими каплями нашатырнаго спирта.

Спазмъ гортани выражается еще въ другой формѣ, въ формѣ такъ наз. **Милларовой астмы**, которая встрѣчается у дѣтей и имѣетъ подобіе крупа. отличаясь отъ послѣдняго отсутствіемъ воспалительнаго состоянія и періодичностію приступовъ. Вслѣдствіе внезапной судороги гортанныхъ мышцъ лицо становится багово-краснымъ, въ глазахъ выражается страхъ, голова запрокидывается назадъ, конечности разслаблены и протянуты или судорожно сведены. Ребенокъ холодѣетъ, мучительно тянется за воздухомъ, издавая рѣдкіе свистящіе звуки, часто въ теченіе цѣлой минуты. Сознаніе въ большинствѣ случаевъ сохранено. Послѣ припадка ребенокъ чувствуетъ себя хорошо. Но приступы все повторяются въ теченіе сутокъ 2—3 и болѣе разъ, преимущественно ночью. Это мучительное состояніе можетъ имѣть мозговое происхожденіе или же оно происходитъ отъ раздраженія идущихъ къ гортани нервовъ, какъ, напримѣръ, вслѣдствіе опуханія близъ лежащихъ железъ, и, наконецъ, оно можетъ быть рефлексомъ (отзвукомъ) иныхъ разстройствъ, какъ прорѣзываніе зубовъ, глисты, ненормальное пищевареніе, простуда и проч. Дѣти, поражающіяся Милларовой одышкой, въ большинствѣ случаевъ одержимы рахитомъ (англійской болѣзнію).

Милларс
одышн

Выше уже сказано, что надо предпринять во время самаго приступа спазма гортани. Для предупрежденія приступа необходимо заботиться о возможно болѣе нормальномъ физическомъ развитіи ребенка; внутрь давать лѣкарства противъ малокровія или золотухи или англійской болѣзни, смотря по каждому данному случаю; къ такимъ лѣкарствамъ относятся: *Арсеник.*, *Калькареа фосфорика* или *Карбоника*, *Сульфуръ*, *Гепаръ сульф.*, *Силиція*; для успокоенія нервной системы *Игнація*, *Хамомилла*. Во время самаго припадка можно дать *Купрумъ ацетик.*, *Вербатрумъ альб.*, *Игнація*.

Предуп
мѣр

Противъ Милларовой одышки: *Ипекакуана*, *Тартар. эметикъ*, *Беллад.*, *Купрумъ*, *Игнація*, *Гельземинъ*. Также *Самбукусъ 1* или въ чистой тинктурѣ.—Давать попеременно или поочереди 2 или 3 лѣкарства. Предупреждающее лѣченіе то же, что и при спазмѣ гортани вообще.

д. Спазм грудобрюшной преграды. Нервная икота.

Икота является часто отъ охлажденія, особенно у маленькихъ дѣтей, также отъ торопливаго питья, и обыкновенно скоро **проходитъ** сама собою при согрѣваніи тѣла или отъ пары глотковъ **теплаго** питья. Помогаетъ также, особенно у дѣтей, небольшое количество **мелкаго сахара** (на кончикѣ ножа), принятое сухимъ въ ротъ. Икота **сопровождаетъ** часто болѣзни желудка, особенно—его спазмъ, у **нервныхъ**, истеричныхъ особъ. Въ нѣкоторыхъ тяжелыхъ болѣзняхъ появленіе упорной икоты служитъ часто предзнаменованіемъ дурного исхода.—Противъ нервной икоты показанъ *Коккулусъ*, также *Белладонна*, *Игнація*, *Гельземинъ*.

е. Спазм смѣха и плача.

Является особой формой грудобрюшнаго спазма и бываетъ у истеричныхъ субъектовъ, иной же разъ является симптомомъ болѣе глубокаго страданія. Главныя лѣкарства, показанныя при такомъ симптомѣ, суть: *Игнація*, *Хамомилла*, *Опій* (послѣ испуга), *Пульсатилла* (при маточныхъ разстройствахъ) и др. (ср. ниже о „Неврозахъ“).

ж. Спазм рѣчи, заиканіе.

Заиканіе состоитъ въ томъ, что нѣкоторые слоги или отдѣльныя буквы не могутъ произноситься свободно, судорожно задерживаясь или повторяясь по нѣскольку разъ. Зависитъ оно отъ спазма языка или гортани и является или усиливается отъ душевнаго волненія, испуга, гнѣва. Заиканіе можетъ быть симптомомъ вещественнаго измѣненія въ мозгу, напримѣръ—послѣ апоплексическаго удара или механическаго поврежденія.

Болѣе или менѣе благопріятные результаты отъ лѣченія можно надѣяться получить лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда заиканіе происходитъ отъ судорожнаго состоянія органовъ рѣчи. *Страмоній* 6—30 есть первое лѣкарство, какое слѣдуетъ примѣнить, 2—3 раза въ день по приему.—Изъ другихъ лѣкарствъ значаются: *Опій* 3—при заиканіи вслѣдствіе испуга; *Игнація* 3—при усиленіи заиканія отъ душевнаго волненія; *Белладонна* 3—при сопровождающемъ приливѣ къ головѣ; *Глоноинъ* 3—при сильномъ сердцебіеніи нервнаго происхожденія; *Арника* 3—когда при-

чиной было поврежденіе. — Рекомендуются еще *Бовиста 3*. — Необходимо обратить вниманіе въ каждомъ случаѣ на нервную систему больного и выбирать соотвѣтствующія лѣкарства.

Изъ вспомогательныхъ мѣръ полезны гимнастическія упражненія, особенно по утрамъ, способствующія болѣе глубокимъ вдыханіямъ воздуха въ легкія. Поэтому же заикѣ рекомендуется производить глубокой вздохъ каждый разъ, когда онъ находится въ затрудненіи выговорить слово. Во время разговора онъ долженъ равномерно и глубоко дышать и стараться говорить не слишкомъ медленно и не слишкомъ быстро.

7) Профессіональныя судороги.

Самая частая форма этихъ судорогъ есть такъ называемый писчий спазмъ; затѣмъ встрѣчается еще музыкальный спазмъ, у играющихъ на роялѣ или струнныхъ инструментахъ, а также спазмъ рукъ у портныхъ, сапожниковъ, кузнецовъ, спазмъ ногъ у работающихъ на ножной швейной машинѣ и т. д. Причина — чрезмѣрно продолжительное напряженіе нервовъ или чрезмѣрная ихъ раздражимость. Развивается на почвѣ общей нервозности.

Каустик. × 3 и *Белладонна 3* рядомъ съ *Арника × 3* всего больше приносили пользу въ такихъ случаяхъ. Послѣднія 2 лѣкарства также въ наружномъ употребленіи въ видѣ согревающихъ компрессовъ и втираній. Рекомендуются также *Станнумъ 3* и *Русъ × 3*, также *Вератр. альб. × 3*.

III. Параличи. Парезы.

Подъ параличемъ разумѣютъ полную потерю движенія въ мышцахъ и чувствительности въ нервахъ (также — дѣятельности мозга). Парезъ есть неполный параличъ, т. е. большее или меньшее ослабленіе движенія или чувствительности. Причинами служатъ болѣзни мозга — кровоизліяніе при апоплексическомъ ударѣ, опухоли — причѣмъ парализована обыкновенно лишь одна сторона тѣла, противоположная той сторонѣ мозга, которая поражена, или парализованы обѣ стороны тѣла, что обыкновенно бываетъ при пораженіяхъ спинного мозга. Въ одномъ и другомъ случаѣ параличъ называется центральнымъ. Если параличъ (или парезъ) происходитъ отъ боли самихъ нервовъ, а не отъ мозга (головного или спинного), то онъ называется периферическимъ;

послѣдній бываетъ часто послѣ дифтерита и другихъ острыхъ болѣзней, какъ тифъ, сыпная лихорадка, также послѣ цынги, сифилиса; но параличи бываютъ и чисто нервнаго характера, равно какъ простудные и отъ отравленій (свинцомъ, ртутью). Периферическіе параличи легче и скорѣе поддаются лѣченію, чѣмъ центральные. Къ центральнымъ параличамъ относятся и параличи вслѣдствіе заболѣваній спинного мозга, какъ опухоли вообще и туберкулезнаго характера, воспаление оболочекъ спинного мозга, костоѣда позвонковъ и проч. Такія формы, конечно, очень опасны, и надежды на выздоровленіе либо очень мало, либо совсѣмъ не имѣется. Вѣроятно, и разсмотрѣнный выше дѣтскій спинной параличъ (стр. 118), проходящій въ нѣкоторыхъ случаяхъ самъ собой, въ другихъ же остающійся навсегда, зависитъ также отъ вещественныхъ измѣненій въ спинномъ мозгу.

Лѣченіе
параличей

Въ свѣжихъ случаяхъ мозгового паралича (см. мозговой ударъ стр. 107) главное средство—*Арника*. Затѣмъ—*Фосфоръ*, *Барита карбоника* (особенно у старыхъ особъ). Если отъ этихъ средствъ, послѣ 2 — 3 недѣль ихъ употребленія, не замѣчается замѣтнаго улучшенія, даютъ *Коккулусъ* или *Каустикъ*. Въ качествахъ разсасывающихъ средствъ показаны еще *Меркуръ солуб.* 3 и *Кали іодат.* 1 или *Меркуръ биіодат.*, также *Бріонія* и *Аписъ*.

При ревматическихъ параличахъ примѣняются главнымъ образомъ *Русъ*, *Каустикъ*, *Дулькамафа*, *Нуксъ вомика*, *Сульфуръ*.

Противъ нервныхъ параличей, исходящихъ отъ головного или спинного мозга, показаны особенно: *Аргент. нитр.*, *Русъ*, *Нуксъ вомика*, *Коккулусъ*, *Цинк.*, *Феррумъ* (особенно при малокровіи), *Фосфоръ* (вслѣдствіе истощающихъ причинъ, рядомъ съ *Хиной*), *Секале* $\times$ 3 (при параличѣ мочевого пузыря въ зависимости отъ спинного мозга).

Въ отношеніи отдѣльныхъ парализованныхъ частей показаны: при параличѣ лицевого нерва особенно *Гельземинъ*, *Каустикъ*, *Графитъ*; при параличѣ вѣкъ—*Гельземинъ*, *Спигелія*, *Страмоній*; при параличѣ языка—*Коккулусъ*, *Белладонна*, *Арника*, *Лазезисъ*; при параличѣ верхнихъ конечностей: *Русъ*, *Коккулусъ*, *Нуксъ вомика*, *Феррумъ*;—нижнихъ конечностей: *Аргент. нитр.*, *Вератр.*, *Цинк.*, *Секале*, *Олеандр.*;—мочевого пузыря:—*Пульсатилла*, *Сенія*, *Кантарисъ*, *Нуксъ вомика*, *Гельземинъ*.

При параличѣ вслѣдствіе отравленія: послѣ ртути—*Нитри ацид.*, *Гепаръ сульф.*, *Аурумъ муріат.*; послѣ свинца—*Опій*, *Нуксъ вомика*; послѣ мышьяка—*Феррумъ*, *Хина*, *Графитъ*.

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отхоженіи параличей.

Аргент. нитрик. 3. При параличѣ съ помраченіемъ, затрудненнымъ дыханіемъ, судорогами; большая слабость, переполнение кровеносныхъ сосудовъ съ замѣтной пульсацией. Головокружение обморочныя состоянія, затрудненное соображеніе. Судорожныя стягиванія лицевыхъ мышцъ.

Арника × 3. Въ свѣжихъ случаяхъ паралича послѣ кровяного удара, также отъ чрезмѣрнаго напряженія и поврежденія. Приливы къ мозгу. Параличъ и расслабленность рукъ и ногъ, съ ощущеніемъ ползанія мурашекъ. Судорожныя подергиванія мышцъ или подпрыгиванія сухожилій въ парализованныхъ частяхъ, также ощущение трепетанія мышцъ какъ бы отъ электрическаго тока.

Барита карбоника 3—6. Особенно у старыхъ людей. Зудъ, ползаніе мурашекъ и жжение въ различныхъ частяхъ тѣла. Большая чувствительность къ холоду, особенно въ пораженныхъ частяхъ, большая общая слабость и расслабленіе членовъ съ угрюмымъ, сердитымъ настроеніемъ духа и слабымъ пищевареніемъ. Параличъ языка.

Гельземинъ × 3. Параличъ двигательныхъ нервовъ, особенно послѣ дифтерита и другихъ острыхъ инфекционныхъ болѣзней, значить—не отъ вещественныхъ измѣненій въ мозгу, головномъ или спинномъ. Расслабленность сфинктеровъ, т. е. замыкательныхъ мышцъ заднепроходной кишки и мочевого пузыря, съ зависящими отъ сего недержаніемъ кала и мочи. Затрудненность дыханія и рѣчи, особенно послѣ душевнаго волненія, у нервныхъ и истеричныхъ особъ. Параличъ верхняго вѣка.

Дулькамара × 3. Параличъ особенно верхнихъ конечностей, ревматическаго, простуднаго происхожденія, безъ вещественныхъ измѣненій.

Каустик. × 3. Односторонній параличъ послѣ мозгового удара, особенно когда поражена правая сторона; односторонній параличъ лица отъ сквозника и простуды вообще, съ поражениемъ также языка и затрудненнымъ говоромъ. Параличъ ногъ или рукъ. Отсутствие ощущенія и силы въ рукахъ.

Коккулусъ × 3. Особенно при двухстороннемъ параличѣ вслѣдствіе простуды, преимущественно ногъ, начиная съ крестца, съ

сильными болями въ пораженныхъ частяхъ или судорожными въ нихъ подергиваніями. Также при параличѣ языка, лица и глотки.

Купрумъ 3—6. При параличахъ, исходящихъ отъ мозга и мозговыхъ нервовъ, съ ослабленіемъ памяти, головокруженіемъ и подергиваніями въ парализованныхъ частяхъ, особенно въ пальцахъ. Также при параличахъ отдѣльныхъ нервныхъ участковъ послѣ дифтерита, тифа и т. п. Параличъ языка.

Ледумъ 3. Параличи, особенно ревматическіе, въ бедреномъ суставѣ, подобно Дулькамарѣ.

Нуксъ вомика 3. Параличи, исходящіе отъ спинного мозга; тяжесть и разслабленность въ ногахъ, съ ощущеніемъ ползанія мурашекъ въ нихъ, послѣ простуды; особенно попеременно съ *Сульфуръ*. Параличъ мочевого пузыря и запоръ.

Плумбумъ 3—6. Потеря движенія и чувствительности въ членахъ, мозговая дѣятельность притуплена. Параличъ языка. Отъ Купрумъ отличается тѣмъ, что при послѣднемъ чувствительность сохранена и въ парализованныхъ частяхъ являются судорожныя подергиванія.

Русъ 3. Весьма важное лѣкарство при периферическихъ (см. выше) параличахъ, особенно вслѣдствіе простуды и ревматизма, также при параличахъ послѣ острыхъ болѣзней (дифтеритъ, тифъ); ощущение тяжести во всѣхъ членахъ и напряженіе сухожилій; односторонній параличъ, особенно нижнихъ конечностей, съ ощущеніемъ ползанія мурашекъ и холода въ пораженныхъ частяхъ.

Сульфуръ 3—6. Параличи у золотушныхъ особъ, съ вещественными измѣненіями въ тканяхъ (также *Калькареа карбоника Графитъ*).

Фосфоръ 3. Особенно при разслабленіи и параличѣ всѣхъ членовъ. Параличи спинномозгового происхожденія послѣ острыхъ болѣзней, также при спинномъ дѣтскомъ параличѣ; попеременно съ *Нуксъ вомика*; при попыткѣ встать—дрожаніе колѣней съ подкашиваніемъ въ нихъ; параличъ рукъ съ дрожаніемъ и потерей мышечной силы.

Г. Общіе невроты.

Содержание этого (Г) под-отдѣла: 1 Неврастенія. Нервная слабость. 2 Ипохондрія 3. Истерія. —Общее лѣченіе невротовъ

Къ общимъ невротамъ относятся разстройства въ отправленіяхъ нервной системы вообще, съ бѣльшимъ или меньшимъ нарушеніемъ душевной дѣятельности организма. Въ этомъ смыслѣ нижеслѣдующія формы общихъ невротовъ, неврастенію, ипохондрію и истерію, можно бы назвать болѣзнями нервно-душевыми, въ отличіе отъ болѣзней чисто-душевыхъ (умопомѣшательствъ), которыя изложены ниже.

1. Нервозность. Нервная слабость (Неврастенія).

Подъ этимъ названіемъ разумѣютъ не опредѣленную болѣзнь съ извѣстнымъ характеромъ и теченіемъ, а скорѣе сумму болѣзненныхъ чувствованій и настроеній, развивающихся въ организмѣ на почвѣ врожденной или пріобрѣтенной въ ранніе годы жизни, вслѣдствіе ненормальнаго питанія и воспитанія, чрезмѣрной возбуждѣнности или раздражимости нервной системы. Такіе больные бываютъ крайне пугливы, легко краснѣютъ, при малѣйшемъ поводѣ испытываютъ усиленное сердцебиеніе; они часто страдаютъ безсонницей, сами не умѣя сказать, чѣмъ она вызывается, очень скоро утомляются отъ всякой умственной работы; чувствуютъ тяжесть въ головѣ и, даже при легкомъ чтеніи, съ трудомъ соображаютъ или припоминаютъ только что, нѣсколькими строками раньше, прочитанное. Во всемъ прочемъ они могутъ чувствовать себя здоровыми, да и на другихъ производятъ такое впечатлѣніе. Чаше однако настроеніе ихъ портится, они начинаютъ подозрѣвать въ себѣ, особенно въ головѣ, въ сердцѣ и брюшныхъ органахъ, разнаго рода болѣзненные измѣненія, что выражается соответственными чувствованіями; они жалуются на головокруженіе, шумъ въ ушахъ, стѣсненіе въ груди, боли подъ ложечкой, тяжесть и полноту въ области желудка, отрыжку, иногда на рвоту и запоръ; кромѣ того можно часто слышать отъ нихъ жалобы на общую слабость или на боли въ разныхъ частяхъ тѣла, особенно въ спинѣ, ногахъ и груди, въ головѣ—во всей или лишь во лбу, въ вискѣ или затылкѣ. Характерно, что всѣ эти и подобныя симптомы такъ же непостоянны и измѣнчивы, какъ непостоянно и измѣнчиво настроеніе больныхъ; при этомъ отсут-

Прояв.
болѣ

ствують объективныя указанія на дѣйствительныя измѣненія въ страдающихъ органахъ.

**Причины
неврастеніи.**

Наслѣдственная форма болѣзни обнаруживается между 15 и 20 годами, приобретенныя же формы развиваются преимущественно между 30—50 годами жизни. На развитіе ея въ значительной степени вліяютъ умственное и физическое переутомленіе, также половыя излишества, при имѣющемся уже предрасположеніи. У женщинъ ближайшими причинными моментами могутъ явиться кромѣ того: беременность, кормленіе грудью, материнскія заботы и проч. Изъ свободныхъ профессій даютъ неврастенію такія, которыя связаны съ мозговымъ переутомленіемъ; сюда относятся инженеры, врачи, литераторы, особенно же журналисты, финансисты и государственные дѣятели. Въ рабочемъ классѣ причиной неврастеніи является усиленная работа, также поврежденія, особенно когда присоединяется развратъ и пьянство.

Борьба за существованіе, превратности судьбы, неблагоприятныя и тяжелыя условія жизни вообще принадлежатъ къ предрасполагающимъ причинамъ. Къ наиболѣе вреднымъ моментамъ относятся раннее пробужденіе полового инстинкта, дурныя половыя привычки, половыя излишества, особенно у лицъ, предрасположенныхъ къ нервной слабости. Неврастенія наблюдается также, какъ временное состояніе, послѣ какихъ-либо острыхъ заболѣваній (воспаленіе легкихъ, тифъ и проч.). Малокровіе является скорѣе (послѣдствіемъ, нежели причиной неврастеніи. То же надо сказать о наблюдаемыхъ у неврастениковъ расстройствахъ пищеваренія. Нѣкоторыя общія хроническія болѣзни, какъ, на примѣръ, сифилисъ или сходныя болѣзни, также артритизмъ, разстраивая организмъ, ослабляютъ нервную систему и дѣлаютъ ее болѣе подверженной разнымъ вліяніямъ, ведущимъ къ неврастеніи.

Симптомы неврастеніи въ общемъ приведены выше. При этомъ надо сказать, что для опредѣленія такой болѣзни, какъ неврастенія, не требуется, конечно, чтобы всѣ перечисленные симптомы имѣлись въ наличности у даннаго больного, но чтобы судить о томъ, къ неврастеніи ли принадлежитъ тотъ или другой симптомъ, необходимо обратить вниманіе на характеръ таковаго.

**Характери-
стика главн.
симптомовъ
неврастеніи.**

Поэтому тутъ приводится характеристика главнѣйшихъ неврастеническихъ симптомовъ.

Неврастеническая головная боль не похожа ни на невралгію, ни на мигрень. Она ощущается какъ каска, давящая на голову сзади, или какъ желѣзные тиски, обручъ или металлическая по-

вязка. Иногда можно услышать отъ больного, что онъ чувствуетъ вокругъ головы какъ бы огромный перстень, тяжелый камень котораго упирается въ затылокъ. Другіе жалуются на свинцовую шапку, тяжелую и тѣсную. Или же бываетъ ощущение забрала, спускающагося до половины лица, или бляшки на лбу или затылкѣ и проч. Головная боль неврастеника протекаетъ различно, но всегда она дневная и часто періодичная; сопровождается иногда ощущеніемъ пустоты въ головѣ, шумомъ въ ушахъ, летающими передъ глазами мушками, свѣтобоязню, слабостью соображенія, особенно же повышенной чувствительностью волосистаго покрова головы.

Боль позвоночника, по характеру своему, подобна описанной выше неврастенической боли головы; она ощущается особенно при давленіи на остистые отростки позвонковъ и при прикосновеніи губки, намоченной въ горячей водѣ; эта боль усиливается при движеніи, сосредоточивается преимущественно въ области шейныхъ позвонковъ и крестцовой кости, и принимается часто за ревматическую.

Встрѣчается и копчиковая боль, особенно у женщинъ.

Двигательная слабость— ощущение болѣзненной разбитости и усталости, какъ бы послѣ долгой прогулки, съ желаніемъ отдохнуть, поскорѣе сѣсть. Характерно для неврастенической усталости, что она ощущается часто по утрамъ, послѣ сна. Иногда наблюдается подкашиваніе ногъ, какъ при сильныхъ душевныхъ волненіяхъ. Если двигательная слабость простирается и на мышцы пищеварительнаго аппарата (желудка и кишекъ), то получается же лудочно-кишечная вялость съ упорнымъ запоромъ.

Къ двигательнымъ разстройствамъ у неврастениковъ относятся также: слабость голоса; слабая дѣятельность мышцъ, какъ бы парезъ, усиливающийся иногда до временнаго, кажущагося паралича; судороги, въ видѣ содроганія тѣла при засыпаніи, сопровождающагося иной разъ чувствомъ какъ бы паденія съ высоты или въ пропасть; легкія подергиванія въ мышцахъ лица, особенно— въ вѣкахъ; неврастеническое дрожаніе является почти исключительно подъ вліяніемъ сильнаго душевнаго волненія; спазмы въ икрахъ, обыкновенно—по ночамъ, и длятся 10—20 минутъ; профессиональныя судороги (писчій спазмъ и проч. стр. 143) встрѣчаются чаще всего у неврастениковъ.

Половая сфера у неврастениковъ имѣетъ характеръ раздражительной слабости, ведущей часто къ половому безсилію. У жен-

щинъ болѣзни матки и яичниковъ бываютъ иной разъ причиною нервнаго истощенія, но половыя разстройства находятся у нихъ часто въ прямой зависимости отъ состоянія нервной системы, таковы—бѣли, разстройства мѣсячныхъ и болѣзненные явленія со стороны матки.

Общая чувствительность сильно повышена у неврастениковъ: выше уже упомянуто о чувствительности кожи головы и о боли позвоночника. Кромѣ того часто наблюдается крайняя чувствительность къ щекотанію, котораго неврастеники совершенно не переносятъ; у нихъ обыкновенныя явленія—ощущеніе ползанія мурашекъ, покалыванія, жженія и зуда; также чувства онѣмѣнія и какъ бы ожога въ пальцахъ ногъ, точно отъ прикосновенія горячихъ угольевъ. Крайняя чувствительность къ колебаніямъ барометра, къ переменамъ погоды и температуры. Ощущеніе болѣзненной разбитости въ мышцахъ, стрѣляющія боли, какъ у табетиковъ, суставныя боли, точно отъ ревматизма.

Разстройства кровообращенія. Сердцебіеніе при отсутствіи всякихъ органическихъ измѣненій въ сердцѣ, мнимая грудная жаба, частая измѣнчивость пульса съ біеніемъ въ вискахъ и въ надчревной области. Біеніе брюшной аорты можно считать однимъ изъ признаковъ неврастеніи.

Различныя состоянія страха, боязни, тоски, отчаянія, отъ такихъ же состояній у душевно-больныхъ отличаются тѣмъ, что у неврастеника они допускаютъ контроль разсудка: неврастеникъ сознаетъ бессмысленность боязни, напимѣръ—площади или толпы, или эпидемической болѣзни (холеры) и проч., но все же не въ силахъ преодолѣть въ себѣ этого чувства.

Теченіе неврастеніи. Теченіе болѣзни бываетъ очень измѣнчиво и съ частыми колебаніями, то къ улучшенію, то къ ухудшенію, въ зависимости отъ благопріятныхъ и неблагопріятныхъ условій жизни. Чѣмъ условія жизни благопріятнѣе, тѣмъ скорѣе возможно болѣе или менѣе прочное излѣченіе. Теченіе болѣзни въ большинствѣ случаевъ хроническое, длительное, но бываютъ и подьострыя формы съ менѣе длительнымъ теченіемъ.

При простой, менѣе сложно выражающейся неврастеніи полное излѣченіе возможно. Часто для этого достаточны покой и нормальный образъ жизни. Трудно обстоитъ съ выздоровленіемъ, когда болѣзнь протекаетъ при неустрашимыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, какъ моральныхъ, такъ и матеріальныхъ. Однимъ изъ наиболѣе неблагопріятныхъ условій для укрѣпленія нервной си-

стемы является половая слабость, могущая пройти лишь въ концѣ всѣхъ прочихъ явленій неврастеніи.

Лѣкарственное лѣченіе см. ниже въ статьѣ подъ заголовкомъ „Общее лѣченіе невровозовъ“.

Вспомогательныя мѣры должны быть прежде всего направлены къ устраненію всѣхъ возбуждающихъ причинъ, къ уменьшенію или временному прекращенію умственной работы, безсонныхъ ночей, усталости и утомительныхъ развлеченій. Уѣхать изъ города или изъ обычной обстановки, пользоваться чистымъ воздухомъ, заниматься физическими упражненіями, но не до переутомленія, правильно питаться и избѣгать алкоголя—вотъ главные и самыя простыя гигиеническія условія, достаточныя въ большинствѣ случаевъ (см. еще стр. 157).

2. И п о х о н д р і я .

Ипохондрія представляетъ особый видъ разстройства душевнаго состоянія или настроенія, при которомъ малѣйшія болѣзненные измѣненія въ организмъ больного отзываются въ его сознаніи въ чрезмѣрно усиленной степени и обнаруживаются въ соотвѣтственно преувеличенной формѣ. Это душевное состояние развивается на почвѣ нервозности или неврастеніи (см. выше), являясь послѣдствиемъ ея или, скорѣе, прямымъ, дальнѣйшимъ ея развитіемъ. Болѣзнію этой страдаютъ почти исключительно мужчины (отъ 18 — 20 до 60 лѣтняго возраста), очень рѣдко — женщины; при истеріи — отношеніе обратное. Больные обыкновенно подозрѣваютъ у себя симптомы той болѣзни, которая имъ больше всего извѣстна и сильнѣе всего пугаетъ: хроническій катарръ зѣва принимается за начинающуюся чахотку; незначительная сыпь (угри и т. п.) даетъ поводъ думать о развившемся сифилисѣ, осадокъ въ мочѣ указываетъ яко бы на тяжкое страданіе почекъ, забывчивость приписывается развивающемуся прогрессивному параличу, ненормальныя ощущенія въ ногахъ—спинной сухоткѣ и т. п.

Ипохондрія отличается отъ обыкновенной неврастеніи главнымъ образомъ тѣмъ, что неврастеникъ, по крайней мѣрѣ на время, довѣряетъ утѣшительнымъ словамъ врача и чувствуетъ подъ его вліяніемъ успокоеніе и облегченіе, тогда какъ стойкій бредъ ипохондрика никоимъ образомъ не поддается увѣреніямъ врача, а, напротивъ того, вызываетъ въ больномъ полное презрѣніе къ врачебной наукѣ, которая не въ состояніи подтвердить его собственныя болѣзненные идеи.

Отличіе
невраст

Признаки болѣзни, какъ и при неврастеніи, весьма разнообразны, а именно: скверное настроеніе духа, еще большая, чѣмъ при неврастеніи, раздражительная слабость, приливы дѣйствительные или кажущіеся, болѣе глубокое разстройство пищеваренія, съ преобладающимъ вздутіемъ живота отъ газовъ, упорные запоры, у женщинъ — значительныя разстройства регулъ. Болѣзнь эта въ болѣе сильномъ развитіи стоитъ ближе къ душевнымъ болѣзнямъ, чѣмъ къ неврастеніи.

Лѣченіе см. ниже подъ заголовкомъ „Общее лѣченіе неврововъ“; (вспомогательныя мѣры—стр. 157).

3. Истерія.

Характернымъ признакомъ для нервно-душевнаго состоянія, называемаго истеріей, является необыкновенная легкость и быстрота, съ которою душевныя состоянія обнаруживаются разнообразными физическими проявленіями (ослабленіе или потеря чувствительности или напротивъ усиленія ея, мимическія движенія, параличи, судороги). На такой истерической почвѣ, которая можетъ быть выражена въ весьма различной степени, можетъ развиться цѣлый рядъ различнѣйшихъ картинъ болѣзни, начиная съ скоропреходящихъ эксцентричныхъ выходокъ и кончая длительными и тяжкими болѣзненными состояніями. Въ общихъ чертахъ истерія сходна съ неврастеніемъ и часто имѣетъ также ипохондрический характеръ (см. ипохондрія). Однимъ изъ постоянныхъ сопровождающихъ истерию непріятныхъ ощущеній есть такъ называемый истерическій шаръ (глобусъ истерикусъ), который какъ бы подкачивается изъ желудка къ горлу. Кромѣ неврастеническихъ и ипохондрическихъ явленій—можно часто наблюдать у истеричныхъ такъ называемыя сумеречныя состоянія, т. е. болѣе или менѣе продолжительные приступы рѣзкаго помраченія сознанія, которые большею частью являются послѣ приступовъ судорогъ. Иногда сумеречное состояніе имѣетъ характеръ сомнамбулическій и наступаетъ во время сна: больная встаетъ съ постели, производитъ разныя, иногда вполне цѣлесообразныя движенія, затѣмъ ложится обратно въ постель и на утро пробуждается съ крайне смутнымъ воспоминаніемъ о случившемся. При неполномъ помраченіи сознанія появляются многочисленныя разнаго рода галлюцинаціи какихъ-либо опасностей, страшныхъ сценъ, или, наоборотъ, развиваются состоянія экстаза съ ощущеніемъ бла-

Ощущеніе
шара при
истеріи.

женства и небесными видѣніями. Подобныя настроенія выражаются обыкновенно въ поступкахъ, рѣчахъ и мимическихъ движеніяхъ. Нерѣдко встрѣчаются состоянія угнетенія духа (депрессивныя настроенія) или наоборотъ состоянія возбужденія, въ формѣ гнѣвнаго раздраженія съ разрушительными стремленіями (истерическое сумасшествіе).

Истерія есть болѣзнь почти исключительно женщинъ (histera— по гречески—матка) и часто находится въ связи съ состояніемъ половой сферы. Хотя во многихъ случаяхъ связь эта очевидна, однако въ новѣйшее время она не считается безусловно необходимой. Извѣстно, что истерическія явленія могутъ развиваться уже задолго до наступленія половой зрѣлости, даже у дѣтей, равно какъ вообще при вполне здоровомъ состояніи половыхъ органовъ. Наконецъ, не подлежитъ сомнѣнію, что, хотя и очень рѣдко, но все же истерія встрѣчается и у мужчинъ.

Что касается вообще лѣченія истерическихъ состояній, то оно часто представляетъ еще больше затрудненій, чѣмъ лѣчение ипохондріи, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ можно воздѣйствовать на причины, обусловливающія болѣзненное состояніе, главнымъ образомъ—на устраненіе, если возможно, ненормальностей, касающихся половой сферы. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ приходится ограничиваться тѣмъ, чтобы умѣрять или по возможности, устранять или предупреждать явленія истерическихъ расстройствъ. Психическое воздѣйствіе со стороны врача или окружающихъ, а также благопріятныя условія домашней жизни и общественнаго положенія играютъ тутъ часто весьма важную роль; важно и лѣкарственное лѣченіе, но оно не принесетъ ожидаемыхъ отъ него результатовъ, если упомянутыя условія будутъ неблагопріятно дѣйствовать на больную.

Лѣкарства приводятся ниже подъ заголовкомъ „Общее лѣченіе неврозовъ“; (вспомогательныя мѣры—стр. 157).

Общее лѣченіе неврозовъ:

неврастеніи, ипохондріи, истеріи.

При этихъ болѣзняхъ еще въ большей мѣрѣ, нежели при другихъ, необходимо обособленно разсматривать каждого больного, то есть—выбирать лѣкарства не по названію болѣзни, а по тѣмъ признакамъ (симптомамъ), какими болѣзнь проявляется въ каждомъ данномъ случаѣ; при этомъ опредѣлить, какіе изъ

признаковъ главные, какіе второстепенные; къ главнымъ относятся прежде всего нервно-душевные симптомы, которые должны лежать въ основѣ выбора лѣкарствъ. Поэтому на первомъ планѣ должны быть тутъ такія лѣкарства, какъ *Аурумъ муриатик.*, *Платина муриатика*, *Игнація*, *Хамомилла*, *Нуксъ вомика*, *Валериана*, *Аргент. нитрик.*

При отдѣльныхъ выдающихся симптомахъ, какъ головная боль, головокруженіе, боль въ спинѣ, невральгическія боли, расстройства сна и проч.—руководящія указанія можно найти въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этой книги (ч. II, отд. IV).

При выдающихся расстройствахъ отдѣльныхъ органовъ справляться также въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ книги: см. оглавление въ началѣ и алфавитн. указатель въ концѣ книги.

Здѣсь приводятся руководящія указанія относительно главнѣйшихъ лѣкарствъ

Актеа рацемоза × 3. Бессонница, дрожаніе и страхъ смерти. Болѣзни матки. Нервный ознобъ. Безпокойное состояніе въ постели, потребность мѣнять положеніе. Перемѣнчивость настроенія, день на день не похожъ. Боли съ затылка по направленію къ главному яблоку.

Анакардій × 3. Больной слышитъ голоса какъ бы издалека. Какъ бы двѣ воли съ различными побужденіями. Боль головы какъ бы отъ вбитаго клина. Ослабленная память.

Анисъ × 3. Чувство якобы предстоящей смерти, но безъ боязни ея. Усталость мозга до степени засыпанія; упадокъ силъ до степени обморока послѣ переутомленія; ощущеніе разбитости въ тѣлѣ; нервная дрожь. Особенно у истеричныхъ особъ. Неловкость рукъ; предметы вываливаются изъ рукъ, съ насмѣшливымъ къ этому отношеніемъ больной. Усиленная похотливость и склонность къ ревности.

Аса фетида 3. Ощущеніе шара въ глоткѣ, послѣ многояденія или движенія, или нервнаго волненія; спазмъ груди и сердцебіеніе. Обмороковъ не бываетъ. Вздутіе живота газами, вонючія испражненія; газы напираютъ кверху, причиняя колики и неприятную отрыжку; при этомъ ощущеніе пустоты подъ ложечкой. Особенно при истерии.

Аргент. нитрик. 3. Спинная боль, хуже при вставаніи съ мѣста, лучше—отъ движенія; дрожательная слабость членовъ, боязнъ передъ выдающимися углами столовъ и т. п.

Аурумъ муриатик. 3. Крайняя раздражительность, брюзжание, попеременно съ безудержной веселостью. Потеря духа и опустылость жизни. Особенно при частой зябкости и нервной дѣятельности сердца. Вздутіе живота газами, большой аппетитъ, неприятный вкусъ во рту.

Валериана 1. Душевная и тѣлесная возбужденность. Чрезмѣрная оживленность, порывистость. Воображеніе опасности вкругъ себя. Головная боль, головокруженіе. Постоянная потребность въ движеніи; ухудшеніе всѣхъ симптомовъ въ покоѣ. Безсонница. Пищевареніе разстроенное. Тошнота, боль подъ ложечкой, скопленіе газовъ въ животѣ.

Игнація 3. Давящія боли въ затылкѣ, спазмы въ глоткѣ съ ощущеніемъ шара въ ней, что-то мѣшаетъ свободно глотать; спазмы груди, икота, отрыжка; ощущеніе тугости въ затылкѣ; подергиванія въ рукахъ и ногахъ; оглушающій, не освѣжающій сонъ; спазмы въ животѣ.

Калькареа карбоника 3—6, особенно у особъ съ пониженнымъ питаніемъ и слабыми мышцами. Скверное, сердитое настроеніе, упадокъ духа до степени меланхолии, особенно въ пасмурную, холодную и сырую погоду. Тяжесть въ головѣ, помраченность съ временными приливами крови. Отсутствіе аппетита съ дурнымъ вкусомъ во рту и бѣлообложеннымъ языкомъ. Твердая и рѣдкія испраженія.

Каннабисъ индика (или сатива) 3. Сильно повышенная нервная дѣятельность, головокруженіе и невралгическія головныя боли, особенно въ правой сторонѣ лица (мигрень). Стѣсненіе въ груди съ ощущеніемъ крайней тоски. У женщинъ при усиленной половой похоти, страдающихъ обильными мѣсячными или ѣдкими гноевидными бѣлями.

Коккулусъ 3. Боли въ поясницѣ, слабость ногъ, раздражительная слабость съ судорожными подергиваніями и въ то же время ощущеніемъ одеревѣнія въ ногахъ. Головная боль въ затылочной области, съ ощущеніемъ натяженія и потребностію закидыванія головы кзади. Головокруженіе, хуже въ сидячемъ положеніи или при попыткѣ подняться изъ такового. Тошнота, позывъ на рвоту, даже обморочное состояніе.

Лакезисъ 6. Нервность, тоскливость, боязнь, неспособность сосредоточиваться на одномъ предметѣ; разговоръ утомляетъ, но имѣется желаніе поддерживать его; склонность ко сну, но невозможность заснуть. Къ позднему вечеру голова проясняется и

способность мышления усиливается, и если больной засиживается поэтому поздно ночью, то на слѣдующій день онъ чувствуетъ тѣмъ еще большее душевное угнетение.

Мосхусъ 3. Обморочное состояніе часто во время ѣды. Спазмы въ груди. Вообще при преобладаніи нервныхъ симптомовъ. При истеріи, особенно во время приступа. Сердцебіеніе, какъ бы отъ тоскливаго ожиданія. Нервное, хлопотливое настроеніе. Припадки обморока съ блѣднымъ лицомъ. Сонливость днемъ. Головокруженіе. Боли головы, спины съ ощущеніемъ тугости мышцъ. Обильное выдѣленіе мочи. Регулы приходятъ раньше времени, очень обильны. Половая раздражительность. Наклонность къ ругани, руганъ до потери сознанія.

Натр. муріатик. 3. Ипохондрическое настроеніе тѣсно связано съ неправильнымъ пищевареніемъ, и тѣмъ оно больше выражено, чѣмъ сильнѣе запоръ. Въ этомъ отношеніи Натр. мур., отличается отъ *Натр. карбоник. 3.* То и другое соотвѣтствуетъ угнетенному настроенію, сопровождаемому раздражительностью вслѣдствіе малѣйшаго повода. Пробужденіе ночью съ сердцебіеніемъ; мысли о предшествовавшихъ непріятныхъ выходкахъ мѣшаютъ засыпать.

Нуксъ вомика 3. Подобно Натр. муріатик.; симптомы со стороны пищеваренія преобладаютъ; геморройное состояніе.

Нуксъ мосхата × 3. Частая перемѣна настроенія и чрезмѣрное вздутіе живота даже послѣ легкой пищи. Ощущеніе сухости во рту, даже при влажности языка и полости рта вообще. Большая слабость и ощущеніе разбитости въ крестцѣ и въ ногахъ; наклонность къ обморокамъ; стѣсненіе дыханія. Вздутіе живота газами. Характерна для этого средства одновременная душевная и тѣлесная вялость. Трудное испражненіе даже при мягкомъ содержимомъ кишечника.

Платина 3—6 или Платина муріат. 3. Тоска, страхъ, дрожь, боязнь смерти, которая кажется близкой; угнетеніе смѣняется веселостью и смѣхомъ; половая возбужденность, судорожныя состоянія. Чрезмѣрное самомнѣніе и презрительность въ отношеніи окружающихъ рядомъ съ полнымъ равнодушіемъ. Спазмы гортани съ громкимъ вздохомъ. Головные боли, стягивающія и давящія, постепенно нарастаютъ и постепенно же отходятъ.

Сангвинарія × 3. Раздражительное состояніе мозга. Повышенная чувствительность, особенно ко всякому шуму и звукамъ, къ запахамъ и проч. Особенно для женщинъ въ переходное время. Головная боль, сердцебіеніе, приливы крови.

Сенія 3. Подавленность духа, плаксивость, постоянная грусть съ примѣсю раздражительности, часто же полное къ всему окружающему равнодушіе. Отсутствіе всякой заботы о своихъ домашнихъ. Головная боль, съ затылка идущая, односторонняя. Хуже послѣ обѣда, часа два спустя. Больной избѣгаетъ общества, даже собственной семьи. Хуже отъ растительной пищи, особенно—мучнистой. Кислая отрыжка, скопленіе слюны, позывы на рвоту, особенно по утрамъ. Вздутіе живота газами, съ коликой вскорѣ послѣ ѣды. Газы съ дурнымъ запахомъ. Запоръ.

Станнумъ × 3. Капризность и плаксивость, отъ плача самочувствіе ухудшается. Общая слабость, плохое пищевареніе, давленіе и какъ бы сосаніе подъ ложечкой, какъ при глистахъ. Глисты служатъ добавочнымъ для Станнума показаніемъ.

Фосфоръ 3. Раздражительность при общей слабости. Боль въ спинѣ, съ ощущеніемъ какъ бы разлома ея при всякомъ движеніи и жженіе въ отдѣльныхъ мѣстахъ спины; лучше отъ тренія. Подобно дѣйствуетъ и *Фосфоръ ацид. × 3*; страдаетъ не только спина, но и голова, въ которой ощущается тяжесть послѣ всякой умственной работы.

Цинк. 3. Боли чисто нервныя въ спинномъ хребтѣ, давящія, мучительныя, преимущественно въ послѣднемъ грудномъ или первомъ поясничномъ позвонкѣ, хуже при сидѣніи, чѣмъ при движеніи. Жженіе въ спинномъ хребтѣ. Дрожаніе членовъ. Спазмы въ области сердца. Пульсъ замедленъ, слабъ, неправиленъ. Ощущеніе въ сердцѣ, точно оно готово разорваться.

Цинкъ валеріаник. 3. Потребность въ постоянномъ движеніи, особенно ногъ, которыя при сидѣніи то и дѣло болтаются. Общее нервное, истеричное состояніе.

О дозахъ, пріемахъ и дѣленіяхъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.

Слѣдуетъ прежде всего принять мѣры къ улучшенію обмѣна веществъ въ организмѣ, къ поднятію его питанія.—Кофе, крѣпкій чай, пряности и спиртные напитки должны быть совершенно исключены изъ режима слабонервныхъ; полезна лишь нераздражающая, удобоваримая пища, молоко, кефиръ, питательный (альбуминный) какао (такой же шеколадъ), пахтанье, простокваша, отвары, въ видѣ пюре (растертые), изъ гороха, бобовъ, чечевицы и проч.; мясо—лишь въ малыхъ количествахъ, не болѣе одного раза въ день, а страдающіе приливами къ головѣ, при чрезмѣрной раздражимости, и вовсе не должны его употреблять. Очень полезны зелень, овощи, плоды. Благопріятно дѣйствуетъ доста- Вспо-
тельнъ
при н

точный отдых и лишь умеренное движение. Изъ специальныхъ вспомогательныхъ (см. часть 3-ью) способовъ, могущихъ поднять питание и благотворно дѣйствовать вообще на нервную систему, рекомендуются обертыванія, ванны, общій массажъ, умеренныя примѣненія пара. Слишкомъ холодныхъ примѣненій воды надо избѣгать; ванны и обливанія ниже 15° Р. отнимаютъ слишкомъ много тепла и ослабляютъ организмъ. Также не слѣдуетъ рекомендовать неврознымъ и морскихъ купаній, по причинѣ холода воды и раздражающаго механическаго дѣйствія прибоя волнъ.—Сидячія ванны и полуванны 26° Р., въ течение 10 мин., съ послѣдующимъ обливаніемъ 23—20° Р. Мало по малу можно температуру ваннъ доводить до 20° Р., съ продолжительностію въ этихъ случаяхъ лишь 5 мин. Для слабыхъ и малокровныхъ полезны общія обмыванія тѣла 22-градусной водой, полчаса передъ вставаніемъ, безъ обсушиванія. Обтиранія тѣла часто не переносятся очень нервными. Цѣльныя обертыванія, 3 раза въ недѣлю (22° Р., въ течение 1 часа), съ дополнительнымъ, если надо, согрѣваніемъ теплыми бутылками и послѣдующимъ общимъ обмываніемъ (22° Р.) или обливаніемъ (25—20° Р.) или полуванной (26—25° Р.). Паровыя примѣненія употребляются не часто, не болѣе 2—3 въ недѣлю, камерная паровая ванна не долѣе 10 мин. продолжительности.—Вообще говоря, во всѣхъ примѣненіяхъ воды надо соблюдать умеренность, такъ какъ въ противномъ случаѣ нервы чрезмѣрно раздражаются, а потому послѣдовательно ослабляются. Общій массажъ, въ течение 20—30 мин., воздушныя и солнечныя ванны, легочная гимнастика (2 раза въ день по 1/4 часа) и другія умеренныя гимнастическія упражненія полезны.—Наконецъ, примѣняется еще электричество въ разныхъ видахъ, преимущественно гальваническія ванны и электрическіе души. При этомъ оказывается полезнымъ лишь очень слабый электрическій токъ, ибо только такой токъ успокаиваетъ нервную систему, болѣе же сильныя токи еще больше ее раздражаютъ.—Примѣненіе гипнотизма (внушеніе посредствомъ усыпленія) не даетъ при неврозахъ сколько нибудь существенныхъ и прочныхъ результатовъ, часто даже вредитъ. Прямое же психическое вліяніе врача на нервныхъ больныхъ, особенно на неврастениковъ, бываетъ очень благотворно, если именно врачъ выслушиваетъ ихъ съ полнымъ вниманіемъ и если для нихъ очевидно его искреннее желаніе помочь имъ своими совѣтами.

Д. Душевные болѣзни.

Содержание этого (Д) под-отдѣла 1) Идиотизмъ, кретинизмъ и врожденное слабоуміе; 2) Манія, неистовство, 3) Меланхолія, 4) Сумасшествіе (параноія), 5) Общий прогрессивный параличъ (паралитическое слабоуміе), Алкоголизмъ

О самопомощи при душевныхъ болѣзняхъ можетъ быть рѣчь развѣ лишь въ самыхъ легкихъ формахъ ихъ или въ самомъ началѣ ихъ развитія. Въ болѣе трудныхъ случаяхъ самопомощь уже потому исключается, что такіе больные нуждаются въ тщательномъ уходѣ и бдительномъ надзорѣ, возможныхъ только въ специальныкъ больницахъ, а отнюдь не въ домашней обстановкѣ.

Душевные болѣзни раздѣляются на двѣ общія группы: врожденные и приобретенныя. Къ врожденнымъ относятся: идиотизмъ, кретинизмъ и врожденное слабоуміе. Къ приобретеннымъ (всегда на почвѣ наследственнаго предрасположенія) относятся. манія, меланхолія, сумасшествіе, паралитическое слабоуміе (общій прогрессивный параличъ) и др

1. Идіотизмъ, кретинизмъ и врожденное слабоуміе.

Эти ненормальности являются главными типами недоразвившейся души.

Идіоты лишены всякаго самосознанія и сознанія происходя- **Идіотиз**
щаго вокругъ нихъ. Душевная жизнь ихъ ограничивается лишь такими дѣйствіями, которыя имѣютъ отношеніе къ удовлетворенію потребности въ пищѣ. Они не имѣютъ представленія о чистоплотности. Выраженіе лица тупое, ничего не означающее. Способность рѣчи крайне ограничена. Память совершенно отсутствуетъ, и лишь въ крайне рѣдкихъ, совершенно исключительныхъ случаяхъ встрѣчается поразительная механическая память на числа или звуки или какая-либо другая односторонняя способность.

Идиотизмъ можетъ развиваться и не въ утробной жизни, а въ теченіе первыхъ лѣтъ послѣ рожденія, самостоятельно на почвѣ какой-либо врожденной наследственности или вслѣдствіе мозговой болѣзни и т. п.

О лѣченіи идиотизма, какъ такового. не можетъ быть рѣчи, развѣ только, если оно будетъ носить характеръ педагогическій, воспитательный. Воспитаніе идиота, однако, настолько трудно, что оно съ нѣкоторымъ успѣхомъ можетъ вестись только въ специальныхъ заведеніяхъ.

Кретинизмъ

Кретины по большей части малаго роста, коренасты, хотя и дѣтскаго сложенія тѣла, съ большой головой, безобразнымъ, морщинистымъ, старообразнымъ лицомъ, впалыми глазами, вздернутымъ носомъ, у переносья глубоко вдавленнымъ; губы у нихъ толсты, вѣки опухши, кожа груба и одутловата. Душевное состояние тупое, заглушенное. Кретинизмъ рѣдко замѣтенъ уже при рожденіи; обыкновенно же онъ обнаруживается лишь спустя нѣсколько мѣсяцевъ или даже лѣтъ: душевное развитіе останавливается; ребенокъ или вовсе не начинаетъ ходить или начинаетъ только во второе пятилѣтіе жизни; онъ дѣлается апатичнымъ, вялымъ, много спитъ и ѣстъ. Зубы выкрашиваются, языкъ становится толстымъ и мясистымъ, а кожа грубой и морщинистой.

О лѣченіи кретинизма, какъ такового, можетъ быть такъ же мало рѣчи, какъ и при идиотизмѣ. Самое большее—посредствомъ *Арсеника*, *Калькареа фосфорика*, *Калькареи карбоника*, *Силиція* и т. п. пытаться поднять и исправлять процессы жизнедѣятельности организма.

Врожденное слабоуміе

Врожденное слабоуміе наблюдается въ видѣ многочисленныхъ переходныхъ ступеней душевной ограниченности, въ предѣлахъ между почти нормальнымъ состояніемъ и идиотизмомъ. Отсюда и большое разнообразіе формъ и типовъ слабоумія. Масса преступленій, обычно нелѣпыхъ или крайне жестокихъ, масса поступковъ самыхъ безобразныхъ и безнравственныхъ, встрѣчающихся въ жизни, имѣютъ своимъ источникомъ эту душевную аномалію. На этой почвѣ развивается именно, такъ называемое, нравственное помѣшательство, которое характеризуется отсутствіемъ или ослабленіемъ тѣхъ нравственныхъ мотивовъ, которые удерживаютъ нормальнаго человѣка отъ необузданнаго удовлетворенія присущихъ ему эгоистическихъ наклонностей. Такое состояние характеризуется необузданной жестокостью, замкнутостью, лживостью, наклонностью къ обману, бродяжничеству, воровству, излишествами; сюда же относится отсутствие чувства чести и всякой привязанности къ близкимъ, извращенное половое чувство и проч.

О какомъ-либо лѣченіи врядъ ли можетъ быть тутъ рѣчь. Возможно болѣе цѣлесообразное и гуманное воспитаніе съ дѣтства, возможно болѣе нормальныя условія жизненной обстановки, наконецъ, спеціальныя заведенія и дома призрѣнія—могутъ сколько нибудь сглаживать душевные изъяны такихъ больныхъ. Въ подходящихъ случаяхъ можно ожидать нѣкоторыхъ результатовъ отъ примѣненія тѣхъ лѣкарствъ, которыя ниже приведены противъ душевныхъ болѣзненныхъ состояній вообще

2. Манія (неистовство).

Вначалѣ—угнетенное, ипохондрическое настроеніе, которое мало по малу переходитъ въ все болѣе усиливающееся безпокойство, начиная съ болтливости и умѣреннаго возбужденія и кончая насильственными дѣйствіями противъ окружающихъ. Теченіе—неравномѣрное, улучшения смѣняются ухудшеніями и наоборотъ. Продолжительность болѣзни 5—7 мѣсяцевъ, рѣдко дольше одного года или менѣе 8—10 недѣль. Предсказаніе, во всякомъ случаѣ, довольно благопріятно: выздоровленіе наступаетъ въ $\frac{4}{5}$ общаго числа случаевъ.

Въ случаяхъ болѣе серьезныхъ, сопровождающихся гнѣвными выходками и насильственными дѣйствіями, необходимо помѣстить больного въ заведеніе; домашнее же лѣченіе возможно развѣ лишь при благопріятныхъ условіяхъ обстановки, при которыхъ больной можетъ пользоваться полнымъ покоемъ и надлежащимъ уходомъ. Особенно благотворно дѣйствуетъ постоянное, впредь до выздоровленія, пребываніе въ постели, подъ бдительнымъ надзоромъ. Полезны тепловатыя ванны.

Главное лѣкарство—*Гіосціамусъ* 3—6, при сильно возбужденномъ состояніи; больной порывисто куда то стремится; воображаетъ, что его желаютъ отравить; или, что его преслѣдуютъ злые духи, или, что кто-то покушается на его жизнь. Предметы ему кажутся слишкомъ большими и точно грозятъ на него навалиться; малѣйшій шумъ его приводитъ въ состояніе возбужденія. Воспалительное состояніе отсутствуетъ. Въ промежуткахъ между моментами возбужденія больной находится больше въ угнетенномъ состояніи, даже какъ бы въ состояніи спячки.

При сильномъ возбужденіи съ буйнымъ бредомъ, багрово-краснымъ лицомъ, блестящими или налитыми кровью глазами подходитъ *Белладонна* 3—6, особенно когда имѣется боязнь свѣта или людей.

Страмоній 3—6. Больному кажется, что изъ всѣхъ угловъ комнаты къ нему надвигаются предметы, темнота и одиночество наводятъ на него страхъ и дѣлаютъ его безпокойнымъ; онъ очень болтливъ, смѣется, поетъ, проклинаетъ и молится; не можетъ спокойно лежать; движенія правильныя, какъ бы размѣренныя. Лицо ярко-красное.

Кали бромат. × 2. Особенно при мани у дѣтей; вскрикиваніе со сна; больному кажется, что кто-то на него набрасы-

Лѣченіе

вается, чтобы сдѣлать ему больно или убить; онъ воображаетъ, что окружающіе его не любятъ и хотятъ ему причинить дурное.

Лахезисъ 6. Симптомы, какъ при *Страмоніи*, только болтливость отличается тѣмъ, что больной не просто болтаетъ, но перескакиваетъ съ одного предмета на другой.

Опій 3. Спячка, перемежающаяся безсонницей, судорожныя состоянія, пугливость.

Ацид. муриатик. 3. Общая слабость, бредъ, сонливость, но невозможность заснуть или безпокойный сонъ съ метаніемъ въ разныя стороны.

Актеа × 3. При послѣродовой маніи; больная утверждаетъ, что она сходитъ съ ума, въ высшей степени подозрительна и недоувѣрчива, болтаетъ всякій вздоръ, сознавая это, но говоря, что не можетъ иначе; ей представляются крысы и тому подобное.

Вератрум. альб. 3. У женщинъ при нимфоманіи („бѣшенствѣ матки“) попеременно съ *Платина муриат. 3*; лишенные стыда разговоръ и поведеніе.

3. Меланхолія.

1. Простая меланхолія. Преобладающимъ явленіемъ оказывается тягостное ощущеніе неспособности къ какой-либо умственной, нравственной или физической дѣятельности (усиленіе того явленія, которое замѣчается и въ предѣлахъ нормы, въ особенности у нервныхъ субъектовъ, черезчуръ много занимающихся умственной работой); въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни развивается мало по малу полнѣйшая угнетенность духа, пренебреженіе жизненными потребностями, самоистязаніе, влеченіе къ самоубійству. Теченіе крайне медленное и продолжительное, но выздоровленіе все же возможно.

2. Активная меланхолія. Выдающійся симптомъ—неопредѣленный страхъ, безотчетная боязнь. Начинается разстройствомъ сна и кошмарами. Опасенія предстоящихъ несчастій. Выздоровленіе вполне возможно.

3. Меланхолія съ отупѣніемъ или оцепенѣніемъ. Также безотчетный страхъ, безсонница и тревожные сны. Но тутъ больной не обнаруживаетъ своего страха, а уходитъ глубоко въ самого себя, и въ немъ развивается состояніе глубокаго внутренняго напряженія. Полное, непробудное, упорное молчаніе.

Больной предается нерѣдко неудержимому рукоблудію; пищу болѣе или менѣе принимаетъ и вообще сколько нибудь все же заботится о чистоплотности, но только не въ тяжелыхъ случаяхъ, въ которыхъ сознаніе помрачается. Теченіе болѣзни весьма продолжительное—отъ 4—6 мѣсяцевъ до 1—2 лѣтъ. Выздоровленіе возможно, причемъ оно наступаетъ крайне медленно. Смерть бываетъ либо отъ самоубійства, либо отъ истощенія, либо, наконецъ, отъ какого нибудь случайнаго заболѣванія.

Въ трудныхъ случаяхъ необходимо пребываніе больного въ специальномъ заведеніи; въ легкихъ же случаяхъ достаточно устранить больного отъ обычныхъ его занятій и окружить его возможно бѣльшимъ покоемъ. Скука является для такихъ больныхъ хорошимъ средствомъ для поправленія здоровья. Вредны же, напротивъ того, всякаго рода развлеченія, утомительныя прогулки или путешествія. Вредно также дѣйствуютъ на больныхъ увѣщанія.

При болѣе сильномъ развитіи болѣзни очень полезно покойное положеніе въ постели, особенно для малокровныхъ и слабыхъ.

Надо заботиться о возможно лучшемъ питаніи больного и принимать мѣры для лучшаго его аппетита и пищеваренія. Лучше давать пищу часто и понемногу, нежели рѣже и по многу на разъ.

Изъ лѣкарствъ главными при меланхоліи являются:

Арсеник. × 3. Большая тоска и отчаяніе, боязнь одиночества; боязнь смерти; общая слабость, малокровіе.

Аурумъ З или *Аурумъ муріатик.* × 3—3. Малѣйшее противорѣчіе приводитъ въ сильное возбужденіе; недовольство жизни, наклонность къ самоубійству; больному кажется, что онъ потерялъ любовь близкихъ; что судьба противъ него, что онъ никому не нуженъ; онъ чувствуетъ сердечную тоску и дрожитъ отъ страха. Половое влеченіе усилено.

Игнація З. Затаенная грусть, наклонность къ слезамъ, разочарованіе въ любви, отверженная любовь; апатія.

Лазезисъ 6. Крайняя подавленность духа, плаксивость, особенно при пробужденіи со сна; тоска, отчаяніе; больному кажется, что онъ находится подъ вліяніемъ какой-то сверхчеловѣческой силы; раздвоеніе воли.

Пульсатилла З. Плаксивость; больная постоянно молится.

Вератрумъ З. Глубокая молчаливость, угнетенное, грустное

настроение; воображаемое несчастье и безутешность; периоды возбуждения с непристойными разговорами и выходками.

4. Сумасшествие. Паранойя.

Постоянное, глубокое изменение душевной личности, выражающееся главным образом тем, что внешние впечатления воспринимаются в совершенно искаженном виде, под влиянием болезненно-ненормальных внутренних ощущений, и перерабатываются в болезненно-изменное воззрение на окружающую среду и собственную личность. Характерными симптомами являются поэтому стойкие идеи бреда (навязчивые мысли) разного характера и направления. Отсюда и разные формы сумасшествия: депрессивный—с угнетенным настроением духа и экспансивный—с настроением, наоборот, приподнятым.

1) К депрессивным формам относятся:

Галлюцинаторный бред преследования со стороны разного рода врагов, внешних или же внутренних, предполагаемых больным в его собственном теле („бред одержимости“). В дальнейшем течении развивается угнетенное, безразличное к окружающему, отношение. Больной исполняет приказания, хотя медленно, нерешительно, сам заботится об удовлетворении своих потребностей. Болезнь может тянуться целые годы. Улучшение состояния возможно.

Комбинаторный бред преследования. Обманы чувств совершенно отсутствуют, а бред преследования является результатом внутренних соображений; у больного вырабатываются недоверие и подозрительность в отношении к нему окружающих, норовящих будто бы пакостить ему или даже погубить. Сюда же относится половой бред преследования (почти исключительно у женщин: в каждом встречном мужчине он готов подозревать покусителя на их женскую честь), бред ревности. Течение болезни—прогрессирующее.

Ипохондрическое сумасшествие. Предположение в себя мнимой, неизлечимой болезни. Течение болезни—прогрессирующее.

Сутяжное сумасшествие. Навязчивые идеи о нарушении правовых интересов обыкновенно на почве какой-нибудь действительной неудачи.

2) К экспансивным формам относятся:

Галлюцинаторный бредъ величія. Больной носится съ идеей объ особенной связи его съ Богомъ; слышитъ разные голоса въ этомъ смыслѣ. На ряду съ этимъ наблюдаются и угнетающія представленія, въ родѣ сознанія своей грѣховности и необходимости соотвѣтственнаго покаянія для достиженія предстоящаго величія. Часто бываютъ и ипохондрическія мысли. Настроение обыкновенно повышенное; разсудительность и память сохранены. Теченіе болѣзни крайне медленное, съ улучшеніями и ухудшеніями.

Комбинаторный бредъ величія. Поводомъ для образования идей бреда служатъ фантастическія сочетанія. Наиболѣе важнымъ, рѣшающимъ для всей жизни, является обыкновенно какое-нибудь видѣніе. Больной признаетъ себя преобразователемъ міра и соотвѣтственно этому дѣйствуетъ. Настроение — равномѣрное, самонадѣянное, разсудительность остается совершенно сохранной, равно какъ способность къ умственнымъ занятіямъ. Однако съ теченіемъ времени обнаруживается то болѣе медленное, то болѣе быстрое прогрессированіе душевной слабости; идеи величія становятся все болѣе нелѣпыми; больной считаетъ себя княземъ, царемъ, апостоломъ и проч. Сюда же относится религіозный бредъ.—Эротическое сумасшествіе: больной считаетъ себя необыкновеннымъ существомъ, обладающимъ важными преимуществами, начинаетъ замѣчать, что дѣйствительно-или мнимо высокопоставленная особа другого пола къ нему неравнодушна, любитъ его; это ведетъ часто къ рукоблудію.

Лѣчение сумасшествія сопряжено съ большими трудностями и требуетъ соотвѣтствующей обстановки (по возможности въ благоустроенныхъ специальныхъ заведеніяхъ), самаго заботливаго ухода и гуманнаго обращенія, при постоянномъ и бдительномъ надзорѣ.

Изъ лѣкарствъ соотвѣтствуютъ:

1) при депрессивныхъ формахъ, т. е. при явленіяхъ угнетенія духа:

Вератрум. 3. Тоска и безутѣшность въ воображаемомъ несчастіи; подавленное настроеніе; упорная молчаливость; слабая память; бредъ религіозный или на почвѣ влюбленности, съ непристойными въ послѣднемъ случаѣ разговорами и поступками; временныя состоянія возбужденности съ крикомъ и бѣганьемъ по комнатѣ.

Пульсатилла 3. Апатія, особенно у молодыхъ особъ жен-

лѣ

скаго пола, нервныхъ и склонныхъ къ плачу, страдающихъ неправильностями въ половой сферѣ. Грустное настроеніе, безучастность къ окружающимъ, постоянное моленіе. Пугающія видѣнія. Пульсатиллѣ подобны по дѣйствию *Графитъ* и *Сенія*.

Цинкъ 3—6. Бредъ со страхомъ; больной говоритъ о совершенномъ имъ преступленіи и боится привлеченія къ суду или преслѣдованію со стороны діавола. Головокруженіе до паденія, слабость соображенія и памяти. Большая слабость, отсутствіе аппетита, запоръ. Неодолимая сонливость или неосвѣжающій сонъ. Тупая головная боль во лбу или въ темени.

Нуксъ вомика 3—6. Ипохондрическое настроеніе, угрюмое, сердитое, раздражительное, вмѣстѣ съ тѣмъ подавленное. Запоръ, геморрой.

Игнація 3—6. Чувство глубокаго горя, невыказываемое наружу и скрываемое отъ окружающихъ; наклонность къ плачу. Подходить въ случаяхъ болѣе легкихъ и недавняго происхожденія. Нѣтъ той сердитости и раздражительности, явно выраженныхъ, какъ при *Нуксъ вомикѣ*.

Стафизагрія 3. Ипохондрическое настроеніе. Предшествовавшія половыя излишества. Стремленіе къ одиночеству и избѣганіе другого пола.

Калькареа карбоника 6—30. Особенно для молодыхъ золотушныхъ особъ съ блѣднымъ лицомъ и вялыми мышцами (у старыхъ особъ при такомъ сложеніи — *Барита карбон.*). Притупленность и отсутствіе энергіи, скрытая грусть и молчаливость. Безпокойный сонъ съ страшными сновидѣніями и громкимъ вскрикиваніемъ. Апатія, слабая память, приливы къ головѣ съ ощущеніемъ холода въ темени.

Силиція 6—30 (подобна *Кальк. карб.*). Слабая память, скверное настроеніе, угрызеніе совѣсти съ жалобами и слезами. Большая слабость, дрожаніе членовъ. Приливъ къ головѣ съ ощущеніемъ жара. Навязчивыя идеи: собираетъ иглы и ножи въ домѣ и постоянно опасается, какъ бы себѣ кто не повредилъ ими и т. п. Ухудшеніе всѣхъ симптомовъ ко времени новолунія.

Кромѣ упомянутыхъ лѣкарствъ надо еще имѣть въ виду: *Фосфори ацид.*, *Сабадилла*, *Анакардій*, *Аурумъ*, *Коккул.*, *Цикута*, *Каустик.*, *Ликоподій*, *Натр. муриат.*, *Арсеникъ*, *Оній*.

2) При экспансивныхъ формахъ, т. е. при явленіяхъ возбужденія, подходятъ слѣдующія лѣкарства:

Белладонна 3—6. Приливы къ головѣ, буйный бредъ, ужасающія видѣнія; сильная боязнь таковыхъ и стремленіе скрыться отъ нихъ. Припадокъ сильного возбужденія съ послѣдующимъ разслабленіемъ. Ухудшеніе послѣ полудня и къ вечеру.

Цимицифуга 3. Подобна Белладоннѣ и особенно у женщинъ; большая дрожательная слабость.

Гельземин. 3. Подобно Беллад., особенно при запозданіи регулъ и разстройствахъ пищеваренія.

Гюсциам. 3—6. При состояніяхъ полового экстаза; бѣшеная ревность; нимфоманія. Сонливость, спячка, со скрежетаніемъ зубовъ во снѣ и вскрикиваніями (подобно Белл. и Страмон.).

Страмоній 6—30. Быстрая смѣна идей и настроеній. Сильная возбужденность, болтливость, сварливость. Непристойныя рѣчи и таковыя же поступки. Стойкія идеи: будто тѣло сломано и т. п. Хуже наединѣ и въ темнотѣ.

Платина 6—30. Большая приподнятость настроенія, быстрая раздражимость; большое сомнѣніе и пренебрежительное отношеніе къ другимъ. Безудержная веселость при неподходящихъ поводахъ. Разочарованность въ жизни, съ большимъ, однако, страхомъ смерти. Сильная половая возбужденность у женщинъ.

Кромѣ указанныхъ лѣкарствъ надо имѣть еще въ виду въ экспансивныхъ формахъ сумашествія: *Опій, Сульфур., Коффеа, Валеріан., Агарик., Лахезисъ, Крокусъ, Вератр., Каннабисъ, Каладій, Селен.*

5. Прогрессивный параличъ. Паралитическое слабоуміе.

Болѣзнь эта является послѣдствіемъ глубокаго хроническаго пораженія мозга (размягченія его) и состоитъ въ постепенно развивающейся слабости во всѣхъ сферахъ душевной жизни. Постепенно и неудержимо развивается упадокъ дѣятельной способности и выносливости въ области мышленія, чувствованій и поступковъ, доходящій до полнѣйшаго распада душевной личности и до самаго тяжкаго безумія. Процессъ этотъ сопровождается обыкновенно разнообразными душевными явленіями раздраженія, состояніями возбужденія и угнетенія, которыя отъ описанныхъ выше состояній главнымъ образомъ отличаются только общимъ болѣе или менѣе выраженнымъ основнымъ характеромъ слабости. Иногда болѣзнь, именно—безпокойная форма ея, имѣетъ скоротечный характеръ (галлопирующій параличъ) съ быстрымъ тече-

ніємъ и смертію въ припадкѣ сильнѣйшаго душевнаго и нервнаго возбужденія.

Къ причинамъ этой болѣзни относится прежде всего сифилисъ, затѣмъ—алкоголизмъ, дѣйствіе солнечныхъ лучей и высокой температуры на голову, а также поврежденія головы и нервно-душевные потрясенія.

Въ начальномъ періодѣ эту болѣзнь легко смѣшать съ неврастеніей, но отличительнымъ признакомъ паралича служить слабость ума и чувствъ, тупость, своеобразное отсутствіе всякой критики, отсутствіе сознательнаго отношенія къ болѣзненнымъ явленіямъ; при неврастеніи, наоборотъ, имѣется повышенная чувствительность, сохранность умственныхъ способностей и мнительность. Кромѣ того при параличѣ имѣются крайне рѣзкіе пробѣлы памяти и видимыя нервныя разстройства, вродѣ небывшаго раньше заиканія, дрожанія языка, подпрыгиванія жилъ (усиленіе сухожильныхъ рефлексовъ), наряду съ прочими явленіями. Старческое слабоуміе отличается отъ общаго паралича постоянствомъ состоянія, причемъ двигательныя разстройства носятъ характеръ простыхъ параличей и парезовъ, кромѣ того—слабостію, развившейся въ преклонномъ возрастѣ.—При алкогольномъ параличѣ, въ противоположность общему, имѣется большая связность представленій и меньшія разстройства рѣчи, также рѣзкія проявленія галлюцинацій; кромѣ того—вполнѣ или относительно благопріятные результаты лѣченія.

Преобладающее значеніе при лѣченіи имѣютъ соотвѣтствующія гигиеническія мѣры, особенно же возможно болѣе благопріятныя условія обстановки и среды, въ которыхъ находится больной. Изъ лѣкарствъ показаны вообще тѣ-же, которыя приведены выше при лѣченіи душевныхъ болѣзней. Главнымъ же образомъ надо примѣнять при этой болѣзни: *Аурумъ муриатик.*, *Аурумъ іодат.*, *Нитри азид.*, *Гепар. сульф.*, *Каннабисъ*, *Физостигма*, *Цинк. цианат.*, *Кали фосфорик.*

Къ душевнымъ болѣзнямъ можно отнести еще

6. Алкоголизмъ. Пьянство.

Острое алкогольное отравленіе или опьяненіе выражается вначалѣ ускореніемъ душевной дѣятельности, но вслѣдъ за этимъ первымъ періодомъ наступаетъ второй, состоящій въ замедленіи и затрудненіи воспріятія внѣшнихъ впечатлѣній, т. е. за

періодомъ общаго возбужденія слѣдуетъ угнетеніе сознанія, чувствительности и движенія. У лицъ нервно-предрасположенныхъ періодъ возбужденія можетъ сопровождаться глубокимъ разстройствомъ сознанія и наклонностію къ убійству и самоубійству (алкогольное помѣшательство). При хроническомъ алкоголизмѣ постепенно исчезаютъ тѣ обычные мотивы къ дѣйствіямъ, которые составляютъ такъ называемое „нравственное чувство“, „характеръ“; мотивы чести, любви къ семьѣ и стыда—все это поглощается непреодолимымъ влеченіемъ къ алкоголю. Рядомъ съ потерей нравственнаго чувства проявляется наклонность къ поспѣшнымъ насильственнымъ актамъ и жестокимъ поступкамъ, къ грубому обращенію съ родными и пр. Часто однако у пьяницъ оказывается полное отсутствіи энергіи, благодушіе и податливость, но не по отношенію къ своимъ домашнимъ, а къ чужимъ, въ заведеніи для душевно-больныхъ, въ тюрьмѣ и т. п., когда они вынуждены къ продолжительному воздержанію. Чѣмъ дальше, тѣмъ все болѣе падаютъ умственныя способности, является ослабленіе памяти и пр. и развивается состояніе сумасшествія, прежде всего запойный бредъ (бѣлая горячка—делириумъ тременсъ), припадокъ котораго продолжается каждый разъ 1—2 недѣли. Предсказаніе въ смыслѣ полнаго выздоровленія обыкновенно крайне неблагопріятно. Настойчивымъ вмѣшательствомъ можно однако добиться продолжительнаго воздержанія отъ водки и такимъ образомъ предупредить дальнѣйшее паденіе больного.

При остромъ спиртномъ отравленіи, больного освобождаютъ отъ тѣсныхъ платьевъ, кладутъ высоко голову и прикладываютъ къ ней холодные компрессы. Къ носу подносятъ *нашатырный спиртъ*, котораго цѣлесообразно дать и внутрь нѣсколько капель въ водѣ. При отсутствіи у него сознанія и трудномъ дыханіи, ставятъ нѣсколько укусовыхъ клистировъ и даютъ рвотное средство, если можно предположить присутствіе спиртной жидкости въ желудкѣ. При маломъ и слабомъ пульсѣ даютъ черный кофе или *Мосхусъ* $\times 2$, также *Камфора* внутрь, также наружно, втирая камфорный спиртъ въ область груди. Противъ оставшагося послѣ опьяненія желудочнаго катарра: *Нуксъ-вои*, $\times 3$.—При бѣлой горячкѣ: *Дигиталисъ* $\times 2$, холодные компрессы на голову, успокоивающія обертыванія. Также *Беллад.*, *Страмоніум.*, *Антимон. тарт.*, *Опіумъ* и проч.—При явленіяхъ упадка силъ: *Арсен. альб.*

Лѣченіе пьянства, и вообще привычнаго влеченія къ спирт-

нымъ напиткамъ, сводится главнымъ образомъ къ общему лѣченію организма, всѣхъ его органовъ (см. „хронич. катар. желудка“, „болѣзни печени“ и пр.).

Полезнымъ лѣкарствомъ для отученія отъ алкоголя является *Арника* Θ или $\times 1$ (поперемѣнно съ *Нуксъ-вом.* $\times 3$) по 2—3 приѣма въ день того и другого. Благодаря Арникѣ, возможно, безъ всякихъ опасеній, сразу же лишить привычнаго пьяницу водки, такъ какъ Арника влѣяетъ возбуждающимъ образомъ на сердечную мышцу и тѣмъ предупреждаетъ ослабленіе ея, обусловливаемое отсутствіемъ привычнаго возбуждителя, т. е. алкоголя. Полезно для этой цѣли и *Камфора Рубини*.

Отдѣлъ пятый.

Болѣзни пищеварительныхъ органовъ.

Содержаніе этого отдѣла: А. Болѣзни губъ и полости рта; болѣзни слюнныхъ железъ. Б. Болѣзни мягкаго нѣба и глотки. В. Болѣзни пищевода, желудка и кишекъ. Г. Болѣзни печени и селезенки.

А. Болѣзни губъ и полости рта; болѣзни слюнныхъ железъ.

Содержаніе этого (А) под-отдѣла: I. Болѣзни губъ: 1) Губной лишай, 2) Гипертрофія губъ, 3) Трещины губъ, слущиваніе кожицы, ссадины и пр. II. Болѣзни языка. Строеііе и видъ языка (нормальный и ненормальный). 1) Воспаленіе языка. 2) Язвы языка. 3) Опухоли языка. III. Болѣзни слюистой оболочки рта: 1) Воспаленіе слиз. обол. рта, 2) Афты, 3) Плѣсневка, 4) Гнилость рта и гангрена щеки (нома). IV. Болѣзни слюнныхъ железъ: 1) Слюнотеченіе, 2) Свиііка (заушница). 3) Лягушечья опухоль, 4) Воспаленіе подчелюстн. железъ и подъязычной клѣтчатки (Ангина Людвига). V. Дурный запахъ изо рта и ненормальности вкуса. VI. Болѣзни зубовъ: Зубная боль разнаго рода. Характеристика лѣкарствъ въ отношеніи зубной боли. Прорѣзываніе зубовъ и уходъ за зубами.

I. Болѣзни губъ.

1) **Губной лишай.** Болѣзнъ эта является въ видѣ мелкихъ, свѣтлыхъ пузырьковъ, мутнѣющихъ и засыхающихъ въ плоскія корки, по отпаденіи которыхъ губа заживаетъ безъ рубцовыхъ слѣдовъ. Пузырьки могутъ слиться въ одинъ общій волдырь. Въ мѣстѣ высыханія ощущается часто жженіе, также зудъ, а

иногда и боль. Причиною можетъ быть либо мѣстное раздраженіе, либо общее лихорадочное заболѣваніе. У людей, predisposed къ этой сыпи, таковая вызывается часто не только отъ нѣкоторыхъ пищевыхъ веществъ, какъ селедка, икра, сыръ и т. п., но и отъ прикосновенія слюны рта даже здороваго человѣка (при поцѣлуяхъ) и отъ питья съ нимъ изъ одного и того же сосуда. Изъ лихорадочныхъ болѣзней особенно рѣзко губной лишай бываетъ при воспаленіи легкихъ, при тифѣ же онъ рѣдко наблюдается. Онъ бываетъ также при болѣзняхъ полости рта и при остромъ катаррѣ желудка, также иногда у женщинъ во время регулъ и отъ душевнаго волненія.

Наружно смазывать миндальнымъ масломъ или *масломъ-русъ*; при образованіи корокъ — *анисъ-масломъ* или *анисъ-помадой*. Раза 2—3 въ день полоскать ротъ растворомъ изъ 20—30 капель *Меркур. корроз.* × 2 на стаканъ воды.

Внутрь употребляютъ средства, показанныя основной болѣзнію (лихорадочной, желудочной, маточной и проч.). Главнымъ образомъ приходится примѣнять *Меркур.*, *Русъ*, *Арсен. альб.* *Кали іодат.*, *Пульсат.*, *Ирисъ* — при лихорадочныхъ и желудочныхъ явленіяхъ; *Пульсат.* и *Сенія* — при маточныхъ страданіяхъ (также *Анисъ* и *Лаксезисъ*); *Игнація*, *Гельземинъ* и проч. при нервныхъ болѣзняхъ.

2) **Гипертрофія губъ.** Подъ такой гипертрофіей разумѣютъ безболѣзненное, хроническое, очень длительное опуханіе губъ, особенно верхней, и именно, красной ея части, до такой степени, что иной разъ является даже полный выворотъ ея. Болѣзнь эта встрѣчается почти только у золотушныхъ дѣтей. Нижняя губа значительно меньше припухаетъ, чѣмъ верхняя; это объясняется тѣмъ, что верхняя губа въ гораздо большей мѣрѣ подвергается раздражающему влиянію истекающей изъ носа слюны (отъ хроническаго насморка) и механическому отъ частаго сморканія и вытиранія. — Гипертрофіи губъ не слѣдуетъ смѣшивать съ врожденной двойной губой.

Лѣченіе — противозолотушное (см. Золотуха). Главными средствами являются: при воспалительномъ состояніи — *Белладонна*, также *Анисъ*, вообще же — *Меркур. солуб.*, *Калькар. карбон.*, *Барита карбон.* При слишкомъ безобразящей гипертрофіи губъ помощь возможна только отъ оперативнаго вмѣшательства.

3) **Трещины губъ, слущиваніе верхней кожицы губъ.** Означен-

ныя заболѣванія встрѣчаются при болѣзняхъ [полости рта, при губномъ лишаѣ, при лихорадочныхъ болѣзняхъ, отъ дурной привычки скусыванія верхней кожицы губъ зубами; у нѣкоторыхъ людей имѣется особое предрасположеніе къ такимъ измѣненіямъ на губахъ.

При трещинахъ на губахъ показаны: *Арника, Бріонія, Калькар. карбон., Игнація, Нуксъ вомика, Фосфоръ, Карбо вегетаб., Кансикумъ.*

Заживленіе трещинъ обыкновенно затрудняется тѣмъ, что при смѣхѣ онѣ постоянно разрываются вновь. Въ такихъ случаяхъ существенную пользу приноситъ полоска *арниковаго пластыря*, наклеиваемая на пораженное мѣсто губы.

При ссадинахъ на губахъ (въ углахъ рта): *Ацид. нитрик., Меркур., Арсен., Натр. муриат., Нуксъ вом.*

При слущиваніи верхней кожицы губъ: *Нуксъ-вом., Кониумъ, Сульфуръ.*

При сухости губъ: *Арсеник., Аконит., Беллад., Бріонія, Русъ, Меркур.*

Опухоли и новообразованія на губахъ относятся къ области хирургіи. О ракъ губы см. въ „Отдѣлѣ десятомъ“.

II. Болѣзни языка.

**Строеніе
языка.**

Языкъ состоитъ изъ группы мышцъ, снабженныхъ нервами и кровеносными сосудами. Языкъ покрытъ слизистой оболочкой, на нижней поверхности гладкой, на кончикѣ же и на спинкѣ языка имѣются сосочки въ видѣ отростковъ, шиповъ или бородавочекъ; изъ нихъ большіе на корневой части. Сосочки эти нормальны и имѣются у всѣхъ людей.

Въ общемъ, языкъ представляется и въ верхней части у большинства людей довольно гладкимъ, у нѣкоторыхъ же имѣются на немъ болѣе или менѣе глубокія борозды, придающія ему морщинистый видъ, но не имѣющія связи съ какимъ либо заболѣваніемъ; въ случаѣ же катарральнаго или язвеннаго процесса эти борозды языка служатъ обыкновенно мѣстомъ образованія язвъ и трещинъ.

**Нормальный
видъ языка.**

Въ нормальномъ состояніи языкъ на кончикѣ и ближайшихъ частяхъ — розоваго цвѣта съ красными крапинами (сосочками); кзади, изъ за большей густоты и величины бѣлыхъ сосочковъ, поверхность становится свѣтлѣе, бѣловато-розовою и

шероховатую; еще же дальше кзади, особенно посерединѣ, языкъ совсѣмъ бѣлый или желтовато-бѣлаго цвѣта, что зависитъ отъ длины и густоты сосочковъ.

Ненормальныя измѣненія вида языка:

Ненормальныя
виды я

Желто-обложенный языкъ бываетъ у нѣкоторыхъ больныхъ, страдающихъ расстройствомъ пищеваренія; при желтухѣ, однако, онъ не такъ сильно желтѣетъ, какъ кожа. Обыкновенно же при расстройствахъ пищеваренія наблюдается бѣлый налетъ, который—по мѣрѣ улучшенія—пропадаетъ.

Бурокрасный, бурый и черный налетъ на языкѣ образуется только у тяжелыхъ больныхъ, но онъ бываетъ такимъ также отъ пищевыхъ веществъ и напитковъ, также отъ крупныхъ дозъ желѣзистыхъ препаратовъ, отъ небольшихъ количествъ засохшей крови, излившейся изъ мелкихъ трещинъ слизистой оболочки при внезапномъ напряженіи сухого языка; но отъ подобныхъ причинъ измѣненный цвѣтъ у людей съ нормальнымъ языкомъ скоро проходитъ, у тяжелыхъ же больныхъ, особенно у тифозныхъ, послѣ кофе, шоколада, красного вина, смородины, черники и т. п. языкъ остается чернымъ въ теченіе нѣсколькихъ дней.

Въ началѣ и въ болѣе легкихъ случаяхъ брюшного тифа языкъ покрытъ бѣлымъ налетомъ, причемъ очень часто на кончикѣ его имѣется красный, склонный къ высыханію, треугольникъ.

Бѣлый налетъ у грудныхъ дѣтей нормаленъ (отъ молочныхъ остатковъ).

У нѣкоторыхъ людей—въ теченіе всей жизни или вообще долгаго времени — безъ всякой опредѣленной причины налетъ на языкѣ представляется въ видѣ ограниченныхъ бѣловатыхъ островковъ разной формы.

При хроническихъ страданіяхъ желудка языкъ бываетъ часто совершенно гладкимъ, слишкомъ влажнымъ и краснымъ.

Нормально языкъ умеренно влаженъ, чрезмѣрная же влажность или—особенно же — сухость языка суть явленія ненормальныя. Только въ рѣдкихъ случаяхъ языкъ дѣлается совсѣмъ сухимъ у людей спящихъ съ открытымъ ртомъ, обыкновенно же, какъ только языкъ при этомъ начинаетъ высыхать, спящій тотчасъ же закрываетъ ротъ. У здоровыхъ людей сухость языка часто зависитъ отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, сильно соленыхъ и пряныхъ кушаньевъ и отъ чрезмѣрнаго куренія.

**Осмотръ
языка.**

Для осмотра языка требуется его высовывание; однако, какъ это ни странно, но далеко не всѣ люди умѣютъ, какъ слѣдуетъ, высовывать языкъ, и оказывается, что и этотъ простой актъ требуетъ иной разъ продолжительнаго упражненія. Нерѣдко люди, въ другихъ отношеніяхъ вполне разумные, на просьбу показать языкъ открываютъ ротъ, не высовывая языка, и, на настойчивое предложеніе, съ усиліемъ выдвигаютъ лишь кончикъ его. Обыкновенно это объясняется дѣйствительнымъ неумѣніемъ производить это движеніе, обусловливаемое сокращеніемъ опредѣленныхъ мышцъ языка, въ другихъ же случаяхъ, особенно у молодыхъ дѣвицъ изъ высшихъ слоевъ общества, это происходитъ отъ ложно понятой стыдливости или жѣманства.

Высовываемый языкъ у нѣкоторыхъ дрожитъ, что наблюдается у здоровыхъ, но нервныхъ людей или при лихорадкѣ и слабости.

Косое высовываніе языка можетъ быть отъ недостатка на одной сторонѣ нижняго ряда зубовъ или отъ параличнаго состоянія.

1) Воспаленіе языка.

Краснота и опуханіе языка, которое можетъ достигнуть такой степени, что языкъ не умѣщается во рту и высовывается наружу. Состояніе это сопровождается обильнымъ слюнотеченіемъ, съ дурнымъ запахомъ, сильной болью и лихорадкой. При надлежащемъ леченіи опухоль спадаетъ и языкъ выздоравливаетъ; въ другихъ случаяхъ болѣзнь кончается нагноеніемъ или хроническимъ затвердѣніемъ языка. Такое затвердѣніе надо отличать отъ затвердѣній (узловъ) сифилитическаго или раковаго происхожденія. Причиной могутъ служить раненіе чѣмъ либо постороннимъ или острыми, сломанными зубами, запущенныя язвы языка, также укусы насѣкомыхъ и т. п.

Лѣченіе.

Аконит. $\times 3$. При лихорадочномъ состояніи и колющихъ боляхъ.—*Арника* $\times 3$ (внутрь и Θ для полосканья въ растворѣ). Послѣ механическаго поврежденія или раненія, попеременно съ *Коніумъ*.—*Белладонна* $\times 3$ и *Гепар. сульф.* 3. При наклонности къ нагноенію.—*Меркур.* *солуб.* 3. При наступившемъ уже нагноеніи или изъявленіи.—*Аписъ* $\times 3$ или *Апизинъ* $\times 3$. При симптомахъ Белладонны, если послѣдняя недостаточна.—*Ледумъ* (внутрь и Θ для полосканія въ растворѣ). При воспаленіи отъ

укуса насѣкомаго.—*Сульфуръ* $\times 3$ или *Сульфур. iodat.* $\times 3$ при остающемся затвердѣніи.—*Силиція, Ацид. флуорик., Аурумъ (iodat.)*. Для той же цѣли, какъ и Сульфуръ.

2) Язвы языка.

Причиною можетъ быть обильная желудочная кислота или катарръ желудка, или острые края дуплистыхъ зубовъ, или старческая слабость, или худосочіе; далѣе отравление ртутью и проч.; язвы могутъ быть и раковыя.

Въ недавнихъ случаяхъ—*Меркур. солуб.*; въ болѣе затяжныхъ—*Ацид. муріат., Ацид. нитрик.*; противъ язвъ ртутнаго происхожденія—*Стафизагрія, Гепаръ сульф., Аурумъ муріат., Iod.* Въ случаяхъ, зависящихъ отъ испорченности соковъ, какъ, наприм., при ракъ,—*Арсеник., Коніумъ, Барита карбон., Силиція* (послѣднія два—особенно при затвердѣніи въ толщѣ языка). Полосканія какъ при гнилости рта (см. выше).

3) **Опухоли языка.** Ракъ языка—см. въ отд. 10-мъ: „Болѣзни крови и лимфы“. Опухоли языка могутъ быть и доброкачественныя (бородавки, кисты, жировики, фибромы), а также и отъ механическихъ причинъ или отъ воспаления, сифилиса. Главныя лѣкарства: *Арника, Меркур., Гепаръ, Барита карб., Коніумъ, Арсеник., Мезереумъ, Туя*, но, вообще говоря, опухоли языка, исключая таковыя отъ механическихъ поврежденій или воспаленія, относятся больше къ хирургии, нежели къ лѣкарственному лѣченію.

Параличъ языка. См. „Параличи“ стр. 143.

III. Болѣзни слизистой оболочки рта.

1) Воспаленіе или катарръ слизистой оболочки рта (Стоматитъ).

Слизистая оболочка воспаляется, т. е., краснѣетъ и набухаетъ, выдѣляя обильныя количества слизи. При этомъ ощущение жара и жженія во рту и чрезмѣрная чувствительность къ горячей или холодной, а также къ пряной и соленой пищѣ. Катарръ рта обыкновенно сопровождается и катарромъ зѣва въ большей или меньшей степени. Причиной этой болѣзни можетъ быть прямое раздраженіе слизистой оболочки острыми или ѣдкими веще-

ствами или же разстройство пищеварения или болѣзни зубовъ, также чрезмѣрное введеніе ртути въ организмъ и, наконецъ, заболѣваніе зѣва, глотки, слюнныхъ железъ. Слизистая оболочка рта воспаляется въ большей или меньшей степени и при лихорадочныхъ болѣзняхъ. Иногда стоматитъ является самостоятельной болѣзнію; въ такомъ случаѣ онъ имѣетъ хроническое теченіе и довольно мучителенъ для больного; слизистая оболочка рта усѣяна красными пятнами, со жгучимъ въ нихъ ощущеніемъ, затрудняющимъ жеваніе; мѣстами красныя пятна, особенно на задней половинѣ языка, покрываются сѣроватыми или бѣловатыми пятнами; при этомъ поражаются часто также зѣвъ и глотка.

Лѣченіе
катарра рта.

Въ началѣ — *Аконитъ* $\times 3$, когда имѣется лишь краснота слизистой оболочки и ощущение боли въ языкѣ. — *Белладонна* 3, при ощущеніи жара и особенно при набухшей слизистой оболочкѣ и при болѣзненномъ глотаніи. — *Капсик. аннуумъ* $\times 3$: если улучшеніе отъ Белладонны не наступило въ теченіе 1—2 дней.

При изъязвленіяхъ слизистой оболочки или при образованіи налетовъ давать, попеременно съ Белладонной, *Меркур. солуб.* 3 или *Меркур. корроз.* 3, или *Меркур. цианат.* 3 (при дифтеритѣ).

Если воспаленіе явилось слѣдствіемъ злоупотребленія ртутью, давать *Гепар. сульф.* $\times 3$ и *Нитри ацид.* 1. Въ хроническихъ случаяхъ — *Натр. muriat.*, *Сульфуръ*, *Алюмина*.

Во всѣхъ случаяхъ воспаленія рта необходимо устраненіе основной причины или лѣченіе основной болѣзни.

Частое полосканіе рта тепловатой водой или растворомъ изъ получайной ложки буры или 30-ти капель *Календула* Θ въ стаканѣ воды.

2) Афты.

Наблюдаются преимущественно у маленькихъ дѣтей при нечистомъ содержаніи рта, особенно у грудныхъ дѣтей (молочница), также нерѣдко у женщинъ во время мѣсячныхъ очищеній, беременности и кормленія грудью, и вообще у взрослыхъ, страдающихъ разстройствами пищеваренія, у курящихъ или жующихъ табакъ.

Слизистая оболочка рта, въ томъ числѣ и края и кончикъ языка, покрываются бѣлыми или желтоватыми язвочками или пятнами съ воспалительной окружностію и болѣзненнымъ жжениемъ во рту. Теченіе болѣзни обыкновенно благоприятное и не

сопровождается гнилостнымъ запахомъ изо рта. Язвочки заживаютъ въ короткое время при чистомъ содержаніи рта и устраненіи мѣстныхъ раздражающихъ вліяній. Часто полоскать ротъ холодной водой или, при большой чувствительности, тепловатой, съ прибавленіемъ на стаканъ воды 30-ти капель *Календула* *Θ*. Внутрь—*Меркур.* *коррозив.* 3 или 2.

3) Плѣсневка. Грибковыя образованія во рту.

Болѣзнь эта поражаетъ преимущественно дѣтей ранняго возраста и происходитъ отъ кислаго броженія во рту. Особенно благоприятныя условія для такого броженія имѣются у грудныхъ дѣтей, особенно у искусственно вскармливаемыхъ посредствомъ соски и у сосущихъ мѣшечекъ, наполненный хлѣбомъ, молокомъ и сахаромъ и такъ часто даваемый, къ сожалѣнію, дѣтямъ въ бѣдныхъ семьяхъ въ цѣляхъ успокоенія ихъ. Болѣзнь состоитъ въ томъ, что на слизистой оболочкѣ рта появляются бѣловатыя точки, плѣсневые отложенія, которыя, по мѣрѣ накопленія, образуютъ пленки, часто довольно плотныя. Подъ этими пленками слизистая оболочка воспаляется и изъязвляется и становится очень болѣзненной. При дальнѣйшемъ развитіи получаютъ признаки гнилости рта (см. ниже) съ вонючимъ выдохомъ, слюнотеченіемъ, также опуханіемъ шейныхъ железъ. Кормленіе ребенка въ такихъ случаяхъ затрудняется въ высшей степени вслѣдствіе испытываемой имъ при этомъ жгучей боли во рту; температура тѣла повышается, пищевареніе разстраивается; являются упорные изнуряющіе поносы, зеленые, жидкіе, особенно въ тѣхъ нерѣдкихъ случаяхъ, когда плѣсневые образованія распространяются изъ полости рта по слизистой оболочкѣ всего пищеварительнаго канала вплоть до задняго прохода.

У взрослыхъ плѣсневка развивается только вслѣдствіе и въ теченіе длительныхъ, изнуряющихъ болѣзней, какъ чахотка, сахарная болѣзнь, ракъ. У нихъ плѣсневка не такъ опасна сама по себѣ, какъ служитъ признакомъ сильно уже развившагося худосочія и знаменуетъ собою приближеніе рокового исхода.

Лѣченіе грибковыхъ образованій должно быть главнымъ образомъ предохранительное. Крайне необходимо прежде всего чистое содержаніе рта у ребенка и груди у кормилицы или сосковъ, употребляемыхъ при искусственномъ кормленіи. Полость рта ребенка вытирать 2—3 раза въ день чистой тряпочкой, смо-

**Причина
и признакъ
болѣзни.**

Лѣченіе

ченною въ растворѣ буры (чайная ложечка на стаканъ воды, къ которой можно прибавить еще 30 капель *Календула* Θ); груди кормилицы послѣ каждого кормленія обмывать крѣпкимъ растворомъ буры (1 — 2 столовые ложки на стаканъ воды); этимъ же растворомъ обмывать соски рожковъ, если таковые употребляются; къ этому раствору можно прибавлять *Календула* Θ 1—2 чайн. ложки на стаканъ.—Причиной отказа ребенка отъ груди при плѣсневкѣ служить иной разъ сухость его рта; въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ, прежде чѣмъ дать грудь, смочить ему ротъ нацѣженнымъ изъ груди молокомъ, послѣ чего ребенокъ охотнѣе беретъ грудь. Если этотъ симптомъ имѣется, надо давать ребенку, рядомъ съ другими лѣкарствами, также *Бріонія* $\times 3$. Вообще же—*Бораксъ* $\times 2$: пищевареніе разстроено, поносъ съ слизью, боль во рту, ребенокъ отказывается сосать грудь.—*Меркур. солуб.* 3: при обильномъ слюнотеченіи; поносъ сопровождается болѣзненнымъ жиленіемъ.

При сильномъ упадкѣ питанія и при признакахъ болѣе глубокой испорченности крови образованіе плѣсневки можетъ стать опаснымъ для жизни ребенка. Въ такихъ случаяхъ дается *Ацид. муріатик.* $\times 3$ или *Ацид. сульфурик.*, или *Ацид. нитрик.* $\times 3$ (см. также ниже: Гнилость рта).

4) Гнилость рта и Гангрена щеки или нома.

Гнилость рта. При гнилости рта имѣются краснота, припухлость, разрыхленіе десенъ, обыкновенно болѣе или менѣе кровоточивыхъ; выдѣленіе гнилостной, съ дурнымъ запахомъ, слизи. Въ дальнѣйшемъ теченіи дѣсны, а также внутренняя поверхность щекъ и языкъ изъязвляются, выдѣленіе слюны и слизи увеличивается; опухаютъ сосѣднія железы и появляется лихорадочное состояніе. Въ обыкновенныхъ случаяхъ наступаетъ выздоровленіе въ — 2 3 недѣли (при ртутной гнилости — въ 4 — 6 недѣль).—Причины болѣзни: худосочіе врожденное или пріобрѣтенное вслѣдствіе нездороваго питанія (цынга); отравленія ртутью, свинцомъ, фосфоромъ; встрѣчается и при каріозныхъ зубахъ и при чрезмѣрномъ накопленіи зубного камня, также при сифилисѣ, при сахарной болѣзни и при дифтеритѣ.

Гангрена Разновидностію гнилости рта является, хотя и рѣдко, такъ **щеки (нома).** наз. гангрена (омертвѣніе) щеки или нома. Эта болѣзнь наблюдается особенно у дѣтей между 3 и 8 годами жизни и разви-

вается на почвѣ глубокой испорченности крови послѣ тяжкихъ заболѣваній корью, скарлатиной, оспой или т. п. Она протекаетъ безъ болей, чѣмъ отличается отъ обыкновенной гнилости рта, но зато мало по малу развивается общая слабость, ткань щеки разъѣдается все болѣе и болѣе, десны опухаютъ и разрыхляются, зубы расшатываются; изо рта идетъ рѣзкій гниlostный запахъ; температура тѣла повышена, пищевареніе разстроено. Въ дальнѣйшемъ теченіи холодѣютъ конечности, пульсъ слабѣетъ все больше, появляется сильная жажда; затѣмъ спячка и смерть.

Меркур. коррозив. 2. Во всѣхъ случаяхъ гнилости рта, за исключеніемъ лишь такой, которая произошла отъ ртути; при ртутной гнилости рта надо давать *Нитри ацид.* 1, раньше или послѣ *Кали іодат.* 1, также *Гепаръ сульф.* × 3 и *Карбо вегетаб.* 3. Полоскать растворомъ *Гидрастисъ* Θ (чайная ложка на стаканъ воды).

Надо имѣть въ виду еще слѣдующія лѣкарства:

Ацид. муриат. или *Ацид. нитрик.* При болѣе глубокихъ изъязвленіяхъ и сильной боли и значительномъ упадкѣ питанія. — *Стафизагрія* (подобно Меркурію и послѣ злоупотребленія Меркуріемъ). Кровоточащія, блѣдныя, рыхлыя десны, испорченныя, шатающіеся зубы, колющія боли въ языкѣ, увеличенныя шейныя железы, сильный упадокъ питанія. — *Арсеникъ* (подобно дѣйствуетъ и *Лазезисъ*). Кровоточащія багроваго цвѣта десны, багровыя или черныя язвы; острая боль и ощущеніе жара во рту; необычайная раздражительность нервной системы. — *Фитолакка*, *Креозотъ*, *Кали фосфорик.*, *Кали бихром.*

Полоскать почаще растворомъ *Гидрастисъ* Θ, или *Фитолакка* Θ, или *Календула* Θ — изъ 30-40 капель на стаканъ воды. Полезны также полосканія настоемъ обыкновеннаго чая. Вредны всякія раздражающія и прижигающія средства. Необходимо заботиться объ общемъ укрѣпленіи организма.

IV. Болѣзни слюнныхъ железъ.

1) Слюнотеченіе.

Слюна вырабатывается тремя железами, изъ которыхъ она черезъ слюнные трубочки протекаетъ въ ротъ и играетъ важную роль въ дѣлѣ пищеваренія; железы эти суть: подъязычная, подчелюстная и околоушная. Слюнотеченіемъ называется чрезмѣрное

скопленіе слюны во рту, причемъ она часто непроизвольно вытекаетъ изъ послѣдняго наружу. Причины бываютъ весьма различныя: заболѣванія самого рта или желудка, чрезмѣрное употребленіе ртути въ большихъ дозахъ, отзывающіяся на слюноотдѣленіе заболѣванія матки, беременность; мозговья и душевныя болѣзни и проч.

Лѣченіе
слюнотеченія

Лѣченіе—сообразно съ причиною. При страданіяхъ слизистой оболочки рта, зубовъ, слюнныхъ железъ—*Белладонна*. При болѣе сильномъ слюнотеченіи, не ртутнаго происхожденія,—*Меркур. солуб.* Въ хроническихъ случаяхъ—*Сульфуръ* или *Алюмина*. При страданіяхъ желудка или поджелудочной железы—*Барита карбон.*, *Натр. муриат.*, *Гепаръ сульф.* Послѣ злоупотребленія ртутью—*Іод.*, *Ацид. нитрик.* Вообще же говоря, слюнотеченіе является всегда лишь однимъ изъ симптомовъ какой-либо болѣзни, противъ которой и должно быть направлено лѣченіе (болѣзни горла, спазмъ глотки, опухоль языка, нервныя страданія, параличъ рта и глотки).

2) Свинка (Заушница, Паротитъ).

За и подъ ухомъ, въ направленіи къ шеѣ и щекѣ, т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится заушная слюнная железа, образуется быстро, втеченіи 1 дня, при сопровождающей лихорадкѣ въ 39—40° Ц., опухоль, мягкая, по срединѣ твердоватая, болѣзненная, особенно при раздвиганіи челюстей, которое затруднено; кожа на опухоли нормальная, не воспаленная. Болѣзнь эта имѣетъ часто эпидемическій характеръ и поражаетъ исключительно молодой возрастъ, преимущественно дѣтей, причемъ у мальчиковъ припухаетъ иногда одновременно яичко, а у дѣвушекъ—большая срамная губа. Втеченіи 6—7 дней температура постепенно падаетъ до нормы и въ то же время опухоль уменьшается и, наконецъ, совсѣмъ исчезаетъ. Если болѣзнь продолжается дольше, то можно опасаться нагноенія, которое и бываетъ нерѣдко. Очень рѣдко остается послѣ болѣзни затвердѣніе железы, мало подвижное и безболѣзненное.

Лѣченіе.

Главное средство—*Фитолакка* × 2, черезъ 2 часа по 3—5 капель.—Кромѣ того *Меркур.-солуб.*, *Беллад.*, а также *Пульсат.*, *Русъ*, *Бром.*—При нагноеніи: *Гепаръ* и *Силиція*, которыя продолжать и при вскрывшемся нарывѣ.—Если гной грязный и вонючій: *Арсен.* и *Креозот.*—Противъ оставшагося затвердѣнія:

Барита-карбон., Коніумъ, Калькар.-карбон., Калькар.-іодат. Сульф.-іодат., Аурум.-іодат. Наружно мазь изъ *Фитолакка* и *Красн. меркур. преципитат.*

3) *Лягушечья опухоль, Ранула.*

Образуется во рту по одной сторонѣ уздечки языка (подъ кончикомъ его) въ подбородной части нижней челюсти и можетъ вырасти до величины куриного яйца, выпирая языкъ кверху. Содержимое такой опухоли—скопленіе слюны въ расширенныхъ выводныхъ протокахъ подъязычной и подчелюстной железъ, вслѣдствіе закупорки ихъ.

4) *Воспаленіе подчелюстныхъ железъ и подъязычной клѣтчатки.*

Ангина Людвига (*Angina Ludovici*, Ангина Любвици).

Впервые описалъ эту болѣзнь проф.-докторъ Людви́гъ, откуда и ея названіе. Воспаленію подвергаются при этомъ не только подчелюстныя железы, но и клѣтчатка и прочія мягкія части въ области подъязычной и подбородочной.

Область эта опухаетъ, и опухоль при умѣренныхъ боляхъ становится все болѣе твердой и въ теченіе нѣсколькихъ дней, увеличиваясь, распространяется на всю переднюю часть шеи, выполняя все пространство между подбородкомъ и грудной костью. Кожа на опухоли туго натянута и красна. Нижняя челюсть мало или вовсе неподвижна, глотаніе затруднено, въ трудномъ случаѣ—и совсѣмъ невозможно, вслѣдствіе тѣсноты во рту, образуемой напирющей на дно полости рта опухолью. При сдавливаніи или при отека гортани и дыхательнаго горла являются признаки недостатка воздуха, удушье, посинѣніе лица, ослабленіе сердца съ малымъ, исчезающимъ пульсомъ.—Теченіе болѣзни всегда острое и въ большинствѣ случаевъ бурное и опасное. Въ болѣе легкихъ случаяхъ опухоль опадаетъ, не переходя въ нагноеніе, но разсасываніе происходитъ лишь медленно, въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. Въ большинствѣ же случаевъ появляется нагноеніе. Особенно опасна та форма ангины Людовици, которая поражаетъ выздоравливающихъ отъ тифа и т. п. остро-заразныхъ заболѣваній. Чѣмъ менѣе остро теченіе, тѣмъ исходъ болѣе благоприятенъ. Въ тяжелыхъ же случаяхъ надо опасаться смертельнаго исхода, который наступаетъ почти въ половинѣ случаевъ, или

При
т
бс

же остаются такіа дурныя послѣдствія, какъ свищевыя гнойныя ходы, сильно стягивающіе шею рубцы, костоѣда нижней челюсти.

Болѣзнь эта является по большей части самостоятельно и вообще не часто. Причиною можетъ быть мѣстное раздраженіе, простуда, особенно во время господства ревматическихъ и рожистыхъ заболѣваній, также сыпныхъ и тифозныхъ.

Лѣченіе.

Первыми лѣкарствами являются *Белладонна* $\times$ 3 и *Меркур. солюб.* 3, черезъ часъ попеременно. Наружно—*масло Белладонны*. При сильной опухоли, или если спустя 24-48 часовъ отъ этихъ средствъ не наступитъ облегченіе, давать *Меркур. солюб.* попеременно съ *Анисъ* $\times$ 3, кромѣ того *Беллад.* какъ питье; наружно—*Анисъ-масло*.—При наступившемъ нагноеніи, вмѣсто Меркурія, давать *Гепаръ сульфур.* 3. — При очень бурно и тяжело протекающей болѣзни—*Лазезисъ* 6.

Противъ остающагося уплотнѣнія и для разсасыванія опухоли показаны: *Сульфур.*, *Іод.*, *Барита карбон.*, *Калькареа карбон.*, *Силиція*.

Съ самаго начала болѣзни необходимо заботиться о тщательной чисткѣ рта зубной щеткой и растворомъ изъ 1 чайной ложки *Календула* Θ , въ стаканѣ воды. Примѣненіе холода, въ видѣ холодныхъ компрессовъ или пузыря со льдомъ, нецѣлесообразно и бесполезно, а показаны скорѣе согревающіе компрессы или прикладываніе лѣкарственныхъ маселъ (см. выше). Полезны также отвлекающіе способы: туловищное обертываніе, обертываніе ногъ; необходимо заботиться объ ежедневномъ опорожненіи кишечника. Діета—самая легкая.

Въ случаяхъ, угрожающихъ опасностію удушенія, можетъ стать необходимымъ оперативное вмѣшательство, т. е. вскрытіе нарыва, возможно болѣе глубокое.

V. Дурной запахъ изо рта и ненормальности вкуса.

Тутъ разумѣется дурной запахъ изо рта, причина котораго не нечистое содержаніе рта и не болѣзни зубовъ (гниеніе) или полости рта, вообще зѣва и горла и пр., а болѣе глубокія разстройства, именно—ненормальный составъ крови, вслѣдствіе болѣзней питанія (наприм. сахарная болѣзнь) или вслѣдствіе нервныхъ причинъ, напримѣръ, у дѣвушекъ въ періодъ созрѣванія.

Главнѣйшія лѣкарства, какія приходится примѣнять при

наличности этого симптома, суть слѣдующія. *Нуксъ вом.*: желудочныя страданія; дурной запахъ изо рта особенно по утрамъ.— *Пульсат.*: особенно по утрамъ и вечерамъ, при приторномъ вкусѣ. Также для дѣвушекъ въ періодъ созрѣванія (рядомъ съ *Аурумъ*). *Хамомилла*—если лишь послѣ ѣды.—*Ликопод.* или *Карбо-вегет.*: при давнишнемъ разстройствѣ пищеваренія.—*Графитъ*: при одновременномъ запахѣ изъ носа.

По характеру запаха, можно руководствоваться въ выборѣ лѣкарствъ слѣдующими указаніями:

гнилой запахъ: *Аурум.*, *Арсен.*, *Іод.*, *Графит.*, *Меркур.*, *Нитри-ацид.*, *Пульсатилла*;—кислый запахъ: *Нуксъ-вомика*;—запахъ стараго сыра: *Кали-карбоник.*;—чесночный запахъ: *Петролеумъ*;—землистый запахъ: *Манган. ацет.*

Полосканіе рта растворомъ *Календула* Θ въ водѣ (1—2 чайн. ложки въ стаканѣ воды).

Если причину дурного запаха изо рта являются каріозныя зубы или гнилыя корни, то лѣченіе должно быть соотвѣтствующее, зубоврачебное, безъ котораго никакія лѣкарственныя средства не принесутъ существенной пользы.

Ненормальный вкусъ во рту, отсутствіе вкуса.

Измѣненное вкусовое ощущеніе и отсутствіе вкуса суть не самостоятельныя болѣзни, а лишь симптомы, встрѣчающіеся при разнаго рода болѣзняхъ, рядомъ съ другими симптомами. Къ такимъ болѣзнямъ относятся разстройства пищеваренія, катарры, лихорадочныя состоянія и пр. Тотъ или другой характеръ вкусового ощущенія можетъ, однако, служить руководящей нитью для выбора тѣхъ лѣкарствъ, которыя надо имѣть въ виду для лѣченія основной болѣзни. Поэтому тутъ сопоставляются разнаго рода вкусы и соотвѣтствующія лѣкарства.

Горькій вкусъ: *Нуксъ вом.*, *Бріон.*, *Сульфур.*, *Хамомилла*, *Пульсат.*, *Вератр.*, *Меркур.*, *Калькар. карбон.*

Пища ощущается горькой: *Пульсат.*, *Хина*, *Арсеник.*, *Феррумъ*, *Гепаръ*, *Стафизагрія*.

Вкусъ крови: *Феррумъ*, *Сульфуръ*, *Ипекакуана*.

Сладковатый вкусъ: *Меркур.*, *Пульсат.*, *Бріонія*, *Сульфуръ*, *Хина*, *Феррумъ*. Если вкусъ такой лишь съ утра, то—*Сульфуръ*. Если хлѣбъ ощущается сладковатымъ, — *Меркур.*; если пиво, то—*Пульсатилла*.

Соленый вкусъ: *Карбо вег.*, *Меркур.*, *Фосфоръ*, *Пульсат.*, *Нуксъ-вом.*, *Арсен.*, *Реумъ*.

Пища ощущается соленой: *Карбо*, *Сульфуръ*; когда при этомъ вызывается кашель, то—*Карбо* и *Коккулусъ*.

Вкусъ кислый: *Реумъ*, *Ацид. фосфорик.*, *Нуксъ-вом.*, *Хина*, *Сульфуръ*, *Игнація*, *Пульсат.*, *Натр. муриат.*

Вкусъ металлическій: *Купрумъ*, *Кальк. карб.*, *Цинк.*

Вкусъ пригорѣлый или какъ бы вкусъ дыма: *Пульсат.*, *Бріон.*

Вкусъ землистый: *Нуксъ мосхата*, *Фосфоръ*, *Пульсат.*

Вкусъ гнилыхъ яицъ и вообще противный: *Пульсат.*, *Арсен.*

Вкусъ водянистый: *Хина*, *Капсик.*, *Стафизагія*, *Натр. муриат.*, *Игнація*.

Вкусъ жирнаго: *Силиція*, *Каустик.*, *Пульсат.*, *Аса фетида*, *Ликопод.*, *Валеріана*.

Вкусъ травянистый. *Нуксъ вом.*, *Фосфоръ*.

Вкусъ слизи или клея: *Арника*, *Русъ*, *Реумъ*, *Платина*.

Вкусъ слишкомъ тонкій: *Хина*, *Коффеа*, *Беллад.*

Вкусъ слабый: *Нуксъ вом.*, *Пульсат.*, *Антим. круд.*, *Калькар. карбон.*, *Сульфуръ*.

Отсутствіе всякаго вкуса: *Вератр.*, *Беллад.*, *Пульсат.*, *Реумъ*, *Бріонія*, *Гепаръ*, *Силиція*, *Натр. карбоник.*

Безвкусіе при употребленіи пищи: *Меркур.*, *Бріонія*, *Нуксъ вом.*, *Арсен.*, *Стафизагія*.

VI. Болѣзни зубовъ.

Зубная боль.

**Нервная
зубная боль**

Въ зависимости отъ причины зубная боль бываетъ разная. Нервная зубная боль послѣ душевныхъ волненій разнаго рода, у нервныхъ, истеричныхъ субъектовъ, у женщинъ во время регулъ, въ періодѣ развитія, въ первой половинѣ беременности. Отличительной чертой этой боли является то, что она распространяется на цѣлый рядъ зубовъ. Характеръ боли — стрѣляющій, рвущій и колющій, внезапное появленіе и часто столь же внезапное прекращеніе.—Главныя въ такихъ случаяхъ лѣкарства: *Нуксъ вом.*, *Русъ*, *Игнація*, *Спигелія*, *Коффеа*, *Платина*, *Фосфоръ*. При періодическомъ появленіи болей: *Арсеник.*, *Хинин. сульф.* $\times 2$; послѣднее лѣкарство брать въ промежуточные дни, когда боли нѣтъ, по 2—3 приѣма въ день. Во время же

боли часто облегчаетъ *Антипиринъ* въ первомъ десятичномъ растираніи ($\times 1$).

Простудная и подагрическая зубная боль поражаетъ обыкновенно всю челюсть или половину ея. Боли отзываются въ соединенныхъ частяхъ и сопровождаются обыкновенно ощущеніемъ удлинненія цѣлаго ряда зубовъ и опухолью десенъ. — Лѣкарства: *Акон.*, *Меркур. корроз.*, а также *Бріон.*, *Нуксъ вом.*, *Русъ*, *Хамомила*, *Рододендронъ*, *Кольхик.*, *Стафизагрія* (послѣдняя особенно при гнилыхъ зубахъ), *Колоцинт*.

Приливающая и воспалительная зубная боль (при испорченныхъ зубахъ) является вслѣдствіе переполненія зубной мякоти кровью, что бываетъ при застояхъ въ венозной системѣ (брюшное полнокровіе, геморрой), во второй половинѣ беременности, равно какъ въ климактерическомъ періодѣ и въ періодѣ созрѣванія у дѣвочекъ и мальчиковъ. Характеръ боли пульсирующій (ударяющій); поражается всегда нѣсколько зубовъ. *Лѣченіе* должно быть, главнымъ образомъ, причинное; при испорченныхъ зубахъ и при гниющихъ корняхъ — преимущественно специально-зубоврачебное. При ясно выраженныхъ застойныхъ симптомахъ (геморрой, расширение ножныхъ венъ): *Нуксъ вом.* или также *Кардуус-маріан.*; заботиться о правильности испражнений (см. запоръ). У малокровныхъ и худосочныхъ: *Пульсат.*, *Феррумъ-карб.* $\times 2$, *Хина*. — При приливахъ къ головѣ: *Акон.* и *Беллад.*; при воспаленіи: *Хамомила*, *Меркур. сол.* и *Белладонна*; въ хроническихъ случаяхъ — *Сульфуръ*.

Зубной нарывъ (флюсъ). Вначалѣ *Меркур. сол.* и *Беллад.* Если дня въ два воспаленіе не проходитъ, а, напротивъ, ударяющая, пульсирующая боль усиливается: *Гепаръ* въ низшихъ растираніяхъ, черезъ часъ по пріему, принимать до тѣхъ поръ, пока болѣзнь пройдетъ; если флюсъ уже вскрылся, брать *Силицію*, пока имѣется выдѣленіе гноя и припухлость.

При зубной боли послѣ оперативнаго удаленія зуба: *Арника*. — При хроническомъ гноетеченіи изъ зуба или изъ челюсти (зубная фистула): *Нитри-ацид.*, *Лахезисъ*, *Арсен.*, *Сульфуръ*, *Силиція*, *Флуор. калы.*

При зубной боли у беременныхъ: *Беллад.*, *Бріонія*, *Мезереумъ*; при частыхъ повтореніяхъ — *Сенія* и другія.

При зубной боли у кормящихъ грудью: *Беллад.*, *Сенія*, *Меркур.*, *Калькар. карбон.*, *Нуксъ вом.*, *Хина*, *Сульфуръ* и друг.

Во время регулъ: *Хамомила*, *Пульсат.*, *Сенія*, *Кальк. карб.* и другія.

**Вспомог. мѣры
при зубной
боли.**

При нервной и простудной зубной боли — болѣе теплыя полосканія рта, при приливной и воспалительной — болѣе прохладныя. Для полосканія чаще всего подходит *Хамомила* Θ , — отъ 30—40 капель до чайной ложки на стаканъ воды. При испорченныхъ зубахъ полезнѣе полосканіе изъ *Стафизагрія* Θ въ той же пропорци. Наружно на щеку—при нервной или простудной боли—теплые или паровые компрессы изъ чистой воды или съ *Бріонія* Θ , *Русь* Θ , *Пульсат.* Θ , *Хамом.* Θ , при приливной же и воспалительной—холодные компрессы съ *Белладона* Θ , или тряпочку съ *Белладонна-масломъ*, поверхъ которой можно еще положить пузырь съ холодной водой. Холодныя примѣненія дѣлаются, однако, лишь въ томъ случаѣ, если они пріятны больному и доставляютъ ему длительное облегченіе. — Болящіе испорченные зубы часто не поддаются никакому другому лѣченію, какъ только специальному, зубоврачебному (пломбированіе, удаленіе). См. ниже: „Уходъ за зубами“.

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи зубной боли.

Белладонна $\times 3$. Зубная боль, приливая или воспалительная, тянущая, подергивающая, ударяющая; улучшеніе отъ холодной воды и въ покоѣ. Приливъ крови къ головѣ, сильная пульсація артерій, рожеподобная припухлость, ознобъ, жаръ, жажда; воспаленная десна. Ухудшеніе отъ ѣды, жеванія, движенія.

Бріонія $\times 2$. Отсутствие прилива или воспаления, боль больше простудная, дергающая, колющая, давящая; зубъ кажется какъ бы удлинившимся; боль усиливается ночью; холодъ большей частью облегчаетъ или по меньшей мѣрѣ не ухудшаетъ; наружная теплота лишь изрѣдка переносится; комнатная теплота не всегда усиливаетъ боль, ѣда же, особенно жеваніе, всегда. Лежаніе на больной сторонѣ облегчаетъ боль, обратно дѣйствуетъ лежаніе на здоровой сторонѣ. Болящій зубъ имѣетъ дупло. Припухлость и болѣзненность десенъ. Въ послѣднемъ случаѣ подходит и *Хамомила*.

Магнезія карбоника $\times 3$. Боль испорченнаго (каріознаго) зуба; боль особенно ночью, буравящая, рвущая, дергающая, невыносимая въ покоѣ, въ постели. Опухлость десны (поперемѣнно съ Меркур. или послѣ него).

Меркур. солюбилисѣ × 3. Боль тянущая, рвущая во многихъ зубахъ, особенно—въ корняхъ; сильное колотье, дерганіе; ощущение, какъ еслибы въ болящемъ зубѣ лежало что либо очень холодное или горячее. Буравящая боль. Боль часто мѣняетъ свой характеръ. Боль, непрерывная днемъ, усиливается ночью. Холодное усиливаетъ боль меньше, чѣмъ теплое. Боль усиливается на свѣжемъ воздухѣ, отъ холодного воздуха, отъ сквозняка, простуды, отъ ѣды. Наружная теплота на моментъ облегчаетъ, но затѣмъ еще болѣе усиливаетъ боль. Потребность постоянно мѣнять положеніе. Зубы обыкновенно дуплисты. Флюсъ. Обильное выдѣленіе слюны. Ночные поты, не облегчающіе. Опухлость шейныхъ железъ.

Нуксѣ вомика × 3. Прилившая, простудная или нервная зубная боль, то давящая, тянущая, то колющая или дергающая, отдающая въ уши, лицевыя кости, голову; усиленіе боли особенно къ утру, иногда же она лишь ночью. Отъ теплаго питья не хуже и не лучше. Боль усиливается отъ умственного напряженія, отъ кофе, отъ спиртныхъ напитковъ. Боль усиливается особенно отъ втягиванія холодного воздуха. — Наружная теплота и покой облегчаютъ. Флюсъ можетъ быть или не быть. У субъектовъ желчнаго темперамента или у привычныхъ къ кофе и вину или ведущихъ сидячую жизнь, страдающихъ геморроемъ и запоромъ. Показанъ часто попеременно съ Фосфоромъ).

Пульсатилла × 3. Простудная, прилившая, рѣже нервная зубная боль, колющая, роющая, рвущая; дерганье съ ощущеніемъ, какъ еслибы зубной нервъ вытягивали и вновь отпускали; боль ощущается не въ какомъ либо отдѣльномъ зубѣ, а распространяется на всю половину верхней или нижней челюсти. Ухудшеніе вечеромъ и ночью, отъ постельной и комнатной теплоты, отъ теплой пищи или теплаго питья, отъ ковырнанія зубочисткой. Улучшеніе отъ холодной воды, уксуса, отъ сна. Особенно характерно улучшеніе на вольномъ воздухѣ и усиленіе боли послѣ входа въ помѣщеніе. Боль въ одной половинѣ головы, рвущая боль въ ушахъ, лицевая боль; блѣдность лица, ознобъ. Подходить особенно для особъ малокровныхъ, плаксивыхъ.

Русс × 3. Простудная зубная боль, рѣже нервная. Боль тянущая, давящая, рвущая; или боль какъ отъ раны, или рѣжущая, или ѣдкая. Ощущеніе какъ бы шатающихся зубовъ; или зубъ дѣйствительно выдвинуть изъ своей луночки. Слюнотеченіе. Ухудшеніе отъ теплаго и холоднаго. Ночью и вечеромъ боль

сильнѣе. Особенно характерно облегченіе боли отъ наружной теплоты, но не постельной, и ухудшеніе отъ покоя. Лишь подергивающія боли уменьшаются отъ приложенія холодной руки. Движеніе облегчаетъ, при стояніи чувствуется лучше, чѣмъ при лежаніи. Безразлично, цѣлы ли зубы или дуплисты. (Въ первомъ случаѣ подходитъ попеременно съ Нуксъ вомика).

Силиція З. При нарываніи флюса (послѣ Беллад. и Гепарь), также при воспаленіи надкостницы и при зубныхъ фистулахъ.

Стигелія × З. Нервная или простудная зубная боль, не въ одномъ, а въ нѣсколькихъ зубахъ, особенно—переднихъ, тянущая, рвущая, дергающая. Боль сильнѣе днемъ, особенно послѣ ѣды, усиливается также отъ холодной воды, отъ жару и отъ свѣжаго воздуха, облегчается же отъ покоя и умѣренной теплоты. Лицевая боль, сердцебіеніе, судорожные припадки (истерическіе), ознобъ.

Стафизагрія × З. Боль въ испорченномъ зубѣ, грызущая; усиливается отъ дотрагиванія, жеванія, отъ попаданія пищи въ дупло зуба, отъ холоднаго воздуха; облегчается отъ теплоты. Болѣзненная припухость десны, которая кро оточить при прикосновеніи. Легкое подавливаніе на зубъ усиливаетъ боль, сильное подавливаніе, наоборотъ, облегчаетъ временно боль.

Сульфуръ × З. Часто повторяющаяся зубная боль, особенно по вечерамъ и ночью, усиливается отъ тепла и холода, отъ жеванія, также на свѣжемъ воздухѣ. Зубы испорченные. Кровоточающая, припухшая, болѣзненная десна. Наклонность къ приливамъ къ головѣ и къ заболѣваніямъ брюшныхъ органовъ.

Хамомила × З. Главное средство при простудно-приливной зубной боли, боль давящая, тянущая, дергающая. Боль не въ опредѣленномъ зубѣ, простирающаяся до уха и являющаяся приступами, особенно ночью. Ухудшается отъ кофе и крѣпкаго чая, отъ холоднаго и горячаго, отъ теплой постели; сильное безпокойство, капризность, плаксивость. Подходить особенно для женщинъ и дѣтей. „Синія капли“ зубныя, продающіяся въ гомеопатическихъ аптекахъ, состоятъ изъ спиртнаго раствора чистаго ромашковаго масла (Хамоиллы).

12) Прорѣзываніе зубовъ и уходъ за зубами.

Порядокъ прорѣзыванія зубовъ.	Въ 7—9 мѣсяцѣ	5.3.4.2.2.2.4.3.5 = верхній рядъ.
	прорѣзываются сред-	5.3.4.3.1.1.3.4.3.5 = нижній рядъ.
	ніе нижніе два рѣзца	Порядокъ прорѣзыванія молочныхъ зубовъ.
(1.1.), спустя нѣсколько недѣль — верхніе рѣзцы (2.2.): средніе,		

затѣмъ крайніе. Въ 12—13 мѣсяцѣ—крайніе нижніе рѣзцы (3—3) и почти одновременно передніе (верхніе и нижніе) щечные зубы. Въ 18—24 мѣсяцѣ прорѣзываются 4 клыка (4—4) и задніе (верхніе и нижніе) щечные зубы (5—5). Такимъ образомъ къ концу второго или къ началу третьяго года прорѣзываніе всѣхъ 20 молочныхъ зубовъ оканчивается. Выпаденіе этихъ зубовъ и замѣна ихъ новыми, постоянными, начинаются на 5—6 году жизни и продолжаются нѣсколько лѣтъ; втеченіе этого времени прорѣзываются еще по 2 щечныхъ зуба съ каждой стороны въ верхней и нижней челюсти, такъ что въ зрѣломъ возрастѣ имѣется уже 28 зубовъ и, наконецъ, въ возрастѣ 17—40 лѣтъ прорѣзываются 4 послѣднихъ щечныхъ зуба, такъ наз. зубы мудрости; итого, значить, всѣхъ зубовъ къ концу прорѣзыванія должно быть 32.

Упомянутый порядокъ прорѣзыванія зубовъ часто нарушается, или та или другая группа зубовъ опаздываетъ въ своемъ появленіи (у слабыхъ, рахитичныхъ дѣтей). Затѣмъ процессъ прорѣзыванія бываетъ часто трудный и болѣзненный, отзываясь раздражающимъ образомъ на другихъ органахъ и вызывая въ нихъ различнаго рода разстройства, начиная съ воспаленія рта, поноса и т. п. и кончая судорогами (конвульсіями у маленькихъ дѣтей).

Надо, однако, быть осторожнымъ въ приписываніи того или иного разстройства зубамъ. Прорѣзываніе зубовъ, хотя бы и трудное, гораздо рѣже служитъ причиной серьезныхъ разстройствъ въ организмѣ, чѣмъ обычно думаетъ публика, и если, полагаясь на неустранимость причины, не принять надлежащихъ мѣръ противъ возможныхъ серьезныхъ заболѣваній (мозга, легкихъ, желудка, кишекъ и пр.), зависящихъ яко бы отъ неправильнаго прорѣзыванія зубовъ, то рискуютъ дать развиваться такимъ заболѣваніямъ до опасной степени. Поэтому, каждый случай прорѣзыванія зубовъ, сопровождающійся какимъ либо разстройствомъ, не долженъ оставаться безъ лѣченія.

Для выбора лѣкарствъ можно руководствоваться слѣдующими показаніями:

1) Зубная боль: *Хамомила* $\times$ 3—при сильномъ безпокойствѣ ребенка, при крикѣ и плачѣ, особенно ночью.

Меркур. солуб. 3—при краснотѣ десенъ, при жарѣ и сухости рта, при слюнотеченіи, скрежетаніи зубами, при зеленыхъ или слизистыхъ испражненіяхъ. Если прорѣзываніе зубовъ продолжается долго, что бываетъ у золотушныхъ, то давать *Калькареа карбоника* 3 или 6; у страдающихъ англійской болѣзнію еще и *Калькареа фосфорика* $\times$ 3 (см. еще выше „Зубная боль“).

Разстрой
при прорѣ
ваніи зу

и ихъ лѣ

2) Судорожныя явленія: при бессонницѣ—*Хамомила* $\times 3$ или *Коффеа* $\times 2$, 1 или 2 раза въ сутки; при легкихъ и частичныхъ подергиваніяхъ—*Игнація* $\times 3$; при судорогахъ, сопровождающихся сонливостію — *Опій* $\times 3$; при обихъ судорогахъ—*Цинк.* 3 или *Мосхусъ* $\times 2$ (см. еще „Судороги“ стр. 129).

3) Приливъ крови къ головѣ или лихорадочное состояніе: при приливѣ безъ повышенія температуры—*Белладонна* 3; при лихорадочномъ состояніи—*Аконитъ* $\times 3$; при надобности, то и другое попеременно, равно какъ попеременно или поочереди съ лѣкарствами, указанными подъ 1) и 2).

4) Разстройства кишечника: *Хамомила* $\times 3$ —при поносѣ; *Ипеакауана* 3—при рвотѣ; *Меркур. солуб.* 3—при слизистыхъ, зеленыхъ испражненіяхъ; *Пульсатилла*—при желтыхъ испражненіяхъ, похожихъ на рубленные яйца; *Реумъ* $\times 2$ —при испражненіяхъ кашицеобразныхъ, кисло-пахнущихъ, водянисто-слизистыхъ. Въ случаяхъ болѣе длительныхъ: *Калькареа аметика* $\times 3$ —при кислыхъ испражненіяхъ съ вздутіемъ живота; *Вератр.* $\times 3$ — жидкія испражненія съ рѣзью или рвотой и похолодѣвшими ногами; *Арсеникъ* 3—при водянистомъ поносѣ, съ рѣзью и сильной жаждой.

5) Разстройства со стороны дыхательныхъ органовъ: *Ипеакауана* $\times 3$ —при тяжеломъ, астматическомъ дыханіи (также *Самбукусъ* $\times 3$); *Спонгія* $\times 3$ — при гортанномъ или горловомъ, какъ бы крупозномъ кашлѣ; *Меркур. солуб.* 3—при болѣе глубокомъ кашлѣ (попеременно съ *Бріонія* $\times 3$); *Аконитъ* $\times 3$ —во всякомъ случаѣ, если имѣется жаръ въ тѣлѣ; *Хамомила* $\times 3$ — если имѣется судорожный кашель; *Гепаръ сульфурисъ* 3 попеременно съ *Тартар. эметик.* 3 — при обильной въ груди мокротѣ.

Вспомог. мѣры Чѣмъ здоровѣе вообще ребенокъ, тѣмъ скорѣе и легче про-
при прорѣзы- исходитъ у него процессъ прорѣзыванія зубовъ. Поэтому должно
ваніи зубовъ быть прежде всего правильно кормленіе ребенка. Дѣти, вскармливаемая грудью, продѣлываютъ этотъ процессъ часто почти незамѣтнымъ образомъ, во всякомъ случаѣ, гораздо легче и безопаснѣе, нежели дѣти искусственно вскармливаемая. Необходимо слѣдить за тѣмъ, чтобы пищевареніе ребенка было въ полномъ порядкѣ, необходимо во всѣхъ случаяхъ заботиться о безотлагательномъ устраненіи всякаго разстройства въ его здоровьи, хотя бы и незначительнаго; необходимо также слѣдить за тѣмъ, чтобы ротъ ребенка содержался въ чистотѣ. Нѣкоторые совѣтуютъ дѣлать на деснѣ надрѣзъ для болѣе легкаго прорѣзыванія зуба. Но

этотъ совѣтъ—плохой, такъ какъ рана отъ надрѣза, въ большинствѣ случаевъ, заживаетъ раньше, чѣмъ зубъ прорѣзался, а образовавшійся рубецъ только еще болѣе затѣмъ затрудняетъ прорѣзываніе зуба.

Уходъ за зубами.

Зубы являются однимъ изъ главныхъ органовъ для правильного и нормальнаго пищеваренія, поэтому забота о ихъ здоровьи и сохраненіи должна начаться съ перваго ихъ появленія во рту ребенка.

Порча зубовъ происходитъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе разложенія остатковъ пищи, вызывающаго образованіе мясо-молочной кислоты, разрушающей зубную эмаль.

Поэтому первая и главная забота должна состоять въ тщательномъ очищеніи рта послѣ ѣды и удаленіи изъ зубныхъ промежутковъ застрявшихъ остатковъ пищи. Ребенка съ самаго нѣжнаго возраста слѣдуетъ приучать къ употребленію зубной щетки. Молочные зубы имѣютъ то же важное значеніе, что и постоянные, которые являются имъ на смѣну только къ седьмому году (см. выше прорѣзываніе зубовъ).

И когда постоянные зубы появляются въ полости рта, гдѣ имѣются уже испорченные, гніющие молочные зубы, они вскорѣ заражаются, портятся и погибаютъ, если во время этого не предупредить. Между тѣмъ извѣстно заблужденіе многихъ родителей на счетъ того, что молочные зубы будто бы должны сгнить, и что все равно на ихъ мѣсто выростутъ новые, хорошіе; на это надо сказать, что на нездоровой почвѣ не вырастаютъ хорошіе плоды. Зубы слѣдуетъ чистить ежедневно щеткой и теплой водой, причемъ щетку слѣдуетъ слегка намылить. Мыло, заключающееся въ немъ щелочью, уничтожаетъ кислое броженіе во рту, способствуетъ растворенію слизи, налета и остатковъ пищи. Слегка намыленную щетку опускаютъ въ зубной порошокъ, лучше всего очищенный мѣлъ, и чистятъ зубы не только поперекъ зубовъ, какъ это обыкновенно дѣлается, но, главнымъ образомъ, вдоль, такъ чтобы щетка проникала въ зубные промежутки. Чистить зубы всего цѣлесообразнѣе — вечеромъ передъ отходомъ ко сну, такъ какъ ночью, при продолжительно-закрытомъ ртѣ, броженіе въ послѣднемъ особенно сильно. Необходимо не меньше одного раза въ году (дѣтямъ же чаще) обращаться къ зубному врачу для

осмотра зубовъ: если имѣются темныя пятна на зубахъ, не поддающіяся чисткѣ, то это доказываетъ, что зубъ уже началъ портиться, и его слѣдуетъ немедленно запломбировать, хотя онъ еще и не причиняетъ боли. Ибо боль появляется лишь тогда, когда разрушено плотное вещество зуба (эмаль и дентинъ) и гніеніе доходитъ до зубной мякоти (зубного нерва или пульпы). Такой зубъ уже очень трудно исправить, а часто и невозможно.

Б. Болѣзни мягкаго нѣба (зѣва) и глотки.

Содержаніе этого (Б) под-отдѣла. Осмотръ мягкаго нѣба. 1. Воспаленія мягкаго нѣба, ангины, жабы: 1) Острыя ангины, 2) Флегмонозная (нарывная) ангина, 3) Воспаленія миндалевидныхъ железъ. — Лѣченіе острыхъ воспаленій мягкаго нѣба. 4) Хроническій катарръ мягкаго нѣба и глотки. — Характеристика главн. лѣкарствъ въ отношеніи хроническ. поражений мягк. нѣба и глотки.

Предварительныя замѣтки.

На мягкомъ нѣбѣ различаютъ переднюю и заднюю поверхность, кромѣ того двѣ переднія и двѣ заднія нѣбныя дуги съ миндалевидными железами и въ срединѣ между ними—язычекъ. Кпереди мягкое нѣбо переходитъ безъ рѣзкой границы въ твердое (костный сводъ рта). Пространство между нѣбными дугами и корнемъ языка образуетъ входъ въ глотку. Задняя стѣнка глотки идетъ вдоль передней поверхности шейныхъ позвонковъ; съ боковъ глотка ограничена глоточно-гортанными пазухами. Сверху она сообщается съ полостью носа, а спереди—съ полостью рта.

Для сужденія о болѣзни мягкаго нѣба требуется прежде всего осмотръ такового. Осмотръ передней поверхности мягкаго нѣба и отчасти задней стѣнки глотки доступенъ каждому, и не—врачу, осмотръ же невидимыхъ спереди частей глотки (и носоглотки) производится специальнымъ зеркальцемъ и требуетъ specialнаго знанія и умѣнія.

Осмотръ возможенъ только при широко открытомъ ртѣ. Нѣкоторые люди, особенно пѣвцы, могутъ въ достаточной для осмотра мѣрѣ раскрывать ротъ безъ сторонней помощи, у другихъ же приходится прибѣгать къ ложечкѣ и т. п., которую вводятъ въ ротъ больного при стоячемъ, сидячемъ или лежачемъ положеніи его и при достаточномъ освѣщеніи. Вводить надо подобный предметъ не слишкомъ далеко въ ротъ, слегка и медленно низдавливая языкъ, лишь настолько, насколько это необходимо для осмотра,

иначе могутъ появиться рвотныя движенія. Цѣлесообразно, если въ это время больной производить вдыханіе и выдыханіе и производить звукъ *а* или *э*.

Маленькія дѣти часто противятся такому осмотру, и у нихъ приходится прибѣгать къ болѣе сложнымъ приемамъ. Требуются прежде всего два помощника: одинъ держитъ неподвижно голову ребенка, другой—его ручки. Если ребенокъ самъ не желаетъ открыть рта, то первому помощнику приходится зажать ему носъ, послѣ чего, вслѣдствіе недостатка воздуха, ротъ открывается. Если ребенокъ пилъ передъ тѣмъ молоко или ѣлъ что нибудь, отъ чего на нѣбѣ могутъ остаться частички, то передъ осмотромъ дають выпить воды, если ребенокъ не можетъ или отказывается прополоскать ротъ.

Мягкое нѣбо и глотка въ нормальномъ, здоровомъ состояніи выглядятъ умѣренно и равномерно красными, обыкновенно болѣе блѣдными на передней поверхности языка и на переднихъ нѣбныхъ дугахъ. Миндалины (миндалевидныя железы) лежатъ между передней и задней нѣбной дугой каждой стороны и въ большей или меньшей мѣрѣ выдаются надъ ихъ краями; форма миндалинъ—плоско-овальная, иногда шарообразная. Цвѣтъ нормальной миндалины—умѣренно-красны, поверхность—слегка бороздчатая, щелеобразная.

В
норм;
з

1) Острая катарральная ангина или жаба.

Встрѣчается очень часто, особенно въ молодомъ возрастѣ; только у грудныхъ дѣтей бываетъ рѣдко. Въ нѣкоторыхъ семьяхъ имѣется особое предрасположеніе къ жабамъ, ослабѣвающее въ годы возмужалости.

Причиной чаще всего служитъ простуда (шеи и ногъ), также мѣстныя раздраженія (горячая пища, горячее питье, острые вещества) и нѣкоторыя лѣкарственныя вещества въ большихъ дозахъ (ртуть, іодъ и др); далѣе ангина можетъ быть слѣдствіемъ воспаленія рта, носа, гортани, или сопровождать острую сыпь (скарлатина и др.) и вообще острую болѣзнь (воспаленіе легкихъ, тифъ); она бываетъ и при всѣхъ почти хроническихъ болѣзняхъ.

При

Симптомы различны, соотвѣтственно степени воспаления и возрасту больного. Ощущеніе давленія въ горлѣ или колотья, жженія и проч., въ покоѣ или при разговорѣ, чаще всего—при глотаніи, которое затруднено или болѣзненно. Больныя части

Про
бо

болѣе или менѣе красны и въ началѣ болѣзни сухи, а затѣмъ влажны. Усиленное отдѣленіе слизи и слюны становится часто очень обильнымъ и, вслѣдствіе затрудненнаго глотанія, тягостнымъ для больного, особенно у маленькихъ дѣтей, отказывающихся изъ за этого отъ пищи. Подчелюстная область всегда болѣе или менѣе болѣзненна и, если притомъ имѣется сильное припуханіе железъ, затруднена также рѣчь. Бываютъ боли также въ мышцахъ затылка.

Лихорадочное состояніе, особенно у дѣтей, въ большинствѣ случаевъ имѣется въ большей или меньшей степени. Часто наблюдается тошнота, иногда до рвоты, потеря аппетита, неприятный вкусъ, усиленная жажда, головная боль; головокруженіе; у дѣтей иной разъ и бредъ.

Нѣкоторые переносятъ ангину легко, даже не обращаясь къ врачу, другіе же, особенно дѣти и изнѣженные особы, представляютъ довольно тяжелую картину болѣзни.

Болѣзнь продолжается нѣсколько дней и проходитъ не сразу, а постепенно; въ болѣе легкихъ случаяхъ и при надлежащемъ лѣченіи она можетъ пройти и въ одну ночь.

Ревматическая ангина. Ангина часто предшествуетъ ревматизму мышцъ или суставовъ, и въ такихъ случаяхъ симптомы ея очень сильно выражены, особенно лихорадка. Замѣчательно, что, съ появленіемъ ревматическаго пораженія, измѣненія въ мягкомъ нёбѣ почти внезапно исчезаютъ.

Переменяющаяся ангина. У людей, страдающихъ маляріей, обыкновенной или скрытой, ангина нерѣдко наблюдается въ видѣ перемежающагося, періодическаго заболѣванія.

Сопутствующая ангина. Чаше всего катарральная жаба сопутствуетъ скарлатинѣ, но она бываетъ и при другихъ острыхъ заразныхъ сыпяхъ, при корі, оспѣ, также при рожѣ лица.

Лѣченіе—см. ниже. О дифтеритической жабѣ см. стр. 78.

2) Флегмонозная (нарывная) ангина.

Проявленія болѣзни. Въ болѣе легкой формѣ болѣзнь эта походитъ на тяжелую катарральную жабу, въ тяжелыхъ же случаяхъ симптомы гораздо болѣе серьезны: болѣзненность горла достигаетъ высшей степени и она ощущается особенно сильно при надавливаніи или движеніи; глотаніе и рѣчь крайне затруднительны и даже невозможны; на мягкомъ нёбѣ замѣчается сильная краснота и опуханіе ткани съ большимъ или меньшимъ отекомъ слизистой оболочки. Языкъ

густо обложенъ, въ тяжелыхъ случаяхъ оттянуть кзади, какъ бы укороченъ и утолщенъ. Во рту скопляется много слизи, часто смѣшанной съ кровью. Шейныя лимфатическія железы мало или совсѣмъ не опухаютъ. Лихорадка обыкновенно умѣренна, не сильно измѣняются также пульсъ и дыханіе. Головная боль то бываетъ, то нѣтъ.—Болѣзнь обыкновенно начинается внезапно. Продолжительность—приблизительно недѣля.

Причины флегмонозной жабы въ общемъ тѣ же, что и катарральной. Болѣзнь эта бываетъ часто и нѣсколько разъ у одного и того же человѣка, рѣже у дѣтей и стариковъ, чаще же у отроковъ и у людей средняго возраста. Большую роль играетъ предрасположеніе (золотуха, испорченность соковъ).—Жабу такую могутъ вызвать такія обстоятельства, какъ вдыханіе горячихъ паровъ или горячаго воздуха или очень горячее питье, также ѣдкія вещества, какъ концентрированныя кислоты или щелочи.

Лѣченіе—см. ниже.

3) Воспаленіе миндалевидныхъ железъ (тонзиллитъ или жаба миндалинъ).

Встрѣчается нерѣдко совмѣстно съ какой либо формой ангины и въ этомъ случаѣ ходъ болѣзни отягощается; чаще встрѣчается самостоятельно и имѣетъ острое или хроническое теченіе. Обыкновенно поражается одна железа, но часто обѣ, или—то одна, то другая. Причины тѣ же, что и обыкновенныхъ жабъ, и такъ же, если еще не болѣе часто (до 20—50 разъ въ теченіе жизни) повтореніе болѣзни у одного и того же человѣка.

Степень воспаленія миндалинъ бываетъ различная, отъ простаго, поверхностнаго катарра слизистаго покрова миндаины до щелевого, фолликулярнаго катарра и, наконецъ, до воспаленія глубокихъ частей миндалинъ, кончающагося часто абсцессомъ (нарывомъ) одной или обѣихъ миндалинъ.

Симптомы при воспаленіи миндалинъ—въ легкихъ случаяхъ сходны съ симптомами катарральной жабы. Щелевая (фолликулярная) и нарывная формы въ началѣ сходны между собою, но въ дальнѣйшемъ теченіи выступаютъ уже различія, причемъ при нарывѣ миндаины картина болѣзни представляется часто очень тяжелой, сопровождаясь болѣе или менѣе сильной лихорадкой, желудочными страданіями и часто даже мозговыми явленіями, во всѣхъ случаяхъ болѣе или менѣе сильно выраженнымъ общимъ

Проя
болѣ
за т

недомоганіемъ. Изъ мѣстныхъ симптомовъ имѣется припухлость зѣва съ краснотой и часто отекомъ; боль, усиливающаяся отъ наружнаго давления, при глотательныхъ движеніяхъ, разговорѣ, харканьѣ и проч., также при движеніи головы и шеи; раскрытіе рта затруднено, иногда въ высшей степени, до невозможности развести зубы.

Лимфатическія челюстныя железы при всѣхъ формахъ воспаления миндалинъ рѣдко припухаютъ, развѣ лишь при частыхъ возратахъ болѣзни и при болѣе умѣренныхъ нарываніяхъ.

Продолжительность болѣзни различна при различныхъ формахъ: поверхностное и щелевое воспаления длятся отъ 3—4 до 8 дней, нарывное—отъ 1 до 1¹/₂, а при ненадлежащемъ лѣченіи—даже до 3 недѣль.

Исходъ—у взрослыхъ всегда благопріятный, развѣ только у маленькихъ дѣтей или у страдающихъ другою тяжелою болѣзнію можетъ представиться опасность отъ высокой лихорадки, отъ отека, также отъ слишкомъ долгаго воздержанія отъ пищи, вслѣдствіе невозможности глотать. Лѣчение—ниже.

Лѣченіе острыхъ воспаленій мягкаго нѣба (ангинъ, жабъ).

Болѣзни эти не требуютъ никакихъ смазываній, ни другихъ мучительныхъ приемовъ лѣченія, а достаточно ограничиться одними гомеопатическими лѣкарствами, которыя даютъ тутъ сплошь и рядомъ весьма благопріятные и скорые результаты.

Въ болѣе легкихъ случаяхъ достаточно давать *Белладонна* 3 черезъ каждые 2 часа; когда въ зѣвѣ имѣется припухлость, то даютъ *Беллад.* попеременно съ *Меркур. солуб.* 3, черезъ 1 или 2 часа, смотря по степени болѣзни, или съ *Меркур. ціанат.* 3—при подозрѣніи на дифтеритъ (см. стр. 78).

Если воспаление очень сильное, сопровождающееся пылающей краснотой зѣва, опухлостью, удлиненіемъ язычка, съ ощущеніемъ какъ бы инороднаго тѣла при глотаніи, также при изъязвленіи въ зѣвѣ, подходитъ больше *Меркур. коррозив.* 2.

При воспаленіи миндалевидной железы даютъ, пока нѣтъ признаковъ нарыванія послѣдней, *Беллад.* × 3—3 и *Меркур. солуб.* 3; въ случаѣ же нарыванія — вмѣсто Меркурія *Гепаръ сульфурисъ* × 3—3 (не 6-е дѣленіе). Это средство часто обрываетъ воспаление, во всякомъ случаѣ, значительно ограничиваетъ, а когда гнойный процессъ въ железахъ уже начался, но медленно по-

двигается впередъ, тогда оно ускоряетъ его и заканчиваетъ иной разъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ.

При острыхъ ангинахъ рѣдко приходится прибѣгать еще къ другимъ средствамъ.

Такъ, при сильномъ воспаленіи съ отечностію зѣва, подходитъ *Анисъ* $\times 3$.

Лахезисъ 6: въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ, съ изъязвленіемъ, похожимъ на антоновъ огонь; сильное воспаленіе съ большой припухlostью, крайне мучительными позывами къ глотательнымъ движеніямъ, обильнымъ скопленіемъ слюны и слизи во рту; судорожныя стягиванія въ глоткѣ; сѣроватоблѣдный цвѣтъ лица, мозговья явленія.

Анисъ или *Лахезисъ* подходятъ именно послѣ Меркурія, при симптомахъ ихъ показующихъ, а не до него, и во всякомъ случаѣ не въ первые дни болѣзни.

Въ случаяхъ, подобныхъ Лахезису, показаны также *Нитри ацид.* $\times 3$ и *Арсеникъ* 3, причемъ, разъ требуется одно изъ послѣднихъ четырехъ лѣкарствъ, то попеременно съ нимъ подходитъ больше *Кантарисъ* 3, нежели Белладонна.

При нервномъ состояніи больного можно давать еще, въ промежуткахъ между прочими приемами лѣкарствъ, *Игнація* 3 или *Хамомила* $\times 3$. — При опухлости подчелюстныхъ железъ — *Бріонія* $\times 3$, *Фитолакка* $\times 2$.

О дозахъ, дѣленіяхъ и повтореніи приемовъ см. ч. 1 гл. 3 и 4.

Наружно на шею прикладывать 2—3 раза въ сутки: при отсутствіи подчелюстной опухоли—*масло или мазь Белладонны*, при опухоли — *масло или мазь Бріоніи или Фитолакка* или мазь изъ *краснаго Меркур. преципитатъ* (1 часть перваго растиранія съ 30 частями жира); или *анисовое масло*; при нарываніи мазь изъ *Гепаръ сульфур.* ($\times 2$ одну часть на 30 чч. жира).

Полоскать горло почаще, каждый часъ, тепловатымъ растворомъ изъ 10 капель *Гидрастисъ* Θ въ 2 столовыхъ ложкахъ воды; при изъязвленіи въ горлѣ—такимъ же растворомъ *Календула* Θ . При нарываніи пріятнымъ и смягчительнымъ полосканіемъ является теплый отваръ изъ цвѣтовъ ромашки.

Нарывъ миндалевидной железы, созрѣвши, вскрывается обыкновенно самъ собою, но если самостоятельное вскрытіе замедляется, а болѣзнь протекаетъ слишкомъ мучительно для больного, если, тѣмъ болѣе, опухоль вызываетъ явленія удушья, то въ

такихъ случаяхъ показано искусственное вскрытіе нарыва помощью прокола, которое нисколько не опасно для жизни и сразу доставляетъ больному облегченіе его страданій. Проколъ такой долженъ быть сдѣланъ, конечно, только врачомъ.

При повышенной температурѣ тѣла полезно во всѣхъ случаяхъ короткое влажное обертываніе туловища. Заботиться надо объ ежедневномъ опорожненіи кишечника. Пищу давать легкую, жидкую.

Противъ предрасположенія къ частому заболѣванію ангиной служатъ средства, указанныя ниже при „хроническомъ катаррѣ мягкаго нѣба“.

4) Хроническій катарръ мягкаго нѣба (хроническая жаба).

Причины.

Наблюдается чаще всего въ среднемъ возрастѣ, но рѣдко самъ по себѣ, а обыкновенно вмѣстѣ съ хроническимъ катарромъ глотки, носа или гортани. Причиной можетъ быть повторное острое пораженіе мягкаго нѣба, но чаще—длительное вліяніе вредныхъ моментовъ, обусловливающихъ постоянный приливъ крови къ нѣбу. Такъ, катарръ такой бываетъ у привычныхъ курильщиковъ, также у пьяницъ. На состояние мягкаго нѣба можетъ отражаться также разговоръ, пѣніе, крикъ, когда они производятся подолгу и часто (проповѣдники, пѣвцы и т. п.), также частое вдыханіе холоднаго или пыльнаго воздуха и проч. Во всѣхъ такихъ случаяхъ хроническая жаба развивается постепенно. Хроническая жаба бываетъ также при болѣзняхъ, ведущихъ къ застою крови (болѣзни сердца, легкихъ и проч.).

Признаки и проявленія болѣзни.

Слизистая оболочка представляетъ умѣренную красноту и большее или меньшее набуханіе, замѣтное особенно на язычкѣ, который и длиннѣе и толще нормальнаго.

Изъ симптомовъ чаще всего бываетъ ощущеніе тягостной сухости, рѣже—жженія. Изрѣдка затрудняется рѣчь и измѣняется голосъ, глотаніе же обыкновенно не затруднено. Болѣзнь всего сильнѣе чувствуется по утрамъ послѣ пробужденія или послѣ вставанія съ постели, или послѣ сильнаго напряженія голоса (напримѣръ, у духовныхъ лицъ послѣ праздничныхъ службъ). Болѣзнь эта развиваетъ привычку часто харкать или заставляетъ часто покашливать; кашель обыкновенно короткій, сухой, но также съ мокротой.

Хроническій катарръ, особенно при удлинненномъ язычкѣ,

лишь рѣдко не вызываетъ какихъ-либо страданій. Чаще же вызываетъ щекотаніе или ощущеніе какъ бы присутствія посторонняго тѣла въ горлѣ, особенно при закидываніи головы кзади или при лежаніи; это ощущеніе, какъ и харканіе, зависятъ во многихъ случаяхъ отъ соприкосновенія язычка съ задней стѣнкой глотки. Больные страдаютъ нерѣдко отрыжкой, тошнотой, позывами на рвоту и даже настоящей рвотой, и симптомы эти бываютъ иной разъ такъ рѣзко выражены, что даютъ поводъ предполагать хроническій катарръ желудка, на самомъ дѣлѣ не имѣющійся. Сонъ бываетъ нерѣдко безпокойный и съ кошмарами. Нерѣдко нарушается и невно-душевная система, особенно при одновременномъ хроническомъ насморкѣ и катаррѣ глотки: больные ипохондрически настроены, опасаются туберкулеза горла или легкихъ и т. п.

На полное излѣченіе можно разсчитывать лишь по устраненіи причинъ. Въ противномъ случаѣ возможно лишь большее или меньшее улучшение, прерываемое, впрочемъ, возвратами. Болѣзнь во всякомъ случаѣ очень продолжительна. Лѣченіе—ниже.

5) Хроническое воспаленіе миндалинъ происходитъ изъ частыхъ острыхъ заболѣваній ихъ, равно какъ обусловливаетъ частыя обостренія воспаленія, особенно когда онѣ гипертрофированы (чрезмѣрно разрощены). Какъ послѣдствіе хроническаго воспаленія миндалинъ наблюдается нерѣдко атрофія ихъ (сморщиваніе) Лѣченіе—какъ при хронич. катаррѣ мягкаго нѣба.

6) Гипертрофія миндалинъ, чрезмѣрное ихъ разрощеніе, составляетъ очень распространенную болѣзнь, притомъ одинаково какъ въ нисшихъ, такъ и высшихъ слояхъ населенія. Причину этого нѣкоторые врачи склонны объяснять настолько же, какъ эта болѣзнь, распространенною прививкой оспы (см. „Золотуха“). Лѣченіе—ниже.

Лѣченіе хроническаго катарра мягкаго нѣба и глотки.

Лѣченіе хроническаго катарра болѣе сложно, а, главное,—гораздо болѣе длительно, нежели лѣченіе острыхъ воспаленій, что понятно въ виду значительной укоренѣлости болѣзни въ большинствѣ случаевъ.

Такихъ опредѣленныхъ и точныхъ указаній лѣкарствъ, какъ при острыхъ воспаленіяхъ мягкаго нѣба, при хроническомъ катаррѣ послѣдняго дать невозможно. Тутъ приходится уже значительно больше обособлять, индивидуализировать каждый случай и выби-

рать лѣкарства соотвѣтственно причинѣ и проявленіямъ болѣзни, а также по общему состоянію организма.

При этомъ можно руководствоваться слѣдующими указа-
ніями.

Главными лѣкарствами являются вообще: *Калькареа карбоника* или—*іодата*, *Барита карбоника*, *Карбо вегетабиліс*, *Гепаръ сульф.*, *Сульфуръ*, *Меркур.*, *Сенія*.

Если въ прошломъ имѣется сифилисъ: *Меркур. оксидат рубер.* $\times 3$ или *Меркур. корроз.* $\times 4$.

При твердой и воспалительной опухоли миндалевидныхъ железъ: *Меркур. биодат.* $\times 3$.

Послѣ предшествовавшего чрезмѣрнаго употребленія ртути (меркури): вначалѣ *Ацидумъ нитрик.* $\times 3$, позднѣе — *Гепаръ сульф.* $\times 3$ —3 или *Карбо вегетаб.* 3—6. Послѣ 5—6 мѣсячнаго употребленія такихъ лѣкарствъ цѣлесообразно перейти еще къ *Меркур.* или *Сульфур.* (въ высшихъ дѣленіяхъ), для окончательнаго устраненія остатковъ болѣзни.

Хроническое затвердѣніе и увеличеніе (гипертрофія) миндалевидныхъ железъ удастся лишь очень рѣдко устранить лѣкарственнымъ путемъ. Изъ лѣкарствъ тутъ рекомендуются *Барита карб.* $\times 4$, *Іод.* $\times 4$ или *Калькареа іодата* $\times 3$ и проч.

О дозахъ, дѣленіяхъ и повтореніи пріемовъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи хроническихъ пораженій мягкаго нѣба и глотки.

Алюмина 3—6. Сухость слизистой оболочки; при глотаніи ощущение какъ бы сухой крошки хлѣба или застрявшей рыбьей 'косточки въ зѣвѣ (то же при *Гепаръ* и *Аргент. нитр.*); видъ зѣва темнокрасный, язычекъ удлинень, хриплость или сиплость голоса особенно по утрамъ.

Аргентумъ нитрикумъ 3. Симптомы подобно таковымъ при *Алюмина*, но Аргент. предпочтительно, когда при всемъ томъ имѣются еще язвочки въ зѣвѣ и когда въ горлѣ собирается густая слизь.

Арсеник. альб. 2—3, особенно же—*Арсеник. іодат.* 2—3, по дѣйствию подходитъ къ Мерк. корроз. Язычекъ удлинень и увеличенъ, темнокрасенъ, и въ горлѣ чувствуется сильное жженіе съ болью или судорожное стягиваніе при глотаніи; явленія эти наблюдаются при обостреніи катарра.

Аурумъ 3. Миндалины обыкновенно красны и увеличены. Рядомъ съ Гепаръ или Ацид. нитрик. подходит для послѣдствій предшествовавшего чрезмѣрнаго употребленія ртути.

Барита карбоника 3—6. Одно изъ лучшихъ средствъ при предрасположеніи къ воспаленію миндалевидныхъ железъ, особенно у золотушныхъ людей, страдающихъ еще и носоглоточнымъ катарромъ. Малѣйшая простуда вызываетъ обострение катарра. Увеличенныя подчелюстныя железы. Поражается чаще или больше правая сторона зѣва. Боль больше при пустомъ глотаніи.

Бораксъ × 3. Большое скопленіе слизи въ горлѣ, очень густой и трудноотдѣляющейся.

Гепаръ сульфурисъ 3—6. Симптомы какъ при *Алюмина*, но съ образованіемъ обильной слизи. При склонности къ нарыванію железы. Противъ послѣдствій чрезмѣрнаго употребленія ртути.

Графитъ 3—6. Ощущеніе комка въ горлѣ, больше при пустомъ глотаніи. Подобно Калькар. карб. и Сульф. Одновременный катарръ носоглотки.

Дулькамафа × 3. При обостреніи болѣзни въ сырую погоду, особенно у золотушныхъ субъектовъ. Дополняетъ дѣйствіе Барита карб.

Иод. × 3. Затвердѣніе и разроженіе миндалинъ.

Кали бихромикумъ 3. Фолликулярный (см. выше) катарръ зѣва. Катарръ сопровождается образованіемъ сырообразныхъ плотныхъ пленокъ отъ густой слизи, имѣющейся въ изобиліи съ ощущеніемъ жесткости и сухости въ горлѣ; подходит особенно для сифилитическихъ поражений зѣва, но также у золотушныхъ дѣтей, болѣе полныхъ тѣломъ, съ одутловатыми щеками.

Кали карбоникумъ 3. Постоянное скопленіе слизи въ горлѣ, съ „харканьемъ“ по утрамъ и ощущеніемъ въ горлѣ какъ бы рыбьей косточки при всякой „простудѣ“. Послѣдній симптомъ имѣется также при Гепаръ, Алюмина, Карбо, Аргент. нитрик., Ацид. нитрик.

Калькареа карбоника 3—6 подобна Графиту. Ощущеніе сухости, смѣняемое часто выдѣленіемъ комковъ слизи. Подходит особенно для явно золотушныхъ субъектовъ, страдающихъ и хроническимъ катарромъ носа съ выдѣленіемъ дурнопахнущей слизи, также комковатой.

Коніумъ 3. Опуханіе миндалевидныхъ железъ безъ склонности къ нарыванію.

Фосфоръ 3. Ощущеніе въ горлѣ жженія, садности, жесткости, сухости; постоянное „харканье“. Слизь кислаго вкуса. Хриплость.

Вспомогат. Для предупрежденія простуживаній горла надо послѣднее **мѣры при** закалить. Не слѣдуетъ привыкать къ ношенію теплыхъ шейныхъ **хронич. жабѣ.** платковъ; вообще же, въ холодное время, одѣваться умѣренно тепло, особенно же оберегаться промоканія и чрезмѣрнаго охлажденія ногъ. Полезно два раза въ день обмывать шею холодной водой; прохладныя ванны. Весьма важно избѣгать всего, что раздражаетъ горло, между прочимъ — пряностей, острыхъ кушаній, спиртныхъ напитковъ, кофе, крѣпкаго чая, равно какъ куренія или жеванія табаку. Полезно употребленіе молока (во всѣхъ видахъ), плодовъ, овощей, зелени. Мясо можно позволить — самое большее — разъ въ день и въ маломъ количествѣ, также рыбу (см. ч. I, гл. VII); пища и питье должны быть умѣренной температуры, ни слишкомъ холодныя, ни слишкомъ горячія.

В. Болѣзни пищевода, желудка и кишекъ

1. Болѣзни пищевода.

Содержаніе. 1. Воспаленіе пищевода. 2. Сѣуженіе пищевода.

Пищеводъ есть трубообразный каналъ, соединяющій глотку съ желудкомъ. Назначеніе пищевода чисто механическое; онъ служитъ лишь для препровожденія пищевыхъ веществъ и напитковъ изо рта и глотки въ желудокъ. По этой причинѣ ткани пищевода отличаются болѣе грубымъ строеніемъ и сравнительно рѣдко подвергаются болѣзненнымъ разстройствамъ.

Въ практическомъ отношеніи важны слѣдующія двѣ болѣзни пищевода: воспаленіе и сѣуженіе.

1. Воспаленіе пищевода.

Причины и признаки болѣзни. Причиною можетъ служить механическое, тепловое или химическое раздраженіе, какъ на примѣръ, ущемленіе или вонзаніе посторонняго тѣла, проглатываніе горячей пищи или горячаго питья, или случайно или умышленно проглоченное разрушительное вещество. Воспаленіе можетъ перейти на пищеводъ изъ сосѣдняго органа или развиваться въ теченіе инфекціонной болѣзни; Въ легкихъ случаяхъ воспаленіе можетъ не ощущаться больнымъ,

или же оно причиняетъ боль въ пищеводъ во время прохожденія черезъ него пищи. Въ болѣе же трудныхъ случаяхъ боль отличается постоянствомъ; она — давящая или судорожная и значительно усиливается при глотаніи плотной пищи, горячей или очень холодной жидкости, а также при поколачиваніи по груднымъ позвонкамъ, отъ сгибанія или выпрямленія туловища, особенно же при введеніи зонда.

Теченіе болѣзни въ легкихъ случаяхъ благопріятное, и продолжительность — отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ дней. Въ болѣе же трудныхъ случаяхъ теченіе болѣе продолжительное, и возможны болѣе или менѣе серьезныя осложненія, какъ изъязвленіе, нагноеніе, омертвѣніе, также послѣдовательное рубцовое суженіе.

Самопомощь при воспаленіи пищевода возможна лишь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не приходится прибѣгать къ специальнымъ приемамъ (для извлеченія, напримѣръ, посторонняго тѣла).

При отравленіи ѣдкимъ веществомъ дается немедленно соотвѣтствующее противоядіе (см. отдѣлъ XV).

Вообще же показаны: противъ воспаленія вслѣдствіе механическаго поврежденія — *Арника*, противъ ожоговъ — *Кантарисъ*, при сильной боли — *Беллад.*, *Арсеник.*, *Гидрастисъ*, *Каустик.* особенно же — *Вератрумъ вириде*.

Во все время, пока имѣется воспаленіе, не слѣдуетъ принимать твердой пищи; при очень затрудненномъ или невозможномъ глотаніи приходится прибѣгать къ питательнымъ клистирамъ, къ введенію жидкой пищи черезъ прямую кишку. Кормленіе черезъ желудочный зондъ при воспаленіи пищевода противопоказано, такъ какъ имъ можетъ быть усилено воспаленіе, а при глубокомъ ожогѣ или изъязвленіи можетъ повести къ прободенію пищевода.

2. Суженіе пищевода.

Чаще всего суженіе пищевода происходитъ отъ частично или вполнѣ закрывающей его просвѣтъ опухоли, въ большинствѣ случаевъ — раковой, охватывающей пищеводъ кольцеобразно. При дальнѣйшемъ развитіи болѣзни является язвенный распадъ раковой опухоли, вслѣдствіе чего пищеводъ можетъ стать вновь проходимымъ и тѣмъ вызвать въ больномъ обманчивую надежду на дѣйствительное улучшеніе. Суживающія пищеводъ опухоли могутъ быть и не злокачественныя; сюда относятся: сифилити-

Лѣч

При
и пр
болѣ

ческія опухоли, зубная опухоль или аневризма аорты и т. п., сдавливающая пищеводъ. Сужение пищевода бываетъ иногда чисто судорожнаго характера и повторяется приступами съ большими или меньшими промежутками времени; оно наблюдается у истеричныхъ особъ и ипохондриковъ.

Симптомы сужения пищевода, какова бы ни была причина, заключаются въ расстройствахъ пищеводнаго питания. На первыхъ порахъ больной, хотя и ощущаетъ трудность прохожденія куска, но не чувствуетъ боли; онъ испытываетъ лишь потребность почти каждый съѣденный имъ кусокъ запивать нѣсколькими глотками воды или другого напитка. Мало по малу прохождение пищи все болѣе затрудняется, и настаетъ, наконецъ, время, когда пища вовсе ужъ не попадаетъ въ желудокъ и извергается обратно въ Глотку и ротъ.

Лѣченіе
суженія
пищевода.

При судорогахъ пищевода, обусловливающихъ сужение его примѣняется *Белладона*, *Игнація* и проч. (см. „спазмы“ стр. 136). При сужении сифилитическаго происхожденія вся надежда на противосифилитическое лѣчение. При сужении постороннимъ тѣломъ или полипомъ можетъ оказать помощь хирургія; сюда же относится постепенное осторожное расширение рубцово-суженнаго пищевода. Противъ опухоли, давящей извнѣ на пищеводъ (аневризма аорты и проч.), медицина вообще безсильна

Ракъ пищевода также относится больше къ области хирургіи, хотя, къ сожалѣнію, и послѣдняя не въ состояніи оказать тутъ существенной помощи.

На помощь отъ гомеопатіи можно рассчитывать лишь въ началѣ развитія рака пищевода; (см. въ 10-мъ отдѣлѣ „Болѣзни крови и лимфы“). Главными лѣкарствами являются *Арсеник.*, *Коніумъ*, *Гидрастисъ*, *Гепаръ сульф.*, *Клематисъ*.

II. Болѣзни желудка.

Содержаніе 1 Общие желудочные симптомы а. Расстройство аппетита, б. Тошнота и рвота, в. Отрыжка, изжога, вздутіе желудка, г Жажда, д. Боль подъ ложечкой. 2. Кардальгія, нервная боль желудка, 3. Диспепсія, несвареніе а Нервная диспепсія, б Старческая диспепсія. 4. Острый катарръ желудка. 5. Хроническій катарръ желудка. 6 Простая язва желудка. 7 Кровотеченіе изъ желудка. 8. Ракъ желудка. 9. Расширеніе желудка.

Предварительныя замѣтки.

Строеніе и
положеніе
желудка.

Желудокъ представляетъ собою мѣшокъ полулунной формы и находится въ верхней части брюшной полости, причѣмъ боль-

шая ($\frac{5}{6}$) часть его приходится на лѣвую половину тѣла, между 4-мъ и 8-мъ ребромъ, а остальная часть переходитъ въ правую, находясь позади передней доли печени. Желудокъ соединяется повыше съ пищеводомъ (это входъ въ желудокъ), именно у нижняго конца грудной кости, а пониже—своимъ такъ называемымъ привратникомъ—съ 12-типерстной кишкой. Вслѣдствие такого положенія привратника, болѣзненные измѣненія его, напримѣръ, изъязвленія, раковыя опухоли, могутъ быть лишь въ томъ случаѣ прощупываемы, когда имѣется ненормальное опущеніе больной части ниже края печени.

Созвѣмъ не доступенъ ощупыванію со стороны брюшныхъ покрововъ входъ изъ пищевода, такъ какъ онъ лежитъ позади грудины и реберъ.

Желудокъ имѣетъ двѣ кривизны, изъ которыхъ большая лежитъ въ лѣвой части брюшной полости, а малая—по срединной линіи въ подложечной области, позади передней доли печени. Сводъ желудка находится въ области лѣваго 5—6-го ребра, дно его проходитъ приблизительно посрединѣ между пупкомъ и подложечкой.

Внутренняя стѣнка желудка выстлана слизистой оболочкой; подъ послѣдней находится мышечный слой, который есть продолженіе мышечнаго слоя пищевода. Между слизистой оболочкой и мышечнымъ слоемъ находятся железки желудка, которыхъ насчитываютъ до 5 миллионовъ, до такой степени онѣ малы. Желудочныя железки вырабатываютъ желудочный сокъ, необходимый для пищеваренія, и слизь. Лимфатическіе пути, кровеносные сосуды и нервы развѣтвлены по всему желудку.

1. Общія желудочныя симптомы.

Опредѣленные болѣзни желудка и ихъ лѣчение слѣдуютъ ниже. Тутъ же приводятся нѣсколько симптомовъ, исходящихъ отъ желудка, хотя и не всегда зависящихъ именно отъ его разстройства, съ указаніемъ нѣкоторыхъ общихъ противъ нихъ средствъ.

а. Разстройства аппетита.

Такия вещества, какъ пряности, соль, горькія травы, кофе, спиртные напитки, могутъ усилить аппетитъ, охоту къ ѣдѣ, тѣмъ **именно**, что раздражаютъ слизистую оболочку желудка, но это **они** дѣлаютъ лишь до поры до времени: раньше или позже они

Причи

ведутъ къ ослабленію желудка и разстройству пищеваренія, и тѣмъ самымъ къ уничтоженію или къ разстройствамъ аппетита. Кромѣ того аппетитъ отсутствуетъ или испорченъ при лихорадочныхъ болѣзняхъ, малокровіи, нервной слабости и проч.—во всѣхъ случаяхъ, однако, ближайшей причиной является ненормальное пищевареніе. Усиленіе аппетита или внезапные приступы голода, утоляемаго незначительными количествами пищи или питья, возбуждаетъ подозрѣніе на счетъ присутствія въ организмѣ глисть, особенно — солитера.

Лѣченіе. Противъ отсутствія аппетита всего чаще подходитъ *Ацид. фосфор.*, *Пульсатилла*, *Сульфуръ*. Для малокровныхъ: *Хина*, *Феррумъ*. Послѣ душевныхъ волненій и у истеричныхъ: *Игнація*. Вслѣдствіе огорченій: *Стафизагрія*, *Игнація*. У женщинъ и дѣтей: *Нуксъ мосхата*. Послѣ тяжелыхъ болѣзней: *Ацид. сульф.* или *Креозотъ*. При разстройствѣ пищеваренія вслѣдствіе предшествовавшего обремененія желудка пищей: *Антимон. круд.*, *Арсеникъ*, *Ипекакуана*, *Нуксъ вом.*, *Пульсатилла*. — Послѣ чрезмѣрнаго употребленія вина: *Нуксъ вом.*, *Карбо вегетаб.*, *Сульфуръ* или *Арсеникъ*. У привычныхъ къ кофе: *Нуксъ вом.*, *Игнація*, *Коккулусъ*.—При ухудшеніи отъ молока: *Ипекак.*, *Калькареа*, *Нуксъ вом.* *Сульфуръ*. При страданіяхъ желудка отъ жирной пищи, отъ свиного мяса, печеній, испорченнаго масла: *Пульсат.* и *Карбо*; отъ свѣжеиспеченнаго хлѣба, пирога и т. п.—*Бріонія*, *Пульсат.*; отъ фруктовъ—*Пульсат.* или *Арсеникъ*.

б. Тошнота и рвота.

Причины. Чаше всего тошнота или рвота являются вслѣдствіе обремененія желудка пищей, въ особенности—вредной или неудобоваримой, затѣмъ—при острыхъ и хроническихъ страданіяхъ желудка, при мозговыхъ заболѣваніяхъ (воспаленіяхъ, размягченіяхъ и сотрясеніяхъ), при нервныхъ страданіяхъ, мигрени, отравленіяхъ; при заболѣваніяхъ кишечнаго канала (преимущественно при ущемленныхъ грыжахъ и вообще закрытіи канала), при воспаленіяхъ брюшины, при холеринѣ (особенно у дѣтей); во время беременности; во время морского путешествія.

Лѣченіе. *Ипекак.*: сильная рвота слизью, пищей, водой (при поносѣ—рядомъ съ *Пульсат.*).— *Нуксъ вом.*: желчная рвота (рядомъ съ *Пульсат.*); рвота послѣ выпивки (если *Нуксъ* недостаточно, то даютъ еще *Антимон.-круд.* или *Антимон.-тартар.*, осо-

бенно при сильной отрыжкѣ и большой жаждѣ).— *Хамомила*: при рвотѣ желчью, послѣ огорченія.— *Этуза*: рвота молокомъ у грудныхъ дѣтей.— *Игнація*: рвота при сильной головной боли.— *Петрол.*: при морской болѣзни, (также *Коккулусъ*, *Нуксъ-вом.*, *Арсен.*, *Натр. мур.*, *Сенія*). — При рвотѣ кровью: *Ипекак.* (кажд. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ часа), *Сульф. ацид.* $\times 1$, (10—12 капель въ $\frac{1}{2}$ стаканъ воды. кажд. 5—10 мин. по чайн. ложкѣ), *Гамамелисъ экстрактъ* (черезъ $\frac{1}{2}$ часа по 5 кап.).—Вообще же надо руководствоваться показаніями основной болѣзни.

О дозахъ, приемахъ и дѣленіяхъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.

Слѣдуетъ прежде всего предоставить желудку возможный отдыхъ, не обременяя его пищей. Пока имѣется рвота, больной не долженъ получать ничего другого, какъ только чистую холодную воду. Затѣмъ даютъ по чайной ложкѣ какого либо жидкаго отвара (ячменнаго, рисоваго, овсянаго). Если втеченіи нѣсколькихъ дней всякая пища изрыгается обратно, необходимы питательные клистиры: 2 яйца въ полустаканъ молока или въ такомъ же количествѣ жидкаго отвара, 2 раза въ день. При упорной рвотѣ рекомендуется слѣдующій ручной (подъязычный) приемъ д-ра Негели для скорѣйшаго прекращенія каждаго ея припадка (особенно при мигрени, коклюшѣ, беременности): становясь передъ больнымъ, какъ бы обхватываютъ гортань, съ ея боковъ, концами пальцевъ (обѣими руками) и надавливаютъ кверху оба конца подъязычной кости (которая ощущается повыше гортани).

Вспомогат. мѣры и діета

в. Отрыжка, изжога, вздутіе желудка.

При разстроенномъ пищевареніи (вслѣдствіе болѣзней) или при чрезмѣрномъ употребленіи такихъ пищевыхъ и вкусовыхъ веществъ, которыя вызываютъ въ желудкѣ броженіе, образуются въ послѣднемъ газы, которыя отрыгаются или же, оставаясь въ желудкѣ, вздуваютъ и растягиваютъ его, вызывая пученіе живота, а также сильныя боли; изжога является вслѣдствіе образования кислотъ въ желудкѣ при вяломъ пищевареніи (пища слишкомъ долго остается въ желудкѣ, больше разлагаясь, чѣмъ перевариваясь) и выражается ощущеніемъ жженія глубоко подъ ложечкой.

Причины.

Къ веществамъ, способнымъ вызвать подобныя состоянія въ желудкѣ, относятся: содержащія угольную кислоту (газъ) напитки, виноградный морсъ, молодое вино, молодое пиво, капуста (осо-

бенно кислая), стручковые плоды (чечевица, бобы, горохъ), незрѣлые плоды, сладости, а также картофель, мучныя блюда, сельдерей, лукъ, чеснокъ, поррей, петрушка, рѣдька, всякія пряности. Всѣ эти вещества должны избѣгаться тѣми, которые страдаютъ отрыжкой и пучениемъ.

Лѣчение Лѣчению подлежатъ основныя страданія болѣзни желудка, нервозность, истерія и проч.

Изъ лѣкарствъ приходится примѣнять чаще всего. *Нуксъ вомика.*, *Ликоподій*, *Пульсатилла*, *Гепаръ сульф.*, *Антимон. круд.*; при изжогѣ облегчаетъ часто *Аммоніак. гумми* $\times 1$, 5 капель въ рюмкѣ воды, черезъ 5—10 минутъ по глоточку. Часто помогаетъ также *нашатырный спиртъ*: 1 или 2 капли въ полустаканъ воды, выпивать передъ ѣдой.

Требуется строгая діета, а главное—крайне умеренное употребленіе пищи. (Сравн. еще лѣкарства, указанныя выше противъ расстройства аппетита).

г. Жажда.

Какъ болѣзненное явленіе, жажда сопровождается острыя лихорадочныя болѣзни, затѣмъ при болѣзняхъ желудка (образованіе кислотъ вслѣдствіе броженія), при ненормальномъ питаніи, чрезмѣрномъ употребленіи соли, при болѣзняхъ крови, напр. сахарной болѣзни и проч.

Лѣчение Лѣчение сводится вообще къ устраненію основной причины чрезмѣрной жажды. Для утоленія жажды въ острыхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ вполнѣ цѣлесообразно и освѣжительно дѣйствуетъ водный растворъ разведенной фосфорной кислоты. Для приготовленія его, выписываютъ изъ аптеки „*растворъ Ацидумъ фосфорикумъ дилутумъ* (*Acidum phosphoricum dilutum*) 1 граммъ въ 25 граммахъ воды“, и изъ этого раствора берутъ 1 чайную ложечку на стаканъ свѣжей холодной воды, изъ котораго пьютъ глотками. Питіемъ для утоленія жажды могутъ служить также молоко (коровье и миндальное), кефиръ, малиновая, земляничная или другія фруктовыя воды, морсѣ, яблочный квасъ, легкое бѣлое или красное вино (въ водѣ) и т. п. Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ, особенно при жадѣ показанныхъ, главныя суть: *Акон.*, *Арсен.*, *Вератр.*, *Брюн.*, *Хина*, *Меркур.*, *Нагр. мур.*, *Русс.*

д. Боль подъ ложечкой.

Причины: болѣзни желудка (катарръ, язва, ракъ), обремененіе его пищей, слишкомъ горячая или слишкомъ холодная пища, спиртные напитки и аллопатическія дозы нѣкоторыхъ лѣкарствъ, желчные камни; затѣмъ этотъ симптомъ встрѣчается при болѣзняхъ головного и спинного мозга, при нервозности, истеріи, малокровіи, неправильныхъ положеніяхъ матки: во всѣхъ послѣднихъ случаяхъ—боль отражательная, такъ называемая рефлекторная. Судорожная (спазматическая) боль желудка является припадками и сопровождается часто отсутствіемъ аппетита, рвотой, изжогой, отрыжкой, сердцебиеніемъ, судорогами и другими нервными явленіями.

Причины.

Чаще всего приходится примѣнять слѣдующія лѣкарства: *Нуксъ-вом.*: стягивающія боли, хуже послѣ ѣды; тошнота, отрыжка, рвота, вздутіе живота, запоръ.—*Брион.*: ощущение какъ бы опухоли въ желудкѣ, давящія и рѣжущія боли, хуже при движеніи; помутненіе головы съ давленіемъ, улучшающимся отъ движенія.—*Хамомил.*: стискивающія боли, тоска; лучше при съезживаніи; подверженность поносу. (Послѣ гнѣва или досады — также *Брионія*).—*Игнація*: послѣ душевныхъ волненій, огорченія, печали; стрѣляющія боли — *Бисмут. нитр.*: при чисто нервной желудочной боли.— Часто хорошо дѣйствуетъ *Беллад.* попеременно съ *Арсеник.* или *Атропин. сульф.* × 4.

Лѣченіе.

Противъ самаго припадка всего лучше дѣйствуетъ теплота: теплое питье, ромашковый чай; горячія покрывала или бутылки, нагрѣтые платки и т. п., паровые компрессы (50° Р.), смѣняемые каждыя 15 минутъ, влажные набрюшные компрессы (22° Р., продолжительностью — 1 часъ), полуванны (28° Р., 15 минутъ); массажъ желудочной области, если давленіе не болѣзненно (съ белладоновымъ масломъ), клистиры (удерживаемые), клистиры опорожняющие и т. п.

2. Кардіальгія или Нервная боль желудка.

Выше и на стр. 136 упомянута между прочимъ судорожная боль (спазмъ) желудка, которая есть та же кардіальгія или гастральгія, здѣсь же дается болѣе подробное описаніе болѣзни. Боль эта можетъ являться самостоятельно или въ теченіе какой-либо болѣзни желудка (язва, ракъ, катарръ).

Отличительнымъ признакомъ нервной желудочной боли

Призна

является то, что она наступаетъ всегда приступами, вдругъ, неожиданно, или послѣ предшествовавшихъ недомоганій: давленія подъ ложечкой, слюнотеченія, тошноты, головной боли и другихъ нервныхъ явленій. Боль—сильная, стягивающая, рвущая, словно въ сердечную ямку впились когти, отдающая въ спину и доходящая иногда до обморока и конвульсій. Характерно для этой боли то, что давленіе на надчревьѣ не только не усиливаетъ ее, но даже уменьшаетъ; поэтому больной самъ сдавливаетъ себѣ подложечную область, прижимаясь къ твердому предмету, ёжится или ложится на животъ. Продолжительность такого припадка отъ нѣсколькихъ минутъ до нѣсколькихъ часовъ, и оканчивается, постепенно ослабѣвая, отрыжкой, рвотой, отдѣленіемъ обильной, прозрачной мочи и сильнымъ утомленіемъ.

Между припадками бываютъ большей или меньшей продолжительности свободные промежутки, въ общемъ же теченіе болѣзни хроническое, за исключеніемъ лишь такихъ случаевъ, когда причиною является обремененіе желудка или присутствіе глистовъ, и съ удаленіемъ причины исчезаетъ и болѣзнь.

**Отличіе отъ
другой подоб-
ной боли.**

Кардіальгію возможно смѣшать съ болѣзнями, сопровождающимися подобной болью; сюда относится, напримѣръ, ревматизмъ брюшныхъ мышцъ, но тутъ нетрудно опредѣлить источникъ боли (мышцы); межреберная невральгія, отзывающаяся подъ ложечкой, особенно если при этомъ имѣются расстройства пищеваренія; но ощупываніемъ межреберныхъ промежутковъ можно обыкновенно опредѣлить болѣзненные точки, говорящія въ пользу межреберной невральгии. За невральгію можетъ быть принята желчная колика (отъ прохожденія желчныхъ камней); въ пользу кардіальгіи говоритъ тутъ безболѣзненная печень и отсутствіе желтухи, равно и боль ощущается больше влѣво отъ срединной линіи. О возможности смѣшенія съ язвой желудка см. ниже (стр. 220).

Лѣкарства противъ нервной желудочной боли приведены на стр. 136 и 209. Кромѣ того необходимо лѣчить основную болѣзнь или сопутствующія расстройства. Сюда относятся: блѣдная немочь, малокровіе, болѣзни половыхъ органовъ (извѣстны, напримѣръ, случаи, когда гастральгія у женщинъ исчезала послѣ излѣченія болѣзни матки), нервныя болѣзни, малярія, артритизмъ и проч.

3. Диспепсія. Несвареніе.

а. Нервная диспепсія.

Нервная диспепсія отличается от диспепсіи, происходящей отъ органическихъ болѣзней желудка (катарра, язвы, рака и пр.), главнымъ образомъ, тѣмъ, что въ первомъ случаѣ припадки несваренія являются лишь временами, особенно — когда больной болѣе или менѣе возбужденъ, тогда какъ въ случаяхъ органическихъ измѣненій въ желудкѣ состояніе несваренія не прекращается. Притомъ измѣненія эти могутъ быть обыкновенно доказаны врачебными способами изслѣдованія, а нервозность, малокровіе и пр. сопровождаются еще и другими свойственными имъ признаками.

Лѣченіе.

Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ превосходно дѣйствуютъ при нервной диспепсіи: *Магнезіа карбон.* $\times 3$, *Калькар. карбон.* (нишшія, но также и высшія дѣленія), *Напр. фосфорик.* $\times 3$ —все эти лѣкарства при кислой отрыжкѣ. — *Сульфурисъ ацид.* и *Ацид. муриат.*—при отсутствіи отрыжки и изжоги (значитъ—при отсутствующей кислотности), но при жадѣ. — *Нуксъ вом.*: при преобладающей изжогѣ, а также спазмахъ въ желудкѣ; также *Бисмут. нитр.*—*Игнація*: припадки вслѣдствіе глубокаго и продолжительнаго огорченія. Затѣмъ также *Напр. муриат.*, *Пульсат.*, *Хамомилла*, *Бріон.* и проч. (См. еще упомянутые выше общіе желудочные симптомы).

б. Старческая диспепсія.

Старческая диспепсія обыкновенно сопутствуетъ общему одряхлѣнію организма и поэтому не легко преодолевается. Полезными средствами для возбужденія аппетита въ такихъ случаяхъ служатъ: холодная простакваша, мороженное, охлажденный на льду кофе, хорошее вино (хересь и т. п.), хорошее пиво, также на льду охлажденное,—все такое, конечно, въ малыхъ на разъ количествахъ, хотя и болѣе часто. При появленіи аппетита даютъ всего лучше бѣлое мясо, куру, дичь, а также другія безвредныя кушанья, которыя желательны больному и хорошо имъ перевариваются. Изъ лѣкарствъ наибольше подходятъ: *Капсикумъ* $\times 3$, *Хина* $\times 3$, *Фосфоръ 3*.

4. Острый катарръ желудка.

Наиболѣе частой причиной служитъ прямое раздраженіе слизистой оболочки желудка, которая воспаляется, краснѣетъ и

Причины
болѣзней.

Причины острого катарра желудка	набухаетъ. Такое раздраженіе могутъ вызвать: горячая пища, лѣкарства въ аллопатическихъ дозахъ, спиртные напитки, чрезмерное употребленіе пряностей, обремененіе желудка пищей, особенно трудноперевариваемой, каковой можетъ быть и здоровая пища въ томъ случаѣ, если она проглатывается недостаточно разжеванными кусками. Трудно перевариваются также: свѣжеиспеченный хлѣбъ и вообще свѣжія печенья, равно какъ слишкомъ жирныя кушанья, крутыя яйца, вареное старое мясо — во всѣхъ этихъ случаяхъ желудочный сокъ не можетъ въ достаточной мѣрѣ пропитывать вводимыя въ желудокъ пищевыя вещества, тѣмъ болѣе, если вдобавокъ вводятся еще большія количества жидкости, разжижающія этотъ сокъ. Затѣмъ острый катарръ желудка можетъ произойти отъ простуды, отъ слишкомъ холоднаго питья, отъ быстрого охлажденія при вспотѣвшемъ тѣлѣ и проч.—Симптомы
Признаки.	острого катарра желудка суть: боль и вздутіе подъ ложечкой, усиливающіяся при давленіи, обложенный языкъ, дурной вкусъ во рту, головная боль, особенно во лбу, тошнота, рвота, полное отсутствіе аппетита. Въ болѣе трудныхъ случаяхъ присоединяется лихорадочное состояніе съ ускореннымъ пульсомъ и съ бредомъ (гастрическая лихорадка) или желтуха. Симптомы острого катарра желудка сопровождаютъ холерину (см. стр. 85).
Лѣченіе	Главными лѣкарствами при остромъ катаррѣ желудка служатъ. <i>Нуксъ вомика 3, Ипекакуана × 3, Пульсатилла × 3, Антимон. крудумъ 3, Арсеник. 3.</i> При гастрической лихорадкѣ: <i>Аконитъ × 3</i> ; если имѣется сильный приливъ крови къ головѣ, который акониту не уступаетъ, то даютъ <i>Белладонна 3</i> ; при преобладающемъ нервномъ возбужденіи, слабости, бредѣ— <i>Русъ × 3</i> и <i>Ацид. фосфорик. × 3</i> (сравн. „Тифъ“). Во время выздоровленія— <i>Хина × 3</i> или <i>Хинин. арсеникоз. 2—3.</i>
О дозахъ, приемахъ и дѣленіяхъ	См. подробную характеристику лѣкарствъ ниже (послѣ „хроническаго катарра желудка“), также въ „Лѣкарствовѣдѣніи“ (ч. 4-я).
Вспомогательныя	Противъ рвоты и жажды черезъ каждыя 15 мин. по 1—2 столов. ложки холодной воды. При вздутіи живота газами и коликѣ—клизтиръ изъ 28-градусной воды или отвара ромашки (станкана три), черезъ каждыя 1—2 часа; паровыя компрессы (50° Р.), смѣняемые черезъ каждыя 15 минутъ или набрюшныя согрѣватели; затѣмъ—набрюшный согрѣвающий компрессъ, смѣняемый черезъ 1—2 часа. При жарѣ тѣла ножноподмышковое обертываніе (20° Р., продолжительностью 1 или 2 часа).

Впредь до выздоровления необходимо соблюдать строжайшую діету. Въ случаяхъ болѣе серьезныхъ всего лучше въ первые дни совсѣмъ почти воздерживаться отъ пищи или же принимать въ самыхъ малыхъ количествахъ лишь отвары изъ крупъ, мясной отваръ; затѣмъ—жидкія каши, яйца въ смятку; молоко или простаквашу — лишь тогда, когда они хорошо переносятся желудкомъ.

5. Хроническій катарръ желудка.

Развивается часто изъ остраго катарра желудка, а также самостоятельно, вслѣдствіе тѣхъ же вредныхъ вліяній, и послѣдовательно при болѣзняхъ сердца и легкихъ; наконецъ, хроническій катарръ сопровождается другія хроническія болѣзни желудка, какъ язва и ракъ. — Симптомы: тупая боль подъ ложечкой, усиливающаяся при надавливании въ этомъ мѣстѣ и послѣ ѣды; кромѣ того имѣется вздутіе желудка и кишечника газами, отрыжка, изжога; языкъ не такъ обложенъ, какъ при остромъ катаррѣ, но тѣмъ не менѣе больной ощущаетъ во рту, особенно по утрамъ, непріятный вкусъ съ обильнымъ скоплениемъ липкой слизи или слюны, аппетитъ отсутствуетъ, а для возбужденія его больные охотно употребляютъ уксусъ, горчицу, кислые огурцы, сельди, сардинки, икру, перецъ и другія острыя пряности, отъ которыхъ болѣзнь еще болѣе усиливается; ко всему присоединяются еще завалы или, наоборотъ, слишкомъ частыя и жидкія испражнения; больной впадаетъ мало по малу въ угнетенное, мрачное, а также раздражительное настроеніе; особенно мучительно для больныхъ бываетъ головокруженіе, наблюдаемое очень часто въ теченіе хроническаго катарра желудка. Они жалуются также на головную боль, бессонницу, общую разбитость членовъ. Настроеніе духа доходитъ нерѣдко до степени ипохондрии (см. стр. 151). Неудивительно, что при продолжительной диспепсии (неправильномъ пищевареніи), сопряженной всегда съ такимъ катарромъ, силы и питаніе больного значительно падаютъ, нерѣдко до такой степени, что цвѣтъ лица измѣняется, становится желтоватымъ, и этотъ симптомъ настолько характеренъ, что опытный глазъ по нему одному можетъ уже издали безошибочно опредѣлить имѣющійся въ данномъ случаѣ хроническій катарръ желудка.

Теченіе болѣзни—длительное, и, если ее запустить или лѣчить ненадлежащимъ образомъ, она можетъ продолжаться годами. Особенно упоренъ хроническій катарръ желудка, зависящій отъ

Причины.

Признаки
теченіе бо
лѣзни.

неизлѣчимыхъ болѣзней другихъ органовъ. Самъ по себѣ, однако, хроническій катарръ желудка къ смерти не ведетъ.

Діагнозъ катарра желудка. Діагнозъ „хроническій катарръ желудка“ можно поставить только въ томъ случаѣ, когда съ достовѣрностью исключены другія хроническія болѣзни желудка, какъ язва, ракъ и расширеніе его. Очень важно также опредѣленіе основной болѣзни, обуславливающей или поддерживающей катарръ желудка; особенно надо имѣть въ виду хроническія болѣзни почекъ, и поэтому ни въ одномъ случаѣ упорнаго катарра желудка не слѣдуетъ упустить изслѣдованія мочи.

Лѣченіе хронич. катарра желудка. При выборѣ лѣкарствъ противъ хроническаго катарра желудка необходимо въ каждомъ случаѣ руководствоваться не только признаками со стороны желудка, но и предполагаемыми причинами болѣзни и общимъ состояніемъ здоровья больного. При этой болѣзни шаблонное лѣченіе еще въ меньшей мѣрѣ допустимо, нежели при какой либо другой. Разныя лѣкарства указаны уже выше при нѣкоторыхъ общихъ желудочныхъ симптомахъ. Тутъ же приводится болѣе подробная характеристика главнѣйшихъ изъ нихъ.

Нуксъ вомика 3. Главное лѣкарство въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ страданія желудка происходятъ отъ спиртныхъ напитковъ, кофе, крѣпкаго чая. Вкусъ горькій или кислый, превратный вкусъ. Отвращеніе къ кофе, табаку и къ черному хлѣбу. Ухудшеніе всѣхъ страданій послѣ ѣды. Отрыжка послѣ ѣды. горькая или кислая, часто болѣзненная. Тошноты большой нѣтъ, рѣдка и рвота, а если и бываетъ то лишь водой и слизью. Область желудка чувствительна, особенно послѣ ѣды, причемъ имѣется часто и вздутость. Боли въ желудкѣ давящія, рѣже—рвущія. Слизистая оболочка рта катарральна. Грязно-бѣлый налетъ на языкѣ, иной разъ—съ пушистобѣлыми полосками. Запоръ. Нуксъ вомика подходит для случаевъ не очень давнихъ, въ которыхъ слизистая оболочка желудка не подверглась еще значительному вещественному измѣненію.

Бріонія 3. Подобна Нуксъ вомикѣ. Та же чувствительность подъ ложечкой, являющаяся вскорѣ послѣ ѣды, вслѣдствіе образованія газовъ въ желудкѣ, и проходящая послѣ нѣсколькихъ отрыжекъ. Отрыжка не горькая или кислая, какъ при Нуксъ, а гнилая, часто съ пищей, и вызываетъ иной разъ рвоту слизью или желчью. Вкусъ горькій или прѣсный. Постоянная жажда къ

обильному холодному питью. Бріонія, какъ и Нуксъ, подходитъ для случаевъ катарра недавняго происхожденія.

Антимоніумъ крудумъ 3. Особенно, когда причиной катарра является перегруженіе желудка пищей. Языкъ очень обложенъ бѣлымъ или желтымъ, запахъ изо рта гнилой или противно-сладкій; во рту обиліе слизи. Аппетитъ имѣется, иной разъ и чрезмѣрный, но съ отвращеніемъ къ пищѣ. Жажда. Отрыжка пустая. Общая слабость. Запоръ.

Пульсатилла × 3. Подобна Бріоніи, но нѣтъ жажды, и страданія являются не вскорѣ же, а лишь нѣкоторое время спустя послѣ ѣды, и уменьшаются отъ движенія (а не ухудшаются какъ при Бріоніи). Зябкость. Это средство умѣстно особенно при сопутствующемъ маточномъ разстройствѣ; съ другой стороны, оно бесполезно при желудочныхъ страданіяхъ во время беременности.

Коккулусъ 3. Подобно Нуксъ вомикѣ, и предпочтительно примѣняется тогда, когда имѣется обильное скопленіе газовъ съ колькообразными болями.

Ипекакуана 3. Полезна часто, какъ промежуточное лѣкарство, при внезапномъ появленіи тошноты или рвоты послѣ простуды или перегруженія желудка пищей, съ приторнымъ или прѣснымъ вкусомъ, отвращеніемъ къ пищѣ; при рвотѣ желчью или слизью, при поносѣ. Пушисто-бѣлый налетъ на языкѣ.

Игнація × 3. У нервныхъ субъектовъ, особенно у женщинъ и дѣтей. Давленіе подъ ложечкой, какъ отъ камня, особенно послѣ ѣды или ночью; грызущая боль, ощущеніе пустоты подъ ложечкой; ощущеніе голода при отвращеніи къ ѣдѣ; ощущеніе слабости, скверное настроеніе, склонность къ обмороку.

Упомянутыя лѣкарства подходятъ для случаевъ болѣе легкихъ; при болѣе же трудномъ и давнемъ катаррѣ желудка надо имѣть въ виду слѣдующія лѣкарства:

Хина × 3. Вкусъ, если только не отсутствуетъ, всегда горькій. Мѣстныя страданія не сильны, но длительны; полное отсутствіе аппетита; желудокъ совершенно бездѣятеленъ, пища въ немъ крайне долго задерживается или же она почти непереваренной отходитъ съ испражнениями. Средство это полезно особенно послѣ тяжелыхъ болѣзней при наличности подобныхъ желудочныхъ разстройствъ.

Сенія 3. Особенно для особъ женскаго пола. Сопутствующія нервныя страданія. Превратный аппетитъ, особенно на острые вещества. Кислотность желудка съ ощущеніемъ жженія послѣ

ѣды, особенно ночью и съ облегченіемъ отъ плотной пищи. Очень полезна при желудочныхъ страданіяхъ у беременныхъ. Жгучая боль въ области лѣвой почки съ отхожденіемъ насыщенной мочи, богатой мочекислыми солями и послѣдующимъ затѣмъ облегченіемъ.

Фосфоръ 3. Въ болѣе трудныхъ случаяхъ катарра желудка. Обильное образованіе кислотъ въ желудкѣ съ маслянистымъ вкусомъ отрыжки или рвоты. Боли въ желудкѣ очень сильныя и увеличиваются еще больше уже во время ѣды, что указываетъ на болѣе глубокія измѣненія слизистой оболочки желудка.

Ликоподій 3. Отсутствие аппетита и быстрое насыщеніе отъ самаго малаго приема пищи. Вздутіе желудка съ болѣзненностію въ области печени. Отвращеніе къ плотной пищѣ. Запоръ. Общее состояніе здоровья сильно нарушено; упадокъ питанія; исхудалость; сѣроватый цвѣтъ лица.

Арсеникъ 3. Давящая или жгучая боль подъ ложечкой. Сильная, мучительная жажда. Вкусъ горькій, соленый или гнилой. Рвота происходитъ съ большимъ трудомъ и съ сильной болью, вскорѣ же послѣ ѣды.—*Арсеникъ* подходит и при отсутствіи боли, но при полномъ упадкѣ пищеварительной способности желудка и сильномъ упадкѣ питанія. Моча содержитъ много мочевоы кислоты.

Сульфуръ 3—6. Подобенъ Нуксъ воикѣ и иной разъ помогаетъ еще въ тѣхъ случаяхъ, когда другія средства уже не дѣйствуютъ, особенно у геморроидальныхъ субъектовъ и у ипохондриковъ, также у страдающихъ печенью. Послѣ Сульфура часто полезны Калькареа карб. и Ликоподій.

Калькареа карбоника 3—6. Особенно у блѣдно-немочныхъ женщинъ и у дѣтей. Сильная жажда на кислое питье; чрезмѣрное образованіе кислотъ въ желудкѣ; прихоть къ острымъ и очень кислымъ веществамъ; отвращеніе къ мясу и вообще къ животной пищѣ и влеченіе къ мучнистымъ кушаньямъ; волчій голодъ при полномъ отсутствіи аппетита; наклонность къ поносамъ.

Натр. муриатик. 3—6. Катарръ желудка съ обильнымъ скопленіемъ слизи и слюны во рту, отсутствіе аппетита и отвращеніе къ черному хлѣбу, къ кофе, также къ табаку. Противный вкусъ, жажда, отрыжка, особенно же изжога, давленіе и вздутіе подъ ложечкой съ ощущеніемъ стягиванія и пульсаціи.

Кромѣ того можно привести еще вкратцѣ слѣдующія лѣкарства, часто полезныя при хроническомъ катаррѣ желудка:

Атропин. сульфурик. × 4. При сильной боли подъ ложечкой, съ облегченіемъ послѣ мучительной рвоты слизью; боль является преимущественно ночью.

Карбо вегетабилис 3—6. Крайне вялое пищевареніе съ образованіемъ газовъ въ желудкѣ и громкимъ урчаніемъ въ животѣ. Жженіе подъ ложечкой вдоль до горла.

Креозотъ 2. Пища долго и трудно переваривается или извергается непереваренной обратно спустя болѣе долгое время послѣ принятія ея. Образованіе газовъ въ желудкѣ, кислотность.

О дозахъ, пріемахъ лѣкарствъ и дѣлекіяхъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.

Діета и вспомогательныя мѣры при хроническомъ катаррѣ желудка.

Главное вниманіе при хроническомъ катаррѣ желудка надо обращать на діету, которая, вообще говоря, должна быть слѣдующая: избѣгать мучнистыхъ веществъ, употребляя лишь въ малыхъ количествахъ бѣлый хлѣбъ, сухари, бисквиты; допускаются отвары и жидкія каши изъ риса, пшена, манны, саго и т. п., но не въ большихъ количествахъ; изъ зелени можно позволить себѣ лишь самую нѣжную, какъ спаржу, молодой хмѣль, сладкій горошекъ безъ стручковъ, молодые бобы, молодую морковь, цвѣтную и красную капусту, картофельное пюре—и все это лишь въ малыхъ количествахъ. Запрещаются же, напротивъ того, всякіе зеленые салаты, также огуречный и картофельный, кислые и пряные кушанья (соусы), лукъ, чеснокъ, сельдереи, мускатный орѣхъ, петрушка, укропъ, корица и т. п. Всѣ подобныя вещества вызываютъ или усиливаютъ броженіе въ желудкѣ.

Вредно также для такихъ больныхъ употребленіе жировъ въ пищу, такъ какъ отъ нихъ образуются въ желудкѣ жирныя кислоты, вызывающія мучительную отрыжку кислымъ, прогорклымъ содержимымъ желудка, изжогу и проч.

Употребленіе яицъ допускается, но ѣсть ихъ слѣдуетъ только въ смятку; крутосваренныя же и сырыя яйца гораздо труднѣе перевариваются желудкомъ.

Мясо допускается преимущественно бѣлое, къ которому относится мясо птицъ, какъ, напимѣръ, грудинка курицы, дичь и т. п.; сравнительно легко перевариваются железистые органы молодыхъ животныхъ, какъ телячья зубная железа, также вареная телятина. Мясо легче переваривается, если оно не слишкомъ

свѣжее, а нѣсколько полежавшее, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ образующаяся въ мясѣ кислота поддерживаетъ дѣйствіе пепсина въ желудкѣ, особенно же способствуетъ преобразованію клейдающихъ веществъ въ клей, благодаря чему процессъ этотъ легче происходитъ окончательно въ желудкѣ. Въ болѣе легкихъ случаяхъ катарра-желудка разрѣшается и говядина, всего лучше—въ видѣ ростбифа, т. е. лишь слегка поджареннаго мяса; слишкомъ же сильное прожариваніе, а также вывариваніе дѣлаютъ мясо жесткимъ, труднопереваримымъ. Вареное мясо переваривается желудкомъ въ 3 раза медленнѣе сырого. Надо остерегаться глотать мясо кусками мало разжеванными. Допускается и мясо рыбъ, особенно бѣлыхъ сортовъ, въ вареномъ видѣ, безъ жира.

Молоко хорошо переносится большинствомъ больныхъ, также простокваша, пахтанье, кефиръ. Въ тѣхъ же однако, случаяхъ, въ которыхъ тотъ или иной молочный продуктъ плохо переваривается, вызывая отягощеніе въ желудкѣ или броженіе, онъ долженъ быть исключенъ изъ діеты больного.

Изъ напитковъ допускается, кромѣ молока, еще ячменный или легуминозный кофе, слабонастоенный чай. Кофе же, крѣпкій чай и вино всякаго рода, также пиво, вредны. При сильной жаждѣ попить чистую или легкую минеральную воду (напримѣръ—Нарзанъ) или глотать кусочки льда.

Фрукты разрѣшаются лишь въ вареномъ видѣ, также печенныя яблоки, фруктовые желе, также кисели; сырые же фрукты—лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда они хорошо перевариваются желудкомъ и вообще не вызываютъ разстройствъ пищеваренія, но отнюдь не въ чрезмѣрномъ количествѣ.

Вспомогат.
мѣры при
катар. же-
лудка

Изъ вспомогательныхъ мѣръ надо упомянуть прежде всего равномѣрно теплое содержаніе тѣла, особенно—ногъ и живота. Полезно брать почаще полуванну (28 град. по Р., 15 минутъ продолжительности) съ послѣдующимъ обмываніемъ (24°). По вечерамъ набрюшный согрѣвающий компрессъ (22° Р.), по утрамъ—цѣльное обмываніе (22° Р.) при вставаніи съ постели. Въ болѣе упорныхъ случаяхъ: 2—3 раза въ недѣлю ножно-подмышковое обертываніе съ влажнозавернутыми согрѣвающими бутылками вдоль ногъ и на желудокъ; послѣ такого примѣненія надо принять полуванну (25° Р.), или цѣльное обмываніе (22° Р.) или обливаніе всего тѣла (2 лейки, 25° или 22°). При привычно-холодныхъ ногахъ: 3 раза въ недѣлю ножная паровая ванна съ,

послѣдующимъ цѣльнымъ обмываніемъ. Показаны также солнечныя ванны, иногда и постельная паровая ванна.

При запорахъ надо до крайней возможности избѣгать слабительныхъ средствъ, да въ нихъ обыкновенно и надобности нѣтъ при надлежащемъ лѣченіи и цѣлесообразной діетѣ, и въ томъ еще случаѣ, если больной ставитъ себѣ неизмѣннымъ правиломъ—каждое утро, послѣ утренняго питья или завтрака, дѣлать попытку къ испражненію на низъ—все равно, есть къ этому позывъ или нѣтъ его. Во многихъ случаяхъ главная причина упорнаго запора заключается именно въ небрежномъ и беззаботномъ отношеніи къ этому отправленію организма.

Мѣры противъ хронич. запора.

При упорномъ запорѣ, если указанныхъ мѣръ недостаточно, прибѣгаютъ къ клистиру изъ 2 или 3 стакановъ воды комнатной температуры (у дѣтей—изъ $\frac{1}{2}$ —1 стакана). Полезенъ также массажъ живота по утрамъ въ теченіе 8—10 минутъ, также гимнастическія упражненія (см. ч. 3-ю). Помогаетъ часто черносливъ, намоченный въ горячей водѣ, и сѣдаемый по нѣскольку штукъ утромъ и на ночь, или пюре изъ варенаго чернослива съ прибавленіемъ ржанныхъ или пшеничныхъ отрубей (2 столовыя ложки на чашку растертаго чернослива), за полчаса до пріема пищи или часа два спустя послѣ того. Рекомендуются какъ легкое слабительное медъ въ молокѣ (чайная ложка на полстакана) или на хлѣбѣ съ масломъ. Въ крайнемъ случаѣ можно принять рюмку слабительной минеральной воды или столовую ложку прованскаго или кастороваго масла.

6. Простая язва желудка.

Язва желудка характеризуется тупыми, часто жестокими болями, ощущаемыми подъ ложечкой и усиливающимися отъ давленія и послѣ ѣды. При этомъ, кромѣ обычныхъ катарральныхъ явленій (изжога, отрыжка и пр.), бываетъ часто рвота кровью, въ видѣ черно-коричневыхъ массъ или же кровь отходитъ заднимъ проходомъ въ видѣ жидкихъ смолообразныхъ испражненій. Иногда же язва желудка протекаетъ совсѣмъ безъ кровотеченія. Особенно часто эта болѣзнь развивается у малокровныхъ молодыхъ особъ женскаго пола и, при надлежащемъ лѣченіи и правильной діетѣ, почти всегда излѣчивается. Предсказаніе хуже въ тѣхъ случаяхъ, когда причиной является болѣзнь сердца, легкихъ, печени. Въ этомъ отношеніи, между прочимъ, язва желудка

Проявленія болѣзни.

отличается отъ рака желудка (см. ниже), который почти безъ исключенія въ 1—1½ года ведетъ къ смерти; кромѣ того ракъ желудка не встрѣчается у людей раньше 40-лѣтняго возраста. Почти постоянно язва желудка сопровождается упорнымъ запоромъ.

**Течение бо-
лѣзни.**

Течение болѣзни—хроническое, видимость же остраго теченія бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣ неопредѣленно долгаго скрытаго періода наступаютъ вдругъ бурныя явленія, напри- мѣръ, прободеніе язвы съ признаками воспаленія брюшины. Иногда бываетъ, что язва желудка протекаетъ отъ начала до конца скрытно и обнаруживается случайно при вскрытіи въ видѣ рубца бывшей язвы у людей, при жизни не страдавшихъ желудкомъ. Такіе случаи служатъ доказательствомъ полной излѣчимости язвы желудка, въ чемъ, впрочемъ, нельзя сомнѣваться и на основаніи результатовъ лѣченія, т. е. случаевъ полного выздоровленія.

Судорожная боль (спазмъ) желудка (см. стр. 209),—кардіальгія—наблюдается часто при язвѣ желудка и происходитъ либо отъ раздраженія желудочныхъ нервовъ язвой, либо отъ рубцового стягиванія зажившей язвы.

Смотря по мѣстоположенію рубца можетъ получиться расширение или суженіе просвѣта желудка: первое—при рубцовомъ суженіи привратника, второе—при рубцахъ входной части желудка.

**Діагнозъ
язвы желудка.**

Опредѣленіе болѣзни во многихъ случаяхъ представляетъ нѣкоторыя затрудненія даже для опытнаго врача. Вообще, касательно діагноза можно сказать слѣдующее.

Если представляется случай сомнительный, какъ, напри- м., у слабыхъ блѣдноемочныхъ женщинъ, жалующихся на сильныя боли въ желудкѣ и расстройства пищеваренія, то надо предпринять такое лѣченіе, какъ если бы навѣрно была язва желудка, между прочимъ—строгое воспрещеніе пищи, за исключеніемъ лишь мясного раствора и проч. (см. ниже). И если при такомъ лѣченіи, спустя нѣкоторое время, не послѣдуетъ улучшенія, то съ большой вѣроятностію можно исключить незажившую язву и лѣчить какъ расстройство, то или другое, пищеваренія.

Въ отличіе отъ чисто нервной боли (кардіальгіи) желудка боль при язвѣ желудка наступаетъ каждый разъ послѣ ѣды, она упорна и усиливается отъ наружнаго давленія; кромѣ того отсутствуютъ другія нервныя явленія, имѣется постоянная диспепсія и рвота.

Въ пользу язвы и противъ рака желудка свидѣтельствуютъ въ сомнительныхъ случаяхъ: молодой возрастъ, здоровый наружный видъ и незамѣтное исхуданіе при давнемъ существованіи болѣзни, непостоянство симптомовъ; весьма обильная кровавая рвота указываетъ скорѣе на язву, нежели на ракъ.

При желчной коликѣ боль сосредоточивается болѣе въ правомъ подреберьи, нежели подъ ложечкой, не говоря уже о другихъ сопровождающихъ симптомахъ, (припухлость печени, желтуха и проч.).

Язва желудка можетъ сопровождаться явленіями хроническаго катарра желудка, но за послѣдній и противъ язвы свидѣтельствуется предыдущее теченіе болѣзни, отсутствіе пароксизмовъ боли, кровавой рвоты, большее постоянство разстройствъ пищеваренія.

При сильной боли въ желудкѣ помогаетъ обыкновенно *Лѣченіе язвы желудка.*
Атропин. сульфурик. $\times 4$ (въ капляхъ или еще лучше въ видѣ порошка). При улучшеніи цѣлесообразно давать нѣкоторое время *Сульфуръ 3—6*, по 1—2 приѣма въ день. Кромѣ того, послѣдовательно или по соотвѣтствію симптомовъ, слѣдующія лѣкарства.

Барита карбоника 3—6. Рвота отсутствуетъ, или лишь очень рѣдко изрыгается слизь. Боль подъ ложечкой, ощущаемая при прохожденіи пищи въ желудокъ.

Карбо вегетабилисъ 3—6. Боль является не только во время ѣды, но и при пустомъ желудкѣ, какъ это бываетъ при чрезмерномъ образованіи кислотъ въ послѣднемъ, но также и при отсутствіи кислотности. Рвота часто бываетъ.

Аргент. нитрик. $\times 3$ (въ капляхъ, но еще лучше въ растираніи, т. е. порошковомъ видѣ). Сильная судорожная боль подъ ложечкой, въ разное и неопредѣленное время, съ мучительными позывами на рвоту, рвота острой, кислой или желчеподобной жидкостію.

Фосфоръ 3. Пища извергается рвотой тотчасъ же послѣ проглатыванія ея. Постоянное, особенно ночью, ощущеніе голода. Временное облегченіе отъ холодной пищи, холоднаго питья. Какъ только пища или питье въ желудкѣ согрѣются, является рвота; рвота слизью и темной комковатой массой.

Кромѣ того надо имѣть еще въ виду: *Арсеник.*, *Натр. muriatic.*, *Хина* и прочія лѣкарства, приведенныя при хроническомъ катаррѣ желудка (стр. 214).

**Діета при
язвѣ же-
лудка.**

Заживленіе язвы желудка возможно лишь въ томъ случаѣ, если на нее не будутъ дѣйствовать продолжительныя внѣшнія раздраженія. Поэтому пища при этой болѣзни должна быть жидкая или, по крайней мѣрѣ, не твердая, а кашицеобразная. Во главѣ діеты должно поставить молоко, это наиболѣе легкое и питательное вещество для больныхъ страдающихъ язвой желудка. Къ сожалѣнію, молоко не всѣми больными хорошо переносится, свертываясь въ желудкѣ въ слишкомъ грубые комья. Въ такихъ случаяхъ молоко замѣняютъ мяснымъ растворомъ. Кромѣ того можно давать понемногу бульонъ съ жидкимъ яйцомъ и ячменный кисель.—При улучшеніи, когда можно полагать, что язва уже рубцуется, можно перейти къ болѣе разнообразной пищѣ. Вредными, раздражающими надо считать, во всякомъ случаѣ: всѣ стручковые плоды, сырые фрукты, черный хлѣбъ, крупяную (гречневую кашу, картофель; послѣдній можно допускать лишь въ видѣ мягкаго пюре (на молокѣ).

Промываніе желудка посредствомъ желудочнаго зонда или выкачиваніе содержимаго его посредствомъ насоса неумѣстны при язвѣ желудка: во 1) приемы эти небезопасны въ виду возможности прободенія язвы, во 2) мучительны для больного, вызывая сильныя рвотныя движенія.

**Питательные
клизмы.**

При постоянной рвотѣ послѣ малѣйшаго приема пищи можетъ понадобиться временное кормленіе больного питательными клистирами, которые вводятся въ заднепроходную кишку два въ день. Такой клистиръ готовится, на примѣръ, слѣдующимъ образомъ: тонко наскобленное и затѣмъ еще мелко изрубленное мясо (около 100 грам.) вмѣстѣ съ очень мелко изрубленной и отъ жира освобожденной массой поджелудочной железы (50 грам.) размѣшиваютъ въ 100 грам. тепловатой воды и посредствомъ клистира или насосной трубки вводятъ въ прямую кишку. Предварительно, за часъ до этого, ставятъ опорожняющій клистиръ.

**Вспомогат.
мѣры.**

Примѣненія воды тѣ же, что при хроническомъ катаррѣ желудка.

Массажъ и гимнастика при язвѣ желудка не показаны и могутъ причинить даже вредъ.

7. Кровотеченіе изъ желудка. Кровавая рвота.

**Желудочное
кровотеченіе.**

Желудочное кровотеченіе чаще всего наблюдается при язвѣ желудка и при ракѣ. Оно можетъ быть вызвано и прямымъ по-

врежденіемъ кровеносныхъ сосудовъ желудка, напримѣръ—отъ Причины же-
проглоченнаго остроконечнаго предмета или отъ химическаго лудочн. кро-
разъѣдающаго вещества. Дальнѣйшими причинами могутъ слу- вотеченія.
жить: разъѣденіе и измѣненіе (напримѣръ—цынготное) стѣнокъ
желудочныхъ сосудовъ, застои крови вслѣдствіе заболѣваній со-
сѣднихъ органовъ (печени, селезенки); къ застойной кровавой
рвотѣ относится и желудочное кровотеченіе, наблюдаемое у ново-
рожденныхъ въ первое время послѣ рожденія при неустановившихся,
какъ слѣдуетъ, кровообращеніи и дыханіи.

Излившаяся въ желудокъ кровь, если она не извергается
немедленно рвотою, измѣняется въ своемъ видѣ подѣ влияніемъ
желудочнаго сока и извергается рвотой, или проходитъ въ кишки
и выдѣляется съ испражненіями, въ видѣ черныхъ, дегтеобраз-
ныхъ массъ.

Ближайшей причиной желудочнаго кровотеченія въ тѣхъ
случаяхъ, когда къ нему имѣется предрасположеніе, можетъ слу-
жить душевное волненіе, тѣлесное напряженіе, обремененіе же-
лудка и проч. Кровотеченіе бываетъ иной разъ замѣщающимъ
при задержанномъ мѣсячномъ очищеніи у женщинъ или скрытомъ
геморроѣ.

При сужденіи объ источникѣ кровавой рвоты является не- Отличитель-
рѣдко сомнѣніе въ томъ, изъ желудка ли кровь или изъ другого ные признаи
мѣста. Такъ, кровь можетъ попасть въ желудокъ изъ носа, черезъ
носоглотку, или изъ зѣва или изъ пищевода, если въ немъ имѣется
язва. Особенно же часто приходится рѣшить вопросъ: легочное
или желудочное кровотеченіе? Отличительными признаками могутъ
служить слѣдующіе:

при *кровохарканіи*:

Предшествующая грудная болѣзнь,
болѣе или менѣе продолжительная,
поврежденіе дыхательныхъ путей,
расположеніе къ чахоткѣ.

Сопровождающее стѣсненіе въ гру-
ди, шекотаніе въ горлѣ, кашель; за-
тѣмъ можетъ послѣдовать удушье
и рвота проглоченной кровью.

Кровь алая, по крайней мѣрѣ въ
началѣ кровохарканія, и пѣниста, съ
примѣсью слизи, иногда—гнойной.

при *кровавой рвотѣ*:

Предшествующее и имѣющееся
страданіе желудка, печени, отрав-
леніе и проч. (см. выше).

Кровавая рвота начинается ощу-
щеніемъ полноты подѣ ложечкой,
тошнотой, позывомъ на рвоту. При
этомъ, если кровь попадетъ въ гор-
тань, она можетъ вызвать кашель.

Кровь темная, — лишь рѣдко, при
обильномъ кровотеченіи, алая, —свер-
нувшаяся въ сгустки, не пѣниста-
съ примѣсью остатковъ пищи.

Кровотечение изъ желудка само по себѣ далеко еще не такъ опасно, какъ оно обыкновенно кажется, и больные обыкновенно оправляются даже послѣ большой потери крови. Кровавая рвота, бывающая при циррозѣ печени, до нѣкоторой степени даже облегчаетъ временно положеніе больного, уменьшая зависящій отъ застоя катарръ желудка и способствуя всасыванію брюшной водянки. Опасность желудочнаго кровотечения кроется больше въ вызывающей его основной болѣзни и въ возможности повтореній. Наименѣе опасны и обыкновенно даже безвредны упомянутыя выше замѣщающія кровотечения.

Лѣченіе же-
лудочнаго
кров. теченія

Лѣченіе сводится во 1) къ остановкѣ кровотечения, во 2) къ устраненію ближайшихъ послѣдствій его, въ 3) къ предупрежденію возвратовъ или, что то же самое, къ устраненію основной болѣзни, когда и насколько это возможно.

Для остановки кровотечения показана прежде всего *Ипекакуана* $\times 3$ или, еще лучше, болѣе низкое дѣленіе, $\times 2$ — $\times 1$, предпочтительно въ порошковомъ видѣ (растираніе изъ рвотнаго корня). Частые приемы.

Нуксъ вомика $\times 3$. Приливъ крови къ головѣ и сильное сердцебіеніе при полномъ, напряженномъ пульсѣ. Кровотечение не обильное, но рвота очень мучительная, натужная. Причиной является болѣе острое страданіе желудка и когда кровь алая и выдѣляется въ маломъ количествѣ. Въ такихъ случаяхъ показана и *Белладонна* $\times 3$.

Если кровотечение уже нѣсколько разъ повторилось и появились уже признаки обезкровленія, то умѣстно *Вератр.* (нисшее дѣленіе): пульсъ слабый, кожа холодная, постоянная тошнота, обморочная слабость.

Секале (нисш. дѣленіе). При симптомахъ, подобныхъ *Вератр.*, но имѣются еще судорожныя подергиванія.

Арсеник 3. Отчаянная тоска, неутолимая жажда, необычайное безпокойство, кожа не очень холодная.

Указанныхъ лѣкарствъ обыкновенно достаточно бываетъ для остановки кровавой рвоты.

Если причина—механическое поврежденіе, надо давать *Арника*.—При кровавой рвотѣ у новорожденныхъ рекомендуется особенно *Аконитъ* $\times 3$.—Противъ слабости, наступающей послѣ кровавой рвоты, дается *Хина* 1, попеременно черезъ 2—3 часа съ *Нуксъ вомика*, *Арсеник.* или *Вератр.*

При замѣщающемъ кровотеченіи, когда оно явилось вслѣдствіе задержавшихся регулъ, даютъ *Пульсатилла* $\times 3$; если же при этомъ имѣется приливъ крови къ головѣ, то больше подходитъ *Белладонна*, особенно въ климактерическомъ періодѣ. Въ такихъ случаяхъ подходитъ и *Ликоподій*.

Затѣмъ должна подлежать лѣченію основная болѣзнь, какъ язва желудка, ракъ, болѣзнь печени или селезенки, болѣзни сердца.

При кровотеченіи вслѣдствіе отравленія необходимо дать немедленно **противоядіе** для предотвращенія дальнѣйшаго разъѣданія и поврежденія кровеносныхъ сосудовъ желудка.

Во время кровотеченія необходимо доставить больному полный покой, тѣлесный и душевный; окружающіе не должны вызывать своего безпокойства, такъ какъ это еще болѣе усиливаетъ волненіе больного, и безъ того достаточно встревоженнаго.

Съ пищей надо быть крайне осторожнымъ; въ первые дни послѣ кровавой рвоты лучше всего воздерживаться отъ всякой пищи, вводимой черезъ ротъ, и довольствоваться питательными клистирами (см. стр. 222), а затѣмъ перейти къ обычному способу питанія, причемъ діета должна быть во всякомъ случаѣ легкая (см. таковую при „Язвъ желудка“).

Вспомогат.
мѣры и діета

8. Ракъ желудка.

Здѣсь приводится лишь описаніе болѣзни, общій же взглядъ на сущность ея, равно какъ подробное общее лѣченіе рака, изложены въ 10-мъ отдѣлѣ этой 2-й части книги („Болѣзни крови и лимфы“).

Ракъ желудка встрѣчается лишь у лицъ стараго и пожилого возраста (не раньше 40 лѣтъ). Симптомы этой болѣзни тѣ же, что при хроническомъ катаррѣ и язвѣ желудка; отличаются же тѣмъ, что при ближайшемъ изслѣдованіи (ощупываніи) подложечной области можно замѣтить ограниченное, болѣзненное затвердѣніе, величиною съ орѣхъ и до гусинаго яйца; кромѣ того рвотныя массы имѣютъ обыкновенно, но не всегда, видъ кофейной гущи. Начало болѣзни можетъ протекать подъ видомъ обычнаго хроническаго катарра и такимъ образомъ быть легко просмотрѣно. Поэтому надо всегда отнестись подозрительно къ такимъ явленіямъ хроническаго катарра, которыя вдругъ являются у человѣка, имѣющаго болѣе 40 лѣтъ отъ роду и до того никогда не страдавшаго желудкомъ. Диагнозъ становится несомнѣннымъ, а врачебное искусство безсильнымъ, когда уже появляются признаки

Признаки и
отличіе отъ
другихъ бо-
лѣзней.

раковаго истощенія: желтовато-блеклый цвѣтъ тѣла, вялость и общая слабость, отеки, исхуданіе и проч., причина которыхъ заключается во всасываніи въ кровь продуктовъ распада раковой опухоли. Особенно за наличность рака говоритъ опуханіе лимфатическихъ железъ, преимущественно надъ ключицами. Но отсутствіе такого опуханія железъ не говоритъ еще противъ рака, равно какъ такіа железы могутъ зависѣть и отъ другихъ причинъ. То же надо сказать о боли и желудочныхъ расстройствахъ. Но если при этихъ симптомахъ случается характерная кровавая рвота, и въ надчревьѣ прощупывается опухоль, то наличность рака становится въ высшей степени достовѣрной. Правда, сомнѣнія возникаютъ иной разъ и при столь полной картинѣ болѣзни, когда приходится подумать надъ тѣмъ, не принадлежитъ ли прощупываемая опухоль лѣвой долѣ печени, или поджелудочной железѣ; однако, дальнѣйшее теченіе болѣзни выясняетъ положеніе. Отъ хроническаго катарра или отъ язвы желудка отличить ракъ желудка обыкновенно не представляетъ особой трудности, если принять во вниманіе исторію болѣзни и ея теченіе, хотя въ начальной стадіи развитія рака сомнѣнія могутъ возникнуть и тутъ. Вопросъ рѣшается надлежащимъ врачебнымъ наблюденіемъ и изслѣдованіемъ.

Лѣченіе. Лѣченіе рака желудка пока все еще лишь симптоматически-палліативное, рѣдко — радикальное; быть можетъ, тутъ играетъ роль то, что лѣчить обыкновенно приходится уже вполне разившійся ракъ. Подробности лѣкарственнаго лѣченія см. въ отдѣлѣ 10-мъ. Болѣе или менѣе специфичными при ракѣ желудка считаются: *Коніумъ*, *Гидрастисъ*, *Арсеникъ*.

Діета и вспомогательныя мѣры тѣ-же, что при хроническомъ катаррѣ и при язвѣ желудка.

9. Расширеніе желудка.

**Причины и
симптомы.**

Болѣзнъ эта довольно частая и развивается не только вслѣдствіе хроническаго катарра желудка, но и вслѣдствіе язвы и рака желудка, если они поражаютъ привратникъ (нижнее устье) послѣдняго. Расширеніе желудка наблюдается также въ теченіе и другихъ ослабляющихъ организмъ болѣзней, какъ блѣдная немочь, туберкулезъ, сахарная болѣзнъ. Симптомы вообще тѣ же, что при хроническомъ катаррѣ, но кромѣ того, если больной, послѣ принятія жидкости, повернется на бокъ или сдѣлаетъ отрыгивые

толчки рукою въ область желудка, слышно въ послѣднемъ плесканіе. Изжога, отрыжка газами и рвота, спустя болѣе долгое время послѣ ѣды, чаще встрѣчаются при расширеніи, чѣмъ при простомъ катаррѣ желудка. Степень расширенія легко обнаружить, если искусственно произвести вздутіе желудка углекислымъ газомъ, давши больному выпить шипучаго порошка. Расширеніе достигаетъ при этомъ иногда такихъ размѣровъ, что нижняя выпуклость желудка доходитъ до нижней части живота. Развившійся отъ шипучаго порошка газъ выходитъ наружу слѣдующими другъ за другомъ частыми отрыжками. Запоръ при расширеніи желудка обуславливается не завалами въ кишкахъ, а главнымъ образомъ тѣмъ, что расширенный желудокъ не въ состояніи проталкивать въ кишки свое пищевое содержимое, вслѣдствіе чего дѣятельность послѣднихъ ослабляется въ значительной мѣрѣ. Теченіе и продолжительность зависятъ отъ основной болѣзни.

Лѣченіе расширенія желудка въ общемъ то-же, что и хроническаго катарра его, больше же всего показаны: *Креозотъ*, *Карбо вегетабилисъ*, *Сульфуръ*, *Калькареа карбоника*, *Магнезія карбоника*. Необходимо и лѣченіе общаго состоянія организма (хлорозъ, малокровіе и проч.).

Лѣченіе.

Тѣ же и вспомогательныя мѣры, но при расширеніи желудка примѣняется еще опорожненіе желудка отъ его содержимаго посредствомъ желудочнаго зонда и выкачивающаго аппарата (насоса), употребленію котораго больной можетъ быть наученъ врачомъ. Такое выкачиваніе содержимаго желудка приноситъ часто большую пользу больнымъ. Бываютъ, однако, случаи, гдѣ примѣненіе желудочнаго насоса неумѣстно и даже можетъ причинить вредъ. Сюда относятся случаи осложненія расширенія язвой желудка, или когда у больного имѣется непреодолимое отвращеніе къ введенію зонда, или когда при каждой попыткѣ подвинуть зондъ въ пищеводъ у больного являются припадкостраха и глотательный спазмъ. Въ такихъ случаяхъ въ аллопатіи примѣняются рвотныя средства, но о частомъ или систематическомъ употребленіи ихъ не можетъ быть, конечно, рѣчи, вслѣдствіе вызываемыхъ ими побочныхъ вредныхъ явленій. Такъ же мало пользы отъ слабительныхъ средствъ при запорѣ, сопровождающемъ расширеніе желудка. Лучшіе же и болѣе существенные результаты получаются отъ гомеопатическихъ лѣкарствъ и отъ тѣхъ вспомогательныхъ мѣръ, какія приведены при хроническомъ катаррѣ желудка.

Вспомогат.
мѣры.

III. Болѣзни кишекъ.

Содержаніе Предварительныя замѣтки: положеніе и строеніе кишекъ, 1. Отдѣльные кишечные симптомы: а. Запоръ. б. Поносъ. в. Боль живота. г. Вздутіе живота газами. 2. Нервная боль кишекъ, Энтеральгія. 3. Воспаленіе или катарръ кишекъ: а. Катарръ тонкой кишки. б. Воспаленіе толстой кишки. в. Воспаленіе слѣпой кишки и червеобразнаго отростка. г. Воспаленіе прямой кишки. 4. Выпаденіе прямой кишки. 5. Язвы кишекъ. 6. Ракъ кишекъ. 7. Кишечное кровотеченіе 8. Геморрой. 9. Закрытіе кишечнаго канала.

Предварительныя замѣтки.

Положеніе и
строеніе ки-
шекъ.

Въ томъ мѣстѣ надчревной области, гдѣ кончается желудокъ (см. стр. 205), именно съ привратника его, начинается двѣнадцатиперстная кишка, длиною около 1 фута; въ нее открывается общій выводной протокъ желчнаго пузыря и поджелудочной железы. Двѣнадцатиперстная кишка переходитъ въ подвздошную кишку, верхняя часть которой называется еще особо тощей кишкой. Общее названіе 12-перстной и подвздошной кишекъ — тонкая кишка, въ отличіе отъ толстой или ободочной кишки, въ которую тонкая переходитъ въ правой паховой области. Слѣпой кишкой называется нижній отдѣлъ толстой кишки въ томъ мѣстѣ, гдѣ тонкая кишка переходитъ въ толстую (въ правомъ подвздошьи); тутъ же находится червеобразный отростокъ. Съ этого мѣста, до реберъ вверхъ, толстая кишка называется восходящею, отсюда влѣво она идетъ подъ названіемъ поперечной кишки, а вдоль лѣваго бока книзу до лѣваго подвздошья или паха — подъ названіемъ нисходящей кишки. Здѣсь толстая кишка образуетъ еще короткую S-образную часть, которая переходитъ въ послѣдній отдѣлъ кишекъ, называемый прямой кишкой, оканчивающійся заднепроходнымъ отверстіемъ. Толстая кишка имѣетъ въ общей сложности длину въ 4 фута, а описанная выше подвздошная кишка представляетъ самую длинную часть всего кишечнаго канала (около 23 футовъ) и занимаетъ большую часть брюшной полости, спускаясь еще, сверхъ того, между тазовыми органами, именно — отъ пупка до лобковой части и отъ праваго до лѣваго бокового края передней части живота; въ задней же части живота имѣется лишь небольшая часть кишечныхъ петель, именно у нижнихъ поясничныхъ позвонковъ.

Большая часть кишекъ покрыта тонкой оболочкой, брюшной, причемъ та часть ея, которая покрываетъ тощую и под-

вздошную кишку, образуетъ брыжейку, а сами кишки состоятъ изъ мышечной ткани, выстланной внутри слизистой оболочкой съ многочисленными складками и разнаго строенія железками, также кровеносными сосудами и нервами. Упомянутымъ складкамъ свойственна способность сглаживаться при растяженіи кишекъ. Только одна складка при такомъ растяженіи не сглаживается, не исчезаетъ, это — поперечная складка надъ заднепроходнымъ отверстиемъ, имѣющая видъ серпа (длиною 6 — 9 сантиметр.) и находящаяся справа и спереди. Поэтому, при введеніи въ прямую кишку клистирной трубки, зонда и т. п. надо держаться правила—вводить данный предметъ въ направленіи влѣво и кзади, а не вправо и кпереди.

Кишечная мышца у задняго прохода образуетъ сжимающее (замыкающее) этотъ проходъ кольцообразное утолщеніе и называется сфинктеромъ прямой кишки, заднепроходнаго отверстія.

1. Отдѣльные кишечные симптомы.

а) Запоръ.

Причины запора. 1) Привычка не удовлетворять своевременно позывовъ на низъ, между тѣмъ какъ каждый для себя могъ бы ввести въ этомъ отношеніи извѣстный порядокъ (см. стр. 219). 2) Сидячая жизнь (у ученыхъ, писателей, а также у сапожниковъ, портныхъ и т. п.), при крайне недостаточномъ движеніи и предрасположеніи къ запору. Въ томъ и другомъ случаѣ каловыя массы, ссыхаясь отъ продолжительной задержки въ прямой кишкѣ, твердѣютъ и производятъ давленіе на мѣстные кровеносные сосуды, что въ свою очередь способствуетъ развитію геморроя, при имѣющемся къ нему предрасположеніи. 3) Болѣзни, влекущія за собою вялую дѣятельность кишекъ, какъ хроническій катарръ ихъ или желудка, малокровіе, нервозность, страданія спинного мозга и пр. 4) Опущеніе и увеличеніе матки, или опухоли въ маломъ тазу, давящія на прямую кишку, механически препятствуя выходу кала. 5) Препятствіе это доходитъ до степени полного закрытія кишекъ при ущемленныхъ грыжахъ, заворотахъ, каловыхъ камняхъ, опухоляхъ—въ этихъ случаяхъ испражненіе невозможно до устраненія задерживающей причины, калъ же выходитъ часто рвотой. 6) Привычное употребленіе слабительныхъ средствъ (пилюль и проч.), вслѣдствіе частаго и чрезмѣрнаго раздраженія кишечника, ведетъ въ концѣ концовъ къ осла-

Причины.

бленію его, къ крайне упорнымъ и трудно излѣчимымъ запорамъ, что въ настоящее время, наконецъ, извѣстно всѣмъ. Запоры развиваются также отъ такихъ лѣкарствъ, какъ опій, свинецъ и разныя „вяжущія“ вещества.

Лѣченіе
запора.

При лѣченіи запора надо помнить всегда, что онъ только симптомъ какой либо болѣзни, а не болѣзнъ самостоятельная, или же—послѣдствіе какого либо вреднаго вліянія. Необходимо поэтому, для основательнаго излѣченія запора, выяснить его причину и стараться таковую устранить.

Чаще всего приходится имѣть дѣло съ хроническимъ катаромъ кишекъ или желудка, или съ нервной болѣзнію (см. эти болѣзни въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этого лѣчебника). Здѣсь же приводятся главныя лѣкарства противъ запора, съ характеристической, относящейся главнымъ образомъ къ таковому.

Белладонна $\times 3$ — $\times 4$: при приливахъ къ головѣ; дѣйствуетъ часто лучше всякихъ слабительныхъ средствъ (черезъ 2—3 часа по приѣму); также при кровоточащемъ геморроѣ, съ сильной болью въ крестцѣ.—*Нуксъ вом.*: у ведущихъ сидячую жизньъ, у привычныхъ къ вину и кофе, у тощихъ людей съ темнымъ цвѣтомъ лица, темными глазами и волосами. Каловыя массы объемисты и съ трудомъ выходятъ или, хотя малы, но причиняютъ боль при испражненіи, съ напрасными натугами (принимать какъ предыдущее).—Послѣ *Нуксъ вом.* часто, особенно при геморроѣ, полезенъ *Сульфуръ*.—*Опіумъ* (2—3 раза въ день): калъ состоитъ изъ большихъ темныхъ, круглыхъ комьевъ.—*Алюмина*: натуги, трудное испражненіе даже мягкихъ массъ.—*Плумбумъ*: при сильной коликѣ, съ ощущеніемъ какъ если бы стягивали животъ кзади веревкой.—*Сенія*: ощущение тяжести въ заднепроходной кишкѣ, какъ будто она закупорена тяжелымъ комомъ. Калъ покрытъ слизью и не можетъ быть испражненъ, несмотря ни на какое усиліе. Ощущеніе пустоты и слабости въ животѣ. При запорѣ у беременныхъ попеременно съ *Сульф.*,—или *Бріон.*, *Сенія*, *Коллинсонія* $\times 2$.—*Бріон.*: темное, сухое, твердое, точно обожженное, испражненіе; также у маленькихъ дѣтей; у послѣднихъ еще: *Опіумъ*, *Нуксъ вом.*, *Сенія*.—*Ликопод.*: безуспѣшные позывы на низъ (натуги) съ судорожнымъ сжатіемъ задняго прохода; ощущение чего то какъ бы еще оставшагося въ послѣднемъ послѣ испражненія.

♦ **дозахъ, приѣмахъ, дѣленіяхъ** см. ч. 1. гл. 3 и 4.

Діета и вспомо-
гат. мѣры.

При запорѣ необходимо регулированіе діеты и образа жизни вообще. Въ случаяхъ привычной вялости (атоніи) кишекъ при от-

сутствіи рѣзко выраженныхъ катарральныхъ симптомовъ, полезенъ хлѣбъ изъ непросѣянной (съ отрубями) муки, особенно—неквашенный, такъ наз. грахамовскій; обильное питье холодной воды, черезъ часъ по полъ-стакана, способствуетъ размягченію каловыхъ массъ и облегчаетъ испражненіе. Пища должна быть преимущественно растительная и молочная: зеленые овощи, сырые плоды, виноградъ, молоко, пахтанье, простокваша, супы, кефиръ, также супъ изъ чернослива, вареные плоды, яблочный квасъ, медъ съ молокомъ или на маслѣ. Для размягченія каловыхъ массъ въ заднепроходной кишкѣ—клизмы большіе, чтобы вызвать испражненіе, и малые, удерживаемые въ кишкѣ и имѣющіе цѣлю увлажнять послѣднюю и размягчать содержимое ея. См. еще стр. 218—219. Далѣе примѣняются противъ запора: массажъ живота при глубокомъ вдыханіи и выдыханіи, гимнастическія упражненія, нагибанія туловища впередъ и въ стороны, выпрямленіе, круженіе туловища, приподниманія туловищныя прилежанія (см. въ 3-ей части). Работа топоромъ и пиленіе дровъ, ѣзда на велосипедѣ, моціонъ, прогулки (послѣднія ежедневно по часу послѣ обѣда и послѣ ужина).

б) Поносъ.

Причины поноса. 1) Недоброкачественная пища или вода, незрѣлые плоды и т. п. 2) Простуда, особенно ногъ и живота. 3) Нервные возбужденія (душевные волненія): гнѣвъ, испугъ, страхъ. 4) Болѣзни, сопровождающіяся изъязвленіемъ кишекъ: тифъ, дизентерія, туберкулезъ. 5) Болѣзни, вызывающія воспаленіе кишечника: холера, кишечный катарръ, дѣтская холера, холерина (лѣтній поносъ со рвотой), острый и хроническій катарръ кишекъ у взрослыхъ.—Обильныя жидкія испражненія, иногда съ коликой въ животѣ, указываютъ на острый катарръ тонкихъ кишекъ; колики въ области пупка — на катарръ толстой кишки; если при этомъ больна также заднепроходная (прямая) кишка, то имѣется кромѣ то еще жженіе въ заднемъ проходѣ и частыя безуспѣшныя натуги. При хроническомъ катаррѣ кишекъ чередуются обыкновенно запоры съ поносами. См. упомянутыя болѣзни въ соответствующихъ мѣстахъ этого лѣчебника.

Причины.

Необходимо въ каждомъ случаѣ выяснитъ основную причину и принять мѣры къ устраненію ея, или лѣчить основную болѣзнь. Главнѣйшія лѣкарства, показанныя при поносѣ, суть слѣдующія.—*Хамомила*: поносъ вслѣдствіе огорченія или простуды:

Лѣченіе поноса.

особенно у дѣтей, при испражненіяхъ водянистыхъ, слизистыхъ, зеленоватыхъ, похожихъ на рубленныя яйца.—*Меркур. дульцисъ*: особенно у дѣтей при зеленыхъ испражненіяхъ; при болѣе водянистыхъ испражненіяхъ: *Арсеникъ*; — при болѣе слизистыхъ: *Пульсат.*; — *Меркур.-корроз.*: главное средство при натужномъ поносѣ и дизентеріи, также у дѣтей; испражненія слизистыя, зеленыя или кровавыя, съ коликой и болѣзненными позывами на низъ, съ ссадненіемъ въ заднемъ проходѣ. (Если симптомы слабѣе выражены, то достаточно и *Меркур. солюб.*).—*Ипекак.*: при лѣтнемъ поносѣ со рвотой (зеленой слизью); холерина, также у дѣтей; поносъ слизистый, натужный, также вслѣдствіе погрѣшностей въ діетѣ.—*Пульсат.*: слизистыя, желчныя испражненія, вслѣдствіе расстройства пищеваренія (особенно — жирнымъ) или простуды; отсутствіе аппетита, ухудшеніе ночью.—*Вератр.*: поносъ послѣ малѣйшихъ количествъ пищи; жажда, похолодѣніе конечностей, упадокъ силъ; также у дѣтей.—*Колоцинт.*: при лѣтнихъ поносахъ съ болью, идущей съ верхней половины живота.—*Фосфоръ*: непрестанный поносъ, крайняя потребность въ очень холодной водѣ.—*Русъ* при поносахъ, являющихся по утрамъ и въ полдень: при сырой и холодной погодѣ (также *Дулькамафа*).

**Диета и вспомо-
гат. мѣры.**

Прежде всего слѣдуетъ значительно ограничить количество употребляемой пищи, особенно жидкой. Само собой разумѣется, что она должна быть легкой и удобоваримой. На первомъ планѣ стоятъ каши изъ риса, изъ манной, овсяной, пшенной и ячменной крупы; также отвары изъ риса, овса, арорутъ, саго, тапіока или ячменя. (Рисъ, овесъ, ячмень въ видѣ крупы — слѣдуетъ намочить накануне вечеромъ, чтобы до слѣдующаго дня они вполне размягчились). Отвары, уже сготовленные, надо пропускать чрезъ сито. Молоко дается лишь въ томъ случаѣ, если оно хорошо переносится. Противъ жажды всего лучше свѣжая чистая вода, по возможности—ключевая. Рѣчную воду, изъ за ея нечистоты, приходится часто употреблять кипяченной, которая однако уже лишена свѣжительныхъ свойствъ. Надежный фильтръ дѣлаетъ лишнимъ кипяченіе. Цѣлесообразнымъ питьемъ при поносѣ является отваръ риса въ водѣ (чайная ложка риса на 3 стакана воды) и водный растворъ яичнаго бѣлка. Затѣмъ полезны при поносѣ: питательный какао (легуминозный), жолудевый или соловодовый кофе, или смѣсь того и другого, черничный или земляничный чай (лучше изъ листьевъ), немного хорошаго краснаго вина, черничное вино.

При натугахъ успокаивающимъ образомъ дѣйствуютъ небольшіе (съ $\frac{1}{2}$ стакана) клистиры изъ крахмального отвара, раза два въ день. При простудномъ поносѣ надо заботиться о тепломъ содержаніи ногъ и живота. Сухая теплота дѣйствуетъ часто лучше влажной: теплые платки или покрывки, теплый песокъ или отруби и т. п. на животъ и къ ногамъ; влажное согрѣваніе достигается припарками изъ льняного сѣмени, паровыми компрессами, теплой ванной (28° Р. и 10 минутъ продолжительности). Въ болѣе легкихъ случаяхъ можно ограничиваться согрѣвающими набрюшными компрессами, смѣняемыми черезъ каждые 2—3 часа. При хроническомъ поносѣ часто хорошо дѣйствуютъ небольшіе (удерживаемые) клистиры изъ 18—20-градусной воды, ежедневно 1—2 раза, каждый разъ послѣ испражненія.

в) Боль живота.

Боль живота можетъ зависѣть отъ разныхъ причинъ. Она можетъ быть: 1) чисто нервная или судорожная, спазматическая (см. ниже подъ 3); 2) приливная, т.-е. вслѣдствіе прилива крови къ брюшнымъ органамъ (геморроидальная колика, менструальная, отъ регулъ, колика); 3) воспалительная (острое воспаление кишекъ, воспаление брюшины); 4) ревматическая или подагрическая; 5) органическая (язвы, ракъ, закрытіе или заворотъ кишекъ); 6) отъ скопленія въ кишкахъ и прохожденія въ нихъ желчныхъ или каловыхъ камней и отъ попаданія въ кишки инороднаго тѣла; 7) отъ разстройства пищеваренія, погрѣшностей въ діетѣ, отъ растяженія кишечника газами; 8) отъ глистовъ; 9) отъ отравленія свинцомъ (свинцовая колика) или мѣдью.

Причины.

Лѣченіе должно сообразоваться съ основной причиной, причемъ въ большинствѣ случаевъ діагнозъ основной болѣзни можетъ быть поставленъ только врачомъ. Далеко не всегда, однако, представляется возможность и врачу сразу опредѣлить причину боли живота, и поэтому приходится выбирать лѣкарства, руководствуясь, главнымъ образомъ, характеромъ боли и сопутствующими обстоятельствами и признаками.

Въ аллопатіи въ такихъ случаяхъ ограничиваются болеутоляющими палліативами (временно облегчающими средствами), главный недостатокъ которыхъ заключается въ томъ, что они затемняютъ основную болѣзнь и тѣмъ самымъ затрудняютъ дѣйствительное, коренное излѣченіе ея. Палліативы уместны только въ

исшедшей отъ скопленія каловыхъ массъ или отъ присутствія въ кишкахъ раздражающихъ, бродящихъ, пучащихъ веществъ. Во всякомъ случаѣ раньше, чѣмъ принять внутреннее слабительное, слѣдуетъ попробовать вызвать очищение кишечника опорожняющими клистирами.—При простудной коликѣ полезна бываетъ теплая ванна съ послѣдующимъ укутаніемъ шерстяными одѣялами.—При коликѣ отъ глистовъ необходимо давать противоглистныя средства.—Для предупрежденія приступовъ колики необходимо соблюдать діету, указанную при хроническомъ катаррѣ желудка (стр. 217) и подходящую также при хроническихъ заболѣваніяхъ кишечника.

г) Вздутіе живота газами. Пученіе живота. Вѣтреная колика.

Причины.

Причины. 1) Чрезмѣрные приемы пищи, особенно неудобоваримой и пучащей (лукъ, стручковые плоды, капуста и т. п.), также молодое пиво, неперебродившій квасъ, незрѣлые фрукты и т. д.; 2) слабость пищеваренія, ипохондрия, геморроидальное состояніе; 3) спазмъ какого либо отдѣла кишечника, встрѣчающійся нерѣдко у нервныхъ субъектовъ, образуетъ сѣуженіе кишечнаго канала съ частичнымъ скопленіемъ газовъ; 4) вялость, бездѣятельность кишечника, запоръ; 5) расширение желудка и кишечника; 6) отравленіе свинцомъ, также мѣдью.

Проявленія болѣзни

Вздутіе или пученіе живота вызываетъ рядъ болѣзненныхъ явленій, часто весьма тягостныхъ, какъ-то: колики живота, боли желудка, колотье въ груди, одышку, сердцебіеніе, головныя боли, *спинныя боли и разнаго рода нервныя явленія.*

Всѣ подобныя разстройства происходятъ отъ того, что, образуясь въ большомъ количествѣ и не имѣя, по какой либо причинѣ, возможности отходить, газы („вѣтры“), скопившись въ одномъ мѣстѣ кишечника, растягиваютъ болѣшую или меньшую часть его, вызывая этимъ сильную боль. Чаше всего это бываетъ при длительномъ запорѣ и вялости кишечника. „Вѣтреная колика“ у дѣтей представляетъ, какъ извѣстно, самое обыденное страданіе,

Лѣченіе.

Для устранения этого недуга необходимо главнымъ образомъ соблюдать діету, указанную при разныхъ болѣзняхъ желудка и кишечника, также вести подвижной образъ жизни.

Изъ лѣкарствъ показаны: *Пульсатилла, Хина, Белладонна, Ликоподій, Карбо вегетабилисъ* и другія. (См. предыдущую статью о коликѣ, также лѣкарства при „хроническомъ катаррѣ желудка“, „диспепси“ и проч.; тамъ же см. и вспомогательныя мѣры).

2. Нервная боль кишекъ. Энтеральгія. Колика.

Представляетъ чисто нервную болѣзнь кишекъ безъ какихъ **Опредѣленіе болѣзни.** либо существенныхъ измѣненій въ нихъ, чѣмъ отличается отъ тѣхъ коликообразныхъ болей, которыми сопровождаются другія болѣзни, какъ ракъ, язва кишекъ и проч.

Нервная боль кишекъ, какъ и нервная боль желудка (стр. 209), наблюдается чаще всего у истеричныхъ, но также весьма нерѣдко у подагриковъ вслѣдствіе чрезмѣрной раздражимости кишечныхъ нервовъ, зависящей въ свою очередь отъ расстройства питания.

Вообще же говоря, чисто нервная колика живота—болѣзнь, сравнительно, рѣдкая, и за таковую въ практикѣ часто принимаютъ боль живота, имѣющую опредѣленную причину (болѣзненные процессы въ кишечникѣ, скопление газовъ, глисты, свинцовое отравление, ревматическая боль и проч.).

За невралгическій характеръ коликовой боли говоритъ **Признаки.** появленіе ея приступами съ промежутками полного здоровья. Приступу боли предшествуютъ часто расстройства пищеваренія, или же боль является внезапно и въ очень сильной степени; боль рвущая, рѣжущая, чаще же всего щемящая, большей частью сосредоточивается въ области пупка. Лицо больного изображаетъ ужасъ и имѣетъ страдальческій видъ, тѣло покрывается холоднымъ потомъ, пульсъ малъ, твердъ и часто замедленъ. Больные съеживаются, прижимая животъ руками или какимъ либо твердымъ предметомъ, упираясь животомъ, напримѣръ, объ край стола. Кончается приступъ нерѣдко съ появленіемъ испражнения или отхожденіемъ газовъ внизъ и вверхъ.

Главными лѣкарствами противъ нервной колики являются **Лѣкарства.** *Белладонна* × 3 (или *Атропин. сульфурик.* × 4), *Плумбумъ* 3, *Купрумъ* 3, *Арсеникъ* 3, *Хаомилла* × 3, *Вератр.* × 3, *Аса фетида* 3, *Гельземинъ* 3 и другія.

Вспомогательныя мѣры тѣ же, что вообще при боли живота (стр. 235).

3. Воспаленіе или катарръ кишекъ.

Сюда относится воспаление или катарръ а) тонкой кишки, б) толстой кишки, в) слѣпой кишки и червеобразнаго отростка, г) прямой кишки.

Общій обзоръ причинъ и симптомовъ катарра кишекъ.

Подраздѣленіе катарра по отдѣламъ кишекъ. Различные отдѣлы кишечнаго канала (см. выше стр. 228) неодинаково предрасположены къ воспаленію. Чаше другихъ отдѣловъ заболѣваетъ толстая кишка, по той причинѣ, что въ ней дольше, чѣмъ въ другихъ отдѣлахъ кишекъ, задерживаются каловыя массы и вліяютъ на стѣнки кишекъ своими раздражающими составными частями.—При воспаленіи 12-перстной кишки наблюдается обыкновенно желтуха вслѣдствіе припуханія и закрытія желчнаго протока, открывающагося въ эту кишку.—Воспаленіе слѣпой кишки происходитъ главнымъ образомъ отъ скопленія каловыхъ массъ и каловыхъ затвердѣній (камней) и, если послѣднія во время не удаляются, воспаленіе переходитъ на болѣе глубокой слой кишечной стѣнки, съ опасностію изъязвленія и прободенія. Такимъ же образомъ происходитъ и протекаетъ воспаленіе червеобразнаго отростка.—Воспаленіе прямой кишки происходитъ также отъ продолжительнаго раздраженія слизистой оболочки затвердѣвшими каловыми массами, которыя здѣсь сверхъ того ведутъ къ расширенію венъ, особенно у выхода прямой кишки (геморрой).—Если болѣзненные измѣненія не ограничиваются лишь кишечной стѣнкой, но переходятъ и на окружающую клѣтчатку (и брюшину, гдѣ она имѣется), то воспаляется и послѣдняя.

Общія причины катарра кишекъ. Причины воспаленія кишекъ бываютъ по большей части случайныя. Если не говорить о тѣхъ случаяхъ, когда воспаленіе переходитъ на кишечникъ съ сосѣдняго органа (съ желчныхъ путей, съ желудка, съ брюшины), то только два обстоятельства могутъ вызвать воспаленіе или катарръ кишекъ: либо необычныя раздраженія, дѣйствующія на нормальную слизистую оболочку кишекъ, либо измѣненіе нормальныхъ свойствъ слизистой оболочки, благодаря которому даже обычныхъ раздраженій, сопряженныхъ съ прохожденіемъ кишечнаго содержимаго, достаточно, чтобы вызвать воспаленіе.

Къ причинамъ воспаленія кишекъ относятся прежде всего вредныя пищевыя вещества, какъ грубая, неудобоваримая пища, незрѣлые или, хотя и зрѣлые, но малоразжеванные фрукты, бродящіе напитки и т. д., также попавшіе въ кишечникъ инородныя тѣла, яды, сильнодѣйствующія лѣкарства, особенно слабительныя, вродѣ сабура и т. п. Большое скопленіе глистовъ также можетъ вызвать воспаленіе кишекъ. То же могутъ производить скопившіяся въ кишкахъ твердыя каловыя массы.

Очень часто причиной кишечнаго катарра бываетъ простуда, также поврежденіе (травма), какъ ушибъ брюшной стѣнки, сдавленіе ея и т. п.

Къ причинамъ, ведущимъ къ измѣненію нормальныхъ свойствъ слизистой оболочки кишекъ, относятся застои крови въ слизистой оболочкѣ кишекъ въслѣдствіе болѣзни печени, легкихъ, сердца, почекъ и проч., наконецъ—язвенные процессы на внутренней стѣнкѣ кишекъ (дизентерическіе, туберкулезные, тифозные, раковые и т. д.).

Воспаленіе кишекъ можетъ быть и малярійнаго происхожденія. Атмосферныя условія также имѣютъ вліяніе на дѣятельность кишечника, и поносы въ жаркое время года зависятъ между прочимъ отъ рѣзкой разницы температуръ воздуха—дневной и ночной, и имѣютъ часто характеръ эпидемическій (см. „Холерина“ стр. 85).

Смотря по тому, скоро или медленно протекаетъ болѣзнь, различаютъ острый и хроническій катарръ кишекъ.

Симптомы катарра или воспаленія кишекъ различны, смотря по тому, какой отдѣлъ кишекъ пораженъ. Поносъ не всегда имѣется при катаррѣ кишекъ. Такъ, при воспаленіи верхняго отдѣла кишекъ, именно—12-перстной и тощей, поноса не наблюдается.—При пораженіи же нижней части подвздошной и ободочной кишки поносъ имѣется, и тѣмъ болѣе сильный, чѣмъ больше часть кишки, пораженная воспаленіемъ.—При катаррѣ прямой кишки неоткуда браться жидкимъ испражненіямъ и они большей частью плотны, тверды.—При хроническомъ катаррѣ кишекъ жидкія испражненія перемежаются обыкновенно съ плотными. Въ такихъ случаяхъ причина задержки кала зависитъ отъ вялости кишекъ, а не отъ недостатка воспалительнаго выпота.

Общіе симптомы катарра кишекъ.

Количество поносныхъ испражненій въ сутки различно, отъ 2—3 до 10 и болѣе. Но не такъ важно количество испражненій, какъ ихъ качество. Они имѣютъ видъ жидкой каловой кашицы, или же они водянисты и зеленовато-желтаго цвѣта, или совсѣмъ безцвѣтны. Кровь въ поносныхъ испражненіяхъ лишь рѣдко наблюдается при катаррѣ кишекъ, только при катаррѣ прямой кишки и при катаррѣ кишекъ послѣ обширнаго ожога кожи. Вообще же, если у людей, долго страдающихъ поносомъ, замѣчается кровь въ испражненіяхъ, то у нихъ, значить, имѣется не простой катарръ, а болѣе глубокія измѣненія въ кишкахъ (язвы и т. п.).

Еще о слизи въ испражненіяхъ. Небольшія примѣси ея не

имѣютъ никакого дурного значенія. Обильное же выдѣленіе слизи бываетъ только при болѣзняхъ кишекъ, и если выдѣляется только слизь, то это всегда указываетъ на катарръ прямой кишки; если же калъ сплошь обтянутъ слизистой массой, то, значитъ, имѣется воспаление толстой кишки. Иной разъ выдѣляются цѣльныя слизистыя трубки, какъ бы слѣпки кишекъ, отъ дюйма до фута длиной; это встрѣчается чаще у женщинъ, особенно—истеричныхъ, и сопровождается коликой надъ пупкомъ, вздутіемъ живота и усиленнымъ расстройствомъ пищеваренія.

Послѣдствіями обильныхъ и продолжительныхъ поносовъ являются: разслабленіе кожи, усиленная жажда, густая моча съ мочекислымъ осадкомъ и проч.

Боль въ животѣ не всегда бываетъ при катаррѣ кишекъ, а когда бываетъ, то въ видѣ постоянной тупой боли, усиливающейся или уменьшающейся отъ давленія. При воспаленіи нижнихъ частей ободочной кишки являются жиленія (тенезмы); послѣднія особенно сильны, когда поражена катарромъ прямая кишка.—При воспаленіи слѣпой кишки боль ощущается въ правой паховой области, и если она настолько сильна, что не переносится ни малѣйшее прикосновеніе, то это даетъ поводъ предполагать переходъ воспаления на брюшину.—Очень же слабы боли, или ихъ вовсе нѣтъ, въ случаяхъ хроническаго катарра кишекъ; но вмѣсто того больные страдаютъ отъ неприятныхъ ощущеній въ животѣ, особенно спустя нѣкоторое время послѣ ѣды, жалуются на крайне тягостныя для нихъ урчаніе и пученье (вслѣдствіе газовъ, развивающихся въ кишкахъ отъ ненормальнаго разложенія кишечнаго содержимаго).

Нерѣдко боль при катаррѣ кишекъ доходитъ до крайней степени и распространяется по всему животу, переходя даже на нижнія конечности и половыя органы. У маленькихъ дѣтей случаются при этомъ конвульсіи, или они стонутъ отъ боли, становятся безпокойны, притягиваютъ ножки къ животу, отказываются отъ груди или, взявъ сосокъ въ ротъ, немедленно же его выпускаютъ.

Въ болѣе трудныхъ случаяхъ катарра кишекъ нарушается и общее состояніе здоровья. Въ острыхъ случаяхъ бываетъ лихорадочное состояніе, головная боль, потеря аппетита и т. д.; у дѣтей—вялость движеній, блѣдность кожи и общее изнеможеніе.

а. Воспаленіе или катарръ тонкой кишки.

Воспаленіе начальной части тонкой кишки, двѣнадцатиперстной,—см. предварительныя замѣтки на стр. 228—является часто продолженіемъ воспаления желудка и сопровождается желтухой. При этомъ имѣется болѣзненность праваго подреберья, усиливающаяся отъ давления и являющаяся спустя 3—6 часовъ послѣ ѣды. Причины: разстройства пищеваренія, простуда или обширный ожогъ кожи.

Причины и
признаки
болѣзни.

Воспаленіе остальной части тонкой кишки—тощей и подвздошной—сопровождается, на ряду съ симптомами воспаления желудка, коликой, сильнымъ урчаніемъ въ животъ и быстрымъ передвиженіемъ содержимаго кишки; поноса при этомъ не бываетъ, а когда бываетъ, то не такъ отъ воспаления тонкой кишки, какъ отъ перехода воспаления на толстую кишку.

Діагнозъ воспаления тонкой кишки можно съ достовѣрностью ставить въ томъ случаѣ, когда, путемъ specialнаго анализа, находятъ въ испражненіяхъ неразложенную желчь, кишечныя бродила, непереваренныя части пищи, особенно—жира. Причины: діететическія погрѣшности, неудобоваримая пища, чрезмѣрное употребленіе спиртныхъ напитковъ, простуда, а также попадающія въ кишку ядовитыя или механически раздражающія вещества, сильныя слабительныя, завалы каловыхъ массъ.

Въ началѣ болѣзни—*Аконитъ* $\times 3$, черезъ 1—2 часа по приему, попеременно съ *Брюніа* $\times 3$ при отсутствіи поноса. При поносѣ—*Белладонна* 3 попеременно съ *Меркур. солуб.* 3; при коликѣ—*Колоцинт.* 3. Этихъ лѣкарствъ бываетъ обыкновенно достаточно для излѣченія. Въ болѣе трудныхъ случаяхъ показаны еще *Арсеникъ*, *Сульфуръ*, *Фосфоръ*.

Лѣченіе и
вспомогатель-
ныя мѣры.

Воспаленіе тонкой кишки влечетъ часто за собою въ послѣдствіи упорный запоръ. Значеніе такого запора часто преувеличивается больными и также большинствомъ врачей, слѣдствіемъ чего является частое примѣненіе внутреннихъ слабительныхъ средствъ, отъ которыхъ обыкновенно бываетъ больше вреда, нежели отъ самой болѣзни. Притомъ же въ такихъ случаяхъ слабительныя средства лишь рѣдко опорожняютъ кишечникъ. Поэтому цѣлесообразнѣе ограничиваться опорожняющими клистирами и принимать внутрь гомеопатическія лѣкарства, устраняющія запоръ тѣмъ, что дѣйствуютъ излѣчивающимъ образомъ на корень болѣзни, т. е. на послѣдствія воспаления кишки и сопровождающія болѣзненныя состоянія.

Къ такимъ средствамъ относится прежде всего *Нуксъ вомика*, затѣмъ—*Ликоподій*, *Опій*, *Антимон. круд.*, *Сетія*, *Натр. муриатик.* и проч. (См. въ „Лѣкарствовѣдѣніи“, ч. 4-я).

Изъ вспомогательныхъ мѣръ, кромѣ указанныхъ уже клистировъ, полезны влажные согрѣвающие компрессы на животъ; сухая теплота въ такихъ случаяхъ мало помогаетъ. При сильной боли, вмѣсто воды для компресса, лучше примѣнять теплое *белладонное масло*. Діета—какъ при остромъ катаррѣ желудка (см. стр. 213).

б. Воспаленіе или катаррѣ толстой кишки.

**Признаки
болѣзни.**

Воспаленіе толстой кишки (колитъ)—см. предварительныя замѣтки на стр. 228—есть наиболѣе частая форма кишечнаго катарра и проявляется болѣе постоянной коликообразной болью въ животѣ и поносомъ, жидкимъ и съ слизью, выделяющеюся иной разъ въ видѣ трубчатыхъ перепонокъ (слизистыхъ цилиндровъ), также гноемъ. Качество испражнений непостоянно и поносъ перемежается нерѣдко съ запоромъ, сопровождающимся метеоризмомъ (вздутіемъ живота газами), затрудненіемъ дыханія, мучительнымъ сердцебіеніемъ, истощеніемъ организма (вслѣдствіе недостаточнаго всасыванія въ кишкахъ), непріятными ощущеніями въ животѣ, тошнотою, отрыжкою, иногда и рвотою. Въ хроническихъ случаяхъ катарра толстой кишки больные страдаютъ обыкновенно въ большей или меньшей мѣрѣ еще и угнетеніемъ душевной дѣятельности (ипохондріей) вслѣдствіе всасывающихся въ кровь ненормальныхъ продуктовъ пищеваренія.

Течение болѣзни въ острыхъ случаяхъ—лишь рѣдко болѣе нѣсколькихъ дней, въ хроническихъ же—теченіе неопредѣленное съ перемежающимися состояніями улучшенія и ухудшенія.

**Отличіе отъ
катарра
другихъ отде-
ловъ кишечникаъ.**

Для рѣшенія вопроса, какая кишка воспалена, толстая или тонкая, надо руководствоваться главнымъ образомъ предшествующимъ состояніемъ больного и качествомъ испражнений: за воспаление тонкой кишки говоритъ наступленіе кишечнаго катарра одновременно съ воспаленіемъ желудка или вслѣдъ за нимъ, частая тошнота и рвота, желтуха, присутствіе въ испражненіяхъ неразложенныхъ продуктовъ и составныхъ частей выделяемаго 12-перстной и тонкой кишки, также непереваренной пищи, и упадокъ общаго питанія; на воспаленіе же толстой кишки указываютъ: жилиненіе, присутствіе въ испражненіяхъ слизи и гноя, болѣзнен-

ность ограниченных мѣстъ на протяженіи ободочной кишки (см. еще стр. 238).

Для сравненія съ холериной и дизентеріей см. стр. 85 и 87.

Надо имѣть еще въ виду случаи поноса, похожаго на поносъ отъ воспаленія толстой кишки, но не воспалительнаго происхожденія. Такъ, у взрослыхъ нерѣдко, вслѣдствіе ли простуды, или чрезмѣрнаго напряженія, или душевнаго волненія, является часто однократный поносъ безъ всякаго послѣдствія для общаго состоянія здоровья. Тутъ, стало-быть, приходится предполагать лишь проходящее усиленіе перистальтики (передвиженія кишекъ) подъ нервнымъ вліяніемъ. Такія же вліянія могутъ служить причиной поноса и у маленькихъ дѣтей при прорѣзываніи зубовъ.

Этимъ, однако, не сказано, что прорѣзываніе зубовъ есть единственная причина поноса у дѣтей этого возраста. Поносъ часто и у маленькихъ дѣтей является вслѣдствіе простуды, угрѣшностей въ кормленіи, перемѣны пищи, сопряженной съ отнятіемъ отъ груди, глистовъ. Въ такихъ случаяхъ имѣется уже настоящее воспаленіе, и болѣзнь начинается безпокойствомъ, жалобнымъ крикомъ и даже конвульсіями. Вначалѣ жидкія испражненія имѣютъ еще нормальный цвѣтъ, но уже вскорѣ они становятся клочковатыми, похожими на рубленныя яйца, желто-зеленаго цвѣта, съ примѣсю непереваренныхъ частицъ пищи и слизи. Вслѣдствіе ѣдкости испражненій окружность задняго прохода краснѣетъ. Животъ отъ скопившихся въ кишкахъ газовъ вздувается на подобіе барабана („лягушечій животъ“), въ остальныхъ же частяхъ тѣло исхудалое, лицо старчески сморщено и носитъ на себѣ печать страданія. Кожа тѣла холодѣетъ, причемъ животъ иногда горячъ, во рту развивается плѣсневка. Аппетитъ не всегда отсутствуетъ и не всегда бываетъ рвота, жажда же, особенно въ острой формѣ, очень сильна. Продолжавшійся долгое время катарръ толстой кишки у дѣтей очень часто кончается смертію или влечетъ за собою развитіе туберкулеза кишекъ, англійской болѣзни, золотухи. Сравнить съ холериной—стр. 85.

Лѣченіе воспаленія толстой кишки не должно быть шаблоннымъ, а необходимо взвѣшивать всѣ проявленія болѣзни, хотя бы и самыя мелкія, и выбирать соотвѣтствующія лѣкарства. Главнѣйшія лѣкарства—слѣдующія:

Реумъ × 2. Подходить какъ для взрослыхъ, такъ и для дѣтей, даже больше для послѣднихъ, особенно если причиной была простуда. Испражненія не жидкія, а больше кашицеобразныя, у дѣ-

Катарръ толстой кишки у маленькихъ дѣтей.

Лѣченіе катара толстой кишки.

тей—съ очень кислымъ запахомъ, темнаго цвѣта и съ примѣсью слизи. Много газовъ со вздутіемъ живота и щемающія боли передъ испражненіями и во время ихъ.

Дулькамафа $\times 3$. Подобна Реумъ въ отношеніи причины и характера болей. Испражненія мало окрашены, всегда кашицеобразны и съ зелеными полосками. Испражненія больше къ вечеру и ночью.

Хамомила $\times 3$. Особенно при поносѣ у дѣтей во время прорѣзыванія зубовъ, вообще же вслѣдствіе душевныхъ волненій, гнѣва, досады. Испражненія кашицеобразны и со слизью, у дѣтей—зеленые, съ примѣсью какъ бы рубленыхъ яицъ и съ кислымъ запахомъ; краснота у задняго прохода. Испражненія больше ночью.

Бріонія $\times 3$. Подобна Хамомиллѣ, особенно въ лѣтнюю жару, при поносѣ отъ холоднаго питья. Также *Инекакуана*.

Меркурій солуб. 3—6. Также преимущественно у дѣтей и именно во время прорѣзыванія зубовъ. Испражненія не очень часты и не очень обильны, темнозеленые, каловые, со слизью, ѣдкія, кислоспахищающія. Подобно Меркуръ солуб. и часто даже лучше дѣйствуетъ *Меркур. дульцисъ* 1— $\times 3$.

Колоцинтъ 3. Испражненія не часты, кашицеобразны, окрашены желчью; сильныя щемающія боли, являющіяся приступами; обиліе газовъ, очень вонючихъ.

Колъхик. 1— $\times 3$. Испражненія жидкія, малоокрашенныя, не частыя, безъ боли.

Пульсатилла $\times 3$. Испражненія безболѣзненные, являются чаще ночью, содержатъ много слизи съ зеленой примѣсью. Испражненія сопровождаются сильнымъ ознобомъ. Непродолжительная боль является непосредственно за испражненіемъ.

Кромѣ указанныхъ лѣкарствъ надо имѣть еще въ виду при остромъ катаррѣ кишекъ слѣдующія: *Оній* $\times 1$ —при невыносимой боли и обильномъ скопленіи газовъ въ ограниченныхъ частяхъ кишки; *Арсен.* 3—при темноокрашенныхъ, вонючихъ и разѣдающихъ задній проходъ испражненіяхъ и сильной жадѣ, особенно ночью (главное лѣкарство и при хроническомъ катаррѣ у дѣтей); *Русъ*—испражненія преимущественно въ утренніе часы; *Хина* $\times 3$ —у слабыхъ, истощенныхъ, малокровныхъ субъектовъ (у дѣтей высшія дѣленія часто лучше дѣйствуютъ); *Ацид. нитрик.* 3—слизистыя испражненія съ примѣсью крови; сильныя натуги; испражненія имѣютъ рѣзкій, кислый запахъ; вонючая моча; *Фосфоръ ацид.* $\times 3$ —давишній водянистый поносъ, съ урчащѣмъ

въ животѣ; произвольныя или трудноудержимыя испражнения, съ отсутствіемъ боли; *Секале*—особенно у дѣтей; испражнения жидкія, желтоватыя или зеленоватыя, безъ боли, но при большой слабости.

Діету и вспомогательныя мѣры см. стр. 232, также ниже: „Общая діета при катаррѣ кишекъ“.

в. Воспаленіе слѣпой кишки и червообразнаго отростка. (Тифлитъ и Аппендицитъ).

Происходитъ чаще всего отъ скопленія каловыхъ массъ, отъ каловыхъ заваловъ, вслѣдствіе раздраженія, производимаго ими на кишечныя ткани, особенно если послѣднія соприкасаются съ проглоченными плодовыми косточками, кусочками кости и т. п. При болѣе глубокомъ воспаленіи могутъ образоваться въ кишкѣ язвы съ опасностію прободенія кишечной стѣнки и зависящаго отъ этого воспаленія брюшины (см. „Язвы кишекъ“).

**Причины
болѣзни.**

Въ началѣ воспаления симптомы бываютъ лишь неопредѣ-
ленные и съ виду незначительные, какъ диспепсія, запоръ, вре-
менное вздутіе живота. Затѣмъ является болѣе или менѣе бо-
лѣзненная при надавливаніи опухоль въ области праваго паха и
въ правомъ бедрѣ. запоръ усиливается, повыше закупореннаго
мѣста собираются газы, является рвота, въ трудныхъ случаяхъ—
даже каловая. Получается картина очень тяжелой болѣзни, но на
самомъ дѣлѣ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ болѣзнь бываетъ дѣй-
ствительно таковой; обыкновенно же, особенно при своевремен-
номъ и надлежащемъ лѣченіи, она принимаетъ благопріятный
оборотъ: калъ начинаетъ выдѣляться, сначала въ малыхъ, а за-
тѣмъ въ большихъ количествахъ, боли уменьшаются и совсѣмъ
проходятъ, улучшается и общее состояніе всего организма; въ
другихъ же случаяхъ припухлость въ области слѣпой кишки не
исчезаетъ совсѣмъ, остается также неправильность отправленія
на низъ, словомъ—тифлитъ принимаетъ хроническую форму. Изъ
общихъ явленій лихорадка можетъ быть и не быть, и степень ли-
хорадки очень непостоянна. Во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ ду-
мать, что меньшая лихорадка свидѣтельствуетъ о болѣе легкомъ
теченіи болѣзни; часто наблюдается обратное. Опасность нагноенія
и прободенія далеко не такъ велика, какъ представляютъ себѣ
сторонники немедленнаго при этой болѣзни хирургическаго вмѣ-
шательства. Продолжительность болѣзни до 3—5 дней, но имѣется
склонность къ возвратамъ.

**Признаки и
теченіе болѣз-
ни.**

При воспаленіи клѣтчатки въ области слѣпой кишки (перитифлитъ) образуется вокругъ кишки опухоль, которая можетъ разсосаться, но можетъ перейти и въ нагноеніе, приче́мъ гной, не задѣвая кишки, пробивается черезъ кожу наружу или прорывается въ слѣпую кишку и выдѣляется съ испражнениями; въ томъ и другомъ случаѣ исходъ обыкновенно благополучный. Гной можетъ найти себѣ выходъ также въ матку или мочевой пузырь. Излѣченіе [еще и тутъ возможно. При прорываніи же гноя въ брюшину получается гноекрово́е со смертельнымъ исходомъ.

При перитифлитѣ, если слѣпая кишка не задѣта воспаленіемъ, вздутіе живота газами незначительно, но боль въ правой ногѣ при движеніи очень сильна, и въ ней чувствуется онѣмѣніе и какъ бы ползаніе мурашекъ.

Воспаленіе червообразнаго отростка, если оно образуется само по себѣ, самостоятельно, не можетъ быть узнано, за крошечностью этого придатка; заподозрить же таковое возможно лишь тогда, когда неожиданно являются признаки воспаленія брюшины начавшагося въ правой паховой области и происшедшаго отъ прободенія отростка.

Объ операціи
при аппенди-
цитѣ.

При этой болѣзни очень важно рѣшить вопросъ, оперировать или нѣтъ? Большинство врачей-аллопатовъ утверждаетъ, что оперировать необходимо, и чѣмъ раньше (въ первые 48 часовъ), тѣмъ лучше, или же, при возвратахъ болѣзни, въ промежуточное время, т. е. во время здороваго состоянія (предупредительное удаление червообразнаго отростка). Оперативное вмѣшательство считается ими самой лучшей мѣрой не только въ тяжелыхъ случаяхъ этой болѣзни, но и въ легкихъ. Тяжелые случаи суть тѣ, гдѣ въ опухоли произошло нагноеніе, притомъ — гнилостнаго характера, или, тѣмъ болѣе, когда произошло прободеніе кишки съ явленіями воспаленія брюшины. Въ такихъ случаяхъ и врачъ-гомеопатъ не будетъ возражать противъ необходимости безотлагательной операціи, которая даетъ еще нѣкоторую надежду на спасеніе больного отъ неминуемой — въ противномъ случаѣ — смерти. Признаками такихъ тяжелыхъ случаевъ служатъ — при гнилостномъ распадѣ: высокая лихорадка, постоянная или возвратной формы, съ потрясающими ознобами, крайній упадокъ силъ, малый частый пульсъ, часто желтуха и содержащая бѣлокъ моча; при прободеніи: явленія перитонита (воспаленія брюшины), именно—очень сильное вздутіе живота, мучительная икота, силь-

ная рвота, очень учащенный и малый пульсъ; температура тѣла бываетъ при этомъ и высокой и низкой, или перемежающеюся.

Когда только что перечисленныхъ признаковъ не имѣется, то болѣзнь представляетъ гораздо меньше опасности, или форма ея вообще легкая. Хирурги однако рекомендуютъ возможно раннюю операцію, какъ самый надежный способъ лѣченія, даже въ такихъ, болѣе легкихъ случаяхъ воспаленія слѣпой кишки. Они основываются при этомъ на своей статистикѣ, по которой, при раннемъ оперированіи, смертность отъ этой болѣзни всего лишь отъ 1 до 7 на сто, въ среднемъ—5⁰/₀. Но вѣдь, и при внутреннемъ лѣченіи смертность отъ воспаленія слѣпой кишки и червообразнаго отростка не превышаетъ 5⁰/₀; отсюда прямой выводъ, что при безразборчивомъ, огульномъ оперированіи въ 95 случаяхъ изъ ста операція производилась бы совершенно напрасно, не говоря ужъ о томъ, что оперативное вмѣшательство всегда сопряжено съ большимъ или меньшимъ рискомъ само по себѣ, независимо отъ болѣзни. И если въ случаѣ смертельнаго исхода при внутреннемъ лѣченіи хирургъ скажетъ, что смертельнаго исхода бы не было, если бы было оперировано, то не съ большимъ ли правомъ можно сдѣлать такой упрекъ хирургу относительно тѣхъ случаевъ смерти, которые бываютъ послѣ операціи а, быть можетъ, и вслѣдствіе таковой.

Во всякомъ случаѣ совершенно неправильно вообще обосновывать цѣлесообразность оперированія на небольшой смертности. Это—шаблонъ, между тѣмъ какъ врачебное искусство должно индивидуализировать до крайней возможности; поэтому оперировать позволительно лишь тогда, когда операція либо безусловно необходима, либо, по крайней мѣрѣ, обѣщаетъ больше шансовъ на выздоровленіе, нежели внутреннее лѣченіе. Этого же навѣрно нельзя сказать въ отношеніи громаднаго большинства случаевъ воспаленія слѣпой кишки, начинающихся безъ особенно тяжелыхъ общихъ явленій. Такіе случаи всего лучше лѣчить внутренними, именно — гомеопатическими лѣкарствами и обыкновенными вспомогательными мѣрами.

Главныя лѣкарства: *Бріонія* $\times 1$ — $\times 3$, *Белладонна* $\times 3$ и *Меркур. солуб.* $\times 3$ (или *Меркур. дульцисъ* $\times 1$ — $\times 2$), черезъ каждые полчаса или часъ (при улучшеніи—рѣже) поочередно. Если боль очень сильна, то, вмѣсто Белладонны, давать *Атропин. сульфурик.* $\times 4$, также *Лаксезисъ* 6.

Лѣченіе.

Когда болѣзнь прошла, цѣлесообразно для предупрежденія

возвратовъ, принимать еще въ теченіе нѣсколькихъ недѣль *Меркурий*, но не такъ часто.

Кромѣ указанныхъ лѣкарствъ могутъ понадобиться, конечно, еще и другія, смотря по ходу болѣзни (см. выше: „запоръ“, „вздутіе живота газами“, „боль живота“ и проч.).

**Вспомогатель-
ныя мѣры.**

Изъ наружныхъ средствъ наиболѣе благотворно дѣйствуютъ набрюшныя согрѣвающие или паровые компрессы. Наружное примѣненіе холода, въ видѣ пузыря со льдомъ, прикладываемаго непрерывно во все продолженіе болѣзни, очень тягостно для больныхъ, притомъ же и вредно, такъ какъ мѣстное обезкровленіе, производимое искусственно холодомъ, можетъ только мѣшать естественному ходу исцѣленія. Только при повышенной температурѣ тѣла цѣлесообразно примѣненіе холода въ видѣ кратковременныхъ холодныхъ компрессовъ съ одновременными влажно-теплыми обертываніями нижнихъ конечностей (20° R., въ теченіе 2 часовъ) и удерживаемыми (малыми) клистирами — 18° R.—раза два въ день. Вообще же цѣлесообразно наружное на животъ примѣненіе *Белладонны* Θ въ видѣ масляныхъ компрессовъ (изъ *масла Белладонны*) или влажно-согрѣвающихъ компрессовъ изъ раствора 1 чайной ложки *Белладонны* Θ на стаканъ воды.—Опорожняющіе клистиры, разъ въ день или разъ въ два дня.—Легкое слабительное средство, вродѣ кастороваго масла и т. п., умѣстно только въ самомъ началѣ болѣзни, когда область слѣпой кишки еще мало болѣзненна, и то лишь послѣ безуспѣшнаго примѣненія клистировъ. Сильныя же проносныя средства могутъ имѣть для больного весьма пагубныя послѣдствія (прободеніе кишечной стѣнки), особенно когда имѣются признаки начавшагося раздраженія или воспаленія брюшины.

Больной долженъ во всякомъ случаѣ, впродъ до выздоровленія, оставаться въ равномерной теплой постели и соблюдать строгую діету. Діета должна быть очень легкая и воздержная: небольшія количества молока, куринаго бульона, отвара изъ крупъ и т. п.; при выздоравливаніи можно прибавить еще жидкія кашицы, яйца въ смятку, сухари, вареные фрукты. Еще о діетѣ см. ниже: „Общая діета при катаррѣ кишекъ“.

Въ хроническихъ случаяхъ полезно, съ предохранительной цѣлью, носить въ холодное время года шерстяные чулки, также теплое нижнее бѣлье, набрюшникъ; важно также соблюденіе діеты и избѣганіе всякаго рода излишествъ (діета и вспомогательныя мѣры тѣ же, какъ при хроническомъ катаррѣ желудка — см.

стр. 217). Полезны въ особенности теплыя ванны (раза два въ недѣлю), а при усиленіи недомоганія живота—набрюшный согрѣвающий компрессъ и лежаніе въ постели впредь до выздоровленія.

Если болѣзнь настолько уже укоренилась, что, несмотря на систематическое лѣченіе гомеопатическими лѣкарствами, возвраты ея часты и сильны, тогда излѣченіе возможно еще только отъ хирургической помощи, причемъ операцію слѣдуетъ произвести въ свободный отъ заболѣванія промежутокъ времени; операція, произведенная въ такое время, и безопасна и наиболѣе радикальна.

г. Воспаленіе прямой кишки (Проктитъ).

Наиболѣе постоянный признакъ воспаленія прямой кишки есть сильное жженіе, вызываемое ощущеніемъ чего то торчащаго въ заднемъ проходѣ и потребностью выжать его оттуда. Заднепроходное кольцо при этомъ спазматически стягивается, и боль въ немъ достигаетъ высшей степени, когда выдѣляется твердый калъ, покрытый слоемъ крови и слизи; неправильно и болѣзненно бываетъ и выдѣленіе мочи. Въ болѣе легкихъ случаяхъ больной страдаетъ лишь отъ жженія въ заднемъ проходѣ и отъ болѣзненныхъ и безуспѣшныхъ позывовъ на низъ; нерѣдко прямая кишка выпирается при каждомъ испражненіи въ видѣ красного вздутія слизистой оболочки.

Признаки
болѣзни.

Если болѣзнь не оканчивается выздоровленіемъ, она переходитъ въ хроническую форму съ менѣе сильными, но болѣе напряженными и давящими болями; выдѣленіе изъ кишки измѣняется, становится гноевиднымъ. Гнойная слизь выдѣляется и сама по себѣ при позывѣ на низъ, и съ испражняемыми каловыми массами, а то и постоянно сочится изъ задняго прохода. Запоръ перемежается съ поносомъ. Болѣзнь нерѣдко осложняется присутствіемъ геморроидальныхъ шишекъ и кровотеченіемъ изъ нихъ, также воспаленіемъ клѣтчатки, окружающей задній проходъ, нарывомъ; послѣдствіемъ же такого нарыва могутъ быть свищи въ области прямой кишки, какъ наружные, такъ и внутренние—кишечно-влагалищные, кишечно-пузырные и т. д.

Отъ дизентеріи (см. стр. 87) проктитъ отличается тѣмъ, что при немъ нѣтъ характерной для той болѣзни красно-желтой, клочковато жидкости, и отсутствіемъ общихъ разстройствъ организма. Въ самомъ же началѣ дизентеріи, когда этихъ признаковъ еще нѣтъ, ее невозможно отличить отъ проктита; воспаленіе пря-

Отличіе отъ
дизентеріи и
проч.

мой кишки, впрочемъ, сопровождается дизентерическій процессъ, равно какъ вторично оно имѣется при ракъ прямой кишки, при язвѣ, а также при туберкулезѣ, тифѣ, сифилисѣ и проч. Первично же оно можетъ явиться вслѣдствіе простуды, (напримѣръ, отъ сидѣнія на холодныхъ камняхъ или на холодной землѣ), отъ частыхъ холодныхъ клистировъ, отъ раздражающихъ клистировъ (съ мыломъ, уксусомъ, солью и проч.), отъ затвердѣлыхъ каловыхъ массъ, отъ раздраженія прямой кишки инородными предметами, также полипами.

Лѣченіе. При простудной формѣ воспаления главное лѣкарство—*Аконитъ* $\times 3$.—При сильномъ жиленіи—*Белладонна* $\times 3$; если нѣсколько часовъ спустя не лучше, то брать, вмѣсто Белладонны, *Атропинъ сульф.* $\times 4$ или *Гіосціамъ* $\times 3$, особенно при одновременномъ задержаніи мочи.—То или другое [попеременно съ *Меркур. солюб.* $\times 3$ —при отсутствіи запора. При запорѣ же—*Нуксъ вом.* 3 *Бріонія* 3 и *Сульфуръ* 3 (или *Гепаръ сульф.* 3) попеременно.—При вторичномъ воспаленіи вслѣдствіе язвенныхъ процессовъ въ прямой кишкѣ: *Арсеникъ* 3 , *Фосфоръ* 3 , также *Сульфуръ* 3 — 6 или *Гепаръ сульфур.* 3 — 6 .

Въ хроническихъ случаяхъ: *Калькареа карбоника*, *Силиція*, *Фосфоръ*, *Туя*, то въ нисшихъ, то въ высшихъ дѣленіяхъ.

При полипахъ является обыкновенно необходимымъ хирургическая помощь, также и при злокачественныхъ процессахъ.

При значительномъ выдѣленіи слизи: *Бораксъ* $\times 3$, *Ликоподій* 3 , *Пульсатилла* 3 , *Намф. муріат.* 3 , *Графитъ* 3 — 6 .

При образовавшемся нарывѣ лѣченіе такое же, какъ при нарывахъ вообще: до вскрытія нарыва—*Гепаръ сульф.* 2 — 3 , послѣ вскрытія его—*Силиція* 3 — 6 . При фистулахъ: *Силиція*, *Ацид. флуорик.*, *Барита карб.*, *Калькар. фосфорики* и проч.

**Вспомогат.
мѣры.**

Изъ вспомогательныхъ мѣръ примѣняются при сильномъ жиленіи мѣстные согрѣвающие или паровые компрессы, припарки, впрыскиваніе въ прямую кишку теплаго растительнаго масла, въ количествѣ 2 — 3 столовыхъ ложекъ, къ которому можно прибавить нѣсколько капель *Белладонна* Θ . или, при очень сильной боли, 2 — 3 капли *Опій* Θ . Наружно—мазь *Белладонны*. Полезны теплыя сидячія ванны. Діета—очень легкая. Спокойное лежаніе въ постели въ горизонтальномъ положеніи успокаиваетъ боль и благотворно вліяетъ на ходъ болѣзни вообще.

Въ хроническихъ случаяхъ требуется прежде всего строгое урегулированіе діеты (см. ниже: „Общая діета при катаррѣ кишекъ“). Прохладныя сидячія ванны.

4. Выпаденіе прямой кишки.

Болѣзнь преимущественно дѣтская. Чаше всего встрѣчается на первомъ году жизни, но также и въ возрастѣ отъ 2 до 6 лѣтъ. Причиною можетъ служить острый или хроническій катарръ прямой кишки, дизентерія, запоръ; встрѣчается и при коклюшѣ, вслѣдствіе сильной натуги при кашлѣ, равно какъ при глистахъ (аскаридахъ), при камняхъ мочевого пузыря, именно у мальчиковъ, перешедшихъ уже за второй періодъ прорѣзыванія зубовъ, при состояніяхъ общей слабости. При выпаденіи слизистая оболочка кишки выворачивается наружу и имѣетъ видъ кольца или цилиндра, съ болѣе или менѣе красной, блестящей поверхностію, часто кровоточащею. Иногда выворачивается кишка большей или меньшей частію своею съ опасностію ущемленія

Причины и
признаки
болѣзни.

При выпаденіи прямой кишки обыкновенно очень скоро помогаетъ *Нуксъ вом. 3—6* (или *Игнація 3*) попеременно съ *Сульфуръ 3*; при привычномъ выпаденіи, обусловливаемомъ вялостію слизистой оболочки, показаны *Калькареа карбон. 6* и *Ликоподій 3*, также *Рута 3*; при аскаридахъ—*Цина 1* и *Меркур. солюб. 3*; при поносахъ—*Арсеникъ 3* и т. д.

Лѣченіе.

Надо слѣдить за тѣмъ, чтобы ребенокъ не натуживался. Въ случаѣ запора—опорожняющіе клистиры, а послѣ каждого испражненія полезны небольшіе удерживаемые (1—2 столовые ложки) клистиры (съ прибавленіемъ *Гиперикумъ Ө*,—5 капель на ложку). Кромѣ того ребенокъ долженъ испражняться не сидя на горшкѣ, а лежа въ постели (такъ какъ брюшной прессъ дѣйствуетъ здѣсь гораздо слабѣе), или же надо держать ребенка надъ горшкомъ такъ, чтобы ноги его висѣли въ воздухѣ. Другія основныя болѣзни должно лѣчить соотвѣтственнымъ образомъ.

Къ вспомогательнымъ мѣрамъ относится прежде всего немедленное вправленіе выпавшей части: для этого кладутъ на нее тряпочку, смоченную холодной водой, и тремя пальцами протискиваютъ кишку обратно въ глубь. Если это не удастся, или въ болѣе трудномъ случаѣ, не слѣдуетъ медлить съ обращеніемъ къ специальной врачебной помощи, такъ какъ выпавшая часть можетъ ущемиться и изъязвиться. Въ застарѣлыхъ, привычныхъ случаяхъ выпаденія прямой кишки приходится носить соотвѣтственно приспособленный бандажъ Т—образной формы для предупрежденія выпаденія. Полезны вообще холодныя обмыванія задняго прохода и прохладныя сидячія ванны для укрѣпленія заднепроходнаго мы-

шечнаго кольца. Діѣта должна быть питательная, но вмѣстѣ съ тѣмъ легкая (см. такую же при „Хронич. катар. желудка“). Необходимо заботиться о правильномъ ежедневномъ испражненіи на низъ (см. стр. 219).

Общая діѣта при воспаленіи или катаррѣ кишекъ.

Соблюденіе діѣты очень важно во всѣхъ случаяхъ катарра кишекъ и обусловливаетъ возможно болѣе удачные результаты лѣченія. Пищеварительная способность воспаленной кишки всегда болѣе или менѣе ослаблена, вслѣдствіе чего и болѣе или менѣе затруднены въ послѣдней переработка и всасываніе принимаемой пищи. Поэтому необходимо избѣгать такихъ пищевыхъ веществъ, которыя мало удобоваримы или механически раздражаютъ слизистую оболочку кишекъ. Сюда относятся стручковые плоды, картофель въ кускахъ, капуста, жесткія овощи, жилистое мясо и т. п. Не слѣдуетъ употреблять также много хлѣба, такъ какъ отъ него образуется слишкомъ твердый калъ. Жирной пищи надо избѣгать, потому что, при катаррѣ кишекъ, большая часть жира можетъ попадать въ непереработанномъ видѣ въ толстыя кишки и подвергаться тамъ разложенію съ образованіемъ газовъ. Наиболѣе же пригодная для больныхъ катарромъ кишекъ пища должна состоять изъ легкопереваримыхъ бѣлковыхъ веществъ, какъ молоко, яйца (особенно яичные желтки), мясной отваръ; затѣмъ легкопереваримыя крахмалистыя кушанья, какъ отвары изъ овсяной, ячменной крупы, также—рисъ, тапіока, саго и т. п.

Другія частности діѣты приведены при катаррѣ желудка (стр. 217) и могутъ быть относимы также къ катарру кишекъ. См. также сказанное о діѣтѣ въ 1-й части, гл. VII и въ 3-ей части.

Главное же, чѣмъ надо руководствоваться у больныхъ, страдающихъ катарромъ кишекъ, это — то, какъ въ каждомъ случаѣ переносится то или другое пищевое вещество. Если какое-либо вещество по общимъ правиламъ какъ бы и подходитъ для больного, но плохо имъ переваривается (напримѣръ—молоко), то оно должно быть временно или вообще исключено изъ его пищевого режима.

Другое важное правило: принимать пищу лишь понемногу на разѣ, хотя бы и болѣе часто.

Изъ напитковъ надо безусловно избѣгать пива, киснущаго вина, молодого кваса, вслѣдствіе ихъ бродящаго свойства. Дозволить можно понемногу краснаго вина съ водою, если только оно

хорошо переносится. Болѣе крѣпкіе спиртные напитки безусловно вредны. Для утоленія жажды можетъ служить, кромѣ молока и чистой воды, еще слабый настой чая или сушенной земляники, также легкая минеральная вода (Нарзанъ).

5. Язвы кишекъ.

Самая частая причина кишечныхъ язвъ — воспаленіе или катарръ кишекъ, причемъ наиболѣе предрасположенными къ язвеннымъ процессамъ являются слѣпая кишка съ червообразнымъ отросткомъ и прямая кишка. Язвы кишекъ развиваются также при туберкулезѣ, тифѣ, дизентеріи, сифилисѣ, ракѣ.

Причины.

Признаки, по которымъ бы можно было съ достовѣрностью опредѣлить присутствіе язвъ въ кишкахъ, не всегда ясно выражены, а главное — неопредѣленны. Подозрительнымъ признакомъ является въ этомъ отношеніи упорный, длительный поносъ, особенно если въ испражненіяхъ имѣется примѣсь крови, и при этомъ исключень рядъ другихъ болѣзней, сопровождающихся кровотеченіемъ изъ кишекъ, какъ застои крови, геморрой, новообразованія и т. д. При язвѣ двѣнадцатиперстной кишки кровотеченіе обыкновенно очень обильно и можетъ происходить не только низомъ, но и вѣрхомъ, черезъ ротъ, въ видѣ кровавой рвоты, какъ при язвѣ желудка. Если язвы находятся въ нижнихъ частяхъ кишечнаго канала, гдѣ каловыя массы оформлены, то кровь обволакиваетъ комки кала поверхностно; напротивъ того, при выше лежащихъ язвахъ, кровь тѣснѣе смѣшана съ каломъ. Примѣсь гноя въ испражненіяхъ при кишечныхъ язвахъ бываетъ лишь въ томъ случаѣ, когда язвы находятся въ самой нижней части толстой кишки. Особенно характерной считается примѣсь комковъ слизи, похожихъ на варенныя саговья зерна. Боль можетъ дать поводъ думать о язвѣ въ кишкѣ, если она сосредоточивается всегда въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ, значительно усиливается отъ легкаго надавливанія или тѣмъ болѣе сопровождается позывомъ на рвоту, что указываетъ на раздраженіе брюшины язвой; особенно это наблюдается при язвѣ въ слѣпой кишкѣ или ея отросткѣ. Язва 12-перстной кишки вызываетъ боль такую же, какъ язва желудка, нѣкоторое время спустя послѣ ѣды (нѣсколько позднѣе, чѣмъ при язвѣ желудка) и усиливается особенно по ночамъ. Язвы въ прочихъ частяхъ кишечнаго канала могутъ вызывать коликообразныя боли, а язвы прямой кишки — тенезмы (болѣзненные натуги, спазматическое сокращеніе замыкательной мышцы

**Признаки и
распознаваніе
болѣзней.**

задняго прохода). Общее состояние разстраивается настолько, насколько это зависит от основной болѣзни.

Если произошло прободеніе кишечной стѣнки язвой въ мѣстѣ, гдѣ имѣется брюшина, то послѣдняя воспаляется и даетъ крайне опасную для жизни картину болѣзни (перитонитъ), подобную той, какая описана на стр. 68.

На тѣхъ мѣстахъ кишекъ, которыя брюшиннаго покрова не имѣютъ, какъ заднія стѣнки второго и третьяго отдѣла 12-перстной кишки, а также восходящей и нисходящей части ободочной, прорвавшаяся язва можетъ и не задѣть брюшины, вызвавъ нагноеніе гораздо менѣе опасное, лишь въ окружающей клѣтчаткѣ.

Предсказаніе относительно исхода кишечныхъ язвъ зависитъ отъ характера ихъ и отъ ихъ мѣстонахожденія въ кишкахъ. Язвы прямой кишки, также—слѣпой, представляютъ наиболѣе надежды на благополучное заживленіе. Нерѣдко, однако, вслѣдствіе рубцовыхъ стягиваній образуются остающіяся на всю жизнь суженія въ кишкахъ, служащія причиной упорныхъ запоровъ.

Лѣченіе. Лѣченіе кишечныхъ язвъ сводится къ лѣченію основной болѣзни, чаще всего — катарра кишекъ и туберкулеза (см. выше, также „Отдѣльные кишечные симптомы“ стр. 229 и проч.). Во всякомъ случаѣ, наряду съ прочими показанными лѣкарствами, примѣняются: *Арсен.*, *Арсен. іодат.*, *Гепар. сульф.*, *Силиція*, *Фосфоръ*.

6. Ракъ кишекъ.

**Признаки и
теченіе
болѣзни.**

Развитіе рака возможно въ любомъ мѣстѣ кишекъ, но чаще всего онъ поражаетъ толстую кишку и прямую. До 40-лѣтняго возраста ракъ очень рѣдко наблюдается. Въ началѣ своего развитія кишечный ракъ не выражается никакими опредѣленными признаками, и таковыя являются лишь въ дальнѣйшемъ теченіи его. Первое, что бросается въ глаза, это—состояніе истощенія, кахексія, характерная для рака и выражающаяся въ поблекшемъ обликѣ больного и своеобразной вялости кожного покрова тѣла. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ рака, особенно въ скоротечныхъ, исхуданіе не такъ ясно выражено. Несомнѣннымъ присутствіе рака въ кишкахъ является тогда, когда прощупывается соответствующая опухоль, твердая, болѣе или менѣе бугристая, обыкновенно подвижная, не всегда болѣзненная. Ракъ кишки развивается въ формѣ кольца, чѣмъ обуславливается суженіе ея съ скопленіемъ кала надъ суженнымъ мѣстомъ и зависящими отъ этого явле-

ніями стеноза (сѣуженія просвѣта) или даже полного закрытія кишки.—Въ калѣ бываетъ, но не всегда, примѣсь крови, гниlostной жидкости и гноя, иногда и отторгнутыя частицы раковаго распада. Въ позднѣйшемъ теченіи возможно прободеніе кишки раковымъ изъязвленіемъ или въ брюшную полость съ развитіемъ общаго воспаленія брюшины, или въ сосѣднюю кишку, мочевоу пупырь, влагалище и т. д. съ соотвѣтствующими послѣдствіями. Смерть наступаетъ либо отъ истощенія, либо отъ общаго зараженія крови, либо отъ закрытія кишечнаго канала.—Излѣченіе уже развившагося въ значительной степени рака принадлежитъ къ большимъ рѣдкостямъ не только при лѣкарственномъ, но и при оперативномъ лѣченіи, если таковое вообще возможно. О лѣкарственномъ лѣченіи рака см. въ 10-мъ отдѣлѣ. Въ общемъ лѣченіе то же, что при язвахъ кишекъ.

7. Кишечное кровотеченіе.

Причины—тѣ же, что и желудочнаго кровотечения (см. стр. 223). Кромѣ того кишечныя кровотечения бывають при такихъ болѣзняхъ, которыя вообще сопровождаются кровотечениями, какъ наприм., при кровоточивости, цынгѣ и т. п. Кровотеченіемъ изъ кишекъ сопровождаются нерѣдко тяжелыя перемежающіяся лихорадки. Оно бываетъ нерѣдко и при сильномъ воспаленіи кишекъ, особенно—дифтеритическомъ, также при дизентеріи и тифѣ. Кровотеченіемъ изъ венъ прямой кишки, вслѣдствіе застоя крови, сопровождается иной разъ хроническій запоръ (отъ давленія каловыхъ массъ на мѣстныя кровеносныя сосуды), или при беременности (отъ давленія на тѣ же сосуды, производимаго беременной маткой). Наконецъ—геморроидальныя кровотечения (см. ниже).

Опредѣлить причину кишечнаго кровотечения можетъ только врачъ послѣ подробнаго изслѣдованія больного. Во всякомъ случаѣ надо прежде всего убѣдиться, нѣтъ ли геморроидальныхъ узловъ, и если таковыя окажутся, то необходимо еще знать болѣе отдаленную или ближайшую ихъ причину: болѣзнь-ли печени, легкихъ или сердца, производящая застой въ венахъ, скопленіе-ли кала вслѣдствіе запора, беременность, катарръ или ракъ прямой кишки. Если ничего такого не имѣется и если еще исключены такія причины, какъ отравленіе, поврежденіе, инородныя тѣла, то должно явиться предположеніе о кишечныхъ язвахъ, какъ о причинѣ кровотечения, и только на самомъ послѣднемъ планѣ

Причины.

стоятъ такія рѣдкія причины кишечнаго кровотеченія, какъ за-
щающее (на мѣсто выбывшихъ регуль) кровотеченіе, пе ерожде-
ніе кишечныхъ сосудовъ, врожденная кровоточивость и проч.

Лѣченіе
ишечн. кро-
вотеченія.

Какова бы ни была причина кишечнаго кровотеченія, ни-
когда не слѣдуетъ медлить съ мѣрами для его остановки, если
только оно сколько-нибудь значительно или часто повторяется.
Мѣры тутъ въ общемъ тѣ же, что при кровотеченіи изъ желудка
(см. стр. 224—225). Если основная болѣзнь извѣстна, лѣчение
должно быть направлено противъ нея (острое воспаленіе, тифъ,
дизентерія и проч.). Вообще же противъ кишечнаго кровотеченія
примѣняются тѣ же лѣкарства, которыя указаны при кровотеченіи
изъ желудка; кромѣ того еще: *Гаммелисъ* × 1, *Креозотъ* × 2,
Аргент. нитрик. × 1—× 3, *Фосфоръ ацид.* × 3, *Нитри ацид.* × 3.
Сульфур. ацид. × 3.—При упадкѣ силъ: *Мосхусъ* 1.

8. Геморрой. Почечуй.

Причины.

Подъ геморроемъ разумѣютъ болѣзненное разстройство, обу-
словливаемое расширеніемъ или набуханіемъ венозныхъ сосудовъ
заднепроходной кишки. Это расширение или набуханіе происхо-
дитъ вслѣдствіе застоевъ въ кровообращеніи, которые бываютъ
при болѣзняхъ сердца, легкихъ и печени, при хроническомъ
желудочномъ или кишечномъ катаррѣ, во время беременности.
Къ развитію геморроя у лицъ, къ нему предрасположенныхъ, ве-
детъ сидячій образъ жизни въ связи съ чрезмѣрными умствен-
ными занятіями или съ чрезмѣрнымъ употребленіемъ пищи, осо-
бенно—мясной и изысканно-пикантной, также чрезмѣрное упо-
требленіе спиртныхъ напитковъ и крѣпкаго кофе; далѣе—частыя
и сильныя слабительныя средства, обильное употребленіе въ пищу
жирныхъ и мучнистыхъ веществъ, также такихъ, которыя спо-
собствуютъ развитію газовъ въ кишкахъ. Беззаботное отношеніе
къ ежедневному правильному испражненію на низъ, наблюдаемое
особенно часто у женщинъ, ведетъ также къ развитію геморроя.
Геморрой часто встрѣчается у людей, слишкомъ предающихся вер-
ховой ѣздѣ. Болѣзнь эта развивается въ среднемъ возрастѣ и у
стариковъ, очень рѣдко—въ молодомъ.

Признаки

Самыми тягостными симптомами геморроя являются давящія
и колющія боли въ заднемъ проходѣ, при лежаніи нѣсколько умень-
шающіяся, бывающія особенно при воспаленіи венозныхъ расши-
реній, такъ называемыхъ геморроидальныхъ узловъ („шишекъ“),

которые бываютъ какъ наружныя, у заднепроходнаго отверстія, такъ и внутренніе, въ заднепроходной кишкѣ; въ послѣднемъ случаѣ узлы выпираются при твердомъ испражненіи наружу, иногда въ такой степени, что, ущемляясь вмѣстѣ съ кишкой, не могутъ втянуться обратно безъ посторонней помощи (вправленія). Узлы часто кровоточатъ, иногда очень обильно. Въ появленіи геморроидальныхъ кровотеченій замѣчается нѣкоторая правильность повторенія и та связь съ общимъ состояніемъ организма, что задержка кровотечения влечетъ за собою ухудшеніе послѣдняго (головныя боли, головокруженіе, стѣсненіе въ груди и проч.) и, наоборотъ, по наступленіи кровотечения, появляется общее облегченіе. Въ другихъ случаяхъ однако теряется такъ много крови, что больной становится малокровнымъ, истощается. Геморроидальное кровотеченіе отличается отъ кровотеченій изъ вышележащихъ частей кишечника тѣмъ, что при немъ кровь — алая, красная, а не темная или черная, и не смѣшана съ каломъ.

Кромѣ упомянутыхъ симптомовъ, при геморроѣ бываетъ часто тягостный зудъ и жженіе въ заднемъ проходѣ, слизистыя истеченія изъ послѣдняго, боли въ крестцѣ, ощущеніе тяжести въ животѣ. Геморроидальныя страданія развиваются часто въ больномъ грустномъ, угнетенномъ настроеніи духа до степени ипохондріи.

Описанная картина болѣзни является обыкновенно приступами, продолжающимися отъ нѣсколькихъ дней до нѣсколькихъ недѣль. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдается періодическое повтореніе приступовъ каждый мѣсяцъ или каждыя 3—6 мѣсяцевъ. Здоровое состояніе длится иногда годами, пока какое либо грубое прегрѣшеніе въ діетѣ или вообще въ образѣ жизни не откроетъ собою вновь цѣлый рядъ геморроидальныхъ приступовъ. Степень излѣчимости геморроя зависитъ отъ основной болѣзни, ведущей къ геморрою или поддерживающей его. Такъ, геморрой можетъ имѣть лишь кратковременный характеръ у выздоравливающихъ отъ острой болѣзни, у беременныхъ — спустя нѣкоторое время послѣ родовъ и т. д.

Лѣченіе геморроя должно сообразоваться какъ съ основной болѣзнію, его обуславливающей, такъ и съ отдѣльными его припадками. Въ первомъ отношеніи надо справляться въ другихъ мѣстахъ этой книги (болѣзни печени, сердца, катарръ кишекъ и пр.). Надо, однако, сказать что не всегда съ устраненіемъ причины удается вмѣстѣ съ тѣмъ устранить и геморрой. Какъ мало можно рассчитывать свести на нѣтъ давнишнее расширеніе венъ въ

**Теченіе
болѣзни**

**Лѣченіе
геморроя.**

ногахъ, такъ же мало поддаются уничтоженію давнишнія геморроидальныя расширенія венъ прямой кишки. Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ имѣется врожденное предрасположеніе къ геморрою, при отсутствіи какой-либо опредѣленной вызывающей причины, особенно важно въ наивозможной мѣрѣ регулировать образъ жизни, избѣгая всѣхъ вредностей, которыя приведены выше и ведутъ къ застою въ венахъ прямой кишки и такимъ образомъ къ образованію геморроидальныхъ расширеній; особенно необходимо заботиться о правильномъ ежедневномъ испраженіи на низъ и соблюдать большую умѣренность въ ѣдѣ и питъѣ. Къ брюшнымъ застоямъ очень склонны люди, страдающіе чрезмѣрной полнотой тѣла, поэтому имъ необходимо подвергать себя обезжиривающему лѣченію; имѣющіе отвислый животъ должны носить хорошо прилаженный брюшной бандажъ; опухоль, давящая на прямую кишку, должна быть по возможности удалена, обращенная къзади матка должна быть поставлена въ нормальное положеніе и т. д.

Что касается хирургическаго лѣченія геморроя, какъ такового, то мѣстныя въ прямой кишкѣ страданія оно часто на болѣе или менѣе продолжительное время устраняетъ, но оно не можетъ вліять на общее геморроидальное состояніе. Помимо этого и въ виду опасностей, всегда сопряженныхъ съ оперативнымъ вмѣшательствомъ, слѣдуетъ вообще прежде всего подвергнуться основательному и выдержанному гомеопатическому лѣченію, на операцію же рѣшиться лишь въ томъ случаѣ, если сильныя и частыя кровотечения не уступаютъ этому лѣченію.

**Выборъ
лѣкарствъ
противъ
геморроя.**

При выборѣ лѣкарствъ противъ геморроя надо руководствоваться какъ мѣстными признаками, такъ и общимъ состояніемъ организма, также основною болѣзнію, ведущей къ развитію геморроя.

Нуксъ-вомика есть главное изъ тѣхъ лѣкарствъ, которыя наиболѣе часто показаны при геморроѣ, и примѣняется отъ $\times 3$ до 3—6 дѣленія. Сидячій образъ жизни, вино и кофе вызываютъ или обостряютъ болѣзнь. Приливы къ головѣ. Нѣсколько часовъ спустя послѣ испраженія рѣжущія боли въ заднемъ проходѣ. Желудочныя недомоганія. Боли въ крестцѣ. Улучшеніе послѣ отхожденія крови или обильной слизи. Соотвѣтствуетъ одинаково закрытому и открытому геморрою. Кровь ало-красная.

Сульфуръ $\times 3$. Примѣняется часто рядомъ съ *Нуксъ-вомика*, особенно при хроническомъ катаррѣ толстыхъ кишекъ и болѣзни печени. Сильныя боли въ поясницѣ и крестцѣ, или въ заднемъ проходѣ, который часто выпирается наружу.

Въ случаяхъ, не очень запущенныхъ, этихъ двухъ лѣкарствъ достаточно для излѣченія.

Изъ другихъ лѣкарствъ надо имѣть въ виду. еще слѣдующія, при наличности соотвѣтствующихъ симптомовъ:

Ликоподій 3. Большіе геморроидальные узлы. Общее состояніе здоровья значительно нарушено: желтовато-сѣрый цвѣтъ лица, общая слабость, безпокойство, бессонница, упорный запоръ съ сильнымъ вздутіемъ живота отъ газовъ, обильная слизь въ испражненіяхъ, выпирание прямой кишки. Къ этимъ симптомамъ присоединяются нерѣдко частые позывы къ выдѣленію мочи, причемъ моча — мутная и содержитъ въ себѣ слизь, иной разъ и кровяныя жилки. Принося въ такихъ случаяхъ большое облегченіе, Ликоподій—одинъ только—недостаточенъ для излѣченія и примѣняется рядомъ съ другими лѣкарствами.

Белладонна × 3. Весьма облегчаетъ въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ преобладаютъ: приливы къ головѣ, сильныя боли поясицы, лихорадочное безпокойство; изъ мѣстныхъ страданій особенно мучительны: колющія и стрѣляющія боли въ заднемъ проходѣ, сильная болѣзненность узловъ при прикосновеніи, коликообразныя боли передъ каждымъ испражненіемъ; обильныя кровотоечения безъ особаго облегченія; задержаніе мочи, спазмъ прямой кишки. Примѣняется въ такихъ случаяхъ и въ аллопатіи, только лишь наружно, но и то часто съ хорошимъ результатомъ.

Арсеникъ × 3. Мѣстныя страданія необычайно сильны. Жгучія или колющія боли въ заднемъ проходѣ, особенно ночью и при движеніи; узлы горячи, темнокрасны и крайне болѣзненны. Испражненіе сопровождается сильной натугой и болью до обморока. Разстройство мочеотдѣленія и жгучія боли въ спинѣ и крестцѣ. Кровоточеніе обильное, не приносящее облегченія. Большой упадокъ силъ.

Карбо вегетабилис 3. Подобно Арсенику и Ликоподию. Особенно при сильныхъ приливахъ къ головѣ, кровоточеніи изъ носа и при постоянномъ выдѣленіи слизи изъ задняго прохода, остающейся на бѣлыхъ очень грязныя пятна.

Антимоній крудумъ 3. Постоянное выдѣленіе слизи, какъ при Карбо, особенно у старыхъ людей, страдающихъ притомъ еще поносами и обильными кровоточеніями изъ прямой кишки.

Изъ другихъ еще лѣкарствъ, могущихъ понадобится при геморроѣ, можно привести слѣдующія:

При очень обильномъ кровоточеніи, если упомянутый уже Арсеникъ недостаточенъ, показаны: *Креозотъ*, *Сабина*, *Ацид*.

муріатик., *Миллефолій*, особенно же—*Гамамелисъ* $\times 2$ (жжение, вздутіе, тяжесть; разбитость въ спинѣ, постоянныя натуги на низъ; зудъ въ заднемъ проходѣ).

При склонности узловъ къ дѣйствительному воспаленію, нарыванію, показаны, кромѣ Меркурія, еще *Фосфоръ* и *Гепаръ сульфур.* Эти три средства показаны при открытомъ геморроѣ, съ выдѣленіемъ гноя и крови. Тенезмы т. е. болѣзненные натуги (Меркурій); безболѣзненный поносъ, съ ощущеніемъ, какъ будто задній проходъ постоянно открытъ (Фосфоръ); запоръ, длинныя и твердыя каловыя массы (Гепаръ сульф.).

У женщинъ, страдающихъ геморроемъ, надо имѣть въ виду, кромѣ общихъ, приведенныхъ въ началѣ лѣкарствъ, также *Игнація* (вмѣсто Нуксъ-вомика), *Сепія* и *Пульсатилла.* *Сепія*: ощущеніе тяжести въ заднемъ проходѣ, выдѣленіе крови вмѣстѣ съ испражненіемъ; во время испражненія и долго послѣ него чувствуется боль. Выдѣленіе сырости изъ задняго прохода. Въ мочѣ образуется мочекислый осадокъ. Опушеніе матки. Сепія умѣстна особенно во время беременности (рядомъ съ *Бріонія*) и въ переходномъ возрастѣ.—*Пульсатилла*: болѣзненные геморроидальныя узлы; закрытый геморрой во время менструаціи. Разстройства пищеваженія. Склонность къ расширенію венъ. Нервные симптомы.

При сопровождающихъ геморрой симптомахъ со стороны мочевого пузыря надо имѣть въ виду, кромѣ указанныхъ уже выше (Белл., Арсен., Сульф., Ликопод.), еще: *Кантарисъ* и *Каннабисъ*, также *Гепаръ* и *Графитъ.* *Графитъ* 3—6 показанъ вообще въ случаяхъ, очень запущенныхъ, гдѣ имѣются большіе, болѣзненные узлы, сильно зудящіе. Геморроидальныя опухоли въ прямой кишкѣ съ жгучими ссадинами въ заднемъ проходѣ, причиняющими при испражненіи сильную боль; послѣ испражненія часами продолжающееся выдѣленіе газовъ. Испражняемыя массы очень объемисты и пропитаны слизью.

При геморроѣ вообще еще показаны: *Кальк. карб.*, *Хамомил.*, *Ацид. нитр.*, *Капсикумъ*, *Фосфори ацид.*, *Коллинсонія*, *Эскулусъ*, *Алюмина*, *Кали карбон.*, *Каустик.*, *Гвако*, *Подофил.*, *Туя* и др. (см. „Лѣкарствовѣдѣніе“ въ 4-ой части).

О дозахъ, дѣленіяхъ и способѣ пріемовъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.

**Діета и образъ
жизни при
геморроѣ.**

Діета страдающихъ геморроемъ должна быть преимущественно молочная и растительная; имъ слѣдуетъ кушать лишь мало мяса и рыбы, мало яицъ, а главнымъ образомъ молоко, простоквашу, пахтанье, отвары изъ крупъ, легкія мучныя кушанья, жидкія каши

(изъ риса, манны, пшена и т. п.), варенные овощи, зелень, фрукты. Кушать понемногу на разъ, хотя и болѣе часто, отнюдь не обременяя желудка пищей. Обильная ѣда и раздражающая пища ведутъ къ брюшнымъ приливамъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ образованію или увеличенію геморроидальныхъ узловъ. По этой же причинѣ безусловно вредны спиртные напитки, кофе, крѣпкій чай, острые и прямые вещества. Для утоленія жажды всего лучше—доброкачественная, чистая вода; воду для питья можно и слегка подкислить. Разведенное водою бѣлое вино или пиво въ небольшихъ количествахъ допускаются въ тѣхъ случаяхъ, когда они вообще хорошо переносятся больнымъ. Особенно строгую діету надо соблюдать въ періоды обостренія болѣзни.

Геморроидальнымъ больнымъ необходимо вести возможно болѣе подвижный образъ жизни, а не сидячій: частыя и продолжительныя прогулки пѣшкомъ на свѣжемъ воздухѣ, особенно по утрамъ и вечерамъ, гимнастическія упражненія. Заботиться о правильной дѣятельности кишечника (см. „Запоръ“ стр. 229, „Понось“ стр. 231).

При болѣзненныхъ узлахъ большое облегченіе получается отъ примѣненія влажныхъ компрессовъ, холодныхъ или теплыхъ, смотря по тому, какіе болѣе пріятны больному. Вообще же говоря, при сухости прямой кишки холодные компрессы переносятся лучше, при слизистомъ же выдѣленіи—теплые. Менѣе цѣлесообразна при боли сидячая ванна, такъ какъ она производитъ дѣйствіе больше общее, нежели мѣстное. Мѣстное кровоизвлеченіе посредствомъ пиявокъ почти никогда не даетъ облегченія, да оно еще и потому не годится, что ранки отъ пиявокъ могутъ вызвать сильное воспаленіе въ узлахъ. Равнымъ образомъ не слѣдуетъ стараться нарочно вызвать кровотеченіе при „скрывшемся“ геморроѣ, наприкладъ—посредствомъ теплыхъ сидячихъ ваннъ, раздражающихъ ножныхъ ваннъ, слабительной соли и т. п.; отъ этихъ средствъ можетъ даже хуже стать; привычное и геморроидальное кровотеченіе можетъ быть задержано вслѣдствіе простуды, душевныхъ волненій и проч., вызывающихъ какую либо другую болѣзнь, и оно вновь появляется само собою послѣ лѣченія, направленнаго противъ тѣхъ причинъ или ихъ послѣдствій.

Очень благотворно дѣйствуетъ при боли въ узлахъ *масло или мазь Белладонны*, также—*Эскулусъ* или *Гаммелисъ*. Эти же средства можно примѣнять и въ видѣ суппозиторій (свѣчей), вставляемыхъ въ задній проходъ, отъ 1 до 3 разъ въ день. Боль

**Вспомогат
мѣры при
геморроѣ.**

въ поясницѣ и крестцѣ при геморроѣ облегчается втираніемъ *Гвако* *Θ* или *Беллад.* *Θ* въ формѣ оподельдока, мази и проч. (см. ч. 1, гл. VI: „Лѣкарства въ наружныхъ примѣненіяхъ“).

9. Закрытіе кишечнаго канала.

Съуженіе или полное закрытіе. Закрытіе кишечнаго канала можетъ быть частичное—вслѣдствіе съуженія просвѣта послѣдняго или полное—вслѣдствіе закупорки, заворота, ущемленія или, наконецъ, внѣдрѣнія одной части кишки въ другую.

Причины. Къ причинамъ, могущимъ вести къ съуженію кишечнаго канала, относятся: опухоль, образующаяся близъ кишки (фиброидъ, киста, ракъ и пр.), рубцы кишечной стѣнки (послѣ зажившихъ язвъ) или утолщеніе ея (отъ новообразованія или воспалительнаго процесса), полипы или затвердѣлыя каловыя массы, инородныя тѣла и проч.; эти же причины могутъ вести постепенно и къ полному закрытію кишекъ. Обыкновенно же полное закрытіе, вслѣдствіе заворота кишекъ, ущемленія или внѣдрѣнія, происходитъ внезапно—безъ видимой причины или вслѣдствіе паденія на животъ, ушиба, сотрясенія.

Самымъ главнымъ послѣдствіемъ съуженія кишечнаго канала является затрудненное или задержанное выдѣленіе кала, ведущее къ привычному запору и сопровождающееся симптомами хроническаго катарра кишекъ. О съуженіи кишекъ при привычномъ запорѣ можетъ быть рѣчь, однако, лишь въ томъ случаѣ, когда каловыя массы тонки въ объемѣ или выдѣляются въ видѣ малыхъ шариковъ вродѣ овечьяго кала; далѣе, когда въ прошломъ существовалъ дизентерическій процессъ или давнишній катарръ кишекъ; когда, наконецъ, путемъ изслѣдованія, обнаруживается какая либо опухоль или другая причина въ брюшной полости, въ маломъ тазу.

При полномъ закрытіи кишекъ, являющемся часто внезапно, посреди полного здоровья, припадки сразу же становятся угрожающими. Вначалѣ преобладаютъ коликовыя боли, очень сильныя и упорныя, приводящія больного въ сильнѣйшее тѣлесное и душевное возбужденіе. Никакія слабительныя, даже сильныя проносныя средства, (слишкомъ часто, къ сожалѣнію, даваемыя при коликовыхъ боляхъ, несмотря даже на появившуюся уже рвоту) не приносятъ ни малѣйшей пользы. Запоръ какъ былъ, такъ и остается, если не считать нѣсколько кусочковъ кала, выдѣ-

ляющихся послѣ клистировъ. Дальнѣйшіе припадки: отрыжка, затѣмъ и рвота, все чаще и чаще повторяющаяся; извергаемая рвотою массы принимаютъ скоро каловый характеръ; это—то состояніе, которое извѣстно подъ именемъ „мизерере“; животъ сильно вздуть, черты лица больного искажаются, западаютъ, принимаютъ вообще смертельный видъ, конечности холодѣютъ, дыханіе становится поверхностнымъ и частымъ, пульсъ все болѣе слабѣетъ. При всемъ этомъ больной сохраняетъ по большей части полное сознаніе. Если болѣзнь не получитъ вскорѣ благоприятнаго оборота къ выздоровленію, больной погибаетъ отъ паралича сердца или отъ развившагося воспаления брюшины. Характеръ болѣзни—быстротечный, нѣскольконедельный.

Мизерере.

О лѣченіи гомеопатическими лѣкарствами съуженія или закрытія кишекъ можетъ быть рѣчь лишь при начальныхъ проявленіяхъ болѣзни, и то лишь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ причина вообще устранима лѣкарственнымъ путемъ (скопленіе каловыхъ массъ, ограниченные воспалительные процессы, судорожныя состоянія кишекъ). Въ другихъ же случаяхъ, къ которымъ относятся: механическое сдавливаніе кишки опухолью, заворотъ или ущемленіе кишекъ и т. п., единственную надежду на спасеніе даетъ только хирургическое вмѣшательство.

Лѣченіе.

Въ началѣ болѣзни и вообще въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ можно ожидать помощи отъ гомеопатическихъ лѣкарствъ, дается *Белладонна* $\times 3$ (или *Атропин. сульфурик.* $\times 4$) черезъ 15—20 минутъ по приему. Если спустя 2—3 часа облегченіе не наступаетъ, то умѣстенъ *Оній* $\times 1—1$ (предпочтительно въ порошковомъ видѣ) черезъ такіе же промежутки времени. При сильной слабости—черный кофе, *Камфора* Θ , *Москусъ* $\times 1—1$. Слабительныхъ средствъ не слѣдуетъ давать до тѣхъ поръ, пока имѣются сильныя боли въ животѣ! Сильное ухудшеніе болѣзни является часто слѣдствіемъ приемовъ такихъ средствъ. Самое большее, что допускается въ такихъ случаяхъ для опорожненія кишечника, это—1—2 клистира изъ воды комнатной температуры. Лишь послѣ того, какъ боли въ теченіе нѣсколькихъ часовъ болѣе не возобновляются, а запоръ продолжается, можно дать слабительную соль 1—2 чайныхъ ложки въ стаканъ воды или стаканъ слабительной минеральной воды, или 5—10 гранъ Ревеня (или Ялаппы).—Въ дальнѣйшемъ примѣняются тѣ средства, какія указаны выше при „Запорѣ“ на стр. 230, также при „Воспаленіи и катаррѣ кишекъ“.

10. Грыжа.

Разныя формы
грыжи.

Подъ грыжей разумѣютъ опухоль, образующуюся отъ выпаденія большей или меньшей части внутренностей подъ кожу или изъ одной внутренней полости въ другую. Чаще всего встрѣчаются слѣдующія формы грыжи: паховая, бедреная и пупочная; когда внутренности попадаютъ черезъ паховой каналъ въ мошонку, то говорятъ о мошоночной грыжѣ. Появленію грыжи способствуютъ всѣ тѣ моменты, которые производятъ сильное и внезапное напряженіе брюшного пресса, какъ напримѣръ, поднятіе тяжести, сильный кашель, рвота, продолжительная игра на духовомъ инструментѣ; при всемъ томъ требуется, конечно, еще и врожденное Предрасположеніе. При благоприятныхъ условіяхъ грыжа сама входитъ или легко втискивается обратно въ полость живота. Въ другихъ же случаяхъ происходитъ такъ называемое ущемленіе грыжи, причемъ послѣдняя съ большимъ трудомъ или совсѣмъ не поддается обратному вправленію. Такое состояніе крайне опасно и ведетъ обыкновенно къ необходимости оперативнаго вмѣшательства. Во избѣжаніе такихъ неприятностей, страдающіе грыжей должны всегда, особенно при работѣ и во время ходьбы, носить хорошо прилаженный бандажъ. Кромѣ того важень также нормальный образъ жизни, умѣренность въ ѣдѣ и питъѣ.

Степень
излѣчимости
грыжи

Объ излѣченіи грыжи гомеопатическими лѣкарствами можетъ быть рѣчь въ томъ лишь смыслѣ, что кишечникъ теряетъ наклонность (отъ вялости своей) выпираться въ грыжевое отверстіе при малѣйшемъ напряженіи тѣла или брюшного пресса, а не въ томъ, чтобы отверстіе это, обыкновенно прирожденно-увеличенное, приняло нормальное состояніе. Въ случаяхъ же давнихъ и большихъ грыжъ и на такую ограниченную помощь отъ лѣкарственнаго лѣченія рассчитывать не приходится и необходимо носить соответствующій бандажъ.

Главнымъ лѣкарствомъ, излѣчивающимъ грыжу въ указанномъ выше смыслѣ, служить *Нуксъ вомика 3*, раза 2—3 въ день по приему, въ теченіе 6—8 дней, послѣ чего дѣлается перерывъ на 1—2 недѣли. Затѣмъ, особенно при вялости брюшной стѣнки, принимать *Аурумъ муріат. x 3*, такъ же, какъ *Нуксъ вом.*, съ тѣмъ же перерывомъ, послѣ чего можно опять принимать *Нуксъ вомику*. Кромѣ того, при наличности явленій катарра желудка или кишекъ, необходимо принимать соответствующія лѣкарства (см. выше въ другихъ мѣстахъ книги).

При внезапномъ появленіи грыжи послѣ сильнаго напряженія или сотрясенія: *Арника* $\times 3$ и *Русь* $\times 3$ попеременно черезъ каждые 2—3 часа въ теченіе нѣсколькихъ дней.

При неудавшемся вправленіи грыжи надо немедленно лечь ^{Мѣры противъ} съ выше, чѣмъ туловище, помѣщенными тазомъ и ногами и про- ^{ущемленной} изводить осторожно давленіе на шейку грыжевого мѣшка и со- ^{грыжи.} сѣдня части грыжи, втискивая пальцы насколько возможно глубоко въ эту часть опухоли, или крѣпко обхватывая ими эту часть и сдавливая, для уменьшенія ея объема и болѣе легкаго проталкиванія обратно въ брюшную полость. При этомъ отнюдь не прибѣгать къ чрезмерному насилію во избѣжаніе поврежденія и разрыва кишки. Не слѣдуетъ также производить сильнаго давленія на всю грыжевую опухоль. Признакомъ удавшагося вправленія грыжи служить шумъ урчанія въ грыжевой опухоль въ моментъ возвращенія въ брюшную полость.

Если же грыжа ущемилась и вправление обратно не удастся, если въ напрасныхъ попыткахъ къ этому проходить 8—10 часовъ, необходимо немедленно обратиться къ хирургической помощи для соотвѣтствующей операціи (грыжесѣченія), иначе предстоятъ опасности, сопряженныя съ ~~закрытіемъ~~ закрытіемъ кишечнаго канала и воспаленіемъ брюшины (см. выше).

Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ, могущихъ въ первые часы ущемившейся грыжи способствовать устраненію ущемленія, надо принимать прежде всего *Аконитъ* $\times 3$ попеременно съ *Нуксвомика* $\times 3$, черезъ каждыя 10—15 минутъ; если спустя 2—3 часа не замѣчается улучшенія, то, вмѣсто Аконита давать *Белладонна* $\times 3$ (или *Атропин. сульфурик.* $\times 4$) попеременно же съ Нуксвом.—При болѣе угрожающихъ симптомахъ (см. выше „Закрытіе кишечнаго канала“) давать *Опій* $\times 1-1$ попеременно съ Беллад.

Наружно при ущемленіи грыжи: влажные теплые или паровые компрессы, компрессъ съ подогрѣтымъ *белладоннымъ масломъ*; при упадкѣ силъ—чашка черного кофе, *Камфора* Θ . При ущемленной грыжѣ часто благотворно дѣйствуютъ клистиры изъ очень холодной воды, которые ставятся въ короткіе промежутки времени.

Г. Болѣзни печени, селезенки и поджелудочной железы.

Содержание этого (Г.) подъ-отдѣла —Предварительныя замѣтки.—1. Желтуха — 2. Желчные камни.—3 Набухание (Гиперемія) печени.—4. Острое воспаление печени.—5. Хроническое воспаление печени: а) Гипертрофія печени, б) Циррозъ печени, в) Жирная печень.—6. Ракъ печени.—7. Воспаление селезенки — 8. Болѣзни поджелудочной железы

Предварительныя замѣтки.

Печень есть самая большая железа человѣческаго тѣла и находится въ верхней части брюшной полости подъ нижними правыми ребрами, лишь отчасти переходя влѣво за срединную линию тѣла. Верхней, выпуклой своей частью печень соприкасается съ грудобрюшной преградой и прикрѣплена къ послѣдней нѣсколькими связками. Нижняя же вогнутая часть ея обращена къ желудку и 12-перстной кишкѣ и сообщается съ ними черезъ посредство желчнаго пузыря и выводныхъ протоковъ, открывающихся въ 12-перстную кишку.— Печень играетъ очень важную роль въ жизнедѣятельности организма. Она не только выдѣляетъ желчь, но имѣетъ большое влияние на кровотоверение и обмѣнъ веществъ, между прочимъ — на выработку сахара. — Болѣзни печени въ большинствѣ случаевъ вторичныя, а не первичныя, очень разнообразны и часты, распознаваніе же ихъ во многихъ случаяхъ крайне затруднено и оно становится возможнымъ лишь тогда, когда болѣзнь достигла полного развитія до такой степени, что на излѣчение имѣется ужъ очень мало надежды.

Селезенка есть также железа и находится въ лѣвомъ подреберьи между 9 и 11 ребромъ въ отдаленіи отъ позвоночника на 1—2 дюйма. Величина и форма селезенки бываютъ различныя. Роль селезенки въ жизнедѣятельности организма недостаточно еще выяснена въ наукѣ. Не подлежитъ лишь сомнѣнію, вообще говоря, ея тѣсная связь съ кровотовереніемъ. Болѣзни селезенки лишь рѣдко бываютъ первичныя, самостоятельныя, а зависятъ обыкновенно отъ расстройства въ другихъ органахъ (печени, сердцѣ, легкихъ) или въ крови (при тифѣ, малярии и проч.).

Поджелудочная железа совершенно скрыта въ глубинѣ тѣла между селезенкой и 12-перстной кишкой, съ которой сообщается своимъ выводнымъ протокомъ, на уровнѣ перваго поясничнаго позвонка. Роль этой железы въ организмѣ пока еще почти со-

вершенно не выяснена, и о заболѣваніяхъ ея по тѣмъ или другимъ симптомамъ возможно говорить лишь гадательно.

1. Желтуха.

Обыкновенная причина желтухи — желудочно-кишечный катарръ. Рѣже она встрѣчается какъ симптомъ болѣзни самой печени. Въ здоровомъ состояніи желчь изливается изъ желчнаго пузыря чрезъ желчный каналъ въ 12-перстную кишку. Если по причинѣ набуханія огверстія канала желчь лишена возможности выдѣляться такимъ путемъ, она, по мѣрѣ своего накопленія въ печени, просачивается въ кровь и разносится послѣднею по всему тѣлу, отчего и происходитъ окраска кожи и слизистыхъ оболочекъ. (Раньше всего желтизна обнаруживается на бѣлкахъ глазъ). Моча при этомъ становится темной, калъ — сѣровато-бѣлымъ съ крайне противнымъ запахомъ, а въ кожѣ появляется зудъ, иногда очень мучительный. По прекращеніи основной болѣзни, желтизна кожи проходитъ лишь медленно и постепенно, по мѣрѣ обратнаго всасыванія желчной краски и выдѣленія ея мочей. Тогда какъ желтуха отъ желудочно-кишечнаго катарра проходитъ обыкновенно вскорѣ послѣ исчезанія послѣдняго, она, напротивъ того, при болѣзняхъ печени можетъ продолжаться очень долго, такъ какъ болѣзни эти затяжны, хроничны. Желтуха наблюдается нерѣдко у беременныхъ въ послѣдніе мѣсяцы беременности (вслѣдствіе давленія увеличенной матки на печень и желчные пути). Въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ разлитіе желчи происходитъ отъ сильнаго душевнаго волненія или потрясенія. Желтуха встрѣчается также у новорожденныхъ и проходитъ обыкновенно спустя 8 — 14 дней, также при такъ наз. желчныхъ камняхъ.

Причины.

Перечисленныя формы желтухи въ общемъ болѣе или менѣе доброкачественны и зависятъ лишь отъ временной задержки желчи въ крови. Злокачественной же желтуха является въ томъ случаѣ если причиной ея служить неизлѣчимая болѣзнь печени (напримѣръ—ракъ) или если причиною ея является не задержка желчи въ крови, а разложеніе самой крови съ превращеніемъ кровяного красящаго вещества въ желчное красящее вещество (желчный пигментъ). Это—такъ называемая кровяная желтуха и наблюдается въ состояніяхъ гноекровоія, послѣ укушенія змѣи, отъ вдыханія ээира или хлороформа, въ тяжелыхъ случаяхъ тифа, также при чумѣ и проч.

Злокачественная форма желтухи.

Результаты лѣкарственнаго лѣченія зависятъ отъ причины, произведшей желтуху. Если причиной является давленіе опухоли, злокачественное новообразованіе и т. п., то результаты окажутся совершенно ничтожными; по счастью такіе случаи желтухи очень рѣдки; въ случаяхъ же, обыкновенно встрѣчающихся въ практикѣ, излѣченіе отъ гомеопатическихъ лѣкарствъ получается скорое и полное.

При сужденіи о томъ, идетъ ли болѣзнь къ выздоровленію или нѣтъ, надо руководствоваться окраской кала и мочи, а не окраской кожи, которая продерживается еще нѣкоторое время послѣ того, какъ внутреннее разстройство, вызвавшее желтуху, уже прошло, а окраска упомянутыхъ выдѣленій стала опять нормальной.

Лѣченіе
желтухи.

При катарральной формѣ желтухи, которая и всего чаще встрѣчается, дается *Аконитъ* $\times 3$ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, а затѣмъ — *Белладонна* $\times 3$, особенно если имѣются мозговые явленія, бредъ, или же сильная боль въ области желудка или печени. Желтизна довольно сильно выражена. Если спустя нѣсколько часовъ отъ *Белладонны* нѣтъ значительнаго облегченія, то вмѣсто нея, даютъ *Атропин. сульфурик.* $\times 4$ — $\times 3$. Эти два лѣкарства подходятъ и въ случаяхъ менѣе доброкачественныхъ.

Кромѣ того показаны еще:

Меркурій солуб. $\times 3$. Жидкія испражненія; отсутствіе или разстройства аппетита, отрыжка, тошнота, рвота; густо обложенный языкъ; усиленіе боли послѣ каждой ѣды. Желтуха лишь умеренная. Особенно у новорожденныхъ и вообще у дѣтей.

Нуксъ вомика $\times 3$. Судорожныя боли въ области печени; желудочные симптомы имѣются и при пустомъ желудкѣ. Запоръ. Геморрой. Особенно у людей, ведущихъ сидячій образъ жизни или привычныхъ къ вину и кофе. Желтизна не очень сильно выражена.

Бріонія $\times 3$. Особенно при лихорадочной желтухѣ. Преобладающіе желудочные симптомы: густое бѣлое обложеніе языка, тошнота съ позывами на рвоту послѣ ѣды или питья. Упорный запоръ. Цвѣтъ лица очень блѣдный. Желтизна лишь небольшая. Общая слабость.

Сенія $\times 3$. Особенно для особъ женскаго пола, блѣдныхъ, съ темными кругами у глазъ. Частые возвраты болѣзни съ хроническимъ теченіемъ, безъ лихорадочнаго состоянія.

Сульфуръ 3 — 6. Въ хроническихъ случаяхъ и при вещественныхъ измѣненіяхъ въ печени. Вообще въ случаяхъ болѣе упорныхъ, особенно—сопровождающихся сильнымъ зудомъ кожи.

Кромѣ этихъ лѣкарствъ могутъ понадобиться, при наличности соотвѣтствующихъ признаковъ, лѣкарства, приведенныя при хроническомъ катаррѣ желудка (см. стр. 214 — 217) и еще: *Хеллдоніумъ, Подофиллумъ, Лептандра, Кардуусъ маріанусъ* и др. (см. дальнѣйшія болѣзни печени, также въ 4-ой ч. „Лѣкарствовѣдѣніе“).

Во всѣхъ случаяхъ желтухи необходимо соблюдать воздержную и легкую діету, особенно когда имѣются признаки разстроеннаго пищеваренія (см. выше при болѣзняхъ желудка и кишокъ).

Вообще же надо избѣгать жирныхъ кушаній, спиртныхъ напитковъ и бродильныхъ веществъ. При боли въ области печени—согрѣвающие компрессы. Зудъ кожи, часто мучительный при желтухѣ, облегчается обмываніями тѣла водой комнатной температуры или разведеннымъ уксусомъ. Полезны также частыя теплыя ванны. При очень упорномъ зудѣ помогаетъ еще втираніе *Русъ Θ* въ видѣ мази, масла или въ смѣси съ глицериномъ.

**Діета и
вспомогат.
мѣры.**

2. Желчные камни. Желчная колика.

Желчные камни образуются изъ желчи и собираются преимущественно въ желчномъ пузырьѣ. Образованію желчныхъ камней у лицъ, къ тому предрасположенныхъ, способствуетъ обильная животная пища, также содержащая много извести вода, подъ вліяніемъ всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя ведутъ къ застою желчи въ желчныхъ путяхъ. Болѣзнь эта бываетъ обыкновенно лишь послѣ 30-ти лѣтняго возраста, и у женщинъ чаще, нежели у мужчинъ. Желчные камни бываютъ разной формы, чаще круглой и овальной, также разнаго цвѣта, бѣловатаго, желтаго или темно-коричневаго.

Причины.

Прохожденіе желчныхъ камней черезъ желчный каналъ не всегда сопровождается сильной болью, а лишь тогда, когда они крупны или съ заостреніями поверхности. Боль происходитъ отъ спазматическаго сокращенія желчнаго протока при прохожденіи черезъ него (въ кишечникъ) камней и называется желчной коликой. Приступъ желчной колики продолжается отъ нѣсколькихъ часовъ до цѣлаго дня и болѣе; боль то ослабѣваетъ, то снова ожесточается, иногда до такой степени, что больной теряетъ сознаніе;

**Признаки и
теченіе
болѣзни.**

она сосредоточивается главнымъ образомъ подъ ложечкой, ближе къ правому подреберью, отзываясь также въ спинѣ, правомъ плечѣ и боку. При этомъ бываетъ часто рвота или мучительные позывы на рвоту или болѣзненная икота; также нервный ознобъ, судороги (особенно—икряныхъ мышцъ). Желчная колика можетъ быть принята за кардіальгію. Желтуха, если она есть, сразу разъясняетъ сомнѣніе, въ противномъ случаѣ только обнаруженіе желчнаго камня въ испражненіяхъ даетъ увѣренность въ діагнозъ, равно какъ такая увѣренность имѣется уже на основаніи предшествовавшихъ приступовъ. Приступъ желчной колики, какъ бы сильна она ни была, кончается обыкновенно благополучно. Лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ камень на болѣе продолжительное время ущемляется въ выводномъ желчномъ протокѣ и, совершенно его закупоривая, вызываетъ сильнѣйшую желтуху; въ такихъ случаяхъ имѣется опасность воспаленія печени, желчнаго пузыря и желчныхъ путей, также разрыва желчного пузыря съ послѣдующимъ воспаленіемъ брюшины.

Лѣченіе
желчной ко-
лики.

Лѣченіе сводится къ прекращенію приступа болѣзни и къ предупрежденію его повторенія. Въ первомъ отношеніи, т. е. при прохожденіи или ущемленіи въ желчныхъ путяхъ камня, отъ чего и происходитъ желчная колика, гомеопатическія лѣкарства иной разъ очень скоро даютъ облегченіе, часто же далеко не такъ скоро, какъ морфіи въ болеутоляющей дозѣ. Но начинать лѣченіе съ морфія, какъ это принято въ аллопатіи въ каждомъ случаѣ желчной колики, не слѣдовало бы уже по одному тому, что морфіи, заглушая лишь боль, но не дѣйствуя на самое болѣзнь, затемняетъ ходъ послѣдней и этимъ можетъ вести къ неправильнымъ заключеніямъ и мѣропріятіямъ съ печальными, быть можетъ, послѣдствіями для больного, тогда какъ облегченіе, полученное отъ гомеопатическихъ лѣкарствъ, свидѣтельствуетъ о дѣйствительномъ, существенномъ, а не мнимомъ, палліативномъ улучшеніи.

И такъ, цѣлесообразнѣе попытаться прекратить приступъ желчной колики гомеопатическими лѣкарствами и нѣкоторыми безвредными вспомогательными мѣрами. *Белладонна* $\times 2$ или, еще лучше, *Атропин. сульфурик.* $\times 4$ попеременно съ *Кардуусъ маріанусъ* $\times 1$ черезъ каждыя 5 минутъ, при облегченіи—рѣже, по 2 капли въ полрюмкѣ горячей воды. При запорѣ—сразу же *Пододфиллинъ* (не *Пододфиллумъ*) $\times 1$, именно въ первомъ десятичномъ растираніи, одинъ гранъ; кромѣ того — столовую ложку прованскаго масла. Черезъ часъ, если не лучше, пріемъ прованскаго масла повторить

и, въ случаѣ надобности, еще разъ—другой, послѣ чего при отсутствіи достаточно обильнаго испражненія на низъ, еще і приемъ Подофиллина $\times 1$. Наружно область печени согрѣвается припарками или паровыми компрессами.

Если при Атропинъ и Кардуусъ спустя часа два улучшения нѣтъ, то даютъ *Арсеник. 3* и *Колоцинтъ* $\times 3$ тѣмъ же способомъ, а при слабомъ и замедленномъ пульсѣ и выраженной желтухѣ—*Дигиталисъ* $\times 1$.

Изъ другихъ лѣкарствъ надо имѣть въ виду при желчной коликѣ слѣдующія: *Коккулусъ, Хина, Вератр. альб., Диоскофеа.*

Въ особенно упорномъ случаѣ, когда въ теченіе нѣсколькихъ часовъ боль подъ вліяніемъ указанныхъ средствъ не проходитъ и очень сильна, тогда не остается ничего больше, какъ прибѣгнуть къ морфію, который можетъ быть прописанъ только врачомъ либо для впрыскиванія подъ кожу, либо для приемовъ внутрь черезъ ротъ. Послѣдній способъ предпочтительнѣе перваго, и для него достаточны такія маленькія дозы, какъ $\frac{1}{60}$ — $\frac{1}{50}$ грана на приемъ черезъ $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ часа, причемъ облегченіе наступаетъ очень скоро послѣ первыхъ же приемовъ. Для этой цѣли можетъ служить первое сотенное растираніе Морфія (*Морфій муриат. или—ацетик. 1*), въ одномъ гранѣ какового (растиранія) заключается $\frac{1}{10^0}$ часть грана чистаго морфія; стало быть—на указанный приемъ приходится брать по 2 лопаточки.

Для предупрежденія образованія желчныхъ камней требуется строгое регулированіе пищеваренія (см. катарръ желудка и кишечника, также сказанное выше при желтухѣ). Изъ лѣкарствъ полезно послѣ приступа принимать еще въ теченіе 2 или 3 недѣль утромъ и вечеромъ по 3 капли *Кардуусъ маріанусъ* Θ и кромѣ того подходящія лѣкарства изъ тѣхъ, какія указаны при катаррѣ желудка и кишечника, особенно же—*Меркур. солюб. или Меркур.-дульцисъ, Подофил., Ликопод., Калькар. карбон., Нуксъ-вом., Сульфуръ.*

Минеральныя воды (Боржомъ, Эссентуки, Карлсбадъ, Мариенбадъ, Киссингенъ и др.) при этой болѣзни не противопоказаны и могутъ принести пользу. То же надо сказать о лѣченіи виноградомъ.

3. Набуханіе (Гиперемія) печени.

Это состояніе печени наблюдается при порокахъ и ожирѣніи сердца, при острыхъ и хроническихъ легочныхъ болѣзняхъ и вообще во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ разстройство кровообращенія ведетъ къ приливамъ или застоямъ крови въ раз-

Причины
происхожденія
и проявленія
болѣзни.

ныхъ органахъ, въ томъ числѣ и въ печени. Вотъ почему набуханіе печени бываетъ не только при упомянутыхъ болѣзняхъ, но и у людей, неумѣренныхъ въ пищѣ и питъѣ, а также при лихорадочныхъ болѣзняхъ, особенно въ перемежающейся лихорадкѣ и при опухоляхъ въ животѣ. Симптомы болѣзни выражаются въ ощущеніи полноты и боли вдоль праваго ребернаго края и подъ ложечкой, въ разстройствахъ пищеваренія, запорѣ, головныхъ боляхъ и проч. Часто наблюдается желтизна глазъ. Изслѣдуя правую подреберную часть живота можно ощущать подъ пальцами увеличенную набухшую печень въ видѣ гладкой и эластичной твердости, тогда какъ въ нормальномъ состояніи она не выступаетъ изъ подъ края реберъ. Величина печени можетъ достигнуть такой степени, что нижній край ея доходитъ до середины, а иногда и до нижней части живота.

**Лѣченіе
набуханія
печени.**

Выборъ лѣкарствъ противъ набуханія печени опредѣляется главнымъ образомъ причинной болѣзнію (сердца, легкихъ и проч.). Вообще же чаще всего приходится примѣнять слѣдующія лѣкарства:

Нуксъ-вомика 3. У ведущихъ сидячій образъ жизни и у привычныхъ къ вину и кофе. Склонность къ запорамъ. Предшествовавшее злоупотребленіе хининомъ. Разстройства пищеваренія.—*Игнація* 3. Подобна Нуксъ-вом., но подходитъ больше для женщинъ, очень нервныхъ и впечатлительныхъ.—*Хамомила* × 3. При гипереміи вслѣдствіе сильныхъ душевныхъ волненій, гнѣва, досады. Желтоватый цвѣтъ лица.—*Хина* × 3. Общая слабость, зябкость, худосочіе, желтоватый цвѣтъ лица. Средство это полезно лишь въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ не предшествовали приемы Хинина въ большихъ, аллопатическихъ дозахъ.—*Сульфуръ* 3. Разстройства пищеваренія, запоръ (рядомъ съ Нуксъ вом. или Игнаціею).—*Лептандра*.

**Діета и
вспомогат.
мѣры.**

Большое вниманіе надо обращать на діету. Вредно введеніе въ организмъ большихъ количествъ жидкостей, равно какъ обремененіе желудка пищей. Совсѣмъ не слѣдуетъ употреблять спиртныхъ напитковъ, кофе, крѣпкаго чая, острыхъ пряностей. Мясо дозволяется лишь въ малыхъ количествахъ, разъ въ день. Лучше же совсѣмъ мяса не употреблять, ограничиваться легкой вегетаріанской діетой. Жирныхъ кушаній надо избѣгать, такъ какъ они не могутъ надлежащимъ образомъ перевариться въ кишкахъ по причинѣ меньшаго выдѣленія желчи больной печенью (См. еще діету и вспомогательныя мѣры при болѣзняхъ желудка и кишечника).

4. Острое воспаленіе печени.

Какъ самостоятельная болѣзнь, острое воспаленіе печени рѣдко наблюдается (часто—лишь въ тропическихъ странахъ); вторично же оно можетъ послѣдовать отъ ущемленныхъ острыхъ желчныхъ камней или отъ какого либо поврежденія извнѣ (ушибъ, раненіе), также отъ другихъ болѣзней печени (ракъ, сифились и проч.). Воспалиться можетъ какъ ткань самой печени, такъ и брюшинная оболочка ея.

Симптомы остраго воспаления печени часто не отличаются особой опредѣленностью, указывающей именно на эту болѣзнь. Въ началѣ симптомы таковы, какъ при гипереміи печени (см. выше); въ случаѣ же нагноенія являются приступы озноба съ послѣдующимъ жаромъ и обильной испариной, чувствительность и увеличеніе печени возрастаютъ еще больше, усиливаются и общія явленія разстройства пищеваренія и дыханія. Исходъ болѣзни различенъ, смотря по степени и распространенности воспаленія, наконецъ по мѣсту куда нарывъ вскрылся, въ случаѣ образованія таковаго, въ брюшную ли полость, съ опасностію воспаленія брюшины, или наружу; послѣдній исходъ—наиболѣе благопріятный.

Признаки.

Въ самомъ началѣ болѣзни—*Аконитъ* $\times 3$; если послѣ нѣсколькихъ пріемовъ его улучшенія не замѣтно, то даютъ *Белладонна* $\times 3$ попеременно съ *Бріонія* $\times 3$ и кромѣ того 2—3 раза въ день *Меркур. солюб.* $\times 3$.—Въ случаяхъ, сопровождающихся тифозными симптомами и быстрымъ упадкомъ силъ, показанъ, вмѣсто Меркур. солюб., *Фосфоръ 3*.—Если причиной было поврежденіе, то главное лѣкарство—*Арника* $\times 3$.—Въ случаяхъ, болѣе затяжныхъ, показаны еще: *Нуксъ вомика*, *Сульфуръ*, *Хина*, *Ликоподій*, *Сенія*, *Силиція* (см. ниже „Характеристика лѣкарствъ въ отношеніи хроническаго воспаленія печени“).

Лѣченіе.

Діета должна быть очень легкая, какъ при лихорадочныхъ болѣзняхъ (см. стр. 67). Наружно—въ началѣ холодные компрессы, затѣмъ—согрѣвающие. Массажъ при этой болѣзни дѣлать нельзя.

5. Хроническое воспаленіе печени.

Хроническое воспаленіе печени имѣется при цѣломъ рядѣ хроническихъ болѣзней этого органа; главнѣйшія изъ нихъ, наиболѣе часто встрѣчающіяся, приводятся ниже подъ означенной рубрикой, а именно: Гипертрофія печени, Циррозъ печени, Жир-

Причины.

ная печень. Предрасполагающими обстоятельствами служатъ: сидячій образъ жизни, особенно при чрезмѣрномъ употребленіи пищи, тѣмъ болѣе—слишкомъ питательной и жирной, жаркій климатъ, чрезмѣрное употребленіе алкоголя, также злоупотребленіе хининомъ, ртутью, чрезмѣрныя душевныя волненія, глубокое горе, наконецъ—общія заболѣванія, какъ малярія, сифилисъ, золотуха, сахарная болѣзнь, равно и болѣзни сердца или легкихъ, которыя обуславливаютъ собою затрудненное кровообращеніе въ печени. Чаше всего заболѣваютъ хроническимъ воспаленіемъ люди средняго возраста, у дѣтей же оно вовсе не встрѣчается (исключая развѣ лишь сифилитическую печень), въ старческомъ же возрастѣ—лишь рѣдко. За исключеніемъ цирроза печени, чаще встрѣчающагося у мужчинъ, всѣ прочія формы хроническаго воспаленія печени встрѣчаются чаще у женщинъ. Не исключено и наслѣдственное предрасположеніе.

**Увеличеніе
печени.**

а. Гипертрофія печени т. е. увеличеніе объема этого органа вслѣдствіе чрезмѣрнаго разростанія его тканей. Симптомы вообще мало характерны, часто и мало выдающіеся, и являютъ лишь приступами, особенно въ началѣ развитія болѣзни. Симптомы эти: мѣстныя боли, ощущеніе давленія въ области печени, увеличеніе ея и временами показывающаяся легкая желтуха. Разстройства со стороны пищеваренія. Пока печень увеличена, можно разсчитывать на излѣченіе; когда же увеличенная печень, какъ это бываетъ, начинаетъ сморщиваться, атрофироваться и въ значительной мѣрѣ уже подверглась этому уничтожающему процессу, тогда надежда на улучшеніе не велика. Лѣченіе ниже. Діета какъ при гипереміи печени (стр. 271).

**Циррозъ
печени.**

б. Циррозъ печени. Болѣзнь заключается въ томъ, что пронизывающія печеночную ткань соединительнотканныя волокна разрастаются, постепенно сводя такимъ образомъ на нѣтъ печеночную ткань. Поэтому только въ началѣ болѣзни печень нѣсколько увеличена или даже вовсе не увеличена, а въ дальнѣйшемъ теченіи она все болѣе уменьшается, пока печеночная ткань совершенно атрофируется (исчезаетъ). Симптомы начинающагося цирроза печени подобны симптомамъ обыкновенной гипереміи (см. выше, стр. 271) или слабо выраженнаго остраго воспаленія печени (стр. 273), поэтому проходятъ обыкновенно незамѣтно, тѣмъ болѣе, что они бывають по большей части лишь у пьяницъ, которые весьма рѣдко обращаются къ врачебной помощи по поводу своихъ недуговъ, мало, какъ въ данномъ случаѣ, ихъ беспокоящихъ.

Нѣкоторыя болевыя ощущенія, имѣющіяся въ началѣ, въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни проходятъ; не сильно выражена бываетъ и желтуха; но что ужъ гонить такихъ больныхъ къ врачу, это — разстройства, происходящія отъ застоя крови въ разныхъ органахъ вслѣдствіе значительно уже развившагося цирроза печени. Разстройства эти суть: сильнѣйшій катарръ желудка и кишекъ, сопровождающійся запоромъ и геморроемъ; испражненія либо свѣтложелты, либо глинистаго, сѣроватобѣлаго цвѣта. Обильное выдѣленіе слизи съ испражненіями. Выдѣленіе мочи всегда уменьшено и содержитъ много мочекислыхъ осадковъ. Полное отсутствіе аппетита съ сильнымъ упадкомъ питанія. Селезенка обыкновенно значительно увеличена. Рядомъ со всѣмъ этимъ, вслѣдствіе все того же застоя крови, происходитъ мало по малу выпотѣніе кровяной сыворотки въ полость брюшины, развивается брюшная водянка (асцитъ), часто — громаднаго размѣра, если только раньше еще не послѣдовалъ смертельный исходъ болѣзни. Теченіе болѣзни тянется обыкновенно долго, годами, если только она не прерывается смертью отъ какой либо другой, случайной болѣзни. Надежды на выздоровленіе при уже вполнѣ развившемся циррозѣ никакой нѣтъ, такъ какъ для возстановленія вновь печеночныхъ клѣтокъ, уже исчезнувшихъ, средствъ не имѣется никакихъ. Лѣченіе — см. ниже. Діета, какъ при гипереміи.

Брюшная
водянка при
циррозѣ
печени.

в. Жирная печень. Жиръ внутри печеночныхъ клѣтокъ образуется и накапливается не исключительно при условіяхъ болѣзненныхъ, но и у здоровыхъ людей, и идетъ, по мѣрѣ надобности, на потребу организму для выработки въ немъ тепла. Если количество жира въ печени увеличивается по причинамъ болѣзнетворнымъ, тогда печень становится жирной въ смыслѣ болѣзни. Когда не жиръ отлагается въ печеночныхъ клѣткахъ, а сами эти клѣтки превращаются въ жиръ, исчезая какъ таковыя, тогда получается жирная атрофія печени. Жирная печень не обуславливается непременно общимъ ожирѣніемъ тѣла; она можетъ образоваться и у худощавыхъ субъектовъ, и наоборотъ, при общемъ ожирѣніи можетъ и не быть жирной печени. Къ причинамъ образованія жирной печени можно отнести слѣдующія обстоятельства: 1) чрезмѣрное употребленіе жира въ пищу или чрезмѣрное употребленіе пищи вообще, хотя бы съ малымъ содержаніемъ жира, такъ какъ извѣстно, что организмъ обладаетъ способностію и самостоятельной выработки жира изъ бѣлковыхъ и углеводистыхъ веществъ. 2) Излишки жира въ томъ и другомъ случаѣ выраба-

Жирная
печень.

тываются, однако, не всегда, а лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ жизнедѣятельности организма имѣется способствующая этому ненормальность. При послѣднемъ условіи чрезмѣрное отложеніе жира въ печени возможно и у малодушихъ. Такая ненормальность легко можетъ развиваться у дюдей, ведущихъ бездѣятельный и малоподвижный образъ жизни. 3) Не надо, однако, забывать, что встрѣчается и необъяснимая личная склонность (предрасположеніе) какъ къ тучности тѣла, такъ и къ ожирѣнію печени, независимая, повидимому, ни отъ діеты, ни отъ образа жизни. 4) Жирная печень часто сопровождаетъ изнурительныя болѣзни, какъ чахотка, ракъ, туберкулезъ костей и суставовъ и проч.; въ такихъ случаяхъ говорятъ о худосочной жирной печени. 5) Жирная печень развивается часто у привычныхъ пьяницъ. 6) Острое отравленіе фосфоромъ ведетъ къ ожирѣнію печени. 7) Жирная атрофія печени (см. выше) наблюдается у страдающихъ болѣзнями сердца, вслѣдствіе недостаточнаго притока кислорода въ кровь.

Жирная печень встрѣчается очень часто, что неудивительно при обиліи перечисленныхъ причинъ.

Симптомы жирной печени не отличаются особой опредѣленностью; печень болѣе или менѣе увеличена, мягка и дрябла, но ее не всегда удастся ощупать, такъ какъ брюшные покровы либо слишкомъ толсты и жирны, либо слишкомъ напряжены. Ощущенія со стороны больного часто отсутствуютъ даже при большой жирной печени, или они выражаются въ полнотѣ и непріятномъ давленіи въ области печени и желудка, особенно при лежаніи на лѣвомъ боку. Въ другихъ же случаяхъ ощущенія въ области печени очень мучительны, какъ это бываетъ особенно у чахоточныхъ. Разстройства со стороны пищеварительнаго канала сопровождаютъ обыкновенно жирную печень, хотя и зависятъ не отъ нея, какъ отъ таковой, а отъ основныхъ болѣзней и случайныхъ обстоятельствъ. Если не говорить о быстротечномъ ожирѣніи печени послѣ остраго отравленія фосфоромъ или объ остромъ ожирѣніи ея у новорожденныхъ и у роженицъ, то во всѣхъ прочихъ случаяхъ жирная печень есть болѣзнь хроническая, длящаяся мѣсяцами и даже многими годами.

При лѣченіи главное вниманіе должно быть обращено на основныя причины, и насколько возможно ихъ устранить, настолько же возможно рассчитывать на уменьшеніе или исчезновеніе накопившагося въ печени жира. На первомъ планѣ стоитъ установленіе правильной діеты. Пища должна быть ограничена,

лишь самымъ необходимымъ, и изъ нея должны быть исключены всякіе жиры и жирные сорта мяса. Надо значительно ограничить и употребленіе сладкихъ блюдъ, а также крахмалистыхъ и мучнистыхъ веществъ. Полезны же тошіе сорта мяса, особенно—рыба, равно какъ свѣжая зелень, зеленые овощи и фрукты. Вредны безусловно спиртные напитки, особенно—крѣпкое пиво, крѣпкое и сладкое вино; дозволить больному можно лишь стаканъ легкаго краснаго вина въ день, съ водою пить. Поменьше спать, побольше быть въ движеніи на свѣжемъ воздухѣ. См. еще діету и вспомогательныя мѣры при хроническомъ катаррѣ желудка. Лѣкарства *Нуксъ вом.*, *Ликопод.*, *Хелидоній*, *Фосфоръ*, *Кансик.*, *Кальк. карб.* и другія (характеристику см. ниже).

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отноше- ніи хроническаго воспаления печени и хроническихъ ея болѣзней.

Выше уже было указано, въ какихъ случаяхъ этихъ болѣзненныхъ состояній, когда и въ какихъ предѣлахъ возможно еще излѣченіе; только въ такихъ случаяхъ соотвѣтствующія гомеопатическія лѣкарства имѣютъ несомнѣнно цѣлебное вліяніе на болѣзнь. Когда же болѣзненный процессъ зашелъ такъ далеко, что объ излѣченіи уже не можетъ быть рѣчи, тогда лѣкарства эти могутъ принести лишь нѣкоторое облегченіе, или даже остаться совсѣмъ безъ всякаго дѣйствія; въ такихъ случаяхъ не остается ничего больше, какъ прибѣгать къ чисто палліативнымъ средствамъ.

Поэтому очень важно не запускать болѣзнь и, при малѣйшихъ симптомахъ со стороны печени, принимать соотвѣтствующія гомеопатическія лѣкарства для предупрежденія дальнѣйшаго развитія болѣзни, причемъ руководствоваться можно ниже слѣдующими указаніями.

Нуксъ вомика 3. У лицъ, обильно и слишкомъ сытно питающихся, любящихъ жирныя блюда и привычныхъ къ вину; при бездѣятельномъ и малоподвижномъ образѣ жизни, или при чрезмерныхъ умственныхъ занятіяхъ. Симптомы обыкновеннаго увеличенія печени и ея гипереміи. Частыя боли и чувствительность въ области печени. У лицъ, принимавшихъ много и долго хининъ. Разстройства пищеваренія съ склонностью къ запору, но не очень сильному, и при безцвѣтныхъ испраженіяхъ. Для излѣченія одна *Нуксъ вом.* недостаточна, и приходится обыкновенно прибѣгать еще къ другимъ подходящимъ лѣкарствамъ.

Сульфуръ $\times 3$ — 6. Дополняетъ дѣйствіе Нуксъ вом., особенно въ случаяхъ, болѣе давнихъ и упорныхъ; однако, Сульфуръ не показанъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ испражненія обезцвѣчены и имѣется уже рѣзковыраженная желтуха. Не подходитъ Сульфуръ и при брюшной водянкѣ или кишечномъ кровотеченіи, равно какъ и при сильномъ истощеніи больного. Особеннымъ показаніемъ для Сульф. служить нечистая, нездоровая, склонная къ высыпямъ кожа, съ зудомъ.

Хина $\times 3$. Нѣкоторые симптомы уже указаны выше при гипереміи печени. Не совсѣмъ еще обезцвѣченные испражненія. Поносы, кровотеченія. Увеличенная селезенка.

Ликоподій $\times 3$. Въ случаяхъ болѣе упорныхъ. Желтоватосѣрый цвѣтъ лица. Симптомы хроническаго катарра желудка и кишекъ. Значительныя геморроидальныя страданія. Брюшная водянка съ быстрымъ общимъ исхуданіемъ.

Сенія 3. Особенно для женщинъ нервныхъ, раздражительныхъ, склонныхъ къ приливамъ, съ темными кругами у глазъ и печеночными пятнами на лицѣ. Общая слабость при кажущемся здоровомъ обликѣ, отвращеніе къ мяснымъ кушаньямъ, разстройства со стороны желудка и менструаціи. Зудъ тѣла. Перемѣнчивость настроенія.

Фосфоръ 3. Въ худшихъ случаяхъ съ тифозными явленіями и быстрымъ паденіемъ силъ. Изнурительная лихорадка. Сильная боль въ печени.

Калькареа карбоника 3—6. Особенно у туберкулезныхъ и блѣдноемочныхъ больныхъ. Симптомы сильнаго катарра желудка и кишекъ, преобладаетъ запоръ.

Силиція 3—6. Подобна Кальк. карбон. Особого рода измѣненіе наблюдается въ ногтяхъ пальцевъ рукъ, они теряютъ прозрачность, желтѣютъ и трескаются, значительно въ то же время утолщаясь. Этотъ симптомъ наблюдается очень часто при болѣзняхъ печени и указываетъ, кромѣ Силиціи, еще на *Графитъ*, *Антимон. круд.* и *Сульфуръ*.

Ацид. нитрик. 3. Сильная желтуха, насыщенная желчью моча, безцвѣтныя испражненія и сильная боль въ области печени. Геморрой и симптомы хроническаго катарра кишекъ. Предшествовавшее чрезмѣрное употребленіе ртути.

Карбо-вегеталисъ 3—6. Крайній упадокъ силъ, исхуданіе, сильнѣйшій желудочно-кишечный катарръ, набуханіе венъ у задняго прохода, брюшная водянка. Умѣстно особенно у пьяницъ, но

также при страданіяхъ печени, развившихся отъ обильныхъ потерь соковъ, какъ, на примѣръ, у женщинъ послѣ обильныхъ маточныхъ кровотеченій или послѣ долгаго кормленія грудью.

Арсеникъ 3—6. Подобно Карб. вегетабил., съ той разницей, что не подходитъ уже въ случаяхъ крайняго упадка жизнедѣятельности.

Кромѣ перечисленныхъ лѣкарствъ несомнѣнное вліяніе на печень имѣетъ еще рядъ другихъ лѣкарствъ: *Бріонія* $\times 3$ въ болѣе легкихъ случаяхъ; *Креозотъ* $\times 3—2$ —симптомы катарра желудка съ увеличеннымъ слюноотдѣленіемъ, скопленіемъ газовъ въ кишкахъ, частой тошнотой и изжогой; частые позывы къ мочеотдѣленію. *Лептандра* $\times 1$ —желтообложенный языкъ, большая общая слабость, жидкія, вонючія испраженія и съ кровью смѣшанныя. *Лаксизъ 6*—въ очень упорныхъ случаяхъ, особенно у пьяницъ, какъ Карбо. См. еще въ „Лѣкарствовѣдѣніи“, *Аурумъ*, *Берберисъ*, *Хелидоній*, *Гепаръ сульф.*, *Лауроцераз*.

Надо упомянуть еще, что при болѣзняхъ печени получаютъ часто хорошіе результаты отъ употребленія минеральныхъ водъ (Боржомъ, Эссентуки, Карлсбадъ, Мариенбадъ и др.), которыя не противопоказаны, вообще говоря, при лѣченіи гомеопатическими лѣкарствами.

Наконецъ, упомянуть надо о представляющейся нерѣдко необходимости прокола живота, для освобожденія брюшной полости отъ накопившейся въ ней жидкости при брюшной водянкѣ и для облегченія страданій, сопряженныхъ съ послѣднею. Къ сожалѣнію, облегченіе это обыкновенно не надолго, ибо жидкость вскорѣ опять накапливается, силы же больного еще больше падаютъ.

6. Ракъ печени.

Печень чаще другихъ органовъ служитъ мѣстомъ раковаго новообразованія. Въ начальной стадіи своего развитія ракъ печени либо совсѣмъ не даетъ о себѣ знать какими либо симптомами, что бываетъ, конечно, рѣже, либо симптомы его неопредѣленны и могутъ одинаково быть и при другихъ болѣзняхъ печени. Только когда печень успѣла значительно увеличиться въ объемъ и раковые бугры образовались на поверхности ея и прощупываются, причемъ оказываются болѣе или менѣе болѣзненными, тогда распознаваніе рака значительно уже облегчено. Желтуха можетъ отсутствовать, если опухоль не сдавливаетъ желчныхъ протоковъ, въ противномъ слу-

чаѣ она имѣется и достигаетъ сильной степени. Вообще симптомы зависятъ отъ мѣстоположенія рака въ печени; если опухоль находится близъ воротной вены и сдавливаетъ послѣднюю, тогда очень быстро развивается брюшная водянка. Желудочно-кишечныя разстройства сопровождаютъ болѣзнь. Уже скоро начинается исхудание организма, несмотря на сохраняющійся еще аппетитъ, что уже въ значительной мѣрѣ свидѣтельствуеетъ въ пользу рака.

Течение рака не всегда одинаковое, продолжается отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до нѣсколькихъ лѣтъ, смотря по быстротѣ его роста.

Надежды на выздоровленіе очень мало. Лѣченіе такое же, какъ при прочихъ хроническихъ болѣзняхъ печени. См. еще о раковыхъ болѣзняхъ въ отд. 10-мъ.

7. Воспаленіе селезенки.

Болѣзни селезенки развиваются крайне рѣдко самостоятельно, а сопровождаютъ обыкновенно другія болѣзни, какъ тифъ, перемежающуюся лихорадку, туберкулезъ и т. п. Наиболѣе частое заболѣваніе этого органа составляетъ острое опуханіе его, которое можетъ перейти и въ хроническое, какъ это бываетъ при маляріи, лѣченной долгое время большими дозами хинина. Симптомами самостоятельнаго воспаленія селезенки, которое бываетъ очень рѣдко, являются: ощущеніе жара и колотья въ лѣвомъ боку въ мѣстѣ нахожденія ея (см. стр. 266) непосредственно подъ ребрами, лихорадочное состояніе перемежающагося типа, усиленіе боли отъ давленія и отъ всякаго движенія, даже отъ чиханія, кашля, выпрямленія спины, также пищеварительныя разстройства и кровавая рвота. Продолжительность болѣзни 7 — 10 дней съ благополучнымъ исходомъ. Въ другихъ случаяхъ, особенно когда причиной является механическое поврежденіе, воспаленіе ведетъ къ нагноенію, къ образованию нарыва. Изъ лѣкарствъ, какія обыкновенно показаны при воспаленіяхъ селезенки, главныя суть слѣдующія: *Акон.*: при лихорадочномъ состояніи (также *Хинин.*: въ свѣжихъ случаяхъ перемежающейся лихоралки; см. стр. 64). — *Бріон.*: при сильныхъ колющихъ боляхъ, а также при имѣющихся желудочныхъ разстройствахъ и запорѣ. — *Арсен.-альб.*: въ затяжныхъ или хроническихъ случаяхъ (рядомъ съ *Нуксъ-вом.*, *Ликопод.*, *Сульфуръ*, особенно при осложненіи желудочными, геморроидальными или желчными страданіями). — *Арника*: при воспаленіи вслѣдствіе механическихъ поврежденій. — Вспомогательныя мѣры и діета — какъ при воспаленіи печени. Въ прочихъ же случаяхъ — лѣченіе основной болѣзни.

8. Болѣзни поджелудочной железы.

Болѣзни поджелудочной железы, изъ за глубокаго положенія ея въ тѣлѣ, не поддаются у постели больного точному наблюденію, да и о самой железѣ еще мало что извѣстно въ наукѣ (см. предварительныя замѣтки, стр. 266). Симптомы таковы, какъ при болѣзняхъ желудка, особенно какъ при хроническомъ катаррѣ его, съ той, однако, разницей, что прямыя желудочныя явленія отсутствуютъ, что очень частая рвота происходитъ при ненарушенной проходимости привратника (входъ въ желудокъ изъ пищевода), что мѣстоположеніе боли иное, чѣмъ при болѣзни желудка (въ глубинѣ, влѣво и ближе къ спинѣ), наконецъ — теченіе болѣзни подострое, а не хроническое, и быстрое исхуданіе при отсутствіи вообще поносныхъ испражнений. Такого рода симптомы могутъ давать поводъ подозрѣвать заболѣваніе поджелудочной железы безъ, однако, твердой опоры для положительнаго утвержденія. Лѣченіе можетъ быть лишь чисто симптоматическое.

ОТДѢЛЪ ШЕСТОЙ.

Глистныя болѣзни.

Въ этомъ отдѣлѣ разсматриваются кишечные глисты именно, ленточные и круглые, а также—трихины и эхинококкѣ.

Въ новѣйшее время отрицается возможность личнаго пред- **О предрас-**
расположенія къ развитію глистовъ въ кишечникѣ и допускается **ложеніи к**
лишь вліяніе личныхъ и мѣстныхъ условий, способствующихъ или **глистамъ**
противодѣйствующихъ приобрѣтенію этихъ паразитовъ. Такъ, значительное вліяніе имѣетъ родъ занятій; напримѣръ, занимающіеся поставкой, продажей и приготовленіемъ мясной пищи, поражаются преимущественно ленточными глистами; большое вліяніе имѣетъ степень культурности населенія, чистота и опрятность вообще и въ дѣлѣ пищи и питья въ частности и т. д. Если, однако, принять во вниманіе многочисленность путей, по которымъ глистные образованія попадаютъ въ пищеварительный каналъ, хотя бы только путь занесенія ихъ съ пищей и напитками, засоренными этими образованіями, то становится труднообъяснимымъ, почему же сравнительно такъ еще мало людей страдаютъ глистами? Извѣстно также, что

часто болѣзненные явленія, имѣющіяся при глистахъ, не проходятъ, а остаются и послѣ изгнанія послѣднихъ, равно какъ они служатъ удобной почвой для появленія и размноженія глистовъ вновь. Такія наблюденія и давали поводъ стариннымъ врачамъ говорить о „глистной болѣзни“, хотя бы глистовъ и не оказывалось. И думается, нельзя еще считать окончательно рѣшеннымъ то, будто тѣ врачи были неправы въ такомъ своемъ взглядѣ. Подтвержденіемъ этому, хотя и косвеннымъ, служитъ то, что нерѣдко болѣзненные явленія, похожія на явленія, бывающія при глистахъ, но при отсутствіи послѣднихъ, все же проходятъ послѣ приѣмовъ противоглистнаго средства *Цина*, даваемого въ гомеопатической дозѣ, или *Филиксъ*, *Камала* и проч.

I. Ленточные глисты.

Разные виды
ленточнаго
глиста.

Имѣются три вида ленточнаго глиста, встрѣчающіеся у человѣка: 1) Солитеръ (*Taenia solium*) или Лентецъ или Цѣпень вооруженный (присосками и крючками съ хоботкомъ и вѣнчикомъ); 2) Лентецъ или Цѣпень невооруженный (*Taenia saginata*), имѣющий присоски, но лишенный хоботка и вѣнчика крючковъ; 3) Лентецъ или Цѣпень широкій (*Bothriocephalus latus*). Другіе виды ленточныхъ глистовъ встрѣчаются исключительно у животныхъ и лишь крайне рѣдко развиваются и въ человѣкѣ.

Общее строеніе и развитіе лентеца.

Ленточный глистъ состоитъ изъ головки и цѣпи соединенныхъ между собой члениковъ, отдѣляющихся лишь по достиженіи ими половой зрѣлости. Головка снабжена, какъ бы вооружена, присосками и крючками, солитеръ—еще и хоботкомъ и вѣнчикомъ. Членики, чѣмъ дальше отъ головки, тѣмъ полнѣе развиты и величиною больше. Они двуполы и производятъ яйца, содержащія въ себѣ глистный зародышъ. Такія яйца, попадая въ соответствующій животный организмъ, теряютъ свою скорлупу, и зародыши дѣлаются свободными; или же уже заранѣе освободившійся зародышъ или переходная глистная форма (пузырчатый глистъ) попадаютъ въ кишечникъ и тамъ развиваются далѣе.

Пути зараженія лентецомъ.

Обыкновенно глистные образованія попадаютъ при употребленіи дурно приготовленнаго мяса, содержащаго такія образованія. Но причиной могутъ быть и другія пищевыя вещества, если къ нимъ какъ нибудь пристали глистные образованія. Употребленіе полусырого или совершенно сырого мяса всегда сопряжено съ возможностью развитія ленточнаго глиста.

Солитеръ приобрѣтается человѣкомъ отъ нехорошо приготовленной шелудивой свинины. Невеооруженный же лентецъ вводится съ мясомъ жвачныхъ животныхъ, преимущественно рогатаго скота. Этотъ глисть неоднократно наблюдался у маленькихъ дѣтей, которыхъ по предписанію врача кормили скобленной сырой говядиной по причинѣ поноса.

Всѣ три вида лентеца встрѣчаются во всѣхъ возрастахъ, но наиболѣе рѣдко у дѣтей и наиболѣе часто у взрослыхъ, особенно у женщинъ, что объясняется болѣе частымъ соприкосновеніемъ послѣднихъ съ сырымъ мясомъ; по этой же причинѣ люди, занимающіеся приготовленіемъ и доставкой мясныхъ продуктовъ, одержимы ленточнымъ глистомъ гораздо чаще, нежели люди другихъ профессій; къ нимъ относятся особенно мясники, повара, кухарки.

Ленточный глисть развивается въ тонкой кишкѣ человѣка и, если онъ находитъ благопріятныя для себя условія, можетъ пребывать въ ней долгое время, даже многіе годы. Обыкновенно ленточный глисть имѣется у человѣка въ единственномъ числѣ, но нерѣдко и во множественномъ; такъ, извѣстны случаи, гдѣ сразу изгонялись 10—12 и болѣе ленточныхъ глистовъ. Въ большинствѣ случаевъ у одного и того же человѣка живетъ лишь одинъ видъ лентеца, но бываетъ, хотя и рѣдко, что существуютъ въ немъ одновременно различные виды такового. Наибольше разстройство причиняетъ человѣку широкій лентецъ. Ленточные глисты, какъ уже сказано, водятся въ тонкой кишкѣ человѣка, но отдѣльные созрѣвшіе членики бываютъ разбросаны и въ толстой кишкѣ.

Солитеръ, достигшій полного развитія, имѣетъ длину до 2—3 метровъ, рѣдко большую. Головка его имѣетъ величину маленькой булавочной головки и снабжена хоботкомъ, на которомъ помѣщается вѣнчикъ съ 26—30 крючками. Присоски можно замѣтить даже простымъ глазомъ. За головкой слѣдуетъ шейка, шириною около 3 сантиметровъ, съ примыкающими къ ней члениками, все болѣе увеличивающимися по мѣрѣ удаленія отъ головки. Зрѣлые членики имѣютъ 9—10 миллиметровъ въ длину и 4—6 миллиметровъ въ ширину. Въ молодомъ возрастѣ, въ видѣ пузырчатого глиста (цистицеркъ), солитеръ живетъ въ межмышечной клѣтчаткѣ и другихъ органахъ свиньи и имѣетъ величину отъ горошины до боба съ тонкими стѣнками и прозрачнымъ содержимымъ. Изъ этого цистицерка, попавшаго въ желудокъ человѣка, развивается солитеръ, водворяющійся въ тонкой кишкѣ, присасываясь головкой къ слизистой оболочкѣ ея (въ верхней трети).

Солитеръ.

**Невооружен-
ный лентецъ.**

Невооруженный цѣпень (см. выше) гораздо крупнѣе, чѣмъ солитеръ, и менѣе прозраченъ. Длина—до 6 метровъ. Головка ($2\frac{1}{2}$ миллиметра ширины) снабжена 4 крѣпкими присосками, но безъ хоботка и вѣнчика крючковъ; вмѣсто нихъ имѣется маленький лобный присосокъ. Шейка очень коротка, и на ней, въ нѣсколькихъ миллиметрахъ за головкой, замѣтна уже простымъ глазомъ членистость. Величина зрѣлаго членика—отъ 16 до 20 миллиметровъ длины и отъ 5 до 7 миллиметровъ ширины. Хозяевами для молодыхъ образованій этого лентеца являются жвачныя животныя, у которыхъ они живутъ въ мышцахъ, въ сердцѣ и мозгу. Глистный пузырь (цистицеркъ) его въ общемъ схожъ съ цистицеркомъ солитера. И этотъ лентецъ развивается въ тонкой кишкѣ человѣка, присосавшись къ ея слизистой оболочкѣ.

**Широкий
лентецъ.**

Широкий лентецъ есть самый большой ленточный глистъ человѣка; длина его доходить до 5—8 метровъ; головка имѣетъ около 2 миллиметровъ длины и 1 миллиметръ ширины. Членики незрѣлые имѣютъ 10—15 миллиметровъ въ ширину и 3—4 миллиметра въ длину, а зрѣлые—почти квадратной формы, размѣръ—5 миллиметровъ. Цвѣтъ свѣжаго глиста—матовый, синевато-сѣрый. Посредниками (хозяевами) широкаго лентеца считаются рыбы, и въ Россіи онъ водится въ Финляндіи, въ Петербургѣ и въ Остзейскомъ краѣ, также въ Польшѣ. Прочіе 2 вида лентеца имѣютъ еще болѣе широкое распространеніе.

**Симптомы
при ленточ-
ныхъ гли-
стахъ.**

Часто присутствіе ленточныхъ глистовъ въ кишечникѣ не даетъ о себѣ знать никакими симптомами и обнаруживается лишь случайно отхожденіемъ члениковъ. Въ другихъ же случаяхъ одержимые ленточнымъ глистомъ люди ощущаютъ неопредѣленное недомоганіе, пищевареніе у нихъ болѣе или менѣе разстроено, наблюдаются ненормальныя явленія и со стороны общаго питанія и нервной системы. Причина всего этого можетъ быть неясна до тѣхъ поръ, пока не покажутся куски ленточнаго глиста, послѣ изгнанія котораго больные сразу выздоравливаютъ. Но симптомы могутъ быть и болѣе рѣзкаго характера: боли въ животѣ, до степени колики, преимущественно натошакъ или послѣ принятія опредѣленныхъ пищевыхъ веществъ, и уменьшеніе болей послѣ утоленія голода или послѣ принятія опредѣленнаго рода пищи; часто бываетъ волчій голодъ; при глистахъ бываетъ также вздутіе живота, поносы чередуются съ запорами, въ животѣ ощущается какъ быдвигающийся предметъ. Присутствіе ленточныхъ глистовъ можетъ вызвать и цѣлый рядъ не мѣстныхъ, а болѣе отдаленныхъ

симптомовъ, какъ зудъ въ заднемъ проходѣ, щекотаніе въ носу, усиленное выдѣленіе слюны, потѣніе, кровотеченія, головныя боли, шумъ въ ушахъ, сердцебіеніе, даже судороги, глухоту, нѣмоту, слѣпоту и т. д. Нервные явленія, вродѣ послѣднихъ, перечисленныхъ здѣсь, когда выяснено несомнѣнно присутствіе солитера, порождаетъ другого рода подозрѣніе. Дѣло въ томъ, что этотъ видъ ленточнаго глиста живетъ въ организмѣ человѣка даже въ своей пузырчатой формѣ (въ видѣ цистицерка—см. выше) и притомъ въ различныхъ органахъ, какъ въ межмышечной клѣтчаткѣ, такъ и въ мозгу и его оболочкахъ, также въ глазу, вызывая въ этихъ органахъ тяжелыя разстройства.

Распознаваніе вида ленточнаго глиста не представляетъ затрудненія, особенно—при микроскопическомъ изслѣдованіи. Нѣкоторыя различія, доступныя простому осмотру, указаны уже выше (стр. 283—284). Тутъ можно еще прибавить, что при невооруженномъ лентецѣ членики отходятъ произвольно и безъ испражненія, при солитерѣ же обыкновенно только съ испражнениями. Членики того и другого лентеца отходятъ по одиночкѣ, тогда какъ широкій лентецъ отходитъ обыкновенно длинными кусками.

Распознаваніе ленточныхъ глистовъ.

Во избѣжаніе ошибки въ распознаваніи кишечныхъ паразитовъ надо имѣть еще въ виду, что за глистовъ могутъ быть приняты непереваренныя пищевыя вещества, напримѣръ сухожилия, нервы и сосуды съѣденнаго мяса, а при хроническомъ катаррѣ толстой кишки—крупные куски и полоски тягучей слизи.

Лѣченіе должно сводиться къ изгнанію глиста и къ устраненію порожденныхъ имъ разстройствъ, если таковыя, послѣ его изгнанія, еще остаются. Для перваго показанія лѣкарства должны быть даны въ достаточно большихъ дозахъ, которыя бы навѣрняка оглушили или убили ленточнаго глиста, для втораго же показанія лѣченіе должно быть чисто гомеопатическое, такъ какъ оно направлено уже не на глиста, а на больной человѣческой организмъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣдній настолько слабъ, что нельзя быть увѣреннымъ въ томъ, что онъ перенесетъ противоглистное изгоняющее лѣченіе, слѣдуетъ ограничиваться только гомеопатическимъ лѣченіемъ вообще и противоглистными въ малыхъ дозахъ въ частности, исходя изъ упомянутаго уже выше соображенія о возможности существованія глистнаго предрасположенія. Равнымъ образомъ цѣлесообразно и въ прочихъ случаяхъ не сразу приступить къ насильственному изгнанію ленточнаго глиста, а пред-

Задачи лѣченія при глистахъ.

послать ему подготовительное гомеопатическое лѣченіе. При послѣднемъ способѣ изгнаніе удается болѣе легко и успѣшно.

Подготови-
тельное лѣ-
ченіе.

Испытаннымъ подготовительнымъ лѣченіемъ является слѣдующее: въ теченіе 7—8 дней даютъ утромъ и вечеромъ по 5 капель *Филиксъ масъ* $\times 1$, а въ теченіе дня по 2 раза попеременно *Станнумъ* $\times 3$ и *Валеріана* $\times 1$. Если имѣются рѣзко выраженные расстройства со стороны пищеварительнаго аппарата, то ихъ надо либо прежде всего устранить, либо давать соответствующее лѣкарство (см. предыдущій отдѣлъ) въ промежуткахъ между только что указанными подготовительными приемами. Въмѣсто Валеріаны часто еще лучше дѣйствуетъ *Креозотъ* $\times 3$, особенно при вздутіи живота газами. Надо заботиться о ежедневномъ дѣйствіи кишечника во всѣ дни подготовительнаго лѣченія, причемъ испраженія должны быть болѣе жидкія и достаточно обильныя. Для этой цѣли полезно брать каждое утро около чайной ложки англійской соли, разведенной въ стаканѣ воды, или $1\frac{1}{2}$ стакана слабительнаго лимонада или слабительной минеральной воды. Если этихъ мѣръ недостаточно, то въ послѣдніе 2—3 дня до изгнанія глиста можно еще и клистиръ ставить, одинъ въ день. Діета въ это время должна быть болѣе легкая, дающая не много кала: мясо, бѣлый хлѣбъ, молоко, чай и т. п. Напротивъ того, избѣгать надо стручковыхъ плодовъ, чернаго хлѣба, овощей, ягодъ съ зернышками (земляника, черника, смородина), яицъ; первыя изъ этихъ веществъ даютъ много кала, а ягоды размельчаютъ глиста и такъ же, какъ и яйца, затрудняютъ отыскиваніе головки. Наканунѣ изгоняющаго лѣченія цѣлесообразно дать больному такія еще средства, которыя считаются неприятыми для глиста; сюда относятся, напримѣръ, соленая селедка, лукъ, также чеснокъ.

Изгоняющее
лѣченіе.

Послѣ того, на другое утро, предпринимается изгоняющее лѣченіе противоглистнымъ средствомъ, которое можно давать и не натошакъ, какъ обыкновенно принято; напротивъ того, даже лучше, если больной выпьетъ чашку кофе или чаю съ небольшимъ кускомъ бѣлаго хлѣба, такъ какъ въ такомъ случаѣ глистогонное средство легче переносится желудкомъ. Лѣченіе начинается часъ спустя послѣ выпитаго кофе, и все нужное количество глистогоннаго лѣкарства принимается въ теченіе 1 или 2 часовъ.

Глистогонныя
лѣкарства.

Глистогонныхъ лѣкарствъ много, и всѣ они болѣе или менѣе дѣйствительны. Лучшие результаты получаются отъ *Филиксъ масъ* (папоротникъ), *Куссо*, *Камала* и *Панна*

Филиксъ масъ всего лучше брать въ видѣ экстракта, смѣшаннаго пополамъ съ порошкомъ. *Филиксъ масъ*, по 3—4 грамма того и другого,

раздѣленныхъ на 4 или 8 равныхъ дозъ; принять въ течение 2 часовъ, черезъ каждыя полчаса по одной дозѣ въ облаткѣ. Это средство не подходитъ только при одновременномъ страданіи печени, и не слѣдуетъ брать его совмѣстно съ касторовымъ масломъ; при надобности берутъ, часть спустя, слабительную соль.

Куссо (порошковое) отъ 4 до 15 граммъ, принять въ 2 или 4 приема, въ теченіе 1—2 часовъ, въ подсахаренной водѣ или въ кашкѣ. Черезъ часъ, если надо, касторовое масло. Имѣется въ продажѣ также въ пастилкахъ.

Камала, отъ 2 до 15 граммъ, въ 2 приема въ видѣ каши или въ таблеткахъ.

Панна, 3 приема по 1—2 грамма, въ теченіе часа времени. Переносится хорошо и дѣтьми.

Большая или меньшая доза глистогоннаго назначается смотря по возрасту, тѣлосложенію и общему состоянію здоровья. Кромѣ того надо сказать, что солитеръ требуетъ меньшей (на $\frac{1}{3}$) дозы, чѣмъ другіе два вида ленточнаго глиста.

Каждый приемъ глистогоннаго лѣкарства можно запивать небольшимъ количествомъ кофе или чаю и, пока не окончится процедура изгнанія, лежать въ постели. Испражненіе, являющееся вслѣдъ за принятымъ глистогоннымъ средствомъ, практично произвести, сидя на горшкѣ, наполненномъ теплой водой, и не вставать до тѣхъ поръ, пока пройдетъ всякая на низъ потребность: при такомъ условіи глисть не обрывается и вѣрнѣе выходитъ цѣликомъ.

Изгнаніе ленточнаго глиста можетъ считаться успѣшнымъ лишь въ томъ случаѣ, когда найдена его головка (или при разныхъ видахъ глиста соотвѣтствующее число головокъ).

Отысканіе головки облегчается тѣмъ, что, прибавивъ къ испражненіямъ чистую воду и давши имъ минутъ 10 постоять, воду сливаютъ, и это повторяется до тѣхъ поръ, пока сливаемая вода уже болѣе не окрашена. Такъ получается чистый, вымытый глисть, въ которомъ легко уже отыскать головку, если только она имѣется; искать ее надо среди самыхъ мелкихъ тонкихъ частей глиста, причемъ разбирать послѣдній надо осторожно, дабы не раздроблять его.

Если по чему либо головка не найдена, то вопросъ объ удачѣ лѣченія можетъ быть рѣшенъ лишь спустя 3 мѣсяца, такъ какъ для полного вновь развитія глиста требуется не менѣе 8—10 недѣль.

Изгнаніе глиста слѣдуетъ предпринимать вообще не ранѣе, чѣмъ членики не покажутся сами собой.

Не слѣдуетъ производить этого изгнанія у людей, очень слабыхъ, у женщинъ во время мѣсячныхъ очищеній и беременности, также у дѣтей, очень молодыхъ или старыхъ или во время острыхъ лихорадочныхъ болѣзней.

Противопоказанія.

Гомеопатич.
лѣченіе при
ленточныхъ
глистахъ.

Какъ сказано уже выше, одержимые глистами, даже будучи отъ послѣднихъ избавлены, очень часто продолжаютъ жаловаться на прежніе свои недуги. Это не должно, конечно, служить поводомъ къ возобновленію изгоняющаго лѣченія, а надо въ такихъ случаяхъ принимать исключительно лишь гомеопатическія лѣкарства.

Гомеопатическое лѣченіе умѣстно и въ тѣхъ случаяхъ, когда изгоняющее лѣченіе по какой либо причинѣ противопоказано (см. выше), равно какъ и тогда, когда имѣется пока только подозрѣніе на ленточныхъ глистовъ, но еще членики не показались, О подготовительномъ лѣченіи гомеопатическими лѣкарствами уже сказано выше.

При выборѣ лѣкарствъ руководствуются имѣющимися въ каждомъ случаѣ расстройствами со стороны пищеваренія и нервной системы. Во всякомъ же случаѣ полезны *Калькареа карбоника*, *Сульфуръ* и *Фосфоръ*, которыя можно давать черезъ день по очереди и 3 приѣма въ день, въ 3 и 6 дѣленіи. Также: *Станнумъ* $\times 3$, *Купрумъ оксидат. нигр.* $\times 4$, черезъ день 3 раза, а каждый день утромъ и вечеромъ—*Валеріана* $\times 1$. Этотъ рядъ лѣкарствъ умѣстенъ при болѣе безпокоящихъ симптомахъ, особенно со стороны нервной системы, и какъ подготовительный къ предстоящему изгнанію ленточныхъ глистовъ.

Діета при
ленточныхъ
глистахъ.

Діета у страдающихъ глистами должна быть легкая и не-раздражающая: молоко, супы, отвары изъ крупъ, мясныя кушанья, приготовленныя безъ всякихъ острыхъ приправъ, яйца и проч. Избѣгать же такимъ больнымъ надо употребленія кислотъ, особенно уксуса, также солений, лука, чесноку, хрѣна, земляники, брусники, смородины, тыквенныхъ сѣмечекъ; всѣ эти вещества дѣйствуютъ раздражающимъ образомъ на ленточнаго глиста, что отзывается разными расстройствами на больномъ организмѣ. Отъ такихъ веществъ случается, что отходятъ членики глиста, поэтому временное нарочитое ихъ употребленіе можетъ быть умѣстно для выясненія вопроса о присутствіи глиста въ случаяхъ сомнительныхъ.

Мѣры предо-
храненія.

Еще нѣсколько словъ о мѣрахъ предохраненія отъ ленточныхъ глистовъ, которыя должны быть какъ общія, относящіяся къ вѣдѣнію санитарной полиціи и сводящіяся къ охраненію населенія отъ зараженнаго пузырчатыми глистами мяса, такъ и личныя, зависящія отъ доброй воли cadaго челоуѣка въ отдѣльности. Тутъ идетъ рѣчь лишь о личныхъ мѣрахъ, которыя сводятся къ слѣдующему: мясо (также рыба) должно употребляться

въ хорошо проваренномъ или прожаренномъ видѣ; сырого мяса не слѣдуетъ ѣсть, и если таковое приходится давать по діететическимъ соображеніямъ, то надо, чтобы была полная увѣренность въ томъ, что мясо—вполнѣ здоровое, не имѣетъ въ себѣ ни одного бѣлаго пятнышка, полоски или пузырька; мясо не должно быть краснымъ, а тѣмъ болѣе—кровянымъ, и при разрѣзываніи его не должна выдѣляться изъ крупныхъ сосудовъ красноватая или, еще хуже, красная жидкость. Въ кухнѣ и въ кладовыхъ должна быть полная опрятность и чистота, и сырое мясо должно всегда класть отдѣльно отъ прочихъ пищевыхъ веществъ, и не получать изъ лавки въ одной общей посудѣ или корзины. Вообще надо помнить, что пузырьчатые глисты могутъ какимъ либо путемъ пристать ко всякимъ пищевымъ продуктамъ (также къ фруктамъ), и поэтому надо всегда заботиться объ употребленіи ихъ въ чистомъ или очищенномъ видѣ.

II. Круглые глисты.

Изъ круглыхъ глистовъ наиболѣе часто встрѣчаются у человека: 1) Струнецъ обыкновенный или крупная аскарида, 2) Острица или мелкая аскарида, 3) Трихина спиральная.

1. Аскарида крупная или струнецъ обыкновенный.

(*Ascaris lumbricoides*).

Формою этотъ глистъ похожъ на дождевого червя и имѣетъ въ длину 18—27, даже до 32 сантиметровъ. Пути, которыми зародыши этого глиста попадаютъ въ кишечникъ человѣка, мало еще выяснены, но несомнѣнно, что недостаточное соблюденіе чистоты и опрятности въ обиходѣ способствуютъ попаданію струнцевыхъ зародышей въ кишки человѣка. Живетъ онъ, именно, въ тонкой кишкѣ, по большей части не въ одиночку, а обществами. Въ толстой кишкѣ онъ бываетъ лишь въ мертвомъ своемъ видѣ или на пути къ выдѣленію наружу. Несравненно болѣе часто струнцы развиваются у дѣтей и у женщинъ, нежели у взрослыхъ мужчинъ, фактъ который служить нѣкоторымъ подтвержденіемъ высказаннаго выше взгляда о глистной болѣзни, т. е. о личномъ предрасположеніи къ развитію глистовъ. Струнцы развиваются нерѣдко въ кишечникѣ рядомъ съ другими породами глистовъ.

Симптомы
при крупной
аскаридѣ.

При небольшомъ числѣ струнцовъ въ кишечникѣ обыкновенно не замѣчается никакихъ разстройствъ въ организмѣ, при значительномъ же ихъ количествѣ разстройства всегда имѣются, часто въ очень сильной степени выраженные. Сюда относятся такія явленія, какъ зудъ въ носу, боли въ животѣ—вокругъ пупка, вздутость въ области желудка, разстройства аппетита, увеличенное слюноотдѣленіе, дурной запахъ изо рта, поносныя испражненія, часто съ слизью и кровью, нерѣдко и нервныя, судорожныя припадки, тревожный сонъ со вздрагиваніемъ и скрежетомъ зубовъ, неправильности пульса; ко всему этому можетъ присоединиться исхуданіе тѣла съ набрякlostью лица, темной окраской вѣкъ; неравномѣрное расширеніе зрачковъ. При совокупности такихъ симптомовъ можно почти съ увѣренностью предположить присутствіе струнцовъ.—Струнцы иногда заползаютъ изъ кишекъ въ другія полости тѣла, чаще всего въ желудокъ, вызывая въ послѣднемъ случаѣ сильную тошноту и рвоту и вслѣдствіе сего извергаясь очень скоро наружу.—Распознаваніе струнцовъ въ слѣчаяхъ сомнительныхъ можетъ быть сдѣлано только путемъ микроскопическаго изслѣдованія кала (на присутствіе струнцовыхъ яицъ).

Изгнаніе
крупныхъ
аскаридъ.

Цытварное сѣмя является наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ для изгнанія струнцовъ изъ кишечника. Для этой цѣли его можно дать въ видѣ порошка или въ кашкѣ, отъ 5 до 10 гранъ, но еще лучше и удобнѣе, особенно для дѣтей, давать его въ видѣ *Сантонины* съ сахаромъ или въ лепешкахъ, въ какихъ онъ продается во всѣхъ аптекахъ. Въ каждой лепешкѣ содержится обыкновенно 1 гранъ Сантонины. Смотря по возрасту, даютъ 2—4 такихъ лепешки вечеромъ передъ отходомъ ко сну; такъ два вечера подъ рядъ; при этомъ пища должна быть легкая, особенно должно поменьше ѣсть мучнистыхъ веществъ. Лучшимъ временемъ для изгнанія струнцовъ считается время между полнолуніемъ и новолуніемъ, когда часто наблюдается и самостоятельное отхожденіе ихъ. Слабительныхъ еще средствъ при этомъ, вообще говоря, не требуется.

Гомеопатич.
лѣченіе.

Когда имѣется только подозрѣніе на струнцовъ или когда изгнаніе по какой либо причинѣ не можетъ или не должно быть произведено, тогда противъ разстройствъ, вызываемыхъ этими глистами, весьма полезны слѣдующія лѣкарства въ гомеопатическихъ дозахъ:

Цина $\times 2$ — $\times 3$. Зябкость или ознобъ по вечерамъ съ ма-

лымъ учащеннымъ пульсомъ, безсонница или тревожный сонъ, бредъ. Капризность. Умственная тупость. Расширены зрачки. Постоянный зудъ въ носу. Растройства со стороны желудка и кишекъ. Непроизвольное мочеотдѣленіе.

Нуксъ-вомика 3. Вздутость и чувствительность живота съ ощущеніемъ жара въ немъ. Запоръ или твердые испражнения, позывы на рвоту. Сильная общая раздражительность съ ухудшеніемъ страданій по утрамъ.

Хина × 3. Давящія боли въ животѣ послѣ каждой ѣды, изжога, обильное скопленіе слюны во рту; чрезмѣрная чувствительность, подергиванія мышцъ, общая слабость.

Кромѣ того показаны еще бываютъ: *Белладонна*, *Меркурій*, *Спигелія*, *Пульсатилла*, *Калькарея карбоника* (см. „Лѣкарствовѣдніе“).

Діета, какъ при хроническомъ катаррѣ желудка. Избѣгать употребленія сладостей и большихъ количествъ мучнистыхъ веществъ, особенно—печеній.

2. Мелкая аскарида, острица.

(*Oxyuris vermicularis*).

Представляетъ маленькаго, тонкаго, бѣлаго круглаго глиста, длиною 3—5 милим. (самецъ) и 9—12 милим. (самка), и имѣетъ загнутую и прямую шиловидную форму. Водится и размножается во всѣхъ частяхъ кишекъ, но больше въ слѣпой кишкѣ, особенно же много этихъ аскаридъ въ прямой кишкѣ, гдѣ оплодотворенныя самки откладываютъ свои яйца; иной разъ онѣ выходятъ изъ кишки наружу и ползаютъ вокругъ задняго прохода по влажной кожѣ.

Острицы развиваются исключительно отъ попаданія зрѣлыхъ яицъ ихъ въ желудокъ человѣка. а разъ уже онѣ завелись у послѣдняго, то въ такомъ случаѣ имѣется постоянный источникъ для дальнѣйшаго самозараженія и для передачи другимъ, главнымъ образомъ черезъ посредство рукъ; именно сильный зудъ, вызываемый особенно ночью острицами у задняго прохода, побуждаетъ страдающаго имъ къ расчесамъ, отчего пальцы и ногти засоряются яйцами или даже цѣльными самками. Это происходитъ часто во время сна. Если затѣмъ пальцы подносятся ко рту, или ими захватывается пища, или если дѣти, по дурной привычкѣ, грызутъ свои ногти, то яйца легко попадаютъ въ ротъ. Вообще нечистота

Пути зараженія мелкими аскаридами.

и неопрятность служат главными причинами заражения или самозаражения острицами.

Приобрѣтенію и размноженію острицъ способствуютъ также хроническіе катарры кишекъ, сопровождающіеся обильнымъ образованиемъ слизи. Острицы въ водѣ погибаютъ, поэтому съ питьевой водой онѣ не могутъ быть занесены. Поэтому и болѣзни, сопровождающіяся частыми жидкими испражнениями, препятствуютъ осѣдлости острицъ, какъ и кишечныхъ паразитовъ вообще.

**Симптомы
при мелкихъ
аскаридахъ.**

Острицы вызываютъ въ организмѣ какъ мѣстные, такъ и общія страданія. Мѣстные страданія имѣются только въ прямой кишкѣ и выражаются невыносимымъ щекотаніемъ и болѣзненнымъ зудомъ, которые подавляются больными посредствомъ разнообразныхъ движеній, треніемъ и ковыряніемъ пальцами, бѣганьемъ взадъ и впередъ по комнатѣ. У женщинъ страданія вызываются еще и заползаніемъ острицъ во влагалище и выражаются сильнымъ раздраженіемъ полового органа, ведущимъ часто, особенно дѣтей, къ рукоблудію. Общія разстройства касаются главнымъ образомъ нервной системы и питания и служатъ послѣдствиемъ мучительныхъ мѣстныхъ страданій.

**Мѣры
противъ
мелкихъ
аскаридъ.**

Однѣ лишь мѣстные мѣры, къ которымъ относятся именно клистиры, приносятъ только паллиативную, временную помощь, такъ какъ ими можно удалить и уничтожить только тѣхъ острицъ, которыя находятся въ самомъ нижнемъ отдѣлѣ кишекъ. Поэтому и болѣзнь является очень часто весьма упорной, и въ болѣе трудныхъ случаяхъ не остается ничего больше, какъ, кромѣ клистировъ, давать нѣкоторое время и внутреннія слабительныя средства для механическаго удаленія изъ кишечника острицъ въ наивозможной мѣрѣ. Изъ слабительныхъ средствъ всего пригоднѣе для этой цѣли минеральныя слабительныя соли. Клистиръ всего лучше дѣлать изъ настоя чесноку, для чего нѣсколько золотниковъ послѣдняго — по возможности свѣжаго — обдають нѣсколькими стаканами кипятку и даютъ настояться; вливаютъ же въ кишечникъ въ достаточно остуженномъ видѣ. Это повторяютъ разъ въ день, въ течение нѣсколькихъ дней, пока исчезнуть острицы и вызываемыя ими явленія. Затѣмъ даютъ гомеопатическія лѣкарства для устраненія всѣхъ тѣхъ разстройствъ, которыя имѣются со стороны пищеваренія и проч., во всякомъ же случаѣ—*Калькафеа карбоника*, *Сульфуръ*, *Феррумъ*. Діета — какъ при крупныхъ аскаридахъ.

3. Трихина.

Встрѣчающаяся въ мясѣ свиней равно какъ и нѣкоторыхъ другихъ животныхъ (мышей, кроликовъ, собакъ), но никогда не въ мясѣ жвачныхъ, спиральная трихина, попадая въ человѣческій пищеварительный каналъ и размножаясь, порождаетъ здѣсь безчисленное множество зародышей, которые проникаютъ въ мышечное мясо всего тѣла и вызываютъ чрезвычайно бурное и опасное разстройство его. Для предохранения отъ этой болѣзни имѣется лишь одно средство, а именно; свиное мясо ѣсть не иначе, какъ только хорошо проваренное, прожаренное или сильно прокопченное, такъ какъ при этихъ условіяхъ заключенныя въ обызвествленныхъ капсулахъ трихины погибаютъ и становятся, по причинѣ своей безжизненности, безвредными для человѣка. Обязательное же изслѣдованіе свиного мяса на трихины имѣетъ лишь относительное значеніе, такъ что разумнѣе не ѣсть сырого свиного мяса, даже—признаннаго свободнымъ отъ этихъ паразитовъ. Отравленіе трихинами вначалѣ обнаруживается симптомами жестокаго остраго желудочно кишечнаго катарра, но, какъ только трихины проникли въ мышцы, является отечное припуханіе вѣкъ, къ которому присоединяются отеки въ другихъ частяхъ тѣла, боль и круженіе головы, жаръ до 39,5—40° Ц. и сильнѣйшія боли въ различныхъ мышечныхъ группахъ, усиливающіяся отъ давленія и движенія и облегчающіяся при полномъ покоѣ. Боли эти, приковывающія больного къ постели, продолжаются недѣли 2—4, и затѣмъ при паденіи температуры и обильныхъ потахъ наступаетъ медленное улучшение. Въ тяжелыхъ же случаяхъ болѣзнь принимаетъ тифозный характеръ и смерть наступаетъ вслѣдствіе упадка сердечной дѣятельности (параличъ сердца).

Въ первые часы отравленія только энергичное рвотное средство можетъ спасти больного отъ размноженія трихинъ и распространенія ихъ въ тѣлѣ. Разъ этотъ моментъ пропущенъ, то лѣчение можетъ быть лишь чисто симптоматическое (см. „боли“, „лихорадочныя болѣзни“, „тифъ“ и проч.). Какъ специфическое средство рекомендуется *Ферр.-ацетик. А* (*Радемахера*), 3 раза въ день по 10—15 капель въ стаканъ воды.

Путь зара-
женія и симп-
томы

III. Эхинококкъ печени.

Эхинококкъ есть ленточный глистъ особаго строенія, имѣющій въ длину около 4 миллиметровъ и состоящій изъ головки и 3 члениковъ, изъ которыхъ лишь послѣдній достигаетъ половой зрѣлости и содержитъ въ себѣ зародышевыя яйца. Хозяиномъ-носителемъ эхинококка въ развитомъ видѣ является собака, также волкъ и шакалъ. У человѣка развивается лишь молодая форма этого глиста изъ зародышевыхъ яицъ послѣдняго, попавшихъ въ его пищеварительный каналъ. Отсюда, еще не вполне выясненнымъ путемъ, яйца эти попадаютъ въ разные органы, наиболѣе часто, именно, въ печень. Распознавание эхинококка печени возможно лишь тогда, когда онъ размножился ужъ настолько, что объемъ печени замѣтно увеличился и когда эхинококковые пузыри находятся близко къ поверхности ея, и прощупывается ограниченная зыблящая опухоль. Въ другихъ же случаяхъ надо разобратся въ отличіяхъ этой опухоли отъ опухолей печени, вызываемыхъ другими причинами, или отъ болѣзней сосѣднихъ органовъ. Но это уже дѣло врачебнаго изслѣдованія, для не врачей же можно привести нѣсколько различительныхъ указаній, касающихся, именно, причины болѣзни, возраста, общаго состоянія питанія, сопровождающихъ симптомовъ.

Распознаваніе
и отличіе
отъ другихъ
болѣзней.

При циррозѣ печени предшествовавшее злоупотребленіе спиртными напитками; далѣе: увеличенная селезенка, опухоль селезенки.—При нарывѣ печени: потрясающіе ознобы, изнурительная лихорадка, поты, увеличивающееся исхуданіе.—При сифилисѣ печени: измѣненія на кожѣ, слизистыхъ оболочкахъ, въ костяхъ, на половыхъ органахъ.—При ракѣ печени: пожилой возрастъ больного, его исхуданіе и проч.—У дѣтей и въ глубокой старости эхинококкъ не встрѣчается.

Ростъ эхинококка печени очень медленный и можетъ продолжаться годами, можетъ и остановиться, вслѣдствіе самоумиранія глиста, и подвергнуться распаду, что представляетъ для больного наиболѣе пріятный исходъ.

Лѣченіе. Лѣченіе эхинококковой опухоли печени принадлежитъ къ области хирургіи, лѣкарственное же лѣченіе (іодистый кали, меркуріальныя препараты, камала, компрессы изъ раствора поваренной соли и проч.) даютъ очень мало надежды на успѣхъ. Оперативное вмѣшательство заключается въ высасываніи содержимаго

Лѣченіе.

опухоли посредствомъ тонкаго троакара (насоснаго прибора) или во вскрытіи ея. Успѣхъ операціи зависитъ отъ того, одногнѣзна или многогнѣзна опухоль. Въ послѣднемъ случаѣ надежды и отъ операціи мало.

Но если лѣченіе эхинококка такъ затруднительно (а при нахожденіи его въ другихъ органахъ, напримѣръ—въ мозгу, и совсѣмъ безнадежно), то за то предохраненіе себя отъ заболѣванія имъ въ значительной мѣрѣ возможно. Выше уже сказано, что посредникомъ въ передачѣ эхинококка человѣку надо считать почти исключительно собаку. Отсюда вытекаетъ и способъ предохраненія: обереганіе пищевыхъ продуктовъ и кухонной посуды отъ загрязненія собачьими испражненіями, которыя могутъ къ нимъ и прямо примѣшаться и черезъ посредство собачьяго рта, ибо во рту собаки могутъ очутиться эхинококковыя яйца вслѣдствіе облизыванія ею задней части у себя или у другой собаки. Это же надо имѣть въ виду тѣмъ, которыя даютъ собакѣ лизать себѣ руку или лицо. Если нельзя себѣ въ этомъ удовольствіи вовсе отказать, то надо, по крайней мѣрѣ, помнить послѣ каждой такой ласки собаки тщательно вымыть облизанныя послѣднюю части. Надо заботиться и объ общей чистотѣ и опрятности въ домашнемъ обиходѣ, а также о чистомъ содержаніи собакъ, если онѣ имѣются въ домѣ.

Предохранительныя мѣры.

ОТДѢЛЪ СЕДЬМОЙ.

Болезни дыхательныхъ органовъ.

Содержаніе этого отдѣла: Предварительныя замѣтки.—А. Болезни носа и носоглотки.—Б. Болезни гортани.—В. Болезни дыхательнаго горла и бронховъ.—Г. Болезни легкихъ.—Д. Болезни плевры.—Добавленіе: Болезни железъ щитовидной и зубной и грудныхъ железъ.

Предварительныя замѣтки.

Дыхательные органы, сообщающіеся съ окружающимъ воздухомъ посредствомъ носа и рта, расположены въ области шеи и въ грудной клѣткѣ и состоятъ изъ гортани, дыхательнаго горла и легкихъ. Носъ является органомъ не только для дыханія, но и для обоня-

нія, и имѣть прямое сообщеніе съ органами пищеваренія. Щитовидная и зубная железа, также грудныя железы, хотя не имѣютъ никакого функціональнаго отношенія къ процессу дыханія, но рассматриваются въ этомъ отдѣлѣ въ виду ихъ близкаго сосѣдства съ дыхательными органами.

**Строеніе
носа.**

Костяной остовъ носа находится между глазными орбитами, остальная же часть носа состоитъ изъ хрящей. Полость носа раздѣлена перегородкою на два боковыхъ отдѣленія и находится въ сообщеніи съ нѣсколькими смежными полостями (кверху—съ лобными пазухами, по бокамъ съ полостью черепа, книзу и кнаружи—съ гайморовой полостью). Кпереди (ноздри) и кзади полость носа открыта; кзади, именно, посредствомъ хоанъ, въ полость глотки (носоглотка). Въ каждомъ изъ двухъ отдѣленій носовой полости выдающимися по бокамъ хрящевыми раковинами образуются три носовыхъ хода: верхній, средній и нижній. Полость носа выстлана слизистой оболочкой, въ которой развѣтвляются нервы и кровеносные сосуды.

**Гортань, ея
строеніе**

Гортань (ларинксъ) лежитъ на передней части шеи впереди нижней части глотки, близъ подъязычной кости, состоитъ изъ хрящей, соединенныхъ между собою связками и мышцами, и внутри выстлана слизистой оболочкой. У входа въ гортань имѣется надгортанный хрящъ (надгортанникъ), служащій для закрытія входа въ гортань во время проглатыванія пищи и питья. Въ начальной части гортани имѣются голосовыя связки, представляющія двѣ пары волокнистыхъ снурковъ и направленные спереди назадъ: одна пара—верхнія или ложныя голосовыя связки, другая пара—нижнія или собственно голосовыя связки. Продольный промежутокъ между обоими нижними голосовыми связками называется голосовою щелью.

**Дыхательное
горло**

Дыхательное горло или трахеа—продолженіе гортани къ легкимъ, представляетъ трубку, состоящую изъ ряда соединенныхъ между собою хрящевыхъ колецъ и идущую по передней поверхности позвоночнаго столба, отъ пятаго шейнаго до третьяго груднаго позвонка за грудной доской и большими сосудами, идущими отъ сердца.

Бронхи.

Въ нижнемъ концѣ дыхательное горло дѣлится на правую и лѣвую, болѣе узкія, трубки, называемыя бронхами; бронхи въ свою очередь также развѣтвляются и идутъ къ легкимъ. Дыхательное горло выстлано внутри слизистой оболочкой съ слизистыми железами, нервами и проч.

Легкія выполняютъ собою большую часть грудной полости и раздѣляются на двѣ части—правое и лѣвое легкое, между которыми находится сердце съ отходящими отъ него сосудами. Ткань легкихъ состоитъ изъ дальнѣйшихъ развѣтвленій бронховъ, причемъ мельчайшія конечныя вѣтки переходятъ, наконецъ, въ маленькіе замкнутые булавовидные мѣшечки, вокругъ которыхъ имѣется масса маленькихъ пузырьковъ (легочныхъ пузырьковъ или воздушныхъ клѣточекъ). Развѣтвленія бронхіальныхъ трубокъ сопровождаются легочными сосудами, переходящими въ волосную сѣть сосудовъ, обрамляющую легочные пузырьки и мелкія воздушныя трубочки. Бронхи, болѣе крупныя и мелкіе, имѣютъ еще хрящевую основу, которая, чѣмъ дальше въ глубь легкаго, тѣмъ все болѣе уменьшается и, наконецъ, совсѣмъ исчезаетъ, и остается лишь очень тонкая и нѣжная соединительная ткань съ заключающимися въ ней кровеносными сосудцами.

Легкія, ихъ строеніе.

Плевры суть тонкія сывороточныя перепонки, которыя, образуя замкнутыя мѣшки, покрываютъ поверхности легкихъ и выстилаютъ внутреннюю поверхность грудной клѣтки. Такимъ образомъ каждая плевра—правая и лѣвая—дѣлится на два главныхъ отдѣла: на подреберную и на легочную плевру.

Плевры.

А. Болѣзни носа и носоглотки.

Содержаніе этого (А) под-отдѣла: 1) Насморкъ, Катарръ носа и носоглотки острый и хроническій. — 2) Сѣужение и закрытіе носовой щели, Полипы. — 3) Кровотеченіе изъ носа.

1. Насморкъ. Катарръ носа и носоглотки.

Острая форма насморка появляется внезапно, въ большинствѣ случаевъ—вслѣдствіе простуды, сопровождаясь часто еще и другими простудными состояніями, какъ боль головы, боль въ членахъ, кашель и проч. Многие люди отличаются особенной подверженностію этому заболѣванію. Далѣе насморкъ можетъ произойти вслѣдствіе прямыхъ раздраженій слизистой оболочки, вдыханія пыли, горячаго воздуха, также отъ механическихъ поврежденій, равно какъ сопровождается и разныя болѣзни, какъ корь, рожа лица, коклюшъ, скарлатина, а также бываетъ при употребленіи нѣкоторыхъ лѣкарствъ въ большихъ дозахъ (іодъ, кали-іодат.). Есть люди, которые не могутъ войти въ помѣщеніе, гдѣ находится порошокъ рвотнаго

Острый насморкъ.

корня, чтобы не нажать себѣ насморка. Нерѣдко и запахъ духовъ вызываетъ насморкъ. Въ эпидемической формѣ насморкъ является при гриппѣ (см. „инфлуэнца“), но ошибочно многіе называютъ острый насморкъ, сопровождающійся лихорадкой, гриппомъ, между тѣмъ какъ эти двѣ болѣзни совершенно различныя (о гриппѣ см. ниже).

**Симптомы
острого на-
сморка.**

Симптомы острого насморка настолько общеизвѣстны, что нѣтъ надобности ихъ перечислять подробно. Отдѣленіе въ началѣ жидкое, сывоточное, становится затѣмъ густымъ, слизистымъ, гноевиднымъ; катарръ является иной разъ, особенно въ началѣ, сухимъ, съ припухlostью слизистой оболочки, производящей суженіе и даже прямо закрытіе носа. Насморкъ часто переходитъ на сосѣдніе органы и ткани. Такъ, кожа у ноздрей набухаетъ и краснѣетъ, что зависитъ отъ стекающихъ отдѣленій и частаго сморканія. Насморкъ нерѣдко служитъ причиной рожи лица. Катарръ можетъ перейти на глотку и въ евстахіеву трубу, вызывая шумъ въ ушахъ, тугость слуха и т. д., или въ гайморову полость, вызывая боль въ щекѣ; съ глотки онъ можетъ спуститься еще ниже, на гортань, дыхательное горло и бронхи. Черезъ слезно-носовой каналъ катарръ можетъ перейти и на глаза. При переходѣ катарра на лобныя пазухи значительно усиливается головная боль. Нерѣдко наблюдается и осложненіе со стороны лимфатическихъ железъ, которыя опухаютъ; особенно это бываетъ у золотушныхъ. Острый катарръ носа часто, но далеко не всегда, передается отъ одного лица къ другому при болѣе близкомъ общеніи.

**Хроническій
насморкъ.**

Хроническій насморкъ развивается большей частью на почвѣ худосочія, особенно золотухи и сифилиса, также малокровія. Затяжной, хроническій насморкъ можетъ развиваться и у нехудосочныхъ людей изъ дурно лѣченного острого насморка или при непрекращающемся дѣйствиі болѣзнетворной причины.

**Симптомы
хроническаго
насморка.**

Хроническій катарръ носа можетъ быть влажный и сухой; сухимъ онъ является обыкновенно въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни, въ застарѣлыхъ случаяхъ, вслѣдствіе сморщиванія (атрофіи) слизистой оболочки. При влажной формѣ хроническаго насморка выдѣленіе болѣе или менѣе обильно и имѣетъ преимущественно гнойный характеръ, притомъ же, часто, настолько густо, что ведетъ къ образованію корокъ въ носу. Корки эти зеленоватаго цвѣта или, если содержатъ кровь или попадающія въ носъ окрашенныя частички (пыль, сажа и проч.), они могутъ имѣть и пестрый видъ. Величина ихъ различна и онѣ часто настолько крѣпко

сидять на слизистой оболочкѣ, что съ трудомъ отмываются водой. Такого рода выдѣленіе изъ носа подвергается часто процессу разложенія, слѣдствіемъ чего является особенное зловоніе, дающее себя чувствовать даже въ отдаленіи отъ больного и напоминающій собою запахъ раздавленныхъ клоповъ (отсюда французское названіе *rhinai sie*). Такой вонючій насморкъ носитъ названіе озэна.

Страданія больныхъ при хроническомъ насморкѣ зависятъ отъ степени болѣзни; иногда они весьма незначительны и даже вовсе отсутствуютъ, иногда же весьма тяжелы. Въ послѣднемъ случаѣ набуханіе слизистой оболочки можетъ вести къ затрудненію дыханія и даже къ астматическимъ припадкамъ; кромѣ того больные жалуются часто на тяжесть и давленіе или боль въ головѣ, на общую вялость и неохоту къ труду, на мрачное, угнетенное настроеніе, головокруженіе и проч. Обоняніе во многихъ случаяхъ ослаблено или потеряно. При озэнѣ же главной жалобой больного является зловоніе, которое чувствуется и самимъ больнымъ и окружающими и дѣлаетъ пребываніе его среди людей крайне стѣснительнымъ. — Хроническій катарръ можетъ перейти и на сосѣдніе органы и ткани: на глотку, на боковыя полости носа и проч. Болѣзнь эта—упорная, особенно—атрофическая ея форма, но все же, хотя не легко и не скоро, поддается лѣченію, часто до степени полного излѣченія.

При остромъ простудномъ насморкѣ, въ первыя сутки, достаточенъ для прекращенія его *Аконитъ* $\times 3$, черезъ 1—2 часа по приему. Если имѣется приливъ къ головѣ, боль и жаръ или сухость въ носу, тѣмъ болѣе—боль въ горлѣ, то уместна, попеременно съ *Акон.*, и *Белладонна* $\times 3$. При дальнѣйшемъ теченіи насморка *Аконитъ* можно оставить и принимать *Беллад.* попеременно съ *Меркур. солуб.* $\times 3$, особенно при слизистомъ выдѣленіи изъ носа. Если выдѣленіе — водянистое и притомъ ощущается жженіе и колотье въ корнѣ носа и разѣданіе кожи у ноздрей и на верхней губѣ, то, вмѣсто Меркурія, больше подходитъ *Арсеник.* $\times 3$. При одновременномъ пораженіи гортани, дыхательнаго горла и бронховъ примѣняются лѣкарства, указанные ниже при катаррѣ этихъ органовъ. Когда выдѣленіе стало густымъ, желтымъ, полезно принимать до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ насморкъ совсѣмъ, *Пульсатилла* $\times 3$ попеременно съ *Гепаръ сульфурисъ* 3 — 6. У маленькихъ дѣтей *Хамомилла* и *Пульсатилла* останавливаютъ часто насморкъ уже въ самомъ началѣ. — При сухомъ насморкѣ: *Нуксъ-вомика* 3 (давящая боль

Лѣченіе
остраго
насморка

во лбу съ ощущеніемъ жара въ головѣ и лицѣ и ухудшеніемъ по утрамъ; также при сухомъ залеганіи носа у новорожденныхъ);
Бріонія 3 (при сухомъ кашлѣ и колотьи въ груди).

Лѣченіе
хроническаго
насморка.

При лѣченіи хроническаго насморка надо принимать во вниманіе какъ мѣстныя измѣненія въ носу и носоглоткѣ, такъ и основную причинную болѣзнь. Для выбора лѣкарствъ приводятся ниже слѣдующія указанія.

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи хроническаго катарра носа и носоглотки.

Калькареа-карбоника 3—6. Обильное выдѣленіе, гноевидное, иногда съ кровью смѣшанное; по утрамъ выдѣленіе уменьшается, причемъ является сильная головная боль. Набуханіе и разрыхленіе слизистой оболочки, изъязвленіе кожи у ноздрей. Золотуха. Хриплый, обложенный голосъ, особенно по утрамъ, съ улучшеніемъ послѣ отхаркиванія.

Сенія—3. Залегающій насморкъ, затрудненное дыханіе, тупая головная боль, шумъ въ ушахъ. Сухость въ носоглоткѣ съ скопленіемъ въ глоткѣ, понуждающимъ къ постоянному харканью; ощущеніе клина въ горлѣ, особенно по вечерамъ; хрипкость, сухой щекочущій кашель, особенно ночью.

Силиція 3—6. Выдѣленіе слизистое, тягучее, гноевидное, въ утренніе часы часто задерживающееся. Одновременное хроническое воспаленіе миндалинъ и безболѣзненная опухоль подъязычныхъ железъ.

Графитъ 3—6, также *Антимоній круд. 3—6.* Выдѣленіе гноевидное, вонючее, часто перемѣшанное съ кровью; изъязвленіе ноздрей; запахъ въ носу, какъ отъ жженныхъ волосъ; одновременный катарръ зѣва съ ощущеніемъ жесткости и царапанья въ горлѣ; по вечерамъ охрипость. Тугость слуха.

Плумбумъ ацетик. 6. Хроническій катарръ носоглотки при одновременномъ катаррѣ зѣва съ ощущеніемъ какъ бы инороднаго предмета въ глоткѣ, который при глотаніи какъ бы опускается книзу. Ослизненіе дыхательнаго горла и сиплый, грубый голосъ. Залеганіе носа.

Аргент. нитрик. 3. Залеганіе носа и носоглотки; выдѣленіе гноевидное, смѣшанное съ кровью; скопленіе тягучей слизи въ горлѣ, понуждающей къ постоянному харканью и откашливанію.

Алюмина 3—6. Густое, тягучее, гноевидное выдѣленіе съ скопленіемъ соленоватой слизи въ горлѣ, понуждающей къ постоян-

ному отхаркиванію; саднящая боль въ горлѣ съ жесткостью и жженіемъ; хрипкость и частый щекочущій кашель.

Бромъ 3. Давнишній, упорный катарръ съ изъязвленіемъ въ носу и у ноздрей, ощущеніе сухости и жженія во рту.

Ацид. флуорик. 3—6. Ощущеніе полноты во лбу; тугость слуха вслѣдствіе одновременнаго катарра евстахіевой трубы съ болью въ послѣдней и садненіемъ въ горлѣ.

Ранункулусъ 3. Большая сухость въ носу съ образованіемъ корокъ, не поддающихся удаленію; катарръ зѣва.

Арумъ трифилл. × 3. Ъдкое выдѣленіе изъ носа съ изъязвленіемъ ноздрей и верхней губы, съ опуханіемъ послѣдней; потребность постоянно ковырять подъ носомъ; одновременный катарръ зѣва. Особенно у дѣтей. Сильное безпокойство.

Кали бихромик. 3. Комковатое выдѣленіе зеленой слизи, выхаркиваемое изъ носоглотки, особенно по утрамъ. Изъязвленія въ носу и глоткѣ, особенно сифилитическаго происхожденія.

Фосфоръ 3. Зеленое слизистое выдѣленіе съ кровяными жилками, вонючій насморкъ.

Сульфуръ 3—6. Образованіе корокъ въ носу; носъ, особенно у ноздрей, опухаетъ и кровоточитъ; залеганіе носа, особенно въ комнатѣ, тогда какъ на свѣжемъ воздухѣ дыханіе носомъ свободнѣе.

Кали карбоник. 3. Насморкъ съ хрипlostію и потерей голоса; большая простужаемость; ощущеніе комка въ горлѣ съ потребностію проглотить. Склонность къ ожирѣнію тѣла.

При вонючемъ насморкѣ (озенѣ) на почвѣ золотухи показаны прежде всего: *Кальк. карб., Сульфуръ, Графитъ, Фосфоръ, Пульсатилла, Силиція.*—При озенѣ сифилитической: *меркуріальныя и іодистыя* лѣкарства, если они раньше не употреблялись въ аллопатическихъ дозахъ; въ послѣднемъ же случаѣ: *Арумъ муриат., Гепаръ сульф., Ацид. нитрик., Кали бихромик., Ацид. флуорик.*—При озенѣ на почвѣ малокровія: *Фосфоръ, Феррумъ, Пульсат., Калькар. фосфорика.*

О дозахъ, пріемахъ и дѣленіяхъ см. ч. 1., гл. 3 и 4.

При легкомъ остромъ насморкѣ не требуется никакихъ вспомо-
гательныхъ мѣръ, достаточно лишь пребываніе въ
равномѣрно-тепломъ помѣщеніи въ холодное время года или при
ненастной погодѣ. Если же насморкъ болѣе сильный, тѣмъ бо-
лѣе—сопровождающійся лихорадочнымъ состояніемъ, лучше всего
лечь въ постель; полезно при этомъ попивать что-либо теплое,
не стремясь, однако, во что бы то ни стало вызвать испарину.

При болѣзненности въ носу цѣлесообразно смазывать въ ноздряхъ подогрѣтымъ прованскимъ или миндальнымъ масломъ или топленнымъ свинымъ саломъ, или же мазью - или масломъ *Пульсатилла* или—*Гидрастисъ*.

Въ хроническихъ случаяхъ, или при подверженности воротамъ остраго насморка, главную заботу должно составлять систематическое (постепенное) закаливаніе организма противъ простудныхъ вліяній. Для этого служатъ: ежедневныя (утромъ съ постели) обмыванія или влажныя обтиранія тѣла (18—20° R.), прохладныя ванны, лѣтомъ—купанье въ рѣкѣ; промываніе носа, посредствомъ носового душа) 18—20- градусной водой, также растворомъ *Календула* Θ , *Гидрастисъ* Θ (30—40 капель на стак. воды); при коркахъ въ носу—смазываніе мазями изъ тѣхъ-же лѣкарствъ. Соотвѣтствующая погодѣ, но не слишкомъ теплая одежда; главнымъ образомъ надо заботиться о тепломъ содержаніи ногъ. Нераздражающая пища: молочная и растительная (овощи, зелень, фрукты), мало мяса.

2. Суженіе и закрытіе носовой полости. Полипы носа.

Причины.

Полость носа можетъ быть сужена или закрыта въ одной только половинѣ его или въ обѣихъ. Причиной можетъ быть прирожденный порокъ или таковой вслѣдствіе какой либо пріобрѣтенной болѣзни носа. Къ прирожденнымъ порокамъ относятся: выгнутая въ одну сторону перегородка носа, костныя отложенія на раковинахъ носа, утолщеніе перегородки и проч. Пріобрѣтенное суженіе или закрытіе встрѣчается при остромъ и хроническомъ катаррѣ слизистой оболочки носа, при опухоляхъ въ полости носа, особенно при полипахъ, наконецъ и при инородномъ тѣлѣ въ полости носа.

При нормальныхъ условіяхъ воздухъ вдыхается въ легкія черезъ носъ при большей частью закрытомъ ртѣ, что очень важно въ разныхъ отношеніяхъ: воздухъ, проходя черезъ полость носа, успѣваетъ согрѣться раньше, чѣмъ попасть въ дальнѣйшіе дыхательные пути; кромѣ того пылеобразныя частицы, вдыхаемыя съ воздухомъ, осаждаются на обширной поверхности, представляемой слизистой оболочкой носа. При продолжительномъ или невозможномъ дыханіи носомъ и необходимости втягиванія воздуха ртомъ, кромѣ того, что попадаемый въ легкія воздухъ можетъ быть загрязненъ или недостаточно согрѣтъ, получается высыханіе рта и

и глотки, да и общія разстройства со стороны нервнодушевной системы и питанія. Особенно сильны и даже опасны послѣдствія закрытія носа у грудныхъ младенцевъ по той причинѣ, что имъ во время кормленія приходится подолгу сосать, чего они, однако, въ такомъ случаѣ, изъ за недостатка воздуха, дѣлать не могутъ. Но и помимо затрудненнаго сосанія, закрытіе носа у грудныхъ младенцевъ можетъ вызывать у нихъ припадки удушья по той причинѣ, что они дышатъ во время сна исключительно носомъ. Астматическіе припадки вслѣдствіе закрытія носа наблюдаются иногда и у взрослыхъ, напимѣръ при полипахъ, особенно во время сна. При закрытіи носа нарушается обонаніе, выдѣленіе мокротъ, также и произношеніе словъ; измѣняется даже общій обликъ (глупое выраженіе лица вслѣдствіе сглаживанія носогубныхъ складокъ при привычномъ ротовомъ дыханіи). Страдаетъ также и слухъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда причиной суженія или закрытія полости носа служить врожденный порокъ (см. выше), лѣкарственное лѣченіе никакой пользы не принесетъ, а необходимо хирургическое лѣченіе, отчасти и чисто механическое (расширеніе полыми бужами и т. п.). У маленькихъ (грудныхъ) дѣтей можетъ потребоваться искусственное кормленіе изъ ложечки. Надо еще замѣтить, что часто ухудшеніе бываетъ отъ того, что ребенка кладутъ плашмя; поэтому его слѣдуетъ класть съ приподнятой головкой.

Къ области хирургіи относятся, вообще говоря, и опухоли носовой полости, между прочимъ и полипы, особенно тѣ изъ послѣднихъ, которые развиваются какъ самостоятельныя новообразованія. Но тѣ полипы, которые развиваются на почвѣ хроническаго катарра слизистой оболочки, проходятъ часто и безъ оперативнаго вмѣшательства при одномъ гомеопатическомъ лѣченіи. Изъ лѣкарствъ, примѣняемыхъ при носовомъ полипѣ, главныя суть: *Тевкріумъ*, преимущественно наружно въ видѣ вдунанія или втягиванія въ носъ порошка изъ растертыхъ листьевъ свѣжаго растенія (дубравника), также внутрь въ дѣленіяхъ, попеременно съ *Калькареа карбоника*, особенно при сѣрыхъ слизистыхъ полипахъ; *Фосфоръ*, также *Стафизагрія*, *Сульфуръ*, *Туя* — при слизистыхъ мясovidныхъ полипахъ, часто кровоточащихъ. При болѣе плотныхъ полипахъ показаны: *Кали бихромик.*, *Каустик.*, *Силиція*, *Сенія*, *Гепар-сульф.* (Ср. еще лѣченіе хроническаго катарра носа). Во всякомъ случаѣ положительнаго результата

Лѣченіе.

Полипы
носовые.

можно ожидать при полипахъ развѣ лишь отъ продолжительнаго лѣкарственнаго лѣченія. Если же дыханіе изъ-за сѣуженія или закрытія носовой полости значительно нарушено, то цѣлесообразнѣе обратиться сряду же къ спеціальной, хирургической помощи.

Попавшее въ полость носа инородное тѣло удаляется чиханіемъ, которое всего лучше вызывать вдуваніемъ въ ность нюхательнаго табака, а если этотъ пріемъ не приводитъ къ цѣли, то надо для извлеченія его (съ помощью ложкообразныхъ или окончатыхъ инструментовъ) обратиться къ врачу (хирургу).

3. Кровотеченіе изъ носа.

Причины и
слѣдствія.

Носовое кровотеченіе бываетъ при застояхъ крови въ головѣ, также при сердечныхъ страданіяхъ, при лихорадочныхъ болѣзняхъ, воспаленіи легкихъ, тифѣ, при сильномъ душевномъ волненіи, вслѣдствіе возбуждающихъ напитковъ. Поврежденіе слизистой оболочки носа, равно какъ ~~и~~ ^исдираніе ногтями внутреннихъ корокъ и присохшихъ язвенокъ, можетъ вызвать кровотеченіе изъ носа. Обыкновенно кровь вытекаетъ изъ одной ноздри, рѣже изъ обѣихъ. Черезъ заднее (глоточное) отверстіе носа (хоаны) часть крови, иногда даже вся истекающая кровь (во снѣ при лежаніи на спинѣ или въ безсознательномъ состояніи больного) попадаетъ въ зѣвъ и гортань или желудокъ; въ этихъ случаяхъ кровь извергается обратно кашлемъ, рвотой или кишечными испражненіями и можетъ подать поводъ къ ошибочному опредѣленію болѣзни. Поэтому надо знать, что легочная кровь краснѣе и пѣниста, кровь желудочная — коричнево-красная и не такъ быстро свертывается, какъ кровь изъ носа. Кровотеченіе изъ носа, если только оно, недолго продолжается и не сильно вообще, не только не опасно, но часто приноситъ даже облегченіе больному, на примѣръ при головной боли вслѣдствіе прилива или при кровотеченіи, замѣщающемъ регулы. Наоборотъ, сильное, частое или продолжительное кровотеченіе истощаетъ больного и можетъ быть даже опасно для него, поэтому требуетъ надлежащаго лѣченія.

Вспомогательныя мѣры.

При каждомъ сколько нибудь обильномъ кровотеченіи изъ носа надо прежде всего пытаться остановить кровь прижатіемъ снаружи; соответствующее крыло носа прижимаютъ къ носовой перегородкѣ такъ, чтобы закрыть ноздрю вмѣстѣ съ передней и верхней частью носовой полости. Больной долженъ сохранить возможно большее спокойствіе духа, не дѣлать излишнихъ дви-

женій, не говорить, не сморкаться, а стараться дышать возможно спокойнѣе. Окружающіе не должны выказывать безпокойной суетливости, а дѣлать лишь то, что требуется въ этомъ случаѣ. Больному всего лучше придать прямое сидячее положеніе съ слегка наклоненной впередъ головой; этимъ предупреждается до нѣкоторой степени стеканіе крови назадъ, въ глотку. Необходимо удалить или разстегнуть всѣ части одежды, затрудняющія отливъ крови отъ головы (тѣсный галстухъ и т. д.).

Если указанныхъ мѣръ недостаточно, то вводятъ въ кровоточащую ноздрю ватный комокъ (тампонъ), всего лучше — свернутый на спичкѣ. Кровотеченіе при этомъ въ большинствѣ случаевъ очень скоро останавливается, если этотъ комокъ смочить растворомъ изъ *Гамамелиса* Θ и воды (1 и 4 части или покрѣпче), или пропитать масляной смѣсью этого лѣкарства. Менѣе помогаетъ растворъ полуторахлористаго желѣза или такъ называемая „желѣзная вата“, приготовленная изъ этого раствора. Въ тяжелыхъ случаяхъ (наприм. при кровоточивости) можетъ потребоваться переднее и заднее тампонированіе носа (спереди и со стороны зѣва), которое можетъ быть произведено только врачомъ.

Втягиваніе или вливаніе въ носъ холодной воды не совсѣмъ цѣлесообразно, такъ какъ уже, быть можетъ, образовавшіеся сгустки крови уносятся струей воды. Холодъ же примѣнить можно въ видѣ холодныхъ компрессовъ на затылокъ и лобъ, часто смѣняемыхъ. Для отвлеченія крови отъ головы можетъ служить также прохладная ножная и ручная ванна (15° R.), въ теченіе 5—10 минутъ, съ послѣдующимъ растираніемъ конечностей шерстянымъ платкомъ до ихъ согрѣванія; для той же цѣли годится набрюшный согрѣвающій компрессъ и т. п.

Внутреннее лѣченіе во время кровотеченія. *Арника*: крово- Внутреннее
вотеченіе вслѣдствіе механическаго поврежденія, но и вообще при лѣченіе.
яркокрасной крови. — *Гамамелис*: при болѣе темной крови. — *Бріонія* и *Беллад.*: при возбужденномъ кровообращеніи. — *Нуксв.*: послѣ кофе, крѣпкаго чая и спиртныхъ напитковъ. — *Пульсат.*: при разстройствахъ регулъ. — *Ипекак.* и *Крокусъ*: при кровотеченіи у дѣтей; послѣднее также у кровоточивыхъ субъектовъ. У послѣднихъ и вообще при подверженности кровотеченіямъ изъ носа: *Намрумъ-нитр.* $\times 2$, — *Аммон.-карбон.*: при кровотеченіи, являющемся каждое утро при умываніи. — Противъ подверженности кровотеченіямъ рекомендуются еще *Аква-силиката* Θ или *Намр.-силицикумъ*. — *Дигиталис*: кровотеченія изъ носа при

сердечныхъ и легочныхъ болѣзняхъ.—*Карбо-вегет.* (также *Хина*): при слабости вслѣдствіе кровотеченій.—*Эвлекія* см. стр. 35.

Предварительное поясненіе къ нижеслѣдующимъ болѣзнямъ дыхательныхъ органовъ (под-отдѣлы: Б., В., Г., Д.).

Точное распознаваніе (діагнозъ) болѣзней дыхательныхъ органовъ, характера ихъ и степени развитія, возможно сдѣлать только на основаніи специальныхъ, врачебныхъ способовъ или приѣмовъ изслѣдованія (осмотръ специальными инструментами, „выстукиваніе“, „выслушиваніе“ и проч.), недоступныхъ лицамъ не обучавшимся таковымъ и не пріобрѣвшимъ соотвѣтствующаго навыка. Такія лица, не-врачи, въ цѣляхъ самопомощи, могутъ руководствоваться тутъ, какъ и вообще въ болѣзняхъ, только признаками или разстройствами, вызываемыми болѣзнію, т. е. симптомами ея, притомъ лишь тѣми изъ послѣднихъ, которые явны для нихъ или лишь ощущаются больнымъ, иначе выражаясь—наблюдаемой картиной болѣзни. Для точнаго же діагноза болѣзни необходимо подвергнуться врачебному освидѣтельствуванію, если надо—и дальнѣйшему наблюденію.

Лѣченіемъ, наиболѣе цѣлесообразнымъ во всѣхъ болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ, является лѣченіе гомеопатическое, и пока таковое не будетъ, наконецъ, принято вездѣ и всюду, всѣми врачами, самопомощь гомеопатическими лѣкарствами является безусловно желательной и необходимой, въ интересахъ здоровья, и при этихъ болѣзняхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ возможности получать помощь отъ врача-гомеопата.

Отдѣльныя формы болѣзней дыхательныхъ органовъ съ подробнымъ ихъ лѣченіемъ приводятся ниже. Для тѣхъ случаевъ, когда форма болѣзни еще не выяснена, руководствомъ для выбора лѣкарствъ могутъ служить главнѣйшіе симптомы болѣзней дыхательныхъ органовъ, какъ то: охриплость, безголосье, кашель, стѣсненіе или боль въ груди и проч.

Поэтому тутъ приводится

характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи охриплости, безголосья, кашля и проч.

Аконитъ × 3. Въ острыхъ случаяхъ, и именно—въ началѣ болѣзни, при лихорадочномъ состояніи; кашель сухой, жесткій, отрывистый; боль въ пораженной части, особенно при втягиваніи воздуха.

Белладона × 3. Лающий, судорожный кашель, являющийся приступами, съ щекотаніемъ въ дыхательномъ горлѣ, особенно ночью; ощущение какъ бы проглоченной пыли. Боль въ горлѣ, при глотаніи, приливъ крови къ головѣ. Головная боль, колотье въ груди. Одышка. Трудное выдѣленіе густой мокроты.

Бріонія × 3. Въ острыхъ и хроническихъ случаяхъ. Кашель изъ глубины груди, сухой, съ позывами на рвоту и даже со рвотой, особенно послѣ принятія пищи. Кашель потрясающій, какъ бы разбивающій грудь. Колотье въ груди при дыханіи. Боль въ головѣ, особенно во лбу при кашлѣ. Разстройства пищеваренія. Подходитъ особенно послѣ Акон. и Белл., но и попеременно съ ними.

Спонгія × 3. Сухой, лающий кашель, отрывистый, но продолжительный, особенно ночью; охриплость, съ жженіемъ въ горлѣ; боль въ гортани при дотрагиваніи.

Бромъ × 3 (или *Аммоній бромат.* × 2). Кашель сухой, гортанный, скребущій и щекочущій, похожій на овечій кашель, съ охриплостью. Дается въ болѣе упорномъ случаѣ (послѣ Спонгіи).

Іод. × 3. Въ острыхъ, особенно же затяжныхъ, хроническихъ случаяхъ катарра верхнихъ дыхательныхъ путей. Кашель сухой, грубый или лающий; ощущение какъ бы раны въ гортани и щекотаніе. Выхаркиваніе сѣровато-бѣлой, соленоватой или сладковатой мокроты. Жесткое, какъ бы пилящее дыханіе, также съ рѣзкимъ свистомъ и хрипѣніемъ въ горлѣ.

Меркурій солуб. 3. Въ началѣ болѣзни. Ощущеніе жесткости, жженія или раны въ гортани и глубже; охриплость или сухой потрясающій кашель, особенно вечеромъ и ночью, также съ отхаркиваніемъ густой мокроты, съ кровавыми крапинками, или водянистой. Насморкъ текучій, необлегчающій потъ. Разстройства пищеваренія, желто-обложенный языкъ, поносъ.

Гепаръ сульф. 3. Кашель болѣе мягкій, слизистый, съ болью въ гортани и особенно вечеромъ и послѣ питья. Охриплость.

Ипекакуана × 3. Особенно въ острыхъ случаяхъ. Судорожный кашель съ обильными хрипами въ груди, до рвоты; кашель можетъ быть и сухой съ позывами на рвоту; или мокрота скудная, слизистая, похожая на яичный бѣлокъ, тошнотворная; стѣсненное дыханіе до степени удушья. Желудочныя разстройства. Поты.

Нуксъ вомика × 3. Постоянное, позывающее къ кашлю раздраженіе въ горлѣ; скребленіе и жесткость въ гортани и щекотаніе въ глоткѣ и зѣвъ; кашель сухой, утомительный, съ труднымъ отхаркиваніемъ тягучей слизи, разбужающій раннимъ ут-

ромъ со сна; ухудшеніе послѣ ѣды; или кашель судорожный, со рвотой. Головная боль, запоръ, боль въ бокахъ живота.

Фосфоръ 3 (или *Фосфори ацид. × 3*). Кашель сухой щеко-чущій, крайне утомительный; жесткость и хриплость до полной потери голоса, колющая боль въ гортани, боль какъ отъ раны въ груди; кашель съ слизистой мокротой, липкой, кровянистой, гноевидной, или сладковатой, гниlostной, кислой.

Тартар. эметик. 3. Обильные хрипы въ груди, одышка, особенно послѣ ѣды и ночью; хрипы слышны уже издали; кашель до рвоты и удушья.

Пульсатилла × 3. При легко отдѣляющейся обильной мокротѣ, бѣловатожелтой съ горькимъ тошнотворнымъ вкусомъ, позывами на рвоту; хуже ночью въ постели, также при ходьбѣ, разговорѣ. Раздраженіе въ горлѣ, щекотаніе въ дыхательномъ горлѣ, одышка.

Гіосціамусъ 3. Сухой кашель. съ щекотаніемъ въ дыхательномъ горлѣ, особенно ночью и при лежаніи, легче въ сидячемъ положеніи,

Арсеник. 3. Въ хроническихъ случаяхъ. Кашель сухой, потрясающій, утомительный, особенно вечеромъ и ночью; хуже отъ питья и ѣды и при лежаніи, также отъ сырого воздуха и сухого холода, или же кашель влажный съ трудно отдѣляемой мокротой, тягучей, слизистой или гноевидной, зеленоватой или сѣрой, соленоватой или горькой на вкусъ, съ гниlostнымъ запахомъ. Одышка. Исхудалость.

Сульфуръ 3 — 6. Въ хроническихъ случаяхъ преимущественно. Кашель влажный, ночью менѣе влажный; мокрота обильная, густая, бѣлая или желтоватая. Или же кашель упорный, сухой потрясающій, со щекотаніемъ, жесткостію и охриплостію, съ колотьемъ въ груди. Особенно у ревматиковъ, подагриковъ, золотушныхъ. Ухудшеніе отъ ѣды, отъ лежанія и при движеніи на вольномъ воздухѣ, также при перемѣнахъ погоды.

Другія еще средства приводятся ниже при отдѣльныхъ формахъ болѣзней дыхательныхъ органовъ.

О дозахъ, приѣмахъ и дѣленіяхъ см. ч. 1. гл. 3 и 4.

Б. Болѣзни гортани.

Содержаніе этого (Б) подъ-отдѣла: 1. Катарръ гортани. Ларингитъ: острый (ложный крупъ) и хроническій.—2. Крупъ.—3. Отекъ гортани.—4. Туберкулезъ гортани, горловая чахотка.—5. Опухоли гортани.—6. Неврозы гортани.

1) Катарръ гортани. Ларингитъ.

а. Острый катарръ гортани.

Главной причиной остраго катаррального воспаленія (катарръ) гортани является простуда, прямо поражающая слизистую оболочку гортани, или же воспаленіе переходитъ на послѣднюю съ носа или глотки, при насморкѣ или ангинѣ (см. эти болѣзни). Затѣмъ ларингитъ можетъ быть послѣдствіемъ вдыханія пыли, горячаго пара, холоднаго питья при разгоряченіи тѣла, слишкомъ сильнаго или продолжительнаго напряженія голоса (пѣніе, разговоръ), особенно если непосредственно или вскорѣ послѣ этого подвергнуться дѣйствію холода.

Причины.

Щекотаніе и колотье или жженіе въ гортани; лихорадочное состояніе преимущественно у дѣтей; боль при глотаніи съ потребностью производить безпрестанно глотательныя движенія; сухой кашель, съ труднымъ отхаркиваніемъ болѣе или менѣе густой, стекловидной слизи; охриплость, а иногда и совершенное отсутствіе голоса.

Симптомы

У дѣтей являются припадки удушья съ лающимъ или беззвучнымъ кашлемъ и свистящимъ дыханіемъ, сопровождающимся посинѣніемъ лица и чрезмѣрной тоской.

Эта форма катарра горла у дѣтей носитъ названіе „ложный крупъ“. Особенность ложнаго крупа заключается, между прочимъ, въ томъ, что онъ является только ночью, тогда какъ днемъ имѣются явленія лишь простаго катарра, притомъ обыкновенно въ умѣренной степени.

Ложный
крупъ.

Приступъ ложнаго крупа можетъ быть единственный, или онъ можетъ повторяться, чѣмъ, между прочимъ, отличается отъ настоящаго крупа, повторное заболѣваніе каковымъ бываетъ лишь крайне рѣдко.

Продолжительность остраго ларингита въ легкихъ случаяхъ 5—8 дней, въ среднихъ — 8—14 дней, а въ тяжелыхъ — 2—3 недѣли и болѣе. При неправильномъ лѣченіи или при продолжающихся вредныхъ вліяніяхъ (простуда, чрезмѣрное напряжение

голоса и проч.), продолжительность болѣзни можетъ затянуться еще болѣе и перейти въ хроническую форму. Приступъ ложнаго крупа кончается, можно сказать, всегда благополучно, смертельный же исходъ, вслѣдствіе отека гортани, принадлежитъ къ величайшимъ рѣдкостямъ.

Лѣченіе
остраго
ларингита.

Въ началѣ дается *Аконитъ* $\times 3$ и *Спонгія* $\times 3$, черезъ 1—2 часа попеременно, при угрожающихъ же симптомахъ удушья—гораздо чаще, даже черезъ 5—10 минутъ, попеременно, по 1—3 капли на приемъ. Аконитъ умѣстенъ лишь въ первый день этой болѣзни; на второй же или третій день, если еще не лучше больному, вмѣсто Акон. дается *Белладонна* $\times 3$. Спонгія дается, пока кашель глухой, хриплый, лающий и является приступами, особенно ночью; кашель сухой или съ отхаркиваніемъ желтой, густой слизи. Если же имѣется сильная лихорадка, боль въ горлѣ, охриплость, но не безголосье, одновременный насморкъ и необлегчающее потѣніе, то, вмѣсто Спонгіи, даютъ *Меркурій солюб.* 3 (попеременно съ Беллад.), также *Іодъ* $\times 3$.

Послѣ Меркурія умѣстенъ *Гепаръ сульф.* 3, когда именно началось уже болѣе легкое выдѣленіе слизи при кашлѣ, попеременно съ *Пульсатилла* $\times 3$.

При упорномъ жесткомъ кашлѣ съ свистящими вдохами, при охриплости съ безголосьемъ показанъ *Бромъ* $\times 3$ или *Аммоній бромат.* $\times 2$ попеременно съ *Нуксъ вом.* 3, или съ *Гіосціам.* 3 (особенно при усиленіи кашля ночью), или съ *Бріонія* 3—при кашлѣ, исходящемъ изъ глубины груди съ болью въ послѣдней.

При судорожномъ кашлѣ съ позывами на рвоту—*Ипекакуана* 3. — При слышныхъ обильныхъ хрипахъ, но затрудненномъ отхаркиваніи и удушьи—*Тартар. эметик.* $\times 3$, одно или попеременно съ *Сенега* $\times 2$.

Вспомога-
тельные
мѣры.

Заболѣвшій острымъ катарромъ гортани долженъ, впредь до выздоровленія, лежать въ постели при равномерной (14—15° P.) температурѣ комнаты. Въ легкихъ случаяхъ можно и не лежать въ постели, но не слѣдуетъ и выходить изъ дому при холодной или вообще неблагоприятной погодѣ. Къ шеѣ приложить согрѣвающий компрессъ или, вмѣсто послѣдняго, еще лучше, тряпочку съ масломъ белладонны, и обернуть чѣмъ нибудь теплымъ. При сильномъ же воспаленіи съ повышенной температурой тѣла цѣлесообразнѣе прохладные (15° P.) компрессы на шею, смѣняемые черезъ 5—10 минутъ, также отвлекающіе способы: набрюшный согрѣвающий компрессъ, короткое туловищное обертываніе и проч.

Во время приступа ложного крупа полезно прикладывание к шеѣ горячихъ компрессовъ, послѣ которыхъ часто сразу же наступаетъ облегченіе. Діѣта — легкая.

При склонности къ частымъ возвратамъ остраго катарра гортани требуется сдѣлать организмъ возможно болѣе устойчивымъ противъ холода, закалить его. Для этого особенно полезны влажныя и холодныя обтиранія всего тѣла по утрамъ прямо съ постели, продолжающіяся минуты двѣ (подробности см. въ 3-ей части). Ношеніе шерстяного бѣлья допускается лишь зимою, лѣтомъ же оно должно быть замѣнено обыкновеннымъ, холщевымъ. Закаливаніе холодомъ надо предпринимать преимущественно лѣтомъ, и послѣ этого его можно продолжать и въ холодное время года. Пребываніе лѣтомъ на берегу моря (и морское купанье) полезно для предрасположенныхъ къ катарру гортани. Если морскія купанья недоступны, то ихъ можно до нѣкоторой степени замѣнить тепловатыми (20—25° Р.) соляными ваннами въ теченіе 10—15 минутъ съ послѣдующими легкими растираніями кожи. Необходимо по возможности щадить свой голосъ, что относится, напримѣръ, къ пѣвцамъ, учителямъ, духовнымъ лицамъ, если они предрасположены къ частому катарру гортани.

б. Хроническій катарръ гортани.

Развивается часто изъ запущеннаго остраго катарра, вслѣд-
ствіе ненадлежащаго лѣченія или недостаточнаго обереганія отъ вредныхъ вліяній, способствующихъ укоренѣнію воспалительнаго процесса. Къ такимъ вліяніямъ относится особенно раздраженіе слизистой оболочки гортани разговоромъ или пѣніемъ, пребываніе въ пыльной атмосферѣ, горячее или очень холодное питье, чрезмѣрное куреніе табаку, злоупотребленіе спиртными напитками. Къ хроническому катарру гортани ведетъ часто хроническій катарръ зѣва (стр. 198), особенно когда присоединяются указанныя вредныя вліянія. Этими вліяніями объясняется, вѣроятно, и то, что хроническимъ катарромъ гортани гораздо чаще страдаютъ мужчины, нежели женщины, и что въ дѣтскомъ возрастѣ эта болѣзнь очень рѣдко встрѣчается. Хроническій катарръ гортани развивается наслѣдственно также при другихъ болѣзненныхъ пораженіяхъ гортани, преимущественно разрушительныхъ (туберкулезныхъ, сифилитическихъ и проч.).

**Симптомы
хронического
ларингита.**

Къ признакамъ хроническаго катарра гортани относятся: ощущение сухости въ горлѣ, щекотанія, садности и мучительнаго раздраженія слизистой оболочки, вынуждающаго больного къ частому откашливанію, откашливанію и глотанію. Эти явленія вызываются особенно разговоромъ, пѣніемъ, куреніемъ и проч. При обостреніяхъ болѣзни ощущается въ горлѣ даже боль, усиливающаяся отъ разговора и дотрагиванія. Голосъ въ легкихъ случаяхъ обыкновенно не измѣненъ; при болѣе же сильномъ развитіи болѣзни голосъ бываетъ болѣе или менѣе чистъ только по утрамъ послѣ того, какъ откашлена накопившаяся за ночь слизь; но затѣмъ, какъ только больной начинаетъ говорить, голосъ становится нечистымъ, и начинается постоянное во время разговора откашливаніе. Или голосъ бываетъ совсѣмъ хриплый, низкій и грубый или, наоборотъ, ненормально высокій, срывающійся на фистулу; говоръ дается при этомъ съ трудомъ, съ большимъ напряженіемъ гортанныхъ мышцъ, вслѣдствіе вялости голосовыхъ связокъ; въ такихъ случаяхъ больные, просыпаясь утромъ, вынуждены, вслѣдствіе мучительнаго раздраженія въ гортани, подолгу откашливаться и откашливаться. Отдѣляющаяся при этомъ слизь бѣловато-сѣрая съ мелкими пузырьками, тянущаяся въ нити, часто свѣтлая, стекловидная, въ болѣе же давнихъ случаяхъ—желтоватая, иногда съ примѣсью кровяныхъ жилокъ. Кашель при этомъ звучитъ низко, жестко и отличается необыкновеннымъ тембромъ.

**Теченіе
хроническаго
ларингита.**

Теченіе хроническаго катарра гортани всегда длительное и перемежающееся, съ улучшениями и ухудшеніями, что въ значительной степени зависитъ отъ внѣшнихъ вліяній, отъ образа жизни, отъ степени заботливости больного о своемъ голосовомъ органѣ. Часто случается, что, почувствовавши болѣе или менѣе значительное улучшение, больной считаетъ себя выздоровѣвшимъ, а мѣры предосторожности ненужными, и тогда малѣйшее излишество усиливаетъ снова катарръ, и опять требуется не мало времени для достиженія улучшения. Это часто наблюдается главнымъ образомъ потому, что болѣзнь эта считается безопасной, какъ и есть вообще на дѣлѣ, и не сопровождается общимъ страданіемъ организма. Поэтому больные становятся равнодушными къ ней и къ ея лѣченію. Исключеніе въ этомъ отношеніи представляютъ люди, профессія которыхъ связана съ ихъ голосовымъ органомъ, какъ духовные, учителя, пѣвцы и т. п.; у такихъ лицъ наблюдается даже крайность—ипохондрической страхъ передъ чахоткой,

вселяющій имъ постоянную, хотя и напрасную тревогу и понуждающій ихъ перебѣгать отъ спеціалиста къ спеціалисту по горловымъ болѣзнямъ. Имъ надо знать, что простой, самобытный хроническій ларингитъ такъ же мало ведетъ къ чахоткѣ гортани, какъ простой хроническій бронхитъ—къ чахоткѣ бронховъ и легкихъ. О вторичномъ же, вслѣдствіе разрушительныхъ процессовъ, катарръ см. при соотвѣтствующихъ болѣзняхъ (горловая чахотка, сифились, ракъ).

При выборѣ лѣкарствъ противъ хроническаго ларингита можно руководствоваться слѣдующими сопоставленіями:

Лѣкарства
противъ
хроническаго
ларингита.

При простомъ хроническомъ катаррѣ гортани, развившемся изъ затянувшагося остраго катарра: *Тартар. эметик.*, *Гепар. сульф.*, *Спонгія*, *Пульсатилла*, и при обостреніяхъ такого катарра: *Меркур. солуб.* и *Белладонна*.

Въ болѣе упорныхъ случаяхъ, но еще не очень застарѣлыхъ: *Іод.*, *Гепаръ сульф.*, *Манганумъ*, *Силиція*, *Калькареа карб.* *Кали бихромик.*; въ застарѣлыхъ, запущенныхъ случаяхъ: *Фосфоръ*, *Сульфур.*, *Арсеник.*, *Карбо вегетабилисъ*.

При упорной охриплости и давнишнемъ катаррѣ гортани у пѣвцовъ, проповѣдниковъ и проч.: *Манган.*, *Фосфоръ*, *Селен.*, *Аргент.*, *Карбо-вегетаб.*; при полной потерѣ голоса вслѣдствіе катарра: *Антимон. крудумъ*, *Фосфоръ*, *Карбо-вегетаб.*, *Іод*.

Характеристика нѣкоторыхъ изъ этихъ лѣкарствъ въ отношеніи катарра гортани приведена выше, характеристика же прочихъ приводятся въ нижеслѣдующемъ:

Манган. З. Охриплость, особенно по утрамъ, стѣсненное дыханіе; то и другое уменьшается послѣ отхаркиванія слизистыхъ комковъ, и къ полудню гортань становится совсѣмъ свободной; ухудшеніе на вольномъ воздухѣ; куреніе табаку приноситъ временное облегченіе тѣмъ, что разрыхляетъ густую, обложившую голосовыя связки слизь, и дѣлаетъ ее такимъ образомъ легче отхаркиваемой.

Селеній ×3—3. Охриплость, особенно у пѣвцовъ и т. п., являющаяся уже въ началѣ пѣнія или говора. Потребность часто отхаркивать прозрачную, клейстерообразную слизь. Подобныя лѣкарства: *Арумъ трифил.* (голосъ часто внезапно перемѣняется въ тонъ и тембръ), *Каустик.*, *Спонгія*.

Мезереумъ ×3. Кашель сухой и ухудшается съ вечера до полуночи; при язвахъ въ гортани, обусловливающихъ ощущеніе колотья въ ней при пустомъ глотаніи, а особенно у сифилитиковъ.

Силиція 3—6. Охриплость, жесткость и сухость въ гортани съ щекочущимъ кашлемъ, идущимъ какъ бы изъ подъ верхней части грудины, или съ ощущеніемъ какъ бы волоска, застрявшаго въ гортани или дыхательномъ горлѣ. Кашель вызывается холоднымъ питьемъ, говоромъ, и ухудшается ночью, какъ только больной ляжетъ, и кончается нерѣдко слизистой рвотой. При такихъ признакахъ подходятъ также *Румексъ, Ликоподій, Амбра.*

Кали бихромик. 3. Кашель глухой, жесткій, какъ бы изъ подложечки идущій. Слизъ тягучая, съ синеватымъ отливомъ, отхаркивается съ трудомъ. Кашель ухудшается послѣ ѣды и облегчается отъ теплаго укутыванія въ постели.

Карбо-вегетабилисъ 3—6. Въ очень укоренившемся катаррѣ. Чрезмѣрная чувствительность къ вольному воздуху, особенно сырому. Охриплость, доходящая временно, при громкомъ говорѣ, до безголосья. Большая сухость, садненіе и колющая боль въ гортани, съ потребностью безпрестаннаго откашливанія и отхаркиванія, несмотря на мѣстную боль. Скудная, зеленоватая или желтая, комковатая, густая слизь, съ большимъ трудомъ отхаркиваемая, особенно по утрамъ.

Предохра-
нительныя
мѣры.

Результаты отъ лѣкарственнаго лѣченія могутъ въ томъ только случаѣ быть болѣе или менѣе прочными, если будутъ устранены всѣ тѣ вредныя вліянія, которыя вызываютъ и поддерживаютъ катарръ гортани. Особенно же важно предоставлять больной гортани возможно больше покоя, не утруждая ее чрезмѣрнымъ говоромъ, пѣніемъ. При этомъ необходимо бросить куреніе или нюханіе табаку и избѣгать накуренныхъ или пыльных помѣщеній, не употреблять спиртныхъ напитковъ и острыхъ пряностей. Надо избѣгать простудныхъ вліяній, особенно же забѣтиться всегда объ умѣренно-тепломъ содержаніи ногъ и вообще всего тѣла. Одинаково вредно для такихъ больныхъ слишкомъ кутать себя въ теплое или слишкомъ легко одѣваться. Закаливать себя примѣненіями холодной воды цѣлесообразно, но это надо дѣлать съ должной осторожностью и постепенностью.—Изъ мѣстныхъ на гортань примѣненій наиболѣе цѣлесообразно вдыханіе растворовъ лѣкарствъ при помощи специально приспособленнаго аппарата-распылителя (ингаляціонный аппаратъ). Вдыханіе производится въ теченіе 4—5 минутъ, 2 раза въ день. Для такихъ растворовъ подходятъ: *Гидрастисъ Ѡ, Фитолакка Ѡ* (того или другого въ пропорціи 5—10 капель на столовую ложку воды), *Кали бихромик. x3* въ порошокъ (1 грань —

Вспомога-
тельные
мѣры.

1 „лопаточка“—на то же количество воды), также растворъ поваренной соли $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ 0/0, или танинъ— $\frac{1}{2}$ —1 0/0, или, при сильной раздражительности слизистой оболочки гортани, растворъ бромистаго калия 2—4 0/0. — Діѣта должна собразоваться съ общимъ состояніемъ организма; во всякомъ случаѣ слѣдуетъ значительно ограничить употребленіе мясной пищи и придерживаться больше молочной и растительной.

2. Крупъ.

(Перепончатая жаба гортани).

Самобытный или первичный крупъ не есть заразная болѣзнь **Опреѣленіе.** и поражаетъ лишь дѣтей (очень рѣдко — взрослыхъ) отъ 2 до 7 лѣтъ. Вторичный же или припадочный крупъ бываетъ въ теченіе нѣкоторыхъ острыхъ заразныхъ болѣзней, особенно часто при дифтеритѣ и кори. Въ этихъ случаяхъ крупъ, конечно, заразнаго характера и бываетъ эпидемическимъ.

Сущность крупознаго воспаленія гортани состоитъ въ томъ что на ея слизистой оболочкѣ образуются болѣе или менѣе плотныя перепонки (плевистыя образованія), которыя выполняютъ и тѣмъ самымъ сѣуживаютъ полость гортани, въ тяжелыхъ случаяхъ—до степени полной ея закупорки.

Начинается болѣзнь обыкновенно легкими катарральными **Симптомы** явленіями, ребенокъ жалуется на жженіе и щекотаніе въ горлѣ, **и ходъ болѣзни.** говоритъ слегка захваченнымъ голосомъ и временами издаетъ рѣзкій кашлевой звукъ. Въ зѣвѣ въ это время замѣчаются уже точечныя выпотѣнія сѣро-желтоватаго цвѣта, краснота и припухлость миндалинъ, или первоначальныя явленія имѣютъ характеръ остраго ларингита. Спустя 1—2 дня болѣзнь, если сразу не захвачена лѣченіемъ, доходитъ до настоящаго приступа крупа. Лишь, въ рѣдкихъ случаяхъ крупъ является совершенно неожиданно-обыкновенно ночью, и ужъ съ самаго начала принимаетъ тяжелый характеръ. Какъ бы, однако, ни развился крупъ, постепенно или внезапно, приступъ его является слѣдствіемъ сѣуженія гортани и обусловливаемого этимъ недостатка воздуха.

Съ трудомъ дышетъ ребенокъ и каждое вдыханіе сопровождается свистящимъ, храпящимъ или пилящимъ шумомъ, слышнымъ обыкновенно уже изъ сосѣднихъ комнатъ, при болѣе или менѣе рѣдко и беззвучномъ кашлѣ. Безпокойство ребенка чрез-

мѣрно: онъ мечется въ разныя стороны, безпрестанно просится на руки, на которыхъ однако недолго остается, а глаза его какъ бы умоляютъ о помощи; это мучительное состояніе сопровождается короткими періодами дремоты, во время которыхъ упомянутый выше вдыхательный шумъ еще болѣе усиливается. Въ дальнѣйшемъ теченіи начинаютъ проявляться приступы сильнѣйшаго удушья: ребенокъ порывисто откидывается назадъ, дыханіе останавливается, лицо багровѣетъ, ручки конвульсивно сжимаются, и больному повидимому грозитъ уже близкая смерть, но спустя нѣсколько секундъ воздухъ съ большимъ трудомъ и свистящимъ шумомъ опять проникаетъ въ гортань, а затѣмъ возобновляется прежнее состояніе, пока снова не наступитъ новый приступъ удушья. Если болѣзнь не идетъ на выздоровленіе, приступы эти учащаются, пока послѣдній изъ нихъ не окончится смертью ребенка. Въ болѣе благопріятно протекающихъ случаяхъ отхаркиваются, вначалѣ съ большимъ трудомъ, а затѣмъ легче, перепончатые (плевистые) обрывки и цилиндры (трубочки), которые должны считаться единственно вѣрнымъ признакомъ истиннаго крупа, тогда какъ всѣ прочіе симптомы могутъ быть и при высшихъ степеняхъ простого ларингита (ложный крупъ). Эти обрывки и цилиндры особенно замѣтны, если ихъ положить въ воду.

Лѣченіе
крупа.

Самобытный или первичный крупъ обыкновенно проходитъ легко и скоро при гомеопатическомъ лѣченіи. Этому лѣченію поддаются часто и случаи вторичнаго крупа даже болѣе тяжелой формы.

Въ тѣхъ же отчаянныхъ случаяхъ, когда болѣзнь грозитъ близкой смертью, остается надежда еще только на хирургическое вмѣшательство, на такъ называемую трахеостомию (горлосѣченіе или наружное вскрытіе дыхательнаго горла съ вставленіемъ въ него трубочки, черезъ которую больной имѣетъ возможность дышать, пока, подъ вліяніемъ дальнѣйшаго лѣченія, пройдетъ болѣзнь гортани).

При первыхъ признакахъ болѣзни даютъ *Аконитъ* $\times 2$ — $\times 3$, *Спонгія* $\times 1$ — $\times 2$ и *Белладонна* $\times 3$, черезъ 10—15 мин. поочередно, при улучшеніи—рѣже, по 2—3 капли на пріемъ. Если въ течение 2—3 часовъ облегченія не замѣчается, или въ тяжелыхъ случаяхъ сряду же, даютъ, вмѣсто Спонгіи, *Іод.* $\times 2$ или $\times 3$, при дифтеритномъ крупѣ—поперем. съ *Меркур. ціанат.* 3. При облегченіи, вмѣсто Іода, давать *Бромъ* $\times 2$ или *Аммон. бромат.* $\times 2$. Когда

кашель смягчился, умѣстны: *Гепаръ сульф.* 3, *Тартар. эметик.* 3 и проч., какъ указано при ложномъ крупѣ. При удушьи, сопровождающемся хрипотой въ груди, когда рвотный актъ можетъ быть полезенъ, послѣдній всего лучше вызвать посредствомъ *Тартар. эметик.* $\times 2$ (въ порошковомъ видѣ, черезъ 10—15 минутъ по 1 приему). При удушьи, не сопровождающемся хрипотой, умѣстны средства, указанные при „спазмѣ гортани“ (стр. 141), особенно *Купрумъ ацетик.* $\times 3$, также *Арсеник.* 3, *Вератр.* $\times 2$, *Мохъ* $\times 2$.—При дифтеритномъ крупѣ, особенно если имѣется бѣлокъ въ мочѣ, умѣстны еще *Апизинъ*, *Ацид. нитр.* Въ тяжелыхъ случаяхъ, когда упомянутыя средства не приносятъ значительнаго облегченія, оказывается часто спасительнымъ *Фосфоръ* въ низкомъ дѣленіи ($\times 1$ — $\times 2$) или въ видѣ *эфиро-фосфорнаго спирта* по 1—2 капли каждый часъ, а также наружно, въ видѣ втиранія въ гортанную область шеи и груди (черезъ каждые $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ часа), раствора 0,1 Фосфора въ 15,0 миндальнаго масла.

Вспомогательныя мѣры и діета тѣ-же, что при остромъ катаррѣ гортани (стр. 310).

3. Отекъ гортани.

Отекъ гортани происходитъ отъ остраго набуханія подслизистой ткани гортани и можетъ быть вызванъ самыми разнообразными вліяніями. Такъ, онъ можетъ случиться при воспаленіи сосѣднихъ частей или самой гортани, (острый катарръ, крупъ, ангина Людовици — стр. 181 — и проч.), также отъ химическихъ и тепловыхъ раздраженій, къ которымъ относятся особенно обжиганія ѣдкими щелочами и кислотами и обвариванія горячими жидкостями, рѣже отъ вдыханія пламени или раскаленнаго воздуха, напримѣръ, на пожарѣ; наконецъ, отъ механическихъ поврежденій (рыбьими косточками, осколками костей и т. п.). Во всѣхъ такихъ случаяхъ отекъ гортани — воспалительный. Не воспалительный же отекъ подслизистой ткани можетъ быть частнымъ явленіемъ общей водянки тѣла какого бы то ни было происхожденія.

Теченіе отека гортани можетъ быть очень острое и бурное, какъ это бываетъ при острыхъ воспаленияхъ, под-острое или затяжное (при язвахъ гортани). Во всѣхъ случаяхъ во главѣ всѣхъ симптомовъ выступаетъ гортанная одышка, затрудненное вдыханіе вслѣдствіе суженія входа въ гортань. Голосъ либо охриплый, либо совсѣмъ беззвучный, или же со свистомъ. Степень одышки зависитъ отъ того, насколько суженъ просвѣтъ гортани. Исходъ болѣзни

Причины.

Симптомы.

въ умѣренныхъ случаяхъ—благопріятный, при высшихъ же степеняхъ сѣуженія гортани смерть наступаетъ отъ задушенія, если въ время не явится соотвѣтствующая помощь.

Лѣченіе
отека
гортани.

Лѣченіе должно быть сообразовано съ основной болѣзью. При малѣйшемъ затрудненіи дыханія, которое можно отнести къ сѣуженію гортани, надо устранить всякое вліяніе, могущее усилить отекъ. Особенно вредно больному говорить. Воздухъ въ помѣщеніи долженъ быть чистый, умѣренной температуры, безъ пыли и дыма, платье и бѣлье на больномъ должно быть разстегнуто. Покуда угрожающихъ явленій нѣтъ, можно ограничиваться лѣкарственнымъ лѣченіемъ и вспомогательными мѣрами. Изъ вспомогательныхъ мѣръ примѣняются: при воспалительномъ отеѣ—холодные компрессы на шею, глотаніе кусочковъ льда, отвлекающее туловищное обертываніе, согрѣваніе и растираніе ногъ, если онѣ холодныя, опорожняющій клистиръ при запорѣ; при невоспалительномъ отеѣ—тепло-влажные или даже горячіе компрессы на шею, которые показаны, именно, въ умѣренныхъ случаяхъ катаррального отека, также въ хроническихъ.

Изъ лѣкарствъ наиболѣе умѣстны при отеѣ гортани: *Иод.* *Фосфоръ*, *Анисъ*, *Лаксизъ*, также *Русъ*.

Въ случаяхъ трудныхъ, угрожающихъ жизни, не слѣдуетъ медлить съ обращеніемъ къ хирургической помощи.

4. Туберкулезъ гортани. Гортанная („Горловая“) чахотка.

При чахоткѣ гортани въ послѣдней имѣются извѣявленія, которыя зависятъ отъ просовидной бугорчатки и бугорчатковаго воспаления. Чахотка гортани рѣдко встрѣчается самостоятельно, а обыкновенно какъ не очень частое осложненіе при чахоткѣ легкихъ. Сѣмптомы вообще тѣ же, что при хроническомъ катаррѣ гортани (см. стр. 311); въ дальнѣйшемъ же развитіи присоединяется постоянная, упорная боль въ гортани при глотаніи и разговорѣ. Распознаваніе не представляетъ никакой трудности въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣются явственныя признаки имѣющейся одновременно легочной чахотки. Въ другихъ же случаяхъ сущность болѣзни можетъ выясниться лишь изъ дальнѣйшаго теченія ея. При различительномъ распознаваніи надо имѣть въ виду и возможность сифилитическихъ язвъ въ гортани. Теченіе болѣзни всегда хроническое, въ общемъ же зависитъ отъ характера легочной чахотки: чѣмъ быстрѣ идетъ чахотка легкихъ, тѣмъ быстрѣ развиваются язвы гортани, и наоборотъ. При горловой чахоткѣ возможно появленіе

отека гортани (см. выше), которое сразу ухудшаетъ предсказаніе и представляетъ собою начало конца даже при успѣшно сдѣланной трахеотоміи.

Бугорчатковая язва гортани не исключаетъ возможности полного ея излѣченія, хотя таковое не часто наблюдается. Обыкновенно шансовъ на излѣчение мало, нѣкоторое же облегченіе наиболѣе мучительныхъ страданій, сопряженныхъ съ горловой чахоткой, въ большинствѣ случаевъ возможно.

Лѣченіе въ общемъ то же, что при хроническомъ катаррѣ гортани и при чахоткѣ легкихъ (см. эти болѣзни). Главнѣйшія же лѣкарства, показанныя именно при бугорчатковыхъ язвахъ въ гортани, суть: *Фосфоръ, Іодъ, Арсеникъ, Арсеник. іодатъ, Генаръ сульф., Силиція, Ацид. флуорик., Кали бихромик.*

Вспомогательныя мѣры — тѣ же, что при хроническомъ катаррѣ гортани.

5. Опухоли гортани.

Къ доброкачественнымъ опухолямъ гортани относятся полипы, которые представляютъ троякаго рода новообразованія: 1) папилломы или сосочковые фибромы, 2) твердо-волокнистые фибромы и 3) слизистые полипы и кистовыя опухоли. Очень рѣдко бываютъ въ гортани жировыя опухоли. Полипы развиваются главнымъ образомъ вслѣдствіе хроническаго катарра гортани, также на почвѣ золотухи, бугорчатки, блѣдной немочи, малокровія. Къ злокачественнымъ же опухолямъ гортани относятся: ракъ и значительно рѣже — саркома, аденома и др. Лѣкарственное лѣченіе можетъ быть только предупредительное (лѣченіе причинныхъ болѣзней), а лѣченіе уже развившейся опухоли можетъ быть только хирургическое, въ той мѣрѣ, въ какой таковое вообще возможно при опухоляхъ въ гортани.

6. Неврозы гортани.

а) **Параличъ гортани.** Голосовыя связки парализуются особенно часто послѣ перенесеннаго дифтерита, а также послѣ тифа и коклюша. Параличъ гортани можетъ быть также мозгового происхожденія и вообще нервнаго (напримѣръ — при истеріи); иногда онъ развивается и изъ хроническаго катарра. При параличѣ не обѣихъ, а лишь одной связки, голосъ еще имѣется, но онъ высокъ и фистулообразенъ; въ противномъ случаѣ онъ болѣе или

менѣ хрипять или совсѣмъ беззвученъ; кашель, глотаніе и дыханіе сопряжены съ большими или меньшими трудностями; отъ паданія пищи или питья въ гортань, отверстіе которой при параличѣ постоянно открыто, можетъ произойти задушеніе или острое воспаленіе легкихъ.

Лѣчение во многихъ случаяхъ плодотворно, особенно когда причина — истерія или малокровіе (блѣдная немочь) или предшествовавшія острые болѣзни. Главныя гомеопатическія лѣкарства суть: *Гельзем.* при параличѣ послѣ дифтерита; *Каустик.*, *Кали-фосф.*, *Бріон.*, *Арника* (при параличѣ вслѣдствіе чрезмѣрнаго напряженія голоса; также *Арумъ-трифил.*); затѣмъ *Плумб.*, *Цинк.*, *Арсен.*, *Іод.* и др. Кромѣ того при лѣченіи паралича гортани примѣняются еще способы, указанные при хроническомъ катаррѣ гортани (стр. 314), равно какъ электричество (фарадизація гортани).

б) Спазмъ (судорога) гортани см. стр. 140.

В. Болѣзни дыхательнаго горла и бронховъ.

Содержаніе этого (В) под-отдѣла. 1. Катарръ дыхательнаго горла и бронховъ, острый и хроническій.—2. Инфлуэнца (Гриппъ).—3. Коклюшъ

1. Катарръ дыхательнаго горла и бронховъ.

Катарръ дыхательнаго горла, трахеитъ, очень рѣдко бываетъ самъ по себѣ; обыкновенно онъ сопровождается катаррѣ гортани или крупныхъ бронховъ, чаще, однако, сочетается съ катарромъ послѣднихъ, нося въ такомъ случаѣ названіе трахеобронхита, остраго или хроническаго, въ отличіе отъ катарра только бронховъ—бронхита.

Симптомы
остраго
бронхита.

а. Острый катарръ дыхательнаго горла и бронховъ очень часто начинается катарромъ зѣва, носа или гортани, сопровождаясь нерѣдко лихорадочнымъ состояніемъ и всегда — кашлемъ, который бываетъ сильнѣе при пораженіи верхняго отдѣла крупныхъ бронховъ и слабѣе при пораженіи среднихъ и мелкихъ бронховъ. Въ первые дни кашель — сухой, притомъ не беззвучный и не хриплый, если гортань не задѣта болѣзнію, и глухой и хриплый — въ противномъ случаѣ; бываетъ и судорожный. При лежаніи на спинѣ кашель усиливается, при отвѣсномъ же положеніи тѣла становится слабѣе. Въ груди ощущается обыкновенно давленіе, стѣсненіе и полнота, иногда и боль въ грудныхъ мышцахъ (отъ сильнаго кашля). Какъ только начинается отдѣляться слизь, ка-

шель перестаетъ быть сухимъ и мало по малу прекращается. Отдѣляемая мокрота вначалѣ прозрачная, пѣнистая, становится затѣмъ постепенно бѣловато-желтой.

Исходъ болѣзни обыкновенно благоприятный, только у больныхъ, истощенныхъ другими болѣзнями, или у маленькихъ дѣтей, острый трахеобронхитъ можетъ принять опасный для жизни оборотъ, перешедши въ разлитое воспаление бронховъ, не только крупныхъ, но и мелкихъ, въ капиллярный бронхитъ.

**Капиллярный
бронхитъ**

Опасность капиллярнаго бронхита заключается въ томъ, что онъ легко можетъ перейти въ катарральное воспаление легкихъ, въ катарральную пневмонію (см. стр. 338).

При капиллярномъ бронхитѣ дыханіе разстраивается, оно ускоряется и затрудняется до степени сильной одышки, особенно у дѣтей.

У слабыхъ, истощенныхъ дѣтей сильной одышки можетъ и не быть даже при тяжелой формѣ капиллярнаго бронхита; въ такихъ случаяхъ можно ожидать скораго присоединенія катарральной пневмоніи; равнымъ образомъ, въ позднѣйшемъ періодѣ болѣзни дѣти часто лежатъ совершенно апатично въ постели, только временами пробуждаясь изъ своего полусоннаго состоянія вслѣдствіе сильныхъ приступовъ кашля, дыханіе ускорено, но поверхностно, губы и вообще лицо синѣютъ, пульсъ малъ, ускоренъ, такъ что и не сосчитать его.

Во всѣхъ случаяхъ капиллярнаго бронхита слышатся въ груди многочисленные хрипы, болѣе сухіе или болѣе влажные, сопровождающиеся часто дребезжаніемъ и свистами. Кашель гораздо болѣе сильный, нежели при трахеобронхитѣ, часто и крайне жестокий съ очень труднымъ отхаркиваніемъ мокроты. Лихорадка имѣется всегда, часто очень высокая.

У стариковъ капиллярный бронхитъ протекаетъ гораздо менѣе бурно и имѣетъ часто затяжное теченіе. У людей же средняго возраста болѣзнь эта имѣетъ вообще болѣе умѣренное теченіе.

Причина первичнаго, самобытнаго бронхита, или трахеобронхита, въ большинствѣ случаевъ—простуда, особенно при вспотѣвшемъ тѣлѣ, но бываютъ случаи, когда причину выяснить трудно. Въ такихъ случаяхъ приходится свести причину на быструю смѣну воздушной температуры, на разницу барометрическихъ давленій и т. п. Въ эпидемической формѣ трахеобронхитъ является въ инфлуэнцѣ или гриппѣ (см. стр. 330). Вторично катарръ бронховъ и дыхательнаго горла встрѣчается при сердечныхъ болѣзняхъ, эмфиземѣ легкихъ, въ острыхъ сыпныхъ лихорадкахъ, особенно въ кори.

**Причины
остраго
бронхита.**

Лѣченіе

Въ легкихъ случаяхъ остраго катарра дыхательнаго горла и бронховъ, не сопровождающагося лихорадкой, достаточно *Нуксъ-вомика* $\times 3$, при лихорадкѣ же—*Белладонна* $\times 3$, которая дѣтямъ дается, во всякомъ случаѣ, попеременно съ *Хамомилла* $\times 3$; послѣдняя особенно маленькимъ дѣтямъ. Какъ только кашель сталъ мягче, влажнѣе, умѣстны *Тартар. эметик.* 3 и *Пульсатилла* $\times 3$; если не лучше, то — *Брюнія* $\times 3$, *Ипекакуана* $\times 3$, *Гепаръ-сульфурисъ* 3 . Въ началѣ болѣзни, кромѣ Беллад., умѣстенъ особенно *Меркур. солуб.* 3 и именно удѣтей и взрослыхъ, и не такъ у стариковъ. При упорствующемъ катаррѣ показаны, послѣ Брюнии и Ипекакуаны, *Фосфоръ*, 3 и *Арсеник.* 3 , также *Карб. вегетабилисъ* 3 , особенно при угрожающемъ переходѣ въ капиллярный бронхитъ. Въ этихъ случаяхъ надо имѣть въ виду и *Иод.* $\times 3$. *Аммоній мургатик* $\times 3$ и *Аммоній карбоник.* $\times 3$.

Характеристику этихъ лѣкарствъ см, стр. 307.

О дозахъ, приемахъ и дѣленіяхъ см ч 1, гл. 3 и 4.

Нецѣлесообразно во что бы то ни стало вызвать при этой болѣзни потъ. Легкие случаи и безъ того скоро проходятъ, въ болѣе же трудныхъ случаяхъ состояние больного можетъ отъ искусственнаго вызваннаго пота скорѣе ухудшиться, нежели поправиться.

**Вспомогатель-
ныя мѣры
при остр
бронхитѣ.**

Полезны же отвлекающія обертыванія груди и туловища 22^0 Р., втеченіи 2 часовъ, одни они или въ связи съ обертываніями (20^0 Р.) бедеръ, оставляемыми лежать втеченіи 4-хъ часовъ, небольшіе удерживаемые клистиры (18^0 Р., $\frac{1}{2}$ стакана, 2—3 раза въ день). На ночь можно и не снимать обертыванія, а оставлять до тѣхъ поръ, пока оно приятно больному. Снявши же, надо сдѣлать общее обмываніе тѣла 22^0 водой. Полосканія горла каждый часъ или два часа способствуютъ размягченію слизи и устраняютъ безпрестанные позывы къ кашлю. Той же цѣли служатъ согревающіе нагрудные компрессы, покрытые фланелью (22^0 Р.), и смѣняемые черезъ каждыя 2 часа, также паровой компрессъ (50^0 Р.), въ фланель завернутый, смѣняемый черезъ каждыя 20 минутъ. Послѣднія примѣненія подходятъ въ особенности для старыхъ людей и маленькихъ дѣтей — При жарѣ тѣла примѣняются цѣльныя обертыванія (22^0 Р.), у дѣтей—ножноподмышковыя и повторныя каждый день цѣльныя обмыванія (22^0 Р.). При припадкахъ удушья— 26 -градусныя полуванны съ 23 -градусными обливаніями спины (струей изъ лейки).—Пища должна быть нераздражающая слизистые супы, молоко, каши изъ риса, пшена, манны, овсяной крупы, варенные

плоды, немного мяса. Запрещаются крѣпкія вина и кофе, Для питья —слабонастойный чай, подслащенная вода, не холодная, а теплая.

Для предупрежденія катарра бронховъ у лицъ, къ нему пред- **Предупреди-
тельные мѣры.**

расположенныхъ, необходимо закалить организмъ, сдѣлать его устойчивымъ противъ простудныхъ вліяній. Для этого служить прохладныя обмыванія, хождение босикомъ въ водѣ, воздушныя ванны и проч. (см. ч. 3), затѣмъ легкая, болѣе или менѣе пористая одежда, нисколько не стѣсняющая и не сдавливающая, корсеты поэтому безусловно вредны, они вредны еще и тѣмъ, что отъ постоянного ихъ ношенія мышцы груди ослабляются, теряютъ свою сократительную силу и не могутъ поэтому въ достаточной мѣрѣ способствовать полному расширенію и сжиманію грудной клѣтки при дыханіи. Закаливать надо однако въ здоровомъ состояніи, а не въ больномъ, и дѣлать это постепенно. Во время болѣзни больные не должны выходить на холодъ, ни даже изъ теплой комнаты въ холодную, а должны дышать равномерно теплымъ воздухомъ (приблизительно 14° Р.), не раскрываться подолгу, что особенно надо предупреждать у дѣтей, имѣющихъ привычку раскрываться по ночамъ. Страдающіе легкой простужаемостію дыхательныхъ органовъ, т. е. усиленнымъ притокомъ крови къ послѣднимъ, должны избѣгать всякихъ чрезмѣрныхъ напряженій, слишкомъ продолжительнаго хожденія, велосипедной ѣзды, танцевъ, куренія или пребыванія въ накуранныхъ помѣщеніяхъ, употребленія кофе, крѣпкаго чая, вина и пива, а также возбужденій, огорченій, чтенія возбуждающихъ книгъ, равно какъ половыхъ излишествъ,

б Хроническій катарръ дыхательнаго горла и бронховъ, хроническій бронхитъ.

Хроническій катарръ очень рѣдко ограничивается дыхательнымъ горломъ, а обыкновенно имѣется, притомъ главнымъ образомъ, и катарръ бронховъ, поэтому тутъ рѣчь будетъ только о хроническомъ бронхитѣ, при которомъ хроническій трахеитъ только подразумѣвается.

Хроническій бронхиальный катарръ бываетъ самобытный, самостоятельный или вторичный, при другихъ хроническихъ болѣзняхъ легкихъ, особенно же при порокахъ сердца; развивается часто и изъ остраго бронхита.

Симптомы хроническаго бронхита въ общемъ сходны съ симптомами остраго бронхита, течение же болѣзни зависитъ отъ

того, самостоятельна ли она или зависитъ отъ другой болѣзни. Преобладающіе симптомы—кашель и выдѣляемая мокрота, которые бываютъ различны и другъ друга обусловливаютъ.

**Сухой
бронхитъ.** Такъ, при болѣе сухомъ бронхитѣ имѣются часто сильныя пароксизмы кашля съ выдѣленіемъ очень скудной мокроты; такой катарръ, при долгомъ существованіи, ведётъ постепенно къ расширенію легкихъ, къ эмфиземѣ (см. стр. 343). Кашель въ такихъ случаяхъ очень сильный и тягостный, съ такимъ напряженіемъ, что дѣло доходитъ до рвоты, лицо становится багровымъ, шейныя вены вздуваются, и лишь послѣ долгихъ усилій больному-удается выхаркнуть немного вязкой слизи.

**Влажный
бронхитъ.** Влажный бронхитъ съ умѣреннымъ выдѣленіемъ мокроты отличается гораздо меньшей жестокостью. Особенно часто этой болѣзнію страдаютъ рабочіе, работающіе въ пыли, и дѣти, золотушные, рахитическіе, малокровные, тѣмъ болѣе—послѣ кори или коклюша. Кашель при этой формѣ бронхита бываетъ лишь весной, зимою и осенью, лѣтомъ же больные мало кашляютъ; они выхаркиваютъ небольшія количества мокроты, причемъ отхаркиваніе идетъ довольно легко. Общее состояніе здоровья можетъ при этомъ оставаться совершенно ненарушеннымъ; нормальна и температура тѣла и повышается лишь въ случаяхъ обостренія болѣзни. Такой бронхитъ можетъ совершенно пройти, но, при непрекращающихся вредныхъ вліяніяхъ или ненадлежащемъ лѣченіи, можетъ продолжаться годами.

**Бронхо-
бленнорея.** Далѣе, есть форма хроническаго бронхита, отличающаяся обильнымъ, даже громаднымъ количествомъ мокроты—бронхальнымъ ослизненіемъ. Эта форма бронхита развивается изъ хроническаго катарра бронховъ или повторныхъ острыхъ катарровъ. Слизисто-гнойная мокрота становится все обильнѣе, болѣе гнойной, кашель учащается и дѣлается сильнѣе, отъ времени до времени выхаркиваются большія количества гнойной мокроты (бронхобленнорея). Такіе больные страдаютъ въ большей или меньшей степени и одышкой, облегчающеюся каждый разъ послѣ выдѣленія мокроты. Общее состояніе здоровья нарушается; больные худѣютъ, теряютъ аппетитъ, плохо спятъ; очень часто бываютъ и небольшія повышенія температуры тѣла. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ хотъ и рѣдкихъ, бронхобленнорея излѣчивается въ томъ именно смыслѣ, что симптомы становятся мало по малу болѣе умѣренными и получаютъ характеръ симптомовъ простаго хроническаго катарра.

Имѣется еще такая форма бронхіальнаго ослизненія, при **Бронхоррея** которой выдѣляемая мокрота, хотя также обильная, но не гной-**сывороточная** ная, а сывороточная (бронхоррея сывороточная), выхаркиваніе которой сопровождается сильными пароксизмами кашля. Такая мокрота состоитъ изъ безцвѣтной, тянущейся въ нити, пѣнистой жидкости. Очень сильные приступы одышки и кашля (бронхіальная астма) повторяются періодически, всего чаще по утрамъ, и **Бронхіальная астма.** уменьшаются только съ выдѣленіемъ большого количества упомянутой мокроты. Лихорадочныхъ явленій при этой формѣ бронхита обыкновенно не наблюдается. Полное излѣченіе бываетъ рѣдко и лишь при особо благопріятныхъ условіяхъ, обыкновенно же можно разсчитывать лишь на большее или меньшее улучшение, и то не скоро.

Наконецъ, встрѣчается еще зловонный или гнилостный бронхитъ, то въ хронической, то въ скоротечной, притомъ самостоятельной формѣ, а не только при гнилостныхъ процессахъ въ легкихъ. Эта форма хроническаго бронхита отличается отъ прочихъ формъ тѣмъ, между прочимъ, что при немъ нѣтъ періодическихъ выхаркиваній обильныхъ мокротъ, а таковыя выхаркиваются часто и понемногу. Выздоровленіе и тутъ возможно, если только нѣтъ гангрены легкихъ и т. п. **Гнилостный бронхитъ.**

Въ случаяхъ давняго и запущеннаго катарра бронховъ, когда уже образовалась эмфизема легкихъ или расширение бронховъ, полное излѣченіе невозможно и при помощи гомеопатическихъ лѣкарствъ. Польза отъ гомеопатическаго лѣченія, однако, велика и въ такихъ случаяхъ: гораздо больше, чѣмъ отъ всякихъ другихъ способовъ лѣченія, во 1) для предотвращенія дальнѣйшаго развитія болѣзни, во 2) для ограниченія и полнаго излѣченія ея обостреній.

Для руководства въ выборѣ лѣкарствъ въ случаяхъ хроническаго бронхита могутъ служить слѣдующія общія указанія (характеристика отдѣльныхъ лѣкарствъ приводится ниже): **Лѣченіе хроническаго бронхита.**

При обильномъ выдѣленіи мокротъ: *Бріонія*, *Тарт. эмет.*, *Пульсат.*, *Калькар. карб.*, *Ликопод.*, *Манган.*, *Силиція*, *Сульфуръ*, *Станнумъ*, *Бафита-карб.*, *Карбо вегетаб.*, *Дигиталисъ*, *Хина*, *Феррумъ*, *Антимон. круд.*, *Амбра*.

При скудномъ выдѣленіи мокротъ или отсутствіи ея: *Нуксво м.*, *Беллад.*, *Спонгія*, *Іод.*, *Сенега*, *Гіосціам.*, *Опій*, *Гемаръ сульфурисъ*, *Арсеникъ*; судорожный щекочущій кашель въ этомъ случаѣ показываетъ особенно: *Белл.*, *Сенега*, *Гіосціам.*, *Опій*.

При недавнемъ хроническомъ бронхитѣ, происшедшемъ изъ остраго, показаны: *Бріонія*, *Тартар. эмет.*, *Пульсат.*, *Сульф-*

фуръ, Нуксъ-вом., Беллад., Гепаръ, Инекакуана,—послѣ кори: *Пульсат.*;—послѣ коклюша. *Купрумъ, Хина, Феррумъ, Арсен., Гепаръ*; у старыхъ людей наиболѣе умѣстны: *Тартар. эмет., Ликопод., Барита, Карбо.*

При обострѣніяхъ хроническаго катарра на первомъ планѣ стоятъ *Брионія, Меркурій, Фосфоръ, Арсеник.*

Во всѣхъ болѣе упорныхъ случаяхъ хроническаго бронхита, порождающихъ подозрѣніе на туберкулезъ, примѣняется лѣчение, указанное при этой послѣдней болѣзни.

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи хроническихъ формъ бронхита.

Тартар. эметик. З. Сильный, судорожный кашель съ обильными хрипами въ груди и выдѣленіемъ большихъ количествъ бѣлой мокроты; превосходно дѣйствуетъ въ случаяхъ недавняго происхожденія наоборотъ же мало пользы отъ этого средства въ случаяхъ застарѣлыхъ, тѣмъ болѣе при уже развившейся эмфиземѣ.

Пульсатила х З. Кашель, являющийся преимущественно ночью, сопровождающийся щекотаніемъ въ дыхательномъ горлѣ съ выдѣленіемъ обильной слизи; слизь большей частью бѣлая, часто смѣшанная и съ желтоватыми или зеленоватыми комками. Мало помогаетъ при эмфиземѣ, наоборотъ въ значительной мѣрѣ—при туберкулезѣ и у блѣднонемочныхъ больныхъ, также у дѣтей

Сульфуръ З—6 Превосходное средство въ застарѣлыхъ случаяхъ, если только еще нѣтъ эмфиземы. Обильная мокрота, или очень тягучая. Чрезмѣрная простудливостъ, но не отъ туберкулеза легкихъ зависящая. Симптомы могутъ быть двоякаго рода кашель либо рыхлый съ легко отдѣляющеюся мокротой, что бываетъ, однако, не постоянно; такъ, ночью кашель сильный, но сухой, утромъ же и днемъ—влажный, а отхаркиваемая мокрота большей частью бѣлая, густая, съ желтоватыми или зеленоватыми комками, гнилостными на вкусъ и даже противнаго запаха; охриплость, ощущение жесткости въ горлѣ и проч., что указываетъ на соучастіе въ катаррѣ гортани и дыхательнаго горла;—или кашель является сильными приступами съ значительной одышкой, онъ судороженъ и сухъ, со свистами въ груди, является преимущественно поздней ночью, и тягучая, стекловидная мокрота лишь къ утру легко отхаркивается. У очень ослабленныхъ, особенно у старыхъ людей Сульф. мало помогаетъ.

Нуксъ-вомика З. Имѣетъ много сходнаго съ Сульфур. Ка-

шель, раннимъ утромъ, сухй, судорожный, вызывающй боль въ животѣ; мокрота отдѣляется легче лишь утромъ послѣ вставанія больного съ постели, также послѣ теплаго питья. Запоръ дополняетъ показаніе. Подходить для больныхъ болѣе крѣпкаго тѣлосложенія и при не слишкомъ еще укоренившейся болѣзни.

Белладонна > 3. Можетъ служить полезнымъ добавочнымъ лѣкарствомъ, когда хроническій бронхитъ сопровождается продолжительнымъ, мучительнымъ, щекочущимъ кашлемъ; кашель вызывается холоднымъ воздухомъ или продолжительнымъ разговоромъ, онъ — сухой или съ очень скудной, тягучей мокротой и ухудшается около полуночи. Эта форма хроническаго катарра не очень часта.

Калькареа карбоника. Подходить при хроническомъ катаррѣ съ эмфиземой, если кашель сухой, мучительный, преимущественно ночью, съ крайне трудно отхаркиваемой мокротой, тягучей или пѣнистой соленоватаго или приторно-сладкаго вкуса.

Силиція 6. Обильное выдѣленіе мокротъ, сильная одышка не только при движеніи, но и въ покоѣ. Особенно при хроническомъ катаррѣ у каменотесовъ (такъ же и Калькареа), имѣющемъ часто злокачественный характеръ.

Барита карбоника 6. Особенно у старыхъ людей съ обильной, но трудноотхаркиваемой мокротой, кашель очень сильный, судорожный, вскорѣ послѣ полуночи.

Ликоподи 3. Особенно у старыхъ людей, при эмфиземѣ. Постоянное щекотаніе въ горлѣ, сильная хрипота въ груди, съ выдѣленіемъ, однако, лишь скудной мокроты, сѣровой и соленого вкуса; ухудшеніе ночью.

Манганумъ 3—6. Кашель судорожный, съ трудно отдѣляемой мокротой, большей частью лишь днемъ; мокрота состоитъ изъ твердыхъ, комковатыхъ кусочковъ желтаго или зеленаго цвѣта.

Спонгія × 3. Кашель является болѣе рѣдкими приступами, но очень сильный, судорожный, съ одышкой и со свистами во всей груди, большей частью ночью, можетъ продолжаться часами, пока отхаркнется мокрота вначалѣ скудная, пѣнистая, а затѣмъ, спустя нѣсколько часовъ, стекловидная, плотная, круглой или продолговатой формы.

Іод. × 3. Имѣетъ сходство съ Спонгеей по характеру кашля и мокроты, съ той разницей, что мокрота не оформлена, и имѣется одышка, не проходящая совсѣмъ и въ промежуткахъ между приступами. Для старыхъ людей мало подходитъ.

Дигиталисъ × 1. При сильной одышкѣ съ посинѣніемъ лица и ощущеніемъ полноты въ груди (отъ прилива крови къ легкимъ).

Арсеникъ 3. Въ случаяхъ запущенныхъ, при эмфиземѣ и симптомахъ, какъ при Дигиталисѣ. Постоянная одышка. Кашель вызывается сильнымъ щекотаніемъ въ дыхательномъ горлѣ и подъ грудной доской, холоднымъ воздухомъ, особенно при значительныхъ переменахъ погоды, преимущественно ночью; кашель сухой, свистящій, съ очень трудно отдѣляемой мокротой, пѣнистой, отчасти тягучей, бѣлой. Арсен. подходит при этой болѣзни больше для больныхъ средняго возраста и меньше для старыхъ. Если Арсен. въ первые нѣсколько дней не вызвалъ благоприятнаго оборота въ болѣзни, то напрасно будетъ брать его и дальше. Особенно Арсен. показанъ при одновременномъ поражении сердца.

Карбо вегетабилисъ 3—6. Имѣетъ много сходста съ Арсен., съ той разницей, что для Карбо требуется обильная мокрота. Мокрота желтая или зеленая, часто съ гнилостнымъ запахомъ. Одновременное поражение гортани дополняетъ показанія. Карбо примѣняется въ случаяхъ, уже очень застарѣлыхъ, и поэтому нельзя ожидать скорыхъ благоприятныхъ результатовъ.

Фосфоръ 3. Подходит больше для случаевъ обострения хронического бронхита.

Бріонія × 3. Подходит также для случаевъ обострившагося катарра или для хронического бронхита недавняго происхожденія, Кашель судорожный, потрясающій, но всегда съ обильной, желтой, слизистой мокротой; Бріонія не уместна при сухомъ кашлѣ съ тягучей, скудной мокротой.

Іюссам × 3. Можетъ быть полезенъ при хроническомъ бронхитѣ, какъ добавочное лѣкарство, когда кашель судорожный, ночной, совсѣмъ сухой, или съ очень скудной, тягучей мокротой, являющийся, какъ только больной ляжетъ, и облегчающийся въ сидячемъ положеніи послѣдняго.

Опій × 2—× 3. Кашель сухой, судорожный, являющийся при ступахъ, преимущественно ночью; кашель щекочущій съ выдѣленіемъ очень скудной мокроты. При обильной мокротѣ опія давать не слѣдуетъ, такъ какъ, успокаивая кашель, онъ ведетъ этимъ къ скопленію мокроты и усилению одышки.

— *О дозахъ и способѣ приѣмовъ*, см. ч. I., гл. 3 и 4.

**Предупре
тельные мѣры**

Образъ жизни не для всѣхъ, страдающихъ хроническимъ катарромъ бронховъ, одинаковъ. При простомъ неосложненномъ катаррѣ молодыхъ и крѣпкихъ субъектовъ не требуется особен-

ных предупредительных мѣръ, и они могут смѣло выходить на воздухъ при всякой сносной погодѣ, хотя бы и вѣтренной, соблюдая лишь самыя обычныя мѣры предосторожности; не слѣдуетъ чрезмѣрно тепло одѣваться, такъ какъ это изнѣживаетъ организмъ и тѣмъ только способствуетъ частымъ обостреніямъ болѣзни. Главнымъ образомъ надо заботиться объ умѣренно-тепломъ содержаніи ногъ. Въ случаяхъ болѣе сильнаго, упорнаго или давняго катарра полезны мѣры закаливанія организма (см. стр. 311 и въ 3-ей части). О закаливаніи не можетъ быть рѣчи у людей старыхъ или, хотя и болѣе молодыхъ, но ослабленныхъ. Для такихъ больныхъ требуется возможно болѣе равномерная температура окружающаго воздуха, соотвѣтственно теплая одежда, равномерность въ образѣ жизни. То же надо сказать о раннемъ дѣтскомъ возрастѣ. Изъ этихъ общихъ правилъ могутъ быть и исключенія. Такъ, встрѣчаются молодые субъекты, рѣшительно не переносящие никакого способа закаливанія, и наоборотъ болѣе старыя, только и хорошо себя чувствующие, когда они выходятъ при всякой погодѣ; одинъ ребенокъ недѣлями не выпускается изъ дому, и тѣмъ не менѣе катарръ его не уменьшается нисколько, наоборотъ же—проходитъ скоро, когда ребенокъ начинаетъ проводить цѣлыя дни на воздухѣ.—Во всякомъ же случаѣ не подлежитъ сомнѣнію то, что хорошій чистый воздухъ, умѣренной температуры и лишенный пыли, дыма и всякихъ запаховъ, и надлежащее, здоровое питаніе являются существенными условіями при лѣченіи всѣхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, стало быть и хроническаго катарра.

Діета должна быть вообще нераздражающая и питательная, **Вспомогатель-
ныя мѣры** и надо избѣгать всего того, что ведетъ къ разстройству пищеваренія или мѣшаетъ дѣйствію гомеопатическихъ лѣкарствъ (см. стр. 47) Въ упорныхъ случаяхъ полезны бываютъ слѣдующія вспомогательныя мѣры. При привычно холодныхъ ногахъ дѣлаются ножныя паровыя ванны съ послѣдующими холодными (15° Р) обтираніями или такими же ножными ваннами (продолжительностью 5 минутъ). Особенно важны паровыя примѣненія камерныя и постельныя, послѣднія продолжительностью 1½ часа, раза 3 въ недѣлю, съ послѣдующимъ общимъ обмываніемъ (22° Р.) или полуванной (25° Р., 10 минутъ). Каждое утро—цѣльное обмываніе (22° Р.) въ кровати; при этомъ начинать съ ногъ и не вытираться на-сухо.—Также массажъ груди, причемъ цѣлесообразны лѣкарственныя втиранія изъ *Беллад.*, *Бріоніи* и т. п. Ле

гочная гимнастика 2—3 раза въ день. Частыя, черезъ 2—3 часа, полосканія (22° Р.) чистой водой или растворами лѣкарствъ, по вечерамъ—нагрудныя обертыванія и обертыванія бедеръ (20° Р.). — При застояхъ въ легкихъ и эмфиземѣ — особенно отвлекающіе способы: ножныя паровыя ванны съ послѣдующимъ вытираніемъ, или холодной ножной ванной (15° Р., 5 мин.), ежедневно полуванна или сидячая ванна (25° Р., 10 мин.), обертываніе бедеръ, набрюшныя согрѣвающій компрессъ, удерживаемые клистиры (18° Р.), каждый разъ непосредственно послѣ испражненія; также по утрамъ цѣльное обмываніе (22° Р.).

2. Гриппъ. Инфлуэнца.

Определение болѣзни.

Гриппъ не есть простой катарръ дыхательныхъ органовъ, хотя и сопровождается симптомами такового. Общій же характеръ этой болѣзни совершенно другой. Она прежде всего эпидемическая, лишь рѣдко спорадическая, и вызывается, какъ надо полагать, особыми микробами, не вполне пока выясненными. Разъ появившись, эпидемія гриппа поражаетъ сразу много людей, а не распространяется постепенно, какъ бы было, еслибы эта болѣзнь передавалась отъ одного лица къ другому. Поэтому прилипчивость гриппа подлежитъ еще сомнѣнію. Разовое заболѣваніе гриппомъ не предохраняетъ отъ повторнаго, и предрасположенными являются всѣ возрасты, въ большей мѣрѣ—люди среднихъ и старческихъ лѣтъ, а также уже страдающіе легкими, особенно—туберкулезные.

Симптомы гриппа.

Очень важно разграничить обыкновенный бронхитъ, хотя бы и бурно, при тифозныхъ явленіяхъ, протекающій, отъ гриппа, и простую простуду съ болѣе или менѣе повышенной температурой тѣла, обычную „инфлуэнцу“ профановъ, отъ настоящей инфлуэнцы, являющейся тѣмъ же гриппомъ. Такое разграниченіе важно, именно, въ цѣляхъ лѣченія. Необходимо поэтому дать здѣсь болѣе полную картину этой болѣзни.

Прежде всего теченіе гриппа не такое, какъ при остромъ бронхитѣ. Гриппозный бронхитъ очень легко принимаетъ форму капиллярнаго бронхита, сопровождаясь катарромъ носа, гортани и дыхательнаго горла, и отличается большимъ упорствомъ и медленнымъ теченіемъ; катарръ этотъ то необычайно сильный, то въ такой степени замаскируется общими явленіями, что легко можетъ быть совсѣмъ просмотрѣнъ. Заболѣванію гриппомъ

предшествуютъ обыкновенно предвѣстники, какъ то: большая усталость съ общей раздражительностію и безсонницей и потерей аппетита; лихорадка отсутствуетъ въ началѣ, или она лишь небольшая. Затѣмъ, съ повышеніемъ температуры тѣла, появляются или, если уже были, усиливаются катарральные признаки со стороны дыхательныхъ органовъ. При этомъ имѣется жестокая и упорная головная боль, чаще всего во лбу, и боли въ мышцахъ тѣла, какъ при ревматизмѣ, съ полнымъ вмѣстѣ съ тѣмъ ослабленіемъ ихъ. На высотѣ развитія болѣзни катарръ можетъ быть сильнымъ или, наоборотъ, незначительнымъ. Лихорадка обыкновенно высокая и имѣетъ тифозный характеръ. Пищевареніе испорчено и имѣется цѣлый рядъ диспептическихъ явленій. Вечеромъ и ночью состояніе больного замѣтно ухудшается, больше всего его донимаютъ кашель и головная боль.

У здоровыхъ, крѣпкихъ субъектовъ продолжительность болѣзни — недѣли двѣ; по окончаніи ея остается часто большая слабость въ теченіе еще болѣе или менѣе долгаго времени, особенно у старыхъ людей.¹⁾ Благопріятнымъ признакомъ является начавшееся пониженіе лихорадки.

Очень часто болѣзнь оставляетъ послѣ себя болѣе или менѣе серьезныя послѣдствія, какъ то упорный хроническій катарръ гортани, дыхательнаго горла или бронховъ; особенно же опасаться можно послѣдовательнаго развитія туберкулеза легкихъ; послѣдствіями являются часто и длительныя разстройства со стороны желудка и кишекъ или печени.

Въ началѣ болѣзни лучшимъ средствомъ является Камфора, которую еще Ганеманъ рекомендовалъ при гриппѣ, въ видѣ камфорнаго спирта для вдыханія (нюханія) и приемовъ внутрь. Вмѣсто обыкновеннаго камфорнаго спирта еще лучше брать *Камфора Рубини* по 1—2 капли на мелкорастертомъ сахарѣ нѣсколько разъ въ день. Не переносящимъ остраго вкуса этого препарата, равно какъ дѣтямъ, можно давать *Камфора* $\times 1$ — $\times 2$, именно въ началѣ болѣзни, если имѣется насморкъ и давящая боль во лбу, или же содержащій камфору *Эвкалипт.* $\times 2$, по 3—5 капель нѣсколько разъ въ день.

Въ болѣе легкихъ случаяхъ можно для начала давать лишь *Аконит.* $\times 3$, *Беллад.* $\times 3$, *Меркур. сол. 3*. Кромѣ того полезнымъ при гриппѣ средствомъ является *Натр.-нитр.* $\times 3$ черезъ 2 часа по 3 капли, а затѣмъ *Нуксъ-вом.*, *Бріонія*. При болѣе глубокомъ пораженіи легкихъ, что обнаруживается усиленіемъ катарра и по-

Лѣченіе
гриппа.

стоянно повышенной температурой (39° Ц. и выше—угрожающее или уже наступившее воспаление легких), надо немедленно дать *Брион.* и *Фосфоръ*, а также *Тартар.-эмет.*, послѣднее—особенно дѣтямъ и старикамъ, при очень короткомъ дыханіи, хрипахъ и свистахъ въ гортани и груди (см. „Острый бронхитъ“, и „Воспаление легкихъ“).

При преобладаніи разстройствъ пищеваренія: *Ацид. муриат.*, *Ипекак.*, *Антим.-круд.*—*Брион* и *Хелидон.*: при поражении печени (см. „Желтуха“).—При тифозномъ гриппѣ: *Русъ*, *Арсен.* *Фосфор.* (см. „Тифъ“).—Рекомендуется еще при гриппѣ *Саон-дилла* (сильное судорожное чиханіе, слезотечение, воспаление горла). *Сульфуръ* умѣстенъ больше въ концѣ болѣзни, если разстройство со стороны легкихъ затягивается слишкомъ долго. Для туберкулезныхъ въ такомъ случаѣ полезнѣе давать *Станнумъ* попеременно съ *Карбо. вегетаб.*

Дѣленія приbedенныхъ лѣкарствъ см. на стр. 35—39.

О дозахъ и способѣ приѣмовъ ч. 1., гл 3 и 4.

Вспомогательныя мѣры и діета вообще тѣ же, что при остромъ катаррѣ дыхательнаго горла и бронховъ (см. выше)

Коклюшъ.

**Симптомы
и теченіе**

Коклюшъ принадлежитъ къ эпидемическимъ, заразнымъ болѣзнямъ. Поэтому надо принимать всѣ мѣры къ отдѣленію здоровыхъ отъ больныхъ, а выкашливаемая послѣдними мокроты обливать кипяткомъ, равно какъ платки и бѣлье съ больныхъ вываривать въ водѣ (къ водѣ можно еще прибавить обычныя дезинфецирующія средства: карболовую кислоту, хлорную известь и пр.). Особенно предрасположены къ этой болѣзни дѣти отъ 2 до 8-лѣтняго возраста. Въ теченіи ея различаютъ 3 періода: остро-катарральный, спазматическій и періодъ разрѣшенія, обыкновенно оканчивающійся скорымъ выздоровленіемъ. Первый періодъ, острый катарръ дыхательныхъ путей, продолжается дней 8—10 и постепенно, но скоро переходитъ въ спазматическій, кашель получаетъ судорожный характеръ и всегда сопровождается рвотой. Характернымъ признакомъ этого кашля является то, что послѣ нѣсколькихъ, болѣе или менѣе отрывистыхъ, кашлевыхъ толчковъ слѣдуетъ глубокое, громкое, свистящее вдыханіе. Припадки кашля, приближеніе которыхъ всегда обнаруживается волненіемъ и безпокойствомъ ребенка, повторяются 3—6—8 и болѣе разъ въ сутки; во время припадка

лицо часто багровѣтъ, и нерѣдко появляется кровотечение изъ носа, рта, уха, или глаза наливаются кровью. Продолжительность этого периода отъ 2 до 12 недѣль, обыкновенно — недѣли 4. Наконецъ, къ 3-ему периоду припадки ослабѣваютъ и рѣже повторяются, кашель становится мягче, съ легкимъ отхаркиваніемъ желтой слизи; этотъ послѣдній періодъ продолжается 1—2 недѣли. Въ общемъ болѣзнь продолжается такимъ образомъ 2 — 3 мѣсяца и ведетъ часто къ значительному ослабленію и истощенію дѣтей. Поэтому для маленькихъ и слабенькихъ она можетъ стать даже опасной, особенно въ зимнее время. Кромѣ того коклюшъ можетъ осложниться воспаленіемъ легкихъ, поносами, мозговыми раздраженіями съ конвульсіями, равно какъ служить причиною развитія такихъ послѣдовательныхъ болѣзней, какъ легочная эмфизема, хроническій бронхитъ, туберкулезъ легкихъ.

Катаральный періодъ лѣчится какъ острый насморкъ и острый катарръ бронховъ (см. эти болѣзни); главнымъ, однако, лѣкарствомъ является *Белладонна* $\times 3$, которая дается попеременно съ *Купрумъ 6* (или *Купрумъ ацетик. $\times 1 - \times 3$*), если кашель начинаетъ принимать коклюшный характеръ. Эти лѣкарства лучше давать при коклюшѣ въ болѣе рѣдкіе, нежели частые промежутки времени, по 2 приема въ день съ cadaго. Если спустя нѣсколько дней не замѣтно облегченія, то вмѣсто Купрумъ, давать *Цинк. 6* или *Цинк. шанат. 3*), которое подходитъ больше во второмъ, спазматическомъ, періодѣ. Это лѣкарство дается утромъ и вечеромъ, а въ прочее время дня другое, наиболѣе подходящее.

Лѣченіе
коклюша.

Изъ прочихъ лѣкарствъ надо имѣть въ виду слѣдующія: *Ипекак. 3*: при рвотѣ пищей, кровотеченіи изъ носа или же сильномъ бронхитѣ; — *Дрозера 6*: при обильномъ скопленіи слизи (хрипы) и охриплости; сопровождающиеся сильнымъ удушьемъ припадки, кровотечение изъ рта и носа, сильный жаръ, теплый потъ. — Послѣ Дрозера, а также послѣ Купрумъ часто подходитъ *Вератр. альбум. 3*: особенно при блѣдности лица, холодномъ потѣ, безпокойствѣ и страхѣ передъ приближеніемъ припадка, равно какъ при произвольномъ мочеиспусканіи во время кашля. — *Коніумъ. 3*: при преимущественно ночныхъ припадкахъ. — *Цина $\times 3$* : когда дѣти часто ковыряютъ въ носу, при ненасытномъ аппетитѣ. — *Страмон. 3* при белладонновыхъ симптомахъ со рвотой; рѣдкое кровотечение изъ носа. — *Арника $\times 3$* : при преобладающихъ кровотеченіяхъ и сильной боли въ груди при кашлѣ (ребенокъ плачетъ при приближеніи припадка). — *Лак-*

тука вироза, Амбра, Коккусъ какти, Кораллиумъ, Лаурацераз. (Характеристику этихъ лѣкарствъ см. въ „Лѣкарствовѣдѣніи“). Осложненія лѣчатся соотвѣтственнымъ образомъ (си „воспаленіе легкихъ“ и проч.).

Гомеопатическое лѣчение при коклюшѣ даетъ тѣмъ лучше результаты, чѣмъ раньше оно начато.

Диета и вспомо-
гательныя
мѣры.

Диета должна быть болѣе легкая, но достаточно питательная, что необходимо для поддержанія и укрѣпленія силъ ребенка. Пищу и питье давать лишь понемногу на разѣ, хотя и почаще. Если имѣется наклонность къ рвотѣ во время припадка кашля, то послѣ каждаго приема пищи лучше ребенку посидѣть или полежать, нежели двигаться. При слишкомъ частой рвотѣ полезно давать понемногу токайскаго вина, раза два-три въ день. Въ судорожномъ періодѣ во время приступа кашля надо помочь больному приподняться, если онъ лежитъ, и поддерживать ему голову. Холодный компрессъ на голову и на грудь часто облегчаетъ приступъ. Можно для этого испытать также ручной приемъ д-ра Негели, описанный на стр. 207.

Относительно пользованія вольнымъ воздухомъ можно сказать вообще слѣдующее: Въ катарральномъ періодѣ болѣзни, если имѣется лихорадочное состояніе, больному надо лежать въ постели при умѣренной температурѣ комнатнаго воздуха. Когда же лихорадки нѣтъ, и въ дальнѣйшемъ періодѣ болѣзни, особенно въ спазматическомъ, надо давать больному почаще возможность дышать вольнымъ воздухомъ. Погода, если только она не очень плоха, не должна служить для этого препятствіемъ, надо только принимать при этомъ мѣры предосторожности противъ простуды. Между прочимъ больной не долженъ оставаться на воздухѣ позднѣе захода солнца. Переменна мѣстопробыванія можетъ имѣть нѣкоторое полезное значеніе лишь въ томъ случаѣ, если мѣняется воздухъ городской на воздухъ деревенскій, но не на городской же.—Ванны (тепловатыя) при коклюшѣ не противопоказаны, а прохладныя обтиранія тѣла по утрамъ прямо полезны, такъ какъ дѣлаютъ дѣтей болѣе устойчивыми противъ простудныхъ вліяній.

Г. Болѣзни легкихъ.

Содержаніе этого (Г) подѣла. 1. Приливъ крови къ легкимъ, Гиперемія легкихъ.—2. Кровотеченіе изъ легкихъ, кровохарканіе.—3. Воспаленіе легкихъ (Пневмонія): а) Катарральная пневмонія, б) Крупозная пневмонія.—4. Эморизема легкихъ.—5. Астма, Спазмъ легкихъ (см. стр 138) —6. Чохотка легкихъ, Бугорчатка (Туберкулезъ) легкихъ

1. Приливъ крови къ легкимъ. Гиперемія легкихъ.

Гиперемія легкихъ можетъ быть активная (приливая), вслѣдствіе усиленнаго притока крови къ нимъ, или пассивная (застойная), вслѣдствіе уменьшеннаго или замедленнаго оттока крови изъ нихъ. Усиленный приливъ крови къ легкимъ вызывается всѣми тѣми обстоятельствами, отъ которыхъ происходитъ усиленная сердечная дѣятельность, тѣмъ болѣе, когда имѣется какая либо ненормальность сердца, или особое личное предрасположеніе, какъ, на примѣръ, у молодыхъ людей, быстро растущихъ, съ узкой, длинной грудной клѣткой, нѣжной кожей и слабыми грудными мышцами. Приливу крови къ легкимъ способствуютъ: сильныя напряженія, бѣганье, танцы, верховая ѣзда, подъемы на гору и т. п. или душевныя волненія, или же вещества, усиливающія кровообращеніе, какъ, на примѣръ, спиртные напитки, кофе, крѣпкій чай; наконецъ, приливы являются отъ выбывающихъ привычныхъ кровотеченій (регуль, геморроя) и отъ прямыхъ раздраженій, дѣйствующихъ на легкія, какъ то: вдыханія очень холоднаго или очень горячаго воздуха, ядовитыхъ газовъ, слишкомъ разрѣженнаго воздуха и т. п. Приливъ крови къ легкимъ легко вызывается при нѣкоторыхъ болѣзненныхъ измѣненіяхъ въ легкихъ. — Пассивная гиперемія легкихъ есть всегда слѣдствіе болѣзненныхъ процессовъ въ другихъ органахъ, чаще всего — въ сердцѣ.

Къ симптомамъ гипереміи легкихъ относятся: въ болѣе легкихъ случаяхъ — стѣсненіе въ груди съ болѣе или менѣе короткимъ и учащеннымъ дыханіемъ, безъ боли и скоропреходящее; въ болѣе же трудныхъ случаяхъ стѣсненіе въ груди является внезапно, усиливается до высшей степени, до удушья: дыханіе очень ускорено и поверхностно, сердце сильно бьется, шейныя артеріи наливаются, лицо краснѣетъ, въ вискахъ — стучаніе и біеніе; къ этому присоединяется мучительный кашель, которымъ выводится въ значительномъ количествѣ сыровоточно-пѣнистая жидкость, смѣшанная нерѣдко съ ярко-красной кровью или же вся окра-

Причины.

Симптомы
гипереміи
легкихъ.

шенная равномерно розовымъ цвѣтомъ. Выдѣленіе сывороточной жидкости въ легочныхъ пузырькахъ можетъ дойти до степени отека легкихъ со всѣми явленіями задушенія, посинѣніемъ лица, крайнимъ ослабленіемъ пульса, хрипѣніемъ въ дыхательныхъ путяхъ.

Активная гиперемія легкихъ проходитъ почти всегда скоро и безслѣдно, въ болѣе же трудныхъ случаяхъ остается, послѣ прекращенія гипереміи, еще на болѣе или менѣе продолжительное время отечное состояніе легкихъ.

Симптомы пассивной гипереміи вообще тѣ же, что и активной, и только предшествовавшее состояніе здоровья и специальное изслѣдованіе сердца и легкихъ могутъ выяснитъ характеръ гипереміи. Теченіе пассивной гипереміи зависитъ отъ основной болѣзни.

Лѣченіе.

Главное лѣкарство при всякомъ активномъ приливѣ къ легкимъ есть *Аконитъ* $\times 3$, особенно въ случаяхъ сердечнаго расстройства; облегченіе получается уже отъ первыхъ приѣмовъ. — *Белладонна* 3 умѣстна при одновременномъ приливѣ къ головѣ съ синевато-краснымъ лицомъ и блескомъ глазъ; сильная тоска и безпокойство, судорожный, сухой кашель. — *Нуксъ-вом.* 3: у полнокровныхъ субъектовъ, ведущихъ сидячій образъ жизни и привычныхъ къ вину и кофе. — *Бріонія* $\times 3$: при приливѣ вслѣдствіе усиленнаго тѣлеснаго напряженія, съ головной болью; одновременное колотье въ боку и сухой кашель.

Въ случаяхъ очень сильныхъ приливовъ съ угрожающимъ отекомъ легкихъ дается *Фосфоръ* 3, *Тартар. эмет.* 3, а у сердечныхъ больныхъ *Арсеникъ* 3.

У слабыхъ и малокровныхъ, склонныхъ къ гипереміи легкихъ и кровохарканію, показано *Феррумъ* 3; или же *Арсеникъ* 6, если тѣлесное напряженіе вызываетъ сильнѣйшее сердцебіеніе и сильное жженіе въ груди, съ неутолимой жаждой.

Для предупрежденія приливовъ къ легкимъ очень важно, важнѣе, чѣмъ при всякой другой болѣзни, совершенно не пить кофе и крѣпкаго чая, также вина, и быть осторожнымъ въ отношеніи всѣхъ тѣхъ причинныхъ моментовъ, которыми вызываются эти приливы.

2. Кровотеченіе изъ легкихъ. Кровохарканіе.

Причины.

Причины: болѣзни сердца (застой или чрезмѣрное накопленіе крови въ легкихъ вслѣдствіе неправильной дѣятельности сердца); болѣзни легкихъ (легочная чахотка, гангрена легкихъ, воспаленіе легкихъ); поврежденія легкихъ (ущемленіемъ, ударомъ, проколомъ,

выстрѣломъ). Попадая изъ легочной ткани въ бронхи, кровь отсюда выбрасывается наружу откашливаніемъ или отхаркиваніемъ, при чемъ она является яркокрасной и пѣнистой (отъ смѣшенія ея съ легочнымъ воздухомъ), обыкновенно лишь въ малыхъ количествахъ, иногда же въ очень большихъ, массовыхъ, когда кровь бьетъ точно фонтаномъ (легочное кровоизліяніе). Кровохарканіе не всегда служитъ признакомъ легочной болѣзни (чахотки), но, какъ и носовое кровотеченіе, можетъ въ маломъ количествѣ явиться иногда облегчающимъ моментомъ при сердечныхъ болѣзняхъ, при скрывшейся менструаціи или при геморроѣ у полнокровныхъ особъ. Сомнѣніе на счетъ исходнаго мѣста кровотеченія можетъ явиться, когда кровь выдѣляется не кашлемъ или отхаркиваніемъ, а второй, какъ бы изъ желудка. Въ послѣднемъ случаѣ кровь смѣшана съ пищевой гущей, притомъ она не яркокрасная, а темная; кромѣ того имѣются другіе признаки желудочнаго заболѣванія; испражненія при желудочномъ кровотеченіи всегда черносмолистыя, при легочномъ—этого нѣтъ. (См. стр. 223).

Во время кровотеченія примѣняются черезъ каждыя 10—15 минутъ и рѣже: *Миллефол.*: особенно при чахоткѣ.—*Акон.*: послѣ душевныхъ волненій, также при явленіяхъ прилива, покраснѣніи лица, ускоренномъ пульсѣ, затрудненномъ дыханіи (рядомъ съ *Беллад.*).—*Арника*: послѣ чрезмѣрнаго напряженія, а также послѣ механическихъ поврежденій.—*Гамамелисъ-экстрактъ*, какъ *Арника*: кровь темнокрасная, комковатая.—*Пульсат.*: при скрывшихся регулахъ.—*Дигитал.*: при сердцебіеніи (послѣ или попеременно съ *Акон.*).—*Арсеник.*: при быстро наступающей слабости.—Затѣмъ—лѣченіе основной болѣзни.

Лѣченіе.

Лѣченіе см. стр. 35—39.

Должно внушить больному возможно болѣе спокойное состояніе духа, такъ какъ волненіе только усиливаетъ кровотеченіе. Онъ долженъ лечь въ постель, возможно спокойно лежать, не говорить, стараться удерживать кашель. На грудь—прохладные (15°) компрессы, смѣняемые каждыя 10 минутъ. Растираніи груди никакихъ нельзя дѣлать въ такихъ случаяхъ, и вообще у больныхъ, склонныхъ къ кровохарканію или кровотеченію изъ легкихъ. Полезными могутъ быть еще набрюшныи компрессъ (22° Р) и обертываніе нижнихъ конечностей (20° Р.), смѣняемые каждые 2—3 часа. Если такое обертываніе недостаточно быстро нагрѣвается, то надо обложить каждую ногу двумя бутылками, наполненными горячей водой и заку-

Вспомогательныя мѣры.

поренными, или же 2—3 раза въ день дѣлать ножную паровую ванну съ послѣдующимъ прохладнымъ обтираніемъ нижнихъ конечностей или 15 градусной ножной ванной, продолжительностію 5 минутъ.— Далѣе, опорожняющіе клистиры, 2—3 раза въ день, и послѣ cadaго испражненія прохладные (18° Р.) удерживаемые (поль-стакана) клистиры. Въмѣсто обертываній можно дѣлать также паровые компрессы на животъ и на ноги.— Пища должна быть прохладная и нераздражающая; молоко, простокваша, фрукты. Безусловно запрещается вино, кофе, крѣпкій чай, также куреніе табака. Температура комнаты не должна превышать 15° Р. (отъ 10° до 14° Р.). (См. еще „Легочная чахотка“).

3. Воспаленіе легкихъ. Пневмонія.

Воспаленіе легкихъ бываетъ катарральное, встрѣчающееся преимущественно у дѣтей и у особъ старческаго возраста, и крупозное — преимущественно въ среднемъ возрастѣ, отъ 20 до 45 лѣтъ.

а. Катарральное воспаленіе легкихъ.

(Бронхопневмонія).

Симптомы.

Эта болѣзнь часто присоединяется къ острому катарру бронховъ (см. стр. 321), самостоятельному или сопровождающему такіа болѣзни, какъ корь, гриппъ, тифъ, и встрѣчается не только у дѣтей и стариковъ, но и въ среднемъ возрастѣ у такихъ особъ, которыя страдаютъ частыми катаррами дыхательныхъ путей. У дѣтей наступленіе бронхопневмонии узнается прежде всего по внезапному и значительному ускоренію дыхания, при чемъ число выдыханій можетъ дойти до 40—60 въ минуту. Дѣти становятся безпокойными, мечутся въ разныя стороны, отрывисто и поверхностно кашляютъ; щеки краснѣютъ, кожа на ошупь горяча и суха; температура тѣла поднимается до 40° Ц., пульсъ ускоренъ, часто настолько, что нельзя сосчитать. Слабыя дѣти рѣдко выносятъ эту болѣзнь и погибаютъ, часто уже въ нѣсколько дней, отъ накопившейся въ крови угольной кислоты и паралича сердца. Болѣе крѣпкія держатся до 10—14 дней, послѣ чего начинаютъ выздоравливать, при постепенномъ паденіи температуры (въ противоположность крупозному воспаленію, гдѣ, при поворотѣ къ выздоровленію, температура сразу, круто спадаетъ до нормы и даже ниже), или же, при дальнѣйшемъ усиленіи болѣзни, уми-

рають отъ вышеупомянутой причины. Неблагопріятнымъ въ такихъ случаяхъ признакомъ считается поблѣднѣніе слизистыхъ оболочекъ (острое малокровіе). Иногда эта болѣзнь влечетъ за собою развитие легочной чахотки, особенно при воспалении коревого происхожденія.

Описаннымъ образомъ протекаетъ болѣзнь, если предоста-вить ее самой себѣ, собственному теченію, или не надлежащимъ образомъ лѣчить. Напротивъ того, при лѣченіи гомеопатическими средствами болѣзнь эта рѣдко кончается смертью, даже у маленькихъ дѣтей, и въ общемъ продолжается не дольше 1—2 недѣль. У взрослыхъ и стариковъ она протекаетъ гораздо менѣе бурно, но все же должна и въ этихъ случаяхъ считаться серьезной, если появляются признаки застоевъ (набухание венъ на рукахъ) и слабый учащенный пульсъ.

Если при бронхопневмоніи приложить ухо въ разныхъ мѣстахъ грудной клѣтки больного, то въ началѣ болѣзни, когда затрудненное дыханіе уже появилось, слышны лишь крупнопузырчатые хрипы, исходящіе изъ крупныхъ бронховъ, и лишь позднѣе, когда воспалительный процессъ придвигается ближе къ грудной стѣнкѣ, слышны настоящіе бронхопневматическіе хрипы, именно—мелкопузырчатые, производящіе на слухъ такое впечатлѣніе, какъ если бы растирать надъ самымъ ухомъ пучекъ сухихъ волосъ. Раньше всего эти хрипы слышны между лопатками и подъ ними.

Главнѣйшія лѣкарства суть: *Тартар.-эмет.* (или *Аноморф.*) и *Фосфоръ*, черезъ каждые полъ-часа — часть по приему; также *Бріон.*, *Ипекак.* и проч. (см. „Острый бронхитъ“). При угрожающемъ коллапсѣ (крайнемъ упадкѣ силъ съ помраченіемъ сознанія): *Вератр.-альб.*, *Арника* (особенно при пневмоніи у стариковъ). Въ періодъ выздоравливанія: *Арсен.-іодат.*, *Калькар.-фосфорик.*

Лѣченіе.

Вспомогательныя мѣры, какъ при остромъ бронхитѣ (см. стр. 322).

6. Крупозное воспаленіе легкихъ.

(Крупозная пневмонія).

Въ противоположность катаральному воспаленію, крупозное почти никогда не поражаетъ дѣтей и стариковъ, а лишь особъ средняго возраста, при томъ тѣхъ преимущественно, которые уже ослаблены предшествующими болѣзнями или чрезмѣрнымъ употребленіемъ спиртныхъ напитковъ. Ближайшей причиной считается простуда при внезапныхъ переменахъ погоды, о чемъ свидѣтель-

ствуетъ наиболѣе частое появленіе этой болѣзни въ холодное время года, при господствѣ восточныхъ и сѣверовосточныхъ вѣтровъ.

**Симптомы
и теченіе
болѣзни.**

Болѣзнъ начинается жестокимъ ознобомъ и слѣдующимъ за нимъ сильнымъ жаромъ тѣла (до 40°Ц.), часто—съ мозговыми явленіями, бредомъ и галлюцинаціями, особенно—у алкоголиковъ; въ то же время или же очень скоро появляются давящія или колющія боли въ груди, во всей или чаще въ опредѣленной части ея, усиливающіяся при дыханіи и кашлѣ. Дыханіе ускорено (до 30—40 въ минуту), ускоренъ также пульсъ, который пріобрѣтаетъ особую полноту и напряженность; головная боль, жажда, общая разбитость; красная, скудная моча. Воспаленіе поражаетъ чаще всего нижнюю долю праваго или лѣваго легкаго, при чемъ она, по мѣрѣ накопленія въ ней сыворотно-кровяного выпота, все болѣе оплотнѣваетъ.

Въ зависимости отъ этого получаютъ слѣдующія явленія при выслушиваніи легкихъ: если приложить ухо къ спинѣ ниже лопатокъ, къ одной или другой ея половинѣ, соотвѣтственно нижней лѣвой или правой долѣ легкихъ, то въ началѣ болѣзни въ заболѣвшей сторонѣ слышны при дыханіи больного мелкопузырчатые хрипы (см. стр. 339), а въ дальнѣйшемъ теченіи рѣзкое и звонкое „бронхіальное“ дыханіе, а не мягкое, дующее, какъ въ здоровыхъ частяхъ легкихъ; еще позднѣе, когда оплотнѣніе (выпотъ) начинаетъ размягчаться и выкашливаться, бронхіальное дыханіе исчезаетъ, и на мѣсто его является дыханіе съ мелко и крупнопузырчатыми хрипами.

Упомянутое выше состояніе продолжается 3—5—7—8 дней, при чемъ температура достигаетъ по вечерамъ $40,5^{\circ}\text{Ц.}$, а по утрамъ понижается на $0,3—0,5—1,2^{\circ}\text{Ц.}$ Затѣмъ (обыкновенно на 5-й день) наступаетъ кризисъ, т. е. переломъ болѣзни съ быстрымъ паденіемъ температуры (исчезаніемъ жара) и значительнымъ улучшеніемъ самочувствія больного. Что касается выкашливаемыхъ мокротъ, то, будучи вначалѣ крайне скудными и пѣнистыми, въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни онѣ становятся ржавыми или кровянистыми и, наконецъ, желтыми. Въ теченіе 1—2 недѣль послѣ кризиса больной оправляется обыкновенно вполне.

**Осложненія
при крупозной
пневмоніи.**

Крупозное воспаленіе можетъ сопровождаться различными осложненіями, соотвѣтственно ухудшающими обычный ходъ болѣзни и шансы на выздоровленіе. Къ осложненіямъ этимъ принадлежатъ: разстройства кишечника съ желтухой, воспаленіе плевры съ выпотомъ, воспаленіе сердечнаго мѣшка, воспаленіе почекъ (бѣ-

локъ въ мочѣ), тифозное состояніе и проч. Случается также, что болѣзнь не сразу принимаетъ оборотъ къ выздоровленію (кризисъ), а проходитъ лишь постепенно (лизи съ), симптомъ за симптомомъ, или воспаленіе переходитъ съ одной части легкихъ на другую (блуждающая пневмонія); понятно, что въ такихъ случаяхъ выздоровленіе значительно затягивается или становится совсѣмъ невозможнымъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ принадлежитъ къ тѣмъ серьезнымъ болѣзнямъ, въ которыхъ гомеопатическое лѣченіе, своевременно начатое, даетъ самые блестящіе результаты въ отношеніи скорого и прочнаго выздоровленія. Спасительнымъ оно можетъ еще быть и въ тѣхъ случаяхъ, когда время отчасти уже упущено было и болѣзнь имѣетъ тяжелый характеръ.

Въ началѣ болѣзни главнымъ лѣкарствомъ является *Аконитъ* $\times 3$, именно когда не произошелъ еще воспалительный выпотъ, а имѣется лишь жаръ и полный, напряженный пульсъ. Если при этомъ имѣются сильные приливы къ головѣ съ мозговыми явленіями, то необходимо давать *Белладонна* $\times 3$, попеременно съ Аконитомъ. При тифоподобныхъ мозговыхъ симптомахъ больше, чѣмъ Беллад., подходит *Русъ* $\times 3$.—При первыхъ признакахъ воспаленія, являющихся обыкновенно 24 часа спустя послѣ начала заболѣванія и выражающихся въ колотьи въ боку, отрывистомъ сухомъ кашлѣ, болѣе короткомъ, но учащенномъ дыханіи, показана *Бріонія* $\times 3$, которая дается до тѣхъ поръ, пока не появится мокрота, видъ которой очень важенъ для діагноза. Мокрота, въ началѣ скудная и очень вязкая, перемѣшана съ кровью ржаваго или кирпичнокраснаго или даже коричневаго цвѣта, становится затѣмъ болѣе обильной и мягкой и легче отдѣляется. Въ эту пору, если имѣется еще жаръ и тифо-подобныя явленія, дается *Фосфоръ* $\times 3$ попеременно съ Бріоніей.—При обильной мокротѣ, но съ трудомъ выкашливаемой, показанъ *Тартр. эметик.* $\times 3$, попеременно съ Фосфоромъ.—При медленно разрѣшающейся мокротѣ дается *Сульф.* $\times 3$, нѣсколько примовъ.

Послѣ кризиса Фосфоръ надо отставить, особенно, если имѣется значительный упадокъ силъ у больного. Въ этомъ періодѣ болѣзни всего больше показанъ *Сульфуръ* $\times 3$ или *Гепаръ Сульфурисъ* $\times 3$; или же—*Іод.* $\times 2$ — $\times 3$ или *Кали іодат.* $\times 2$ — $\times 3$, если имѣется большая слабость съ труднымъ отхаркиваніемъ мокроты, особенно же, когда болѣзнь оканчивается не кризисомъ, а лизисомъ, т. е. постепеннымъ паденіемъ температуры тѣла и

Лѣченіе
крупозной
пневмоніи.

вообще медленнымъ разрѣшеніемъ воспалительнаго процесса; *Юд.* умѣстенъ и раньше еще, попеременно съ *Бріоніею*, если послѣдняя не производитъ улучшенія въ теченіе 10—12 часовъ, или если гомеопатическое лѣченіе начато позднѣе, т. е. уже во второмъ періодѣ болѣзни.

Въ случаяхъ болѣе трудныхъ и при осложненіяхъ надо имѣть въ виду также *Хина*, *Ликоподій*, *Сенія* и *Силицію*, особенно же *Карбо вегетабил.* и *Арсеник.*—Какъ добавочныя лѣкарства въ третьемъ періодѣ болѣзни полезны еще *Фосфори ацид.* $\times 3$ и *Нитри ацид.* $\times 3$.

О дозахъ, приѣмахъ и дѣленіяхъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.

При воспаленіи легкихъ у пьяницъ особенно осложняющими моментами являются состоянія мозга и сердца. При мозговыхъ симптомахъ въ такихъ случаяхъ подходитъ больше всего *Опій* $\times 3$, а при явленіяхъ сильнаго возбужденія—*Беллад.* или *Гіосціам.*; при сердечной слабости—*Арника* $\times 3$. Во второмъ періодѣ болѣзни у такихъ больныхъ *Тартар эмет.* важнѣе, чѣмъ *Фосфоръ*.—Если *Тарт.* эмет. недостаточенъ, то *Карбо вегетаб.* его дополняетъ, также *Дигиталисъ* при слабости сердца и *Русь*—при общемъ упадкѣ силъ.

Прочія осложненія лѣчатся соотвѣтствующимъ образомъ (см. „Плевритъ“, „Болѣзни сердца“ и проч.).

Вспомогатель-
ныя мѣры и
дѣйствія.

Температура помѣщенія, въ которомъ находится больной, должна быть равномѣрная и не превышать 15° Р., отнюдь не болѣе теплая, а еще лучше—13—14°. Воздухъ при этомъ долженъ быть чистый, часто освѣжаемый, и не слишкомъ сухой; воздухъ увлажняется вывѣшиваніемъ въ помѣщеніи мокрой простыни. Больной долженъ полегче укрываться, а не лежать подъ шерстяными одѣялами. Больной долженъ лежать не на перинѣ, а на матрацѣ или т. п., съ нѣсколько приподнятой верхней половиной тѣла. Не слѣдуетъ при воспаленіи легкихъ добиваться искусственной испарины. Прохладныя обтиранія тѣла очень полезны и пріятны больному. Объ опасности простуды при этомъ не можетъ быть и рѣчи. Когда жаръ тѣла превышаетъ 39,5 Ц., дѣлаютъ полуванну (25—20° Р., продолжительностію 10 минутъ), при 39° Ц. (и нѣсколько выше) ножно-подмышковое обертываніе (20° Р., втеченіи получаса) съ послѣдующимъ обмываніемъ (22° Р.) или полуванной (25° Р.). Послѣ полуванны можно сдѣлать еще болѣе прохладное (22° Р.) обливаніе. Для отвлеченія крови отъ легкихъ: въ началѣ болѣзни прохладные (15° Р.) мѣ-

стные, на воспаленную часть груди, компрессы, смѣняемые черезъ каждыя 10 минутъ; затѣмъ на брюшной согрѣвающий компрессъ (23° Р., втеченіи 1 часа), обертываніе бедеръ (20° Р., втеченіи 2 часовъ), въ подходящемъ случаѣ — ножная паровая ванна (втеченіи получаса), съ послѣдующимъ влажнымъ обтираніемъ (18° Р.).—Діета должна быть укрѣпляющая и нераздражающая: молоко, кефиръ, молочныя каши, слизистыя супы изъ ячменной, овсяной и друг. крупы; питательный какао. Все возбуждающее слѣдуетъ устранять, какъ, на примѣръ, кофе, чай, крѣпкое вино и т. п. Вино въ небольшихъ количествахъ показано только въ состояніяхъ упадка силъ, но не въ первомъ воспалительномъ періодѣ болѣзни, а во второмъ, особенно же въ третьемъ. Для питья всего лучше—хорошаго качества холодная вода, непомногу на разъ, а глоточками, не слишкомъ частыми, или же холодное молоко. Какъ только температура спала, когда обыкновенно и аппетитъ у больного становится лучше, необходимо перейти къ болѣе укрѣпляющему питанію (крѣпкій мясной или куриный бульонъ, уха, яйца).—Въ холодное время года больной не долженъ раньше полнаго выздоровленія выходить или выпускаться на вольный воздухъ.

4. Эмфизема легкихъ. Расширеніе легкихъ.

Подъ эмфиземой разумѣютъ такую болѣзнь легкихъ, которая происходитъ отъ уменьшенной или утерянной эластичности легочныхъ пузырьковъ (см. стр. 297), вслѣдствіе чего обмѣнъ воздуха затрудняется, вдыхаемый воздухъ не выталкивается легкими обратно весь, какъ должно быть, а застаивается въ нихъ, что въ свою очередь ведетъ къ расширенію послѣднихъ. Такое состояніе легкихъ развивается при катаррахъ слизистой оболочки бронховъ, особнно же при хроническомъ катаррѣ, сопровождающемся сильнымъ набуханіемъ слизистой оболочки и зависящимъ отъ этого суженіемъ просвѣта бронховъ, а также, почти какъ нормальный, неизбѣжный процессъ въ старческомъ возрастѣ, когда стѣнки легочныхъ пузырьковъ становятся въ большей или меньшей степени вялыми. Къ эмфиземѣ ведутъ также частыя и чрезмѣрныя напряженія легкихъ, вызываемыя бѣганьемъ, танцами, подниманіемъ тяжестей, игрой на духовыхъ инструментахъ, также параличъ грудобрюшной преграды, вслѣдствіе котораго выдыханіе становится неполнымъ; наконецъ — опухоли живота, пороки сердца, коклюшъ,

Опредѣленіе
понятія
„эмфизема“.

Причины

вообще всѣ тѣ болѣзни, которыя ведутъ къ сильному расширенію легкихъ при дыханіи или застоѣ воздуха въ нихъ.

Эмфизема можетъ образоваться въ каждомъ возрастѣ, но чаще всего это — болѣзнь болѣе пожилыхъ и старыхъ людей. У мужчинъ она чаще встрѣчается, нежели у женщинъ, что объясняется тѣмъ, что первые чаще подвергаются соотвѣтствующимъ вреднымъ вліяніямъ. Замѣчается до нѣкоторой степени и наследственность. Худощавые и слабые субъекты болѣе склонны къ эмфиземѣ, нежели полные и крѣпкіе.

**Признаки
эмфиземы.**

Главнымъ симптомомъ эмфиземы является одышка, но по одной одышкѣ нельзя ставить діагнозъ „эмфизема“, такъ какъ она можетъ зависѣть и отъ другихъ причинъ. Точное опредѣленіе болѣзни можетъ быть сдѣлано врачомъ послѣ надлежащаго изслѣдованія грудной клѣтки. Послѣдствіями затрудненнаго дыханія при эмфиземѣ могутъ быть: застои крови въ легкихъ и обусловливаемый ими хроническій катарръ, также ослабленіе сердца и даже пороки его, застои крови въ брюшныхъ органахъ, въ головѣ и, наконецъ, вслѣдствіе порчи крови, выступленіе кровяной сыворотки изъ сосудовъ въ ткани—водянка. При сильно развитой эмфиземѣ грудная клѣтка расширяется и имѣетъ бочкообразную форму.

**Течение
болѣзни.**

Не всѣ эти явленія имѣются въ каждомъ случаѣ эмфиземы, и развиваются они не сразу, а очень медленно, на протяженіи 'десятковъ лѣтъ; острой эмфиземы не бываетъ, а всегда она хроническая.

Одышка, обусловливаемая эмфиземой, при отсутствіи катарра бронховъ—лишь мало беспокоитъ больного, усиливается же послѣ всего того, что затрудняетъ у него дыханіе, послѣ, напримѣръ, хотя бы умѣреннаго наполненія желудка, или при скопленіи газовъ въ кишкахъ, или при всякомъ усиленномъ напряженіи тѣла; особѣнно же сильной и длительной становится одышка при остромъ бронхіальномъ катаррѣ или при обостреніи имѣющагося уже хроническаго катарра. Въ такихъ случаяхъ одышка достигаетъ столь сильной степени, что больной кажется вотъ-вотъ задохнется на смерть. По счастью, однако, отъ эмфиземы, какъ таковой, такого исхода не бываетъ, развѣ лишь въ случаяхъ, въ которыхъ успѣла уже развиться водянка, но тогда смерть является не прямо отъ эмфиземы, а отъ отека легкихъ или отъ болѣзни, ее осложняющей.

Эмфизематики могутъ при нормальномъ и осторожномъ образѣ жизни достигнуть глубокой старости. Колебанія въ состояніи здоровья у такихъ больныхъ зависятъ не отъ усиленія или умень-

шенія эмфиземы, а отъ того, въ какомъ состояніи находятся у нихъ бронхи. Поэтому лѣто и сухая зимняя погода являются для нихъ наиболѣе благопріятными, тогда какъ весною и осенью они чувствуютъ себя всего хуже, и малѣйшая переменѣна погоды (атмосфернаго давленія) чувствуется ими уже напередъ за полсутки.

Эмфизема, разъ уже она образовалась, т. е. разъ уже стѣнки легочныхъ пузырьковъ потеряли свою эластичность, не можетъ быть устранена никакими средствами, подобно тому, какъ резиновому баллону, потерявшему свою эластичность отъ частаго и длительного растягиванія, невозможно вернуть таковую, привести въ первоначальное состояніе. Иначе говоря, объ излѣченіи эмфиземы, какъ таковой, хотя бы гомеопатическими лѣкарствами рѣчи быть не можетъ. Этимъ, однако, не сказано, что вообще лѣченіе при эмфиземѣ напрасно и бесполезно; наоборотъ, польза отъ лѣченія можетъ быть очень большая и существенная, именно въ отношеніи предупрежденія дальнѣйшаго развитія болѣзни, равно какъ устраненія или уменьшенія тѣхъ болѣзненныхъ процессовъ которые сопровождаютъ или обусловливаютъ эмфизему. Таковы задачи лѣченія эмфиземы, и нельзя сказать, что бы онѣ были маловажны.

Итакъ, слѣдуетъ прежде всего не запускать хроническаго бронхита и лѣчить его надлежащимъ образомъ (см. стр. 326), систематически и выдержанно, особенно у людей старыхъ и предрасположенныхъ къ одышкѣ; надо избѣгать всего того, что такъ или иначе мѣшаетъ правильному дыханію, а именно — тѣсныхъ одеждъ, чрезмѣрныхъ тѣлесныхъ напряженій, длительныхъ согбенныхъ положеній и проч. (см. выше). Особенно надо оберегать себя отъ острыхъ катарральныхъ заболѣваній дыхательныхъ органовъ, закаливая себя въ то же время противъ простудныхъ вліяній (см. стр. 311). Куреніе табака для эмфизематиковъ безусловно вредно, равно какъ и пребываніе въ душныхъ или накуренныхъ помѣщеніяхъ. — Необходимо заботиться о правильной дѣятельности организма вообще, особенно — органовъ пищеваренія и сердца. Въ отношеніи пищеваренія важно соблюдать возможно болѣе легкую діету, при чемъ избѣгать надо обильной мучнистой пищи и такихъ овощей, которые способствуютъ образованію газовъ въ кишкахъ (капуста, брюква, бобы, горохъ и т. п.). Ненормальные состоянія со стороны пищеваренія лѣчатся соотвѣтствующимъ образомъ (см. „Болѣзни желудка и кишекъ“), равнымъ образомъ и болѣзненные состоянія со стороны сердца и проч. Только такими

Задачи лѣченія при эмфиземѣ.

Предупредительныя мѣры.

окольными путями возможно въ значительной мѣрѣ облегчать страданія эмфизематиковъ и противодѣйствовать дальнѣйшему развитію эмфиземы. Временное облегченіе получается при этой болѣзни отъ вдыханія сжатого воздуха съ помощью особоприноровленного аппарата, который, однако, слишкомъ дорогъ для того, чтобы быть общедоступнымъ. Но и уменьшенное давленіе воздуха (разрѣженность) имѣетъ благотворное вліяніе на эмфизематиковъ, о чемъ можно заключить изъ того, что такіе больные гораздо лучше себя чувствуютъ лѣтомъ въ высокой гористой мѣстности, гдѣ и катарръ дыхательныхъ путей уменьшается и общее питаніе организма улучшается; впрочемъ, тутъ благотворно дѣйствуетъ, можетъ быть, не такъ уменьшенное давленіе, какъ чистота и своеобразное вообще качество горного воздуха.

5. Астма. Спазмъ легкихъ—см. стр. 138.

6. Легочная чахотка. Туберкулезъ легкихъ.

Легочная чахотка можетъ быть воспалительнаго или туберкулезнаго (бугорковаго) происхожденія. Туберкулезная же чахотка легкихъ въ свою очередь бываетъ въ двухъ разныхъ формахъ: то какъ самостоятельный, самобытный туберкулезъ (бугорчатка) легкихъ, то какъ частичное проявленіе остраго милиарнаго туберкулеза (просовидной бугорчатки), поражающаго съ самаго же начала различныя части организма, преимущественно же—легочную ткань, и имѣющаго быстрое теченіе со смертельнымъ исходомъ.

Легочная чахотка воспалительная а) Легочная чахотка—болѣзнь хроническая, длящаяся годами; даже такъ назыв. скоротечная или галлопирующая чахотка не можетъ быть названа острой, такъ какъ она длится рѣдко менѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Зачатки болѣзни обыкновенно настолько неопредѣленны, что мало обращаютъ на себя вниманіе и даютъ развѣ только поводъ подозрѣвать основной ея характеръ. Къ этому присоединяется еще общеизвѣстная черта чахоточныхъ больныхъ вѣрить во что угодно, лишь не въ серьезность своей болѣзни, а это ведетъ къ недостаточной заботливости о своемъ здоровьи. Эта роковая черта не оставляетъ больныхъ часто до самаго конца жизни, и даже усиливается по мѣрѣ развитія болѣзни; нерѣдко такой оптимизмъ передается ими также и близкимъ имъ людямъ. — Къ первымъ признакамъ, которые можно считать какъ бы предвѣстниками чахотки, относятся: блѣдность кожи, слабость, потеря аппетита, частое лихорадочное со-

Признаки и теченіе.

стояніе, исхуданіе, ночные поты. Бываетъ, что уже въ эту пору какъ бы безпричинной хворости, и еще при отсутствіи болѣзненныхъ явленій со стороны груди, врачебное изслѣдованіе послѣдней даетъ положительные результаты, а именно ненормальное состояніе верхушекъ легкихъ; или измѣреніемъ температуры констатируется лихорадочное состояніе, подозрительное въ томъ случаѣ, если ни въ организмъ больного, ни въ условіяхъ его жизни нельзя указать причины для лихорадки. Или же бываетъ и такъ, что имѣется лишь кашель, не обращающій на себя вниманія въ началѣ, въ виду еще хорошаго общаго самочувствія, и продолжающійся недѣлями и мѣсяцами, пока постепенно начинаютъ обнаруживаться общая слабость, блѣдность, исхудалость, особенно же лихорадочное состояніе и ночные поты, которые, наконецъ, заставляютъ больного обратиться къ врачу. При такихъ признакахъ, а тѣмъ болѣе, когда имѣется уже и кровохарканіе, чахотка легкихъ становится уже весьма вѣроятной. Въ такихъ случаяхъ оказывается несомнѣнное влияние наслѣдственности или то, что больные страдали въ дѣтствѣ золотухой, или перенесли воспаленіе легкихъ или плевры, или что имѣются особые неблагоприятныя условія жизни, которыя могли способствовать появленію и развитію чахотки при имѣющемся къ ней предрасположеніи.

Часто уже внѣшній видъ чахоточнаго больного характеренъ. Глаза большей частію голубые съ просвѣчивающими бѣлками и длинными рѣсницами, легкій румянецъ на блѣдномъ лицѣ, тощія, длинныя руки съ искривленными впередъ ногтями и ярко-красной каемкой около рѣзцовъ и клыковъ, все это — признаки, заставляющіе подозрѣвать чахотку уже въ самой ранней стадіи ея развитія. Характерны также слѣдующіе внѣшніе признаки: худощавость груди, рѣзкое очертаніе надключичныхъ, над- и подлопаточныхъ ямокъ, крылоподобная приподнятость лопатокъ, малый передне-задній размѣръ грудной клѣтки и широкіе межреберные промежутки. При всемъ томъ дыханіе учащено, сердечная дѣятельность ускорена (ускоренный пульсъ). На кожѣ груди и спины имѣются обильныя желтоватыя пятна, которыя легко шелушатся. Температура тѣла по утрамъ нормальна или даже слегка понижена, послѣ полудня же и вечеромъ слегка повышена (38° Ц. подъ мышкой), щеки краснѣютъ, руки слегка горятъ.

Въ ранней стадіи кашель можетъ быть незначительный. Кашель этотъ сухъ, выражается короткими, но частыми покашливаніями; въ плечевой области имѣется временами незначительная

боль. Общее состояние организма может при этомъ быть вполне нормальнымъ или кое въ чемъ лишь слегка уклоняющимся отъ нормы. Если въ это время изслѣдовать область легочныхъ верхушекъ, то находятъ на одной сторонѣ удлиненное, жесткое выдыхание и при кашлѣ нѣсколько пузырчатыхъ хриповъ, которыхъ не слышно въ другихъ частяхъ легкихъ.

Если болѣзнь продолжаетъ развиваться, то кашель все болѣе усиливается, наступаетъ и кровохарканіе, которое можетъ стать и очень обильнымъ. Появляется лихорадка уже и въ утренніе часы, ночью бываютъ легкіе поты, хрипы въ одной верхней долѣ легкаго становятся обильными, звучными, и шумъ выдыханія, особенно въ надлопаточной ямкѣ, рѣзко-бронхіальный, и при постукиваніи обнаруживается явное притупленіе. Больной вынужденъ ложиться въ постель, и вѣсь тѣла его начинаетъ замѣтно уменьшаться. Кашель въ эту пору мокротный, состоитъ изъ маленькихъ, желтоватыхъ массъ, содержащихъ плотныя бѣлыя полоски и зернышки, которыя въ водѣ мало по малу опускаются на дно сосуда. При микроскопическомъ изслѣдованіи такой мокроты въ ней находятъ часто, между прочимъ, эластическія волокна и коховскія бациллы, послѣднія — когда имѣется еще и туберкулезный процессъ. Аппетитъ уменьшенъ, пульсъ ускоренъ.

Такое состояніе поддается еще улучшенію, что бываетъ обыкновенно лѣтомъ, и больной можетъ поправиться настолько, что окружающіе, въ томъ числѣ и врачъ, преисполняются надеждъ на полное выздоровленіе, самъ же больной обыкновенно и не отчаивался. Большой частію, къ сожалѣнію, надежды эти бываютъ обманчивы. Съ наступающей осенью опять усиливается кашель и мокрота. Болѣзненный процессъ въ легкихъ принимаетъ большіе размѣры, появляются колющіе боли въ боку, гдѣ слышенъ бываетъ шумъ тренія, увеличиваются хрипы, и они слышны уже въ верхнихъ частяхъ груди и у другой верхушки, также усиливается бронхіальное дыханіе. Лихорадка вновь является и держится уже упорно, доходя по вечерамъ до 38,5—39 5° Ц., утромъ же падая почти до нормы. Больной все болѣе и болѣе худѣетъ, онъ выхаркиваетъ большія количества мокротъ, густыхъ и комковатыхъ, совершенно тонущихъ въ водѣ, и рядомъ съ ними также полужидкія, гнойныя. Ночные поты очень обильны. Надежда у всѣхъ окружающихъ рушится, только больной не теряетъ надежды и терпѣливо ждетъ грядущаго излѣченія, но, вмѣсто послѣдняго, при продолжающемся истощеніи жизненной энергии, приходитъ роковой конецъ.

Описанное течение чахотки сопровождается сплошь и рядомъ еще и другими симптомами, въ зависимости отъ распространения болѣзненнаго процесса еще и на другіе органы и отъ разнаго рода осложнений, вслѣдствіе чего картина болѣзни различнымъ образомъ видоизмѣняется. Наиболѣе часто имѣются явленія со стороны гортани („горловая чахотка“ — см. стр. 318) и кишекъ (упорные поносы). Кишечный каналъ поражается обыкновенно въ позднѣйшей стадіи болѣзни, и если это случается, то смертельный исходъ значительно ускоряется.

При такъ называемой скоротечной (галлопирующей) чахоткѣ, продолжающейся обыкновенно нѣсколько мѣсяцевъ, лихорадка постоянна и болѣе или менѣе высока, и истощение идетъ быстро впередъ. Въ этой формѣ легочной чахотки остановка болѣзненнаго процесса и улучшения бывають, но рѣдко. Кашель при скоротечной чахоткѣ очень жестокъ, сильно изнуряетъ больного, разстраиваетъ ему сонъ, усиливаетъ потъ, но бывають случаи, когда кашель мало беспокоитъ больного. Дыханіе постоянно учащено, въ груди чувство стѣсненія, иногда плеврическія боли. Скоротечная чахотка поражаетъ только молодыхъ людей; чѣмъ старше возрастъ, считая съ періода половой зрѣлости, тѣмъ медленнѣе протекаетъ болѣзнь.

**Скоротечная
чахотка**

б) Туберкулезъ или бугорчатка легкихъ бываетъ либо въ самостоятельной формѣ, ограничиваясь только или главнымъ образомъ легкими, либо какъ частичное, хотя и главное проявленіе разсѣянной во всемъ тѣлѣ острой просовидной бугорчатки.

**Легочная
чахотка
туберкулез-
ная**

При туберкулезной легочной чахоткѣ разрушеніе легочной ткани исходить отъ развитія въ ней и размноженія бугорковъ, образующихъ собою большіе или меньшіе очаги, раньше всего въ верхушкахъ легкихъ. Съ теченіемъ времени бугорки эти подвергаются распаду и къ распаду же ведутъ и легочную ткань. Туберкулезный процессъ присоединяется сплошь и рядомъ къ обыкновенной легочной чахоткѣ, являясь какъ бы ея осложненіемъ. Теченіе болѣзни въ общемъ не отличается отъ описанной выше легочной чахотки; при этой формѣ, однако, чаще наблюдается также туберкулезное пораженіе гортани и зѣва; равнымъ образомъ поражается и плевра, а въ позднѣйшемъ теченіи болѣзни и кишечникъ и брыжеечныя железы.

Острая просовидная (милиарная) бугорчатка поражаетъ сразу многие органы и ткани (прежде всего сывороточныя оболочки—пле-

**Просовидная
бугорчатка
легкихъ.**

вру, брюшину, — также мозговые оболочки, печень и пр.), главнымъ образомъ, однако, легкія, въ позднѣйшей стадіи легочной чахотки, ускоряя собой роковой исходъ. Течение болѣзни въ такихъ случаяхъ бываетъ какъ острое, быстротечное, такъ и болѣе длительное (хроническая бугорчатка).

Предсказаніе при чахоткѣ легкихъ. Предсказаніе при легочной чахоткѣ не является безусловно неблагоприятнымъ, такъ какъ не рѣдки случаи исцѣленія, о чемъ можно судить хотя бы уже по тому, что часто приходится изслѣдовать субъектовъ, которые чувствуютъ себя въ отношеніи легкихъ совершенно здоровыми, между тѣмъ имѣютъ въ одной или обѣихъ верхнихъ доляхъ явныя уплотнѣнія или каверны (полости отъ распада легкаго). Въ такихъ случаяхъ приходится предположить зарубцевыванія послѣ бывшаго раньше болѣзненнаго процесса. Предсказаніе тѣмъ лучше, чѣмъ хроничнѣе случай болѣзни, и тѣмъ хуже, чѣмъ онъ быстротечнѣе; оно лучше въ простой легочной чахоткѣ, нежели въ бугорчатковой. Большое значеніе имѣютъ для предсказанія наследственное предрасположеніе больного, сложеніе и строеніе грудной клѣтки, предшествующія болѣзни, также возрастъ. Чѣмъ болѣе благоприятны эти обстоятельства, тѣмъ лучше становится предсказаніе.

Предсказаніе зависитъ до нѣкоторой степени и отъ отдѣльныхъ симптомовъ болѣзни. Очень умѣренный въ началѣ кашель указываетъ на простую воспалительную форму чахотки, равнымъ образомъ и скудная мокрота при общемъ удовлетворительномъ состояніи больного. Съ другой стороны незначительный кашель и скудная мокрота въ позднѣйшей стадіи болѣзни еще не говорятъ за легкость послѣдней, если упадокъ силъ быстро идетъ впередъ. Если мокрота обильна, комковата, гнойна, и въ то же время лихорадка ослабѣваетъ и общее состояніе улучшается, то это—признакъ благоприятный, и можно предположить ограниченіе болѣзненныхъ очаговъ и рубцеваніе. Если же количество мокроты увеличивается, а лихорадка держится на одной степени или усиливается, то процессъ распадѣнія, значитъ, дѣлаетъ быстрые успѣхи. Обильная гнойная мокрота указываетъ на присутствіе кавернъ; если она къ тому же зловонна, то это отъ гнилостнаго распада и угрожаетъ разѣденіемъ стѣнокъ кавернъ, кровотоchenіемъ и дальнѣйшимъ распространѣніемъ процесса.

Кровохарканіе въ томъ только случаѣ указываетъ на быстро идущій впередъ процессъ распада легкаго, если оно часто повторяется. Съ другой стороны, кровохарканіе можетъ отсутствовать

въ скоротечныхъ случаяхъ и, наоборотъ, часто бывать въ случаяхъ медленно протекающихъ.—Язвенные процессы въ гортани ухудшаютъ предсказаніе.—Самое важное значеніе для предсказанія имѣютъ лихорадка и потеря въ вѣсѣ тѣла, также состояніе пищеварительныхъ органовъ.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что легочную чахотку нельзя считать вообще неизлѣчимой. То обстоятельство, что смертность отъ чахотки легкихъ громадна (почти $\frac{2}{7}$ всѣхъ вообще смертныхъ случаевъ приходится на долю этой болѣзни), свидѣтельствуется не такъ о ея неизлѣчимости, какъ о безпомощности противъ нея господствующаго, аллопатическаго способа лѣченія, усугубляемой еще и неблагопріятными условіями жизни. И въ самомъ дѣлѣ, если легочная чахотка есть прежде всего — а это несомнѣнно — болѣзнь, происхождение, неблагопріятное теченіе и исходъ которой зависать отъ присущаго организму болѣзненнаго *предрасположенія*, отъ такъ наз. *конституціональной аномаліи* (см. о туберкулезѣ въ отд. 10-мъ), главнѣйшимъ примѣромъ которой является золотуха, то на первомъ планѣ требуется устранить эту конституціональную аномалію. Невозможно себѣ представить, чтобы такое болѣзненное предрасположеніе могло быть устранено всякими гваяколями, тіоколями, креозотами и т. п., и хотя бы даже новѣйшимъ туберкулиномъ, примѣняемымъ въ такихъ большихъ сравнительно дозахъ, которыя, раньше чѣмъ излѣчивать, какъ предполагается, дѣлаютъ больной организмъ еще значительно больше больнымъ, а это при такихъ еще обычныхъ вызывающихъ или ухудшающихъ причинахъ, какъ бѣдность, дурной воздухъ, недостатокъ или недоброкачественность пищи, нездоровое жилище, чрезмѣрный трудъ и проч. Спеціальныя для такихъ больныхъ санаторіи представляютъ собою лучшее, что можно сдѣлать при современныхъ соціальныхъ условіяхъ, помимо лѣкарственнаго лѣченія, но невозможно себѣ представить, чтобы такихъ санаторій оказалось когда либо столько, чтобы ихъ хватило на всѣхъ въ нихъ нуждающихся больныхъ.

Поэтому главными и, можно сказать, основными способами борьбы противъ чахотки легкихъ являются надлежащее лѣкарственное лѣченіе и возможно болѣе правильный образъ жизни.

Чахотка несомнѣнно заразная болѣзнь, и заразное начало содержится въ выкашливаемой чахоточными мокротѣ. Надо поэтому принимать мѣры къ обезвреживанію послѣдней дезинфицирующими средствами. У себя дома больной долженъ выплевывать

Предупредительныя мѣры.

свою мокроту въ сосудъ съ карболовымъ, на прим., растворомъ, а внѣ дома онъ можетъ это дѣлать въ платокъ, который, при замѣнѣ его чистымъ, слѣдуетъ положить въ такой же растворъ, прежде чѣмъ отдать въ стирку. Дѣти изъ чахоточныхъ семей нуждаются въ самомъ заботливомъ уходѣ и правильномъ воспитаніи, въ цѣляхъ искорененія въ нихъ наследственнаго предрасположенія. Чахоточная мать не должна сама кормить грудью своего ребенка. Постепенное закаливаніе организма (см. стр. 311), хорошее питаніе, свѣжій воздухъ, гимнастика, не чрезмѣрное обремененіе умственными занятіями и проч., это — тѣ мѣры, которыя могутъ въ значительной степени улучшить наследственное предрасположеніе къ чахоткѣ. Золотушное состояніе надо стараться устранить выдержаннымъ, систематическимъ лѣченіемъ. Всякое заболѣваніе дыхательныхъ органовъ должно устраняться въ самомъ зачаткѣ. Чахоточнымъ слѣдуетъ воздерживаться отъ вступленія въ бракъ, не потому только, что они рискуютъ народить чахоточное потомство, а потому, что болѣзнь можетъ отъ этого значительно ухудшиться у нихъ.

**Лѣченіе
чахотки
легкихъ.**

Надлежащее лѣченіе легочной чахотки не должно быть шаблоннымъ, одинаковымъ для всѣхъ случаевъ этой болѣзни. При этой болѣзни больше, чѣмъ при какой-либо другой, требуется обособленіе соотвѣтственно формѣ болѣзни, ея стадіямъ и проявленіямъ, также и общему состоянію организма. Поэтому тутъ могутъ быть даны лишь самыя общія указанія.

При явленіяхъ остраго бронхальнаго катарра примѣняется въ началѣ *Аконитъ* $\times 3$ при сухомъ жарѣ, а затѣмъ, если такой жаръ продолжается, *Белладонна* $\times 3$. — *Бріонія* $\times 3$ показана, если имѣется большая слабость при неособенно сильной лихорадкѣ, также при боляхъ, тянущихъ или колющихъ въ легочныхъ верхушкахъ, или боляхъ въ рукѣ соотвѣтствующей стороны. Въ позднѣйшемъ же теченіи *Бріонія* рѣдко бываетъ умѣстна. — *Дигиталисъ* $\times 1$: симптомы, какъ при *Бріоніи*, но кашель не сухой, а больше влажный. — *Спонгія* $\times 3$: при катаррѣ, сопровождаемомъ упорной охриплостію; кашель сухой и лающий, судорожный, сопровождается давленіемъ въ груди и одышкой. — *Гепаръ сульф.* 3: сухой кашель съ постояннымъ щекотаніемъ въ гортани, особенно у золотушныхъ субъектовъ. — *Пульматилла* $\times 3$: когда кашель сталъ мягкимъ и мокрота легко отдѣляется. *Ипекакуана* $\times 3$: при слизистыхъ хрипахъ съ труднымъ откашливаніемъ, до рвоты.

Если острый бронхитъ сопровождается кровохарканіемъ, то

первыя средства суть: *Аконитъ*, *Арника* и *Дигиталисъ* (см. „Кровохарканіе“ стр. 336).

При малѣйшемъ подозрѣніи на туберкулезъ, больной не долженъ оставаться безъ лѣченія и послѣ перенесеннаго остраго катарра дыхательныхъ органовъ. Лѣчение должно быть общее, и главными лѣкарствами являются слѣдующія:

Феррумъ (жельзо) 3—6: Блѣдность лица съ часто появляющимся румянцемъ на немъ, или съ желтоватымъ оттѣнкомъ; отсутствіе аппетита или извращенный аппетитъ; частыя боли въ желудкѣ, запоръ; наклонность къ сердцебіенію и къ приливамъ къ легкимъ; мышечная слабость, усталость при всякомъ непривычномъ движеніи; большая нервная раздражительность. Жельзо въ большихъ (аллопатическихъ) дозахъ въ такихъ случаяхъ можетъ причинить больному большой вредъ, если имѣется наклонность къ приливамъ крови къ легкимъ, такъ какъ можетъ вызвать кровотечение изъ послѣднихъ; въ малыхъ же, гомеопатическихъ, дозахъ его можно давать безъ всякихъ опасеній.

Калькарея карбоника 3—6. Цвѣтушій обликъ съ румяными щеками и очень нѣжнымъ цвѣтомъ лица. Приливная головная боль; легкая возбудимость, сангвиничность; неправильности пищеваренія, часто поносъ; больные жалуются на слабость, хотя такая со стороны какъ бы и не видна; половая возбудимость; обильныя регулы раньше срока и болѣзненные.

Хина × 3. Уже рано появляющіеся признаки истощенія съ приливами къ печени (постоянныя боли въ правомъ подреберьи и правомъ боку), также въ позднѣйшей стадіи болѣзни, какъ промежуточное средство, при сильной слабости, безпрестанномъ кашлѣ и выхаркиваніи гнойной мокроты; въ такихъ случаяхъ показанъ и *Креозотъ* × 3.

Арсеникъ 3 — 6. При явленіяхъ скоротечной чахотки съ сильной жаждой, расстройствами пищеваренія и проч.; особенно мучительны приступы кашля, являющіеся какъ бы періодическими.

Арсеникъ. іодат. × 4. Въ хроническихъ случаяхъ недавняго еще происхожденія. Мокрота густая и не очень обильная. Отсутствіе лихорадочнаго состоянія. Особенно у золотушныхъ особъ.

Іод. × 3. Въ начальной стадіи болѣзни, особенно у золотушныхъ особъ, но молодыхъ и крѣпкихъ. Мокрота больше гнойвидная. Продолжительная охриплость. Не подходитъ при поносѣ.

Кали карбоник. 3. Сильный кашель съ гнойной мокротой и съ колющей болью въ ограниченномъ мѣстѣ груди. Набрякъ

лость верхнихъ вѣкъ.. Общая слабость, особенно у многожизненныхъ женщинъ (рядомъ съ Хиной).

Гепаръ сульф. 3—6. Въ случаяхъ, грозящихъ быстрымъ теченіемъ. Кашель больше сухой, хотя больные чувствуютъ въ груди хрипы и свисты. Золотушное состояніе. Противопоказаніемъ служить сильный поносъ.

Силиція 3—6. При медленно протекающей чахоткѣ, у людей болѣе старыхъ. Сухой, потрясающій кашель, а также отхаркиваніе гнойной мокроты съ кровавистыми жилками. Большая слабость и разбитость въ членахъ, особенно по утрамъ. Ночные изнуряющіе поты. Постоянно холодныя ноги. Ухудшеніе послѣ скрывшагося ножного пота.

Фосфоръ 6. Во всѣхъ стадіяхъ болѣзни, но не въ случаяхъ съ кровохарканьемъ. Упорная охриплость съ мучительнымъ, сухимъ кашлемъ и ощущеніемъ какъ бы израненности въ гортани и дыхательномъ горлѣ. Боль въ желудкѣ послѣ каждой ѣды, также позывы на рвоту и рвота слизью. *Упорный поносъ*, послѣ каждого приема пищи. Чрезмѣрная половая возбудимость. Поты ночные, особенно во время сна. Дѣленія Фосфора въ такихъ случаяхъ предпочтительны болѣе высокія, чѣмъ низкія.

Ликоподій 3. Въ случаяхъ, происшедшихъ отъ запущеннаго воспаленія легкихъ. Длительная лихорадка съ липкими ночными потами. Обильная мокрота, одышка.

Фелландрій $\times$ 3. Въ послѣдней стадіи чахотки при зловонной мокротѣ (также *Креозотъ* $\times$ 3).

Сангвинарія $\times$ 3. Приливы къ щекамъ и вызываемая ими одышка; лихорадочное состояніе, усиливающееся уже съ полудня. Сухой кашель съ щекотаніемъ въ горлѣ. Чувство напряженія и полноты въ груди. Колотье, особенно въ правомъ легкомъ и чувство разбитости въ грудныхъ мышцахъ. Ограниченный румянецъ щекъ. Средство это особенно умѣстно въ скоротечной чахоткѣ.

Станнумъ 3. Кашель особенно жестокъ ночью, съ отхаркиваніемъ обильной мокроты; ощущеніе слабости въ груди, одышка, отсутствие аппетита, исхуданіе.

**Палліативы
при чахоткѣ
легкихъ.**

Въ теченіи чахотки легкихъ приходится прибѣгать часто и къ такимъ лѣкарствамъ, которыя при этой болѣзни лишь палліативную пользу, а именно: *Белладонна* $\times$ 3—въ начинающейся чахоткѣ при надобѣдливомъ сухомъ кашлѣ съ стѣсненіемъ дыханія; *Кодеинъ* 1—при сухомъ скребящемъ кашлѣ, не дающемъ больному покою ни днемъ, ни ночью; *Морфій*

сульф. 1, — въ позднѣйшихъ стадіяхъ болѣзни при очень сильномъ, мучительномъ кашлѣ, котораго не облегчаютъ никакія другія средства; *Карбо вегетабилис* 3—6 часто облегчаетъ кашель съ обильной вонючей мокротой.

Противъ изнурительной лихорадки никакія средства не дѣйствительны и она уменьшается лишь при улучшеніи чахоточнаго процесса, отъ котораго она зависитъ.

Средства противъ кровохарканія см. стр. 337.

Противъ сильной головной боли, отнимающей у больного сонъ, главными средствами являются *Дигиталис* и *Арсеник*.

Противъ желудочныхъ страданій (боли подъ ложечкой, тошнота, рвота)—*Арсеник*., *Креозотъ*, *Феррумъ*; противъ поносовъ—*Фосфоръ* или *Фосфори ацид*., *Ипекакуана*, *Калькарея ацетика* и *Калькарея фосфорика*.

Чѣмъ хроничнѣе, затяжнѣе случай болѣзни, тѣмъ рѣже должны приниматься лѣкарства; дѣленія лучше брать вообще среднія, нежели болѣе высокія или низкія; не слѣдуетъ слишкомъ часто мѣнять лѣкарства, а, при отсутствіи улучшенія, лучше раньше испытать другія дѣленія выбранныхъ лѣкарствъ, нежели самія лѣкарства мѣнять. Бываетъ также полезно возвращаться къ примѣнявшимся раньше лѣкарствамъ, къ тѣмъ, отъ которыхъ замѣчалась раньше польза (см. еще о дозахъ, приемахъ и дѣленіяхъ ч. 1, гл. 3 и 4).

О приемахъ
лекарствъ
при чахоткѣ

Изъ вспомогательныхъ мѣръ надо прежде всего упомянуть о рыбьемъ жирѣ, благотворное дѣйствіе котораго при легкой чахоткѣ можно объяснить лишь заключающимся въ немъ очень малымъ количествомъ іода, а не жиромъ какъ таковымъ. Достаточно брать его въ день по чайной (дѣтямъ) или по столовой (взрослымъ) ложкѣ, больше—не слѣдуетъ, и именно—лишь по утрамъ; данный вечеромъ, рыбій жиръ лишь очень немногими переносится хорошо.

Вспомогатель
ныя мѣры и
діета.

Противъ мучительныхъ, обильныхъ ночныхъ потовъ палліативно помогаетъ присыпка, состоящая изъ смѣси 3 частей салициловой кислоты, 10 частей картофельной муки и 87 частей талька. Этимъ порошкомъ напудриваютъ все тѣло вечеромъ передъ сномъ. Если кожа очень суха то ее предварительно смазываютъ слегка жиромъ для того, чтобы порошокъ лучше держался на тѣлѣ. Во время напудриванія больной держитъ у рта и носа платокъ для предупрежденія вдыханія порошка, могущаго вызвать или усилить кашель вслѣдствіе раздражающаго его вліянія на

слизистую оболочку дыхательных путей. Присыпка такая временно уменьшает выделение пота, что само по себе безвредно, больной же чувствует себя счастливым, проводя ночь в сухой постели.

При лечении легочной чахотки надо обращать внимание особенно на правильную диету, надлежащий уход за кожей и на широкое пользование свежим и чистым воздухом. — Диета должна быть нераздражающая, однако возможно более укрепляющая и в то же время не производящая приливов к легким. Поэтому из режима чахоточного надо совершенно исключить водку, крепкая вина, чай, кофе, а мясо давать лишь в малых количествах; напротив того полезны для таких больных молоко во всех видах, зелень и овощи (кроме картофеля), плоды, отвары из гороха, бобов, чечевицы, затем из риса, манны, пшена, тапиоки, питательные (альбуминные) какао и шоколад, овсяные или другие питательные бисквиты или сухари и т. п. — Уход за кожей: ежедневный (1—2 раза) целенный обмывания (22° R.), утром — в кровати и после полудня, если возможно — вне кровати, с последующим движением до полного согревания тела. У крепких больных применяют 3 раза в неделю ножноподмышковое обертывание (22° R. и 1 час продолжительности), с прикладыванием, в случае надобности, согревающих бутылок и с последующей 10-минутной полуванной (26° R.) и массажем всего тела. Таким образом способствуют не только более энергичной деятельности кожи (дыханию ее и выделениям), но и усилению аппетита и укреплению мышц тела. Что касается одежды, то платье должно быть из материи не плотной, а более легкой, пористой; более же — не бумажное, а тонкое, полотняное. Осенью и зимою целесообразно носить шерстяное белье непосредственно на телѣ или поверх полотняного. В теплое время года шерстяное белье слѣдует отставить, и нѣтъ основанія бояться от этого простуды. Большое значение для организма имѣет закаливаніе его против переменъ температуры воздуха (см. стр. 311), но это надо дѣлать лишь въ случаяхъ съ хроническимъ теченіемъ, а не въ болѣе острыхъ. Равнымъ образомъ важно для такихъ больныхъ возможно больше пользоваться свѣжимъ, чистымъ воздухомъ и заниматься гимнастикой, особенно легочной; но и гимнастика умѣстна лишь въ случаяхъ хроническихъ и вообще, когда больные обладаютъ еще достаточной физической силой.

Что касается климатическаго лѣченія, т. е. избранія особенно благопріятныхъ мѣстъ пребыванія для больныхъ туберкулезомъ, то, вообще говоря, гористая мѣстность и болѣе теплый климатъ наиболѣе подходящи; однако, въ практическомъ отношеніи это менѣе важно, чѣмъ предполагается въ теоріи. Надо при томъ же имѣть еще въ виду, что слишкомъ рѣзкая перемена климата, съвернаго на южный, тѣмъ болѣе—обратное возвращеніе въ прежній климатъ, могутъ имѣть для больного вредныя послѣдствія. Во всякомъ случаѣ перемена климата можетъ имѣть смыслъ лишь въ начальной стадіи чахотки и въ случаяхъ медленно протекающихъ, но отнюдь не въ случаяхъ скоротечныхъ или въ послѣдней стадіи болѣзни.

Д. Болѣзни плевры.

Содержаніе этого (Д) под-отдѣла: 1. Воспаленіе плевры (Плевритъ).—2. Водянка груди.—3. Пневмотораксъ (скопленіе воздуха въ плевральномъ мѣшкѣ).

1. Воспаленіе плевры (Плевритъ).

О томъ, что такое плевра, см. стр. 297.

Плевритъ бываетъ первичный, самобытный, и вторичный, присоединяющійся къ другимъ болѣзнямъ, чаще всего—дыхательнаго аппарата. Причины первичнаго плеврита: простуда, которой подвержены особенно выздоравливающіе отъ тяжелыхъ болѣзней также люди, принимающіе сильнодѣйствующія лѣкарства въ аллопатическихъ дозахъ; такъ, напримѣръ, больные, проходящіе курсъ ртутнаго или іоднаго лѣченія, необыкновенно легко поражаются плевритомъ при малѣйшемъ простудномъ вліяніи; далѣе, плевритъ можетъ быть вызванъ сильнымъ ушибомъ груди или другимъ какимъ либо поврежденіемъ; если при этомъ имѣется прорывъ мягкихъ частей грудной клѣтки, то въ полость плевры можетъ попасть, кромѣ крови, также и воздухъ (см. ниже „Пневмотораксъ“).

Воспаленіе можетъ ограничиваться небольшою долей плевры, или оно поражаетъ большую часть ея, или всю. Воспаленіе состоитъ въ выпотѣ изъ центральной плевры, при чемъ, если выпотъ плотный, волокнистый (фибринозный), то плевритъ носить названіе сухого плеврита, если выпотъ—жидкій, то говорятъ о жидкомъ плевритѣ, при чемъ выпотъ можетъ быть сывороточный или гнойный. Отъ этихъ разныхъ обстоятельствъ зависитъ картина болѣзни, также теченіе и исходъ ея.

Причины

Опредѣле

**Симптомы
плеврита.**

Легкій плевритъ, влекущій за собою часто сращеніе плевръ, можетъ протекать безъ чувствительныхъ признаковъ или съ такими ничтожными явленіями, что они не обращаютъ на себя особеннаго вниманія больного. Обыкновенно же уже небольшой ограниченный плевритъ вызываетъ чувство давленія и даже боль въ пораженномъ мѣстѣ, также затрудненіе при вдыханіяхъ, при кашлѣ, чиханіи, зѣвотѣ и т. д.

Болѣе сильный плевритъ, съ образованіемъ значительнаго волокнисто-сывороточнаго выпота, начинается иногда потрясающимъ ознобомъ, за которымъ слѣдуетъ жаръ, жажда и рѣзкое общее недомоганіе. Въ пораженной половинѣ груди ощущается боль, колющая, рѣже—рвущая или давящая, и эта боль въ первые дни болѣзни составляетъ почти исключительную жалобу больного.

Въ особенно трудныхъ случаяхъ плеврита температура тѣла доходитъ утромъ и вечеромъ до 40° и выше, пульсъ очень учащенъ, кожа горяча и суха, аппетитъ отсутствуетъ, жажда усилена, моча насыщенно красная, отдѣляется въ маломъ количествѣ, въ тяжелыхъ случаяхъ имѣется еще бредъ и тифозное состояніе; къ счастью, плевритъ очень рѣдко встрѣчается въ столь острой формѣ. Обыкновенно же теченіе болѣзни гораздо менѣе бурно. Выпотъ увеличивается постепенно въ теченіе 1 до 4 недѣль, послѣ чего лихорадка начинаетъ убывать и вмѣстѣ съ тѣмъ постепенно всасывается и выпотъ, при увеличивающемся отдѣленіи мочи. При обильномъ выпотѣ одышка достигаетъ нерѣдко столь сильной степени, что требуется, для устраненія ея, проколъ грудной стѣнки. Въ благопріятно протекающихъ случаяхъ всасываніе заканчивается въ 2—4 недѣли, при менѣе благопріятномъ теченіи оно можетъ продолжаться многіе мѣсяцы.

**Гнойный
плевритъ.**

Если выпотъ принимаетъ гнойный характеръ, то теченіе болѣзни становится особенно тяжелымъ и длительнымъ. Лихорадка необычайно высока, пораженный бокъ очень болѣзненъ, и на немъ замѣчается отеканіе подкожной клѣтчатки. Такъ можетъ продолжаться недѣли 2 до 6, послѣ чего лихорадка принимаетъ перемежный характеръ, крайне изнуряя силы больного: по утрамъ температура нормальна или ниже нормальной, къ вечеру сильно повышается. Гной, если не выпускается искусственно, прорывается наружу либо черезъ бронхи, либо черезъ реберную плевру и мягкія части грудной клѣтки. Это—сравнительно благопріятные исходы. Если гной прорывается инымъ путемъ (въ брюшную полость и проч.), то положеніе больного становится безнадежнымъ. Безна-

дежны также вообще случаи гниlostного плеврита, встрѣчающагося при гниlostномъ зараженіи крови, или кровянистый плевритъ (при цынгѣ, общей кровоточивости и т. п.).

Для надлежащаго и вѣрнаго опредѣленія (діагноза) болѣзни требуется въ каждомъ случаѣ плеврита специальное врачебное изслѣдованіе груди „постукиваніемъ“, „выслушиваніемъ“, и проч.

Въ началѣ болѣзни *Аконитъ* $\times 3$ и *Бріонія* $\times 3$; послѣдняя особенно при сухомъ плевритѣ, но также и въ началѣ образованія выпота. Далѣе при сухомъ плевритѣ примѣняются еще: *Беллад.* $\times 3$, *Арсен.* $\times 3$, *Кали-карбон.* $\times 3$, также *Арника* $\times 3$, особенно у старыхъ людей.—При сывороточно и сывороточно-фибринозномъ выпотѣ: *Сицлла* $\times 2$, а также, для всасыванія его, *Гепар. сульф.* 3 *Аписин.* $\times 3$, *Кали-іодат.* $\times 2$, *Арсен.-альб.* $\times 3$, —При гнойномъ: *Арсен.-іодат.* $\times 4$, *Кальк.-іодат.* 3 и *Калькар.-карбоника* $3-6$;—какъ вставочное средство—*Сульфуръ* $3-6$.—Если выпоть достигаетъ такого объема, что угрожаетъ опасностію жизни чисто механическимъ давленіемъ на легкое, является неизбѣжнымъ оперативный проколъ грудной клѣтки для выпущенія наружу жидкости, скопившейся въ полости плевры (операция—безопасная). Еще болѣе оперативное вмѣшательство показано при гнойномъ плевритѣ, если не предвидится благопріятное самостоятельное вскрытіе его наружу.—При гниlostномъ и кровянистомъ плевритѣ не поможетъ и операция. Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ въ послѣднихъ случаяхъ показаны *Фосфор.*, *Нитри-ацид.*, *Креозот.*, *Арсен*, *Карбо вегет.*, *Лаксизис* и т. п.—Осложненія при плевритахъ лѣчатся соотвѣтственнымъ образомъ (см. Воспаленіе легкихъ и проч.).

Вспомогательныя мѣры вообще тѣ-же, что при воспаленіи легкихъ (см. выше). Показаны также втиранія въ грудь опodelьдока *Бріоніи* или *Белладонны*, также—*Русъ*; позднѣе—для ускоренія всасыванія—втиранія *Аписъ-масломъ*, также согрѣвающие компрессы, нагрудные или туловищныя. Втиранія противопоказаны при гнойномъ плевритѣ. Противъ остающихся сращеній полезна легочная гимнастика.

Лѣченіе
плеврита

2. Водянка груди (Гидротораксъ).

Водянку груди, т. е. накопленіе воды между плевритическими листками, надо отличать отъ жидкаго плеврита. Она никогда не встрѣчается въ видѣ самостоятельной болѣзни, а лишь въ видѣ одного изъ симптомовъ, сопровождающихъ болѣзни почекъ, сердца,

легкихъ, печени или болѣзни питанія, при томъ всегда въ обѣихъ половинахъ груди, а не въ одной только, какъ обыкновенно при плевритѣ. Въ большинствѣ случаевъ, кромѣ водянки груди, имѣются еще водяночныя опуханія другихъ частей тѣла или брюшная водянка. Самый выдающійся симптомъ болѣзни—одышка, особенно при лежаніи. Грудная водянка, какъ таковая, протекаетъ всегда безъ лихорадки, также безъ боли въ груди. Кашля либо совсѣмъ не бываетъ, либо онъ незначительный, насколько зависитъ отъ водянки. Лѣченіе должно быть направлено на основную болѣзнь.

3. Пневмотораксъ.

(Скопленіе воздуха въ плевральномъ мѣшкѣ).

Пневмотораксъ есть всегда вторичная болѣзнь, развивающаяся въ томъ только случаѣ, когда плевра повреждается въ какомъ либо мѣстѣ до такой степени, что воздухъ проникаетъ сквозь нее въ плевральный мѣшокъ извнѣ или черезъ легкія или бронхи.

Причиною является внѣшнее поврежденіе: проникающія грудную клѣтку раны (колотыя, порѣзныя, огнестрѣльныя); при цѣлости наружныхъ покрововъ—поврежденіе легкаго концами сложенныхъ реберъ; сильные ушибы грудной клѣтки (напр. при сильномъ ударѣ или толчкѣ въ грудь, паденіе подъ лошадь, переѣзжаніе экипажемъ и т. п.), если отъ нихъ повреждается легочная ткань вмѣстѣ съ прилегающей плеврой. Изъ внутреннихъ причинъ къ прониканію воздуха въ полость плевры могутъ вести процессы распада легкаго, если болѣзненный очагъ находится близъ плевры и т. д.—Послѣдствіемъ прониканія воздуха въ полость плевры является сильная одышка, вслѣдствіе сдавленія соответствующаго легкаго; для уменьшенія одышки больной инстинктивно принимаетъ сидячее положеніе или ложится на больной бокъ, дабы здоровое легкое могло свободнѣе расширяться. Смерть можетъ наступить уже въ первыя минуты послѣ развившагося пневмоторакса, въ другихъ случаяхъ болѣзнь выдерживается недѣлями, мѣсяцами и даже годами. Много зависятъ теченіе и исходъ отъ причины пневмоторакса и отъ состоянія легкихъ. Всего лучше еще предсказаніе при травматическихъ формахъ и въ случаяхъ, происшедшихъ отъ гнойнаго плеврита, всего хуже при гангренѣ легкихъ и т. п.

Лѣченіе опредѣляется основной болѣзнію; при пневмотораксѣ отъ травматическаго поврежденія главное средство—*Ариика*,

внутри и наружно. Кроме того—и оперативная помощь, если она возможна и целесообразна.

ДОБАВЛЕНИЕ КЪ СЕДЬМОМУ ОТДѢЛУ.

Болѣзни щитовидной и зубной железы.

Щитовидная железа относится къ кровянымъ железамъ, на- Предваритель-
ходится въ нижней передней части шеи, прилегая къ нижней ча- ния замѣти
сти гортани и къ началу дыхательнаго горла, а назадъ и влѣво—
къ пищеводу. Железа эта состоитъ изъ боковыхъ долей, соеди-
няющихся между собою перешейкомъ. Кроме того имѣются еще
добавочныя боковыя железы у наружныхъ краевъ и сзади щито-
видной железы. Щитовидная железа изобилуетъ кровеносными
сосудами и нервами.

Зубная или внутренняя грудная железа представляетъ собою
мягкій железистый органъ, состоящій изъ двухъ долей. Железа
эта только въ первые годы жизни имѣетъ свои полныя размѣры,
впослѣдствіи же она мало по малу уменьшается, а на 20—25 году
оказывается уже превратившеюся въ комокъ соединительной ткани,
изобилующей жиромъ. Зубная железа лежитъ въ нижней части
передняго груднаго средостѣнія кпереди отъ дыхательнаго горла
и позади грудины, за боковыя предѣлы которой она обыкновенно
болѣе или менѣе переходитъ.

Железы эти могутъ подвергаться воспаленіямъ и опуханіямъ,
но причины таковыхъ представляютъ еще совершенно темную
область; ничего опредѣленнаго неизвѣстно въ наукѣ ни объ от-
правленіяхъ этихъ железъ, ни о томъ, для чего они имѣются въ
организмѣ. Предполагается же одними авторами, что назначеніе
щитовидной железы обезвреживать образующееся въ организмѣ
вещество, накопленіе котораго дѣйствуетъ ядовито на централь-
ную нервную систему. Другіе же авторы приводятъ свои очень важ-
ныя наблюденія надъ послѣдствіями удаленія (у собакъ и у обезьянъ)
щитовидной железы. Удаленіе послѣдней влекло, именно, за
собою смерть при слѣдующихъ явленіяхъ. Вначалѣ —отрыжка и
рвота, ускореніе дыханія, а позднѣе—одышка, разстройства сер-
дечной дѣятельности, затрудненное проглатываніе пищи, спячка,
замедленность и остановка движеній, рядомъ съ судорожными по-
дергиваніями до настоящихъ судорогъ; потеря чувствительности,

паденіе кровяного давленія, дурной запахъ изо рта, бѣлковая моча и проч. Полное удаленіе щитовидной железы даетъ и у чловѣка крайне печальные результаты („зобное истощеніе“), между прочимъ — развитіе такъ наз. **Миксѣдема** (слизистый отекъ), т. е. слизистое пропитываніе (инфильтрація) подкожной клѣтчатки головы, шеи и проч. рядомъ съ глубокими разстройствами нервно-душевной системы вплоть до развитія идиотизма. Болѣзнь эта можетъ явиться и при наличности этой железы, когда она болѣзненно бездѣтельна, равно какъ и отъ другихъ невыясненныхъ еще причинъ. Такого рода наблюденія должны служить предостереженіемъ противъ оперированія зобныхъ опухолей. Лѣченіе миксѣдемы очень затруднительно. Всего больше подходятъ: *Хина*, *Феррумъ*, *Арсеник.*, *Фосфоръ*, также и *Тиреодинъ* (въ гомеопатическихъ дозахъ), при надлежащей укрѣпляющей діетѣ. Рекомендуются также примѣненіе массажа и электричества.

1. Воспаленіе щитовидной и зобной железы.

Какъ уже сказано, железы эти могутъ подвергаться воспаленію, причины котораго, если только не поврежденіе, неизвѣстны. Признаки же слѣдующіе. Лихорадка, стрѣляющія боли и опухоль, вначалѣ мѣстная, охватывающая всю железу или лишь одну долю ея, а затѣмъ перепоясывающую всю шею въ видѣ валика; вены шеи напрягаются, лицо багровѣетъ; головная боль, головокруженіе, кровотеченіе изъ носа, а то и изъ болѣе глубоко лежащихъ дыхательныхъ органовъ. Воспаленіе железы можетъ окончиться и разрѣшеніемъ, чаще, однако, оно переходитъ въ нагноеніе, съ теченіемъ такимъ, какъ при ангина Людовици (см. стр. 181). Лѣченіе такое-же, какое указано при послѣдней болѣзни.

2. Зобъ (обыкновенный).

азныя формы
зоба

Подъ зобомъ разумѣютъ увеличеніе щитовидной железы, всей или части ея, или прилегающихъ добавочныхъ железокъ. Различаютъ разные формы зоба въ зависимости отъ строенія опухоли, главнымъ образомъ, именно: пузырьковую, волокнистую и сосудистую. Всего легче поддаются лѣкарственному лѣченію пузырьковые зобы. Зобъ развивается весьма медленно; въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ опухоль образуется въ короткое время, дѣло идетъ о приливѣ къ железн, случающемся въ зобной мѣстности подъ вліяніемъ особенныхъ при-

чинъ, сильныхъ тѣлесныхъ напряженій, мѣсячныхъ и т. п. Обыкновенный зобъ во многихъ случаяхъ, кромѣ большей или меньшей уродливости шеи, не вызываетъ никакихъ другихъ явленій. Но часто также онъ влечетъ за собою разстройства, вызываемыя давленіемъ опухоли на сосѣдніе органы, главнымъ образомъ на гортань и дыхательное горло: измѣненіе голоса и дыханія, одышку, кашель. Особенно у женщинъ во время мѣсячныхъ нерѣдко появляется вдругъ очень продолженное звучное вдыханіе, вмѣстѣ съ особымъ грубымъ кашлемъ и измѣненнымъ голосомъ, которые вызываются увеличеніемъ зоба отъ менструальнаго набуханія сосудовъ.

Отдѣльныя формы зоба распознаются слѣдующимъ образомъ: **Распознаваніе**

Приливный (гиперемическій) зобъ (во время мѣсячныхъ, **отдѣльныхъ** беременности и т. д.) характеризуется округленностію шеи и сглаженіемъ ея ямокъ. Форма железы не измѣнена и ткань ея на ощупь мягка. **формъ зоба**

Пузырьковый зобъ отличается большей плотностію и болѣе замѣтными очертаніями, чѣмъ приливный, при чемъ поражена вся железа или лишь часть ея.

Сосудистый зобъ сохраняетъ форму щитовидной железы, очень умеренно увеличенъ въ своихъ размѣрахъ, отъ давленія постепенно спадается и затѣмъ снова наполняется. При такомъ зобѣ бываетъ замѣтна въ немъ пульсация.

Волокнистый зобъ отличается раннимъ появленіемъ отдѣльныхъ очень твердыхъ узловъ въ одной какой-либо части железы или во всей. Этотъ зобъ часто обызвѣствляется и становится твердымъ, какъ камень.

При долгомъ существованіи зоба въ немъ могутъ появиться кистовидныя образования. Кистовидный зобъ имѣетъ широкое основаніе и въ немъ можно часто прощупать зыбленіе.

Чаще всего зобъ встрѣчается въ видѣ эндемической (т. е. свойственной опредѣленной мѣстности) болѣзни, но наблюдались также случаи какъ бы эпидемическаго его появленія. Встрѣчаются и спорадические случаи зоба въ мѣстностяхъ, вообще свободныхъ отъ зоба.

Къ заболѣванію зобомъ предрасположены юноши, особенно же женщины—въ періодъ полового созрѣванія и во время беременности. Наблюдается и наслѣдственная передача зоба. Къ эпидемическимъ причинамъ относятся; узкія горныя долины, влажныя низменности, расположенныя по рѣкамъ, особенности почвы.

Причины.

Послѣдняя причина, однако же, далеко еще не выяснена; обыкновенно ее приписываютъ колодезной водѣ, которая либо лишена однихъ веществъ, либо содержитъ, напротивъ, слишкомъ много другихъ веществъ, наприм., известъ, магнезію и т. п. Какъ бы то ни было, но замѣчено, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ одновременно съ зобомъ господствуетъ и кретинизмъ.

Легкія формы зоба могутъ разрѣшиться иногда сами собою, чаще же зобы исчезаютъ отъ лѣкарственного лѣченія. Въ болѣе упорныхъ случаяхъ можетъ помочь переселение больныхъ въ свободныя отъ зоба мѣстности. Иногда наблюдается исчезновение зоба послѣ перенесенной острой болѣзни. Скорѣе всего поддаются лѣченію гиперемиическій и пузырьковый зобы. Застарѣлые, твердые и очень большіе зобы обыкновенно уже не поддаются никакому лѣкарственному лѣченію.

Лѣчение
зоба.

Іодъ въ большихъ дозахъ ведетъ иной разъ къ уменьшенію зоба, но часто наблюдается, наоборотъ, увеличеніе послѣдняго послѣ іода; во всякомъ же случаѣ сплошь и рядомъ онъ вызываетъ явленія іодизма: насморкъ, сильныя приливы къ головѣ, припадки раздраженія сердца, исхуданіе. Въ малыхъ же, гомеопатическихъ дозахъ *Іодъ* является превосходнымъ въ большинствѣ случаевъ средствомъ противъ зоба и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно безвреднымъ. Примѣняется *Іодъ* $\times 1$ — $\times 2$ или *Кали іодат.* $\times 1$ — $\times 2$, также близкіе къ іоду по дѣйствию *Спонгія* 1 — $\times 3$ и *Бромъ* $\times 4$. Въ случаяхъ болѣе упорныхъ: *Калькар. карб.* 3 — 6 , *Барита карбон.* 3 — 6 , *Коніумъ* $\times 3$, *Магнезія карбон.* 3 — 6 (и высія дѣленія). Успѣшныя результаты могутъ при зобѣ получиться лишь послѣ продолжительнаго употребленія этихъ лѣкарствъ.

Наружно: 1 ч. Брома въ 20 частяхъ глицерина (смазываніе).—Славится также зобный порошокъ слѣдующаго состава: *Спонгія marina тоста* (высуш. морская губка) 2 чч., *Кальк. преципитата* (осажденный мѣлъ) 1 ч. и сахару 3 чч. — принимать каждый мѣсяцъ, начиная съ полнолунія, втеченіи 10—12 дней, нѣсколько разъ въ день на кончикѣ ножа.

Надо избѣгать всего того, что способствуетъ приливу крови къ головѣ или застою крови въ шейныхъ сосудахъ, заботиться вообще о правильной дѣятельности организма.

3. Зобъ Базедовскій, Базедова болѣзнь.

Предѣленіе

Діагнозъ „Базедова болѣзнь“ можно ставить лишь въ томъ случаѣ, когда три симптома явно выражены, а именно: усилен-

ное сердцебиение, увеличение щитовидной железы (зобъ) и выпячивание глазныхъ яблокъ изъ ихъ орбитъ (пучеглазіе). Появление и развитіе этихъ симптомовъ происходитъ всегда въ томъ порядкѣ другъ за другомъ, въ какомъ они здѣсь приведены. Болѣзнь развивается обыкновенно очень медленно, хронически, причемъ улучшения смѣняются возвратами и обостреніями. Если болѣзнь идетъ на излѣчение, то позднѣ всего проходитъ пучеглазіе. Имѣются наблюденія, что вступленіе въ бракъ и послѣродовой періодъ влекли за собою исчезновеніе Базедовой болѣзни. При очень долгой продолжительности своей болѣзнь эта ведетъ къ общему истощенію организма и водянкѣ.

Женщины заболѣваютъ этой болѣзнію вдвое чаще, нежели мужчины, и именно между 15-мъ и 30-мъ годами жизни; мужчины же заболѣваютъ въ гораздо болѣе позднемъ возрастѣ.

Нервное предрасположеніе занимаетъ первое мѣсто среди причинъ этой болѣзни; ближайшимъ поводомъ къ болѣзни служить часто сильное душевное волненіе или потрясеніе, затѣмъ—малокровіе, блѣдная немочь; особенно склонны къ этому заболѣванію люди нѣжнаго тѣлосложенія, блондинки; расстройства менструаций играютъ также предрасполагающую роль; съ урегулированіемъ менструаций наблюдалось исчезновеніе Базедовой болѣзни. Причинами болѣзни считаются еще ослабляющія вліянія (острыя сыпи, заразныя болѣзни, кровотечения, слишкомъ долгое кормленіе грудью, онанизмъ и проч.) и поврежденія.

Причины.

Оперативнымъ удаленіемъ всей щитовидной железы болѣзнь не устраняется, состояніе же организма еще болѣе ухудшается (см. выше, стр. 361): является сильное истощеніе организма, душевное угнетеніе до степени кретинизма и проч.

Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ примѣняются: *Іод.* $\times 3$ —3, *Арсеник. іодат.* 3, *Беллад.* 3, *Дигиталисъ* $\times 2$; также: *Феррумъ* 3—у малокровныхъ; *Сенія*, *Пульсатилла*, *Кали карбоник.*—при неправильностяхъ регулъ; *Кактусъ*, *Аконитъ*, *Игнація*, *Глоноинъ*—при сильномъ сердцебиеніи и т. д.

Изъ вспомогательныхъ мѣръ особенно показаны ножноподмышковыя обертыванія (22° Р., въ продолженіи 1 часа), съ холодными компрессами на область сердца и послѣдующими полуваннами (25° Р., въ продолженіи 10 мин.) или обливаніями (22° Р.); электрогальваническія ванны (27—25° Р., въ продолженіи 10 мин.); нераздражающая, питательная діета; легочная гимнастика на свѣжемъ воздухѣ.

Болѣзни грудныхъ (молочныхъ) железъ—см. въ отд. 9-омъ, IV.

ОТДѢЛЪ ВОСЬМОЙ.

Болѣзни сердца и сосудовъ.

Содержаніе этого отдѣла: А. Болѣзни сердца.—Б. Болѣзни артерій и венъ.—
В. Болѣзни лимфатическихъ сосудовъ.

Предварительныя замѣтки.

Строеніе
сердца.

Сердце и кровеносные сосуды образуютъ собою систему кровообращенія въ организмѣ, причѣмъ сердце есть органъ, управляющій движеніемъ крови въ сосудахъ. Сердце заключается въ полости груди между правымъ и лѣвымъ легкимъ, непосредственно подъ грудной доской, и именно большей своей частью ($\frac{2}{3}$) въ лѣвой половинѣ и меньшей ($\frac{1}{3}$) въ правой. Оно имѣетъ, говоря вообще, яйцеобразную форму съ обращеннымъ вверхъ тупымъ концомъ (основаніемъ). Положеніе сердца въ груди косвенное: справа, сверху и сзади—налѣво, внизъ и впереди, такъ что верхушка (т. е. нижній конецъ) сердца находится почти непосредственно подъ грудной клѣткой въ 5-мъ межреберномъ пространствѣ близъ лѣваго грудного соска; остальная бóльшая часть покрыта легкими. Сердце раздѣлено перегородками на четыре отдѣленія: на два предсердія и два желудочка. Ткань сердца состоитъ изъ поперечно-полосатыхъ мышцъ (т. е. такихъ же, какъ мышцы костнаго остова тѣла), переплетающихся въ самыхъ различныхъ направленіяхъ. Снаружи сердце покрыто сывороточною, а внутри болѣе эластическою оболочкою.—Между правымъ предсердіемъ и правымъ желудочкомъ имѣется трехстворчатый клапанъ, между лѣвымъ предсердіемъ и лѣвымъ желудочкомъ—двухстворчатый клапанъ; клапанами снабжены и прочія устья сердца, въ мѣстахъ сообщенія съ большими сосудами. Все сердце заключено въ сумку (околосердечная сумка—перикардій), образующую, подобно плеврѣ, наружный и внутренній листокъ. Въ перикардіи заключается небольшое количество прозрачной сывороточной жидкости.

Сосуды
тѣла.

Сосуды тѣла состоятъ изъ артерій, венъ и капилляровъ; эти три рода сосудовъ, кровеносныхъ, находятся въ прямой связи съ сердцемъ; кромѣ того имѣются еще лимфатическіе сосуды и млечные ходы, имѣющіе прямое отношеніе къ кровеноснымъ сосудамъ, въ которые они впадаютъ.—Артеріи начинаются двумя главными стволами: легочною артеріей изъ праваго и аортою изъ лѣваго желудочка. Легочная артерія несетъ темную, возвратившуюся изъ тканей тѣла, такъ наз. венозную кровь, аорта

же—кровь алую, окисленную въ легкихъ кислородомъ воздуха.—Стѣнки артерій сравнительно толсты, плотны и упруги (эластичны); стволы изъ довольно прямы, только немногіе изъ нихъ изогнуты; мелкія же вѣтви артерій всѣ болѣе или менѣе извиваются, имѣя между собою много соединеній (анастомозовъ). Артеріи большаго калибра находятся обыкновенно въ глубинѣ тѣла; на конечностяхъ онѣ идутъ по сторонѣ сгиба.—Съ венами артеріи сообщаются посредствомъ тончайшихъ волосныхъ сосудовъ (капилляровъ). Вены входятъ въ предсердія 7-ю стволами: 4-мя такъ наз. легочными венами—въ лѣвое предсердіе и 3-мя венами тѣла (двумя полыми и одной общей сердечныхъ венъ) въ правое. Первыя несутъ артеріальную кровь (изъ легкихъ), вторыя—венозную, собранную ими изъ мельчайшихъ развѣтвленій соответствующихъ артерій. Кромѣ того имѣется еще одинъ венозный стволъ, воротная вена, идущая не къ сердцу, а къ печени, и несущая кровь отъ большей части брюшныхъ внутренностей. Стѣнки венъ гораздо тоньше, чѣмъ въ артеріяхъ, мягче и легко спадаются. Вены снабжены во многихъ мѣстахъ своихъ карманно-образными клапанами.

Кровообращеніе состоитъ въ слѣдующемъ:

Кровь изъ тѣла собирается венами въ правое предсердіе черезъ полныя вены, отсюда направляется въ правый желудочекъ; послѣдній проталкиваетъ ее по легочной артеріи въ легкія, откуда, пройдя по легочнымъ волоснымъ сосудамъ, она возвращается легочными венами къ сердцу, въ лѣвое предсердіе. Этотъ токъ крови отъ сердца къ легкимъ и обратно называется легочнымъ или малымъ кругомъ кровообращенія. Изъ лѣваго предсердія кровь поступаетъ въ лѣвый желудочекъ, который проталкиваетъ ее по большимъ артеріямъ тѣла во всѣ его части; отсюда она собирается черезъ волосные сосуды въ венозные стволы и ими приносится снова въ правое предсердіе; это—большой кругъ кровообращенія. Недалеко же отъ своего вхожденія въ правое предсердіе вены тѣла принимаютъ въ себя содержимое лимфатической и млечной системъ.

Кровообращеніе.

Млечно-лимфатическіе сосуды предназначены для отвода питательныхъ соковъ различныхъ частей тѣла въ кровеносную систему. Отъ кровеносныхъ сосудовъ млечно-лимфатическіе отличаются между прочимъ тѣмъ, что образуютъ не замкнутый кругъ, а систему трубокъ, болѣе мелкія развѣтвленія, которой распространены въ разныхъ тканяхъ и органахъ тѣла, стволы же прямо соединены съ кровеносной системой.

Лимфатическіе сосуды.

На всемъ протяженіи лимфатическихъ сосудовъ распространены особенные железистые органы, лимфатическія железы, которыя не только процѣживаютъ проходящіе черезъ нихъ питательные соки, но сообщаютъ имъ еще элементы, вырабатываемые ими самими.

А. Болѣзни сердца.

Содержаніе этого (А) под-отдѣла: 1 Воспаленіе сердца (Перикардитъ, Эндокардитъ, Міокардитъ).—2. Гипертрофія сердца.—3. Ожирѣніе сердца.—4. Пороки сердца.—5. Нервное сердцебіеніе (Пальпитация сердца).—6. Спазмъ сердца, Грудная жаба (см. стр. 137).

1. Воспаленіе сердца.

(Перикардитъ, Эндокардитъ, Міокардитъ).

Изъ заголовка видно, что здѣсь идетъ рѣчь о воспаленіи разныхъ составныхъ частей сердца; это — потому, что очень часто всѣ эти части совмѣстно воспаляются, и еще потому, что и лѣченіе въ общемъ совпадаетъ, т. е. оно одно и то же для всѣхъ трехъ формъ.

Причины.

Воспаленіе сердца поражаетъ преимущественно людей цвѣтущаго возраста, отъ 15 до 40 лѣтъ. Самая частая причина — простуда, и поэтому не удивительно, что мужчины заболѣваютъ чаще, нежели женщины. Предрасполагающими обстоятельствами могутъ быть чрезмѣрные тѣлесныя напряженія, злоупотребленіе алкоголемъ, прямые механическія поврежденія и т. п.—Первичное воспаленіе, однако, очень рѣдко встрѣчается. Воспаленіе сердца въ большинствѣ случаевъ—вторичное, вслѣдствіе заболѣванія легкихъ, плевры или болѣе отдаленныхъ органовъ, особенно же вслѣдствіе ревматизма. Острыя заразныя болѣзни сопровождаются также нерѣдко той или другой формой воспаленія сердца.

Точный діагнозъ этой болѣзни можетъ быть поставленъ только врачомъ, путемъ специальныхъ способовъ изслѣдованія, недоступныхъ профанамъ; по однимъ же наружнымъ симптомамъ, или по тому или другому самочувствію больного, точно опредѣлить болѣзнь невозможно. Это надо имѣть въ виду не только при воспаленіяхъ сердца, но и при всѣхъ прочихъ болѣзняхъ сего органа. По симптомамъ же можно только подозрѣвать ту или другую болѣзнь сердца; однако же, руководствуясь симптомами можно и не врачу выбрать соотвѣтствующія гомеопатическія лѣкарства, которыя обыкновенно оказываются и подходя-

щими во всякомъ случаѣ, какая бы ни была форма воспаленія. Въ этомъ отношеніи самопомощь возможна до нѣкоторой степени и при сердечныхъ болѣзняхъ; не слѣдуетъ только ограничиться одной самопомощью, а надо, при малѣйшей возможности, стремиться выяснить характеръ болѣзни путемъ врачебнаго изслѣдованія.

а. Воспаленіе околосердечнаго мѣшка (Перикардитъ). Какъ **Перикардитъ** между листками плевры (см. „Плевритъ“) можетъ, вслѣдствіе воспаленія, образоваться жидкій выпотъ, такъ точно послѣдній можетъ произойти и между листками околосердечнаго мѣшка (перикардія). Какъ и при плевритѣ, выпотъ можетъ быть тутъ серозный, серозно-фибринозный, кровянистый и гнойный (въ послѣднихъ двухъ случаяхъ больной почти всегда погибаетъ). Когда выпотъ всосется, могутъ остаться сращения между листками перикардія. Перикардитъ развивается обыкновенно при остромъ суставномъ ревматизмѣ, но можетъ сопровождать также воспаленіе плевры и легкихъ, родильную горячку, воспаленіе почекъ, чахотку легкихъ и другія заболѣванія сердца, какъ, на примѣръ, воспаленіе оболочки, выстилающей внутреннюю поверхность сердца (эндокардитъ).—Симптомы перикардита: боли въ области сердца, сердцебиеніе, одышка (затрудненное дыханіе), припадки сильной тоски. Сердечные тоны почти не слышны, при приложеніи уха къ области сердца; вмѣсто же нихъ можно часто слышать въ области сердечнаго толчка (нѣсколько ниже и кнаружи отъ соска) шумъ тренія. Теченіе перикардита вообще довольно благопріятно въ острыхъ болѣзняхъ, при ревматизмѣ и воспаленіи легкихъ; напротивъ того, неблагоприятно при имѣющихся еще и другихъ пораженіяхъ сердца, при легочной чахоткѣ и воспаленіи почекъ.

б. Воспаленіе внутренней оболочки сердца (эндокардитъ). **Эндокардитъ** Причины тѣ же, что и при перикардитѣ. Сущность же болѣзненнаго процесса заключается въ набуханіи внутренней оболочки, при чемъ, особенно въ остромъ ревматизмѣ, на внутреннихъ клапанахъ образуются сосочковыя разрастанія, влекущія за собою порчу клапановъ (пороки сердца).—Симптомы эндокардита вообще тѣ же, что и при перикардитѣ. Появленіе его при острой болѣзни обнаруживается тѣмъ, что больной начинаетъ жаловаться на припадки сердцебиенія, при чемъ онъ становится очень безпокойнымъ, часто мѣняетъ положеніе въ кровати, предпочитая во всякомъ случаѣ полусидячее, въ которомъ дыханіе не такъ затруднено. Пульсъ ускоренъ, а въ области сердца (см. выше „перикардитъ“) слышны не оба сердечныхъ тона, а вмѣсто одного

изъ нихъ, совпадающаго по времени съ сердечнымъ толчкомъ, дующій или пилящій шумъ. Упомянутыя выше сосочковыя разраженія на клапанахъ сердца могутъ изъязвиться, и тогда выдѣленія этихъ язвъ, въ свернутомъ состоянїи, могутъ быть занесены токомъ крови въ отдаленные органы и закупорить тамъ мелкіе кровяные сосуды, съ послѣдующимъ отъ этого мѣстнымъ кровоизліяніемъ (въ селезенкѣ, почкѣ, сѣтчаткѣ глаза, въ мозгу и проч.). Такіе заносы называются эмболіями.

Міокардитъ.

в. Воспаленіе сердечной мышцы (міокардитъ) встрѣчается обыкновенно въ связи съ одной изъ предыдущихъ формъ воспаленія и поражаетъ не всю сердечную мышцу, а отдѣльныя, ограниченныя мѣста. Воспалительный процессъ можетъ разрѣшиться, или воспалительный очагъ, претерпѣвъ нѣкоторыя измѣненія, можетъ откапсулироваться. или же, наконецъ, можетъ образоваться нарывъ съ такими послѣдствіями, какъ перикардитъ, порокъ сердца, эмболія. Определенныхъ симптомовъ это воспаленіе не имѣетъ. Боли при немъ не бываетъ, а при другой болѣзни сердца можно лишь подозрѣвать міокардитъ по быстронаступающему ослабленію пульса, по чрезмѣрному упадку сердечной дѣятельности, по необычному чувству ужаса, охватывающаго больного. Міокардитъ, впрочемъ, не поддается точному опредѣленію и специальными способами изслѣдованія, и его всегда возможно только предположить, но не съ точностію распознать.

Лѣченіе воспаленій сердца: Перикардита, Эндокардита и Міокардита.

Аконитъ × 3 дается при первыхъ признакахъ болѣзни: безпокойствѣ, боли, затрудненномъ дыханіи, сердцебіеніи; если въ теченіе 3—4 часовъ не замѣчается улучшенія, то послѣ Акон. въ большинствѣ случаевъ подходит *Спигелія* × 3. — *Бріон.*: при сильныхъ колотьяхъ въ области сердца. — *Дигитал.* × 2: при одышкѣ, ускоренномъ и слабомъ пульсѣ, черезъ 1/2 часа по приему. — Подобно Дигиталису дѣйствуетъ *Строфант.* — Когда сердце успокоилось отъ Дигиталиса или Строфанта, то вмѣсто нихъ умѣстенъ *Кактусъ-грандифлор.* × 2. — Если въ 24 часа не замѣчается улучшенія, или, если лѣченіе началось позже этого срока, то сразу же даютъ *Арсен.-альб.*, особенно при очень слабой дѣятельности сердца и перебояхъ пульса. Это же средство надо давать главнымъ образомъ и въ болѣе трудныхъ случаяхъ, сопровождающихся эмболіями (см. выше); въ послѣднемъ случаѣ также *Аписинъ* или *Фосфоръ*. — Когда воспалительныя явленія (повы-

шенная температура, сильныя боли) прошли или уменьшились, то полезень *Кали-іодат.* $\times 2$. для содѣйствія скорѣйшему всасыванію выпота.—При подозрѣніи на чахотку легкихъ: *Арсен.-іодат.*—Противъ остающихся сращеній (при перикардитѣ): *Сульф.*, *Аурумъ-іодат.*—Изъ другихъ лѣкарствъ, могущихъ найти примѣненіе при этихъ болѣзняхъ, надо упомянуть: *Беллад.*: при волнообразномъ пульсѣ; *Кальмія* $\times 2$: при неправильномъ пульсѣ; *Вератрумъ альб.*: при значительной одышкѣ и синевѣ лица; *Аскленіасъ*: въ менѣ бурныхъ случаяхъ; *Нитрумъ* $\times 3$: при значительныхъ ревматическихъ страданіяхъ (также *Кольхик.*, *Кали-карбон.*, *Пульсат.*, *Сицилла*, *Тартар.-змет.*, *Гепаръ-сульф.* и проч.).

Дѣленія см. ниже при „характеристикѣ лѣкарствъ въ отнош. сердечныхъ болѣзней вообще“, **о приѣмахъ** и проч.—ч. 1, гл. 3 и 4.

Холодные компрессы (15° Р.) на область сердца, смѣняе-Вспомогатель-
мые черезъ каждыя 10 минутъ. Основательное провѣтриваніе ком-
наты больного; лежать, по возможности, при открытыхъ окнахъ. **нныя мѣры и діета.**
Отвлекающіе способы: набрюшный согрѣвающий компрессъ (22° Р.), продолжительностію 2 часа; обертываніе бедеръ (20° Р), продолжительностію 3—4 часа, или паровые компрессы на животъ и ножная паровая ванна; кромѣ того компрессы (15° Р.) на шею, смѣняемые черезъ каждыя 10 минутъ. Діета: нераздражающая пища, слизистые отвары (изъ овсяной, ячменной, пшенной и т. п. крупы), небольшое количество мяса, яйца, молоко въ любомъ видѣ, также пахтанье, вареные фрукты, спаржа, сельдерей, петрушка. Избѣгать употребленія большихъ количествъ жидкостей и кофе.

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи сердечныхъ болѣзней вообще.

Аконитъ $\times 3$ — 3. Твердый, полный, учащенный пульсъ. Сердцебиеніе, чувство стѣсненія въ области сердца; сильный страхъ. Сердцебиеніе ухудшается при движеніи. Приступы сильной боли, идущей отъ сердца къ лѣвой рукѣ съ онѣмѣніемъ и какъ бы ползаніемъ мурашекъ въ пальцахъ. Аконитъ не подходитъ при порокахъ клапановъ съ гипертрофіей сердечной мышцы (его замѣняетъ въ этомъ случаѣ Белладонна, также Арника).

Арника $\times 3$. Симптомы вообще какъ при Аконитѣ. Набухаютъ руки при опусканіи ихъ и при малѣйшемъ ихъ напряженіи. Ощущеніе въ сердцѣ, какъ будто оно стиснуто рукою (какъ при Кактусѣ). Во всей груди ощущеніе боли и разбитости; кожа груди очень чувствительна и не переноситъ прикосновенія одежды (какъ при Лахезисѣ).

Арсеникъ 3—6. Усиленные сердечные толчки, видимые со стороны и ощущаемые самим больнымъ. Хуже ночью и при лежаніи на спинѣ. Пульсъ съ перебоями, или онъ скоръ и слабъ. Сильное безпокойство и страхъ. Отечныя состоянія. Приступы удушья, особенно послѣ полуночи. Кожа тѣла холодная, липкая, внутри же больной чувствуетъ какъ бы жгучій жаръ. Особенно при недостаточности двустворчататаго клапана и при расширеніи праваго сердца.

Аурумъ муриат. 3. Усиленная дѣятельность сердца, ведущая къ увеличенію сердечной мышцы (къ гипертрофіи). Приливы къ груди. При болѣе или менѣе сильномъ напряженіи получается подъ грудиной давленіе и тяжесть.

Белладонна 3. Неправильная дѣятельность сердца съ перебоями. Усиленная пульсація большихъ артерій, приливы къ легкимъ. Особенно при недостаточности аортальнаго клапана рядомъ съ Аурумъ и Кали іодат.

Вератр. алб. × 3. Затрудненное дыханіе, страхъ и тоска; лучше въ лежачемъ положеніи, хуже при вставаніи и движеніи. При нервномъ сердцебіеніи.

Вератрумъ вириде 3. При сердечныхъ болѣзняхъ ревматическаго происхожденія. Постоянная тупая жгучая или колющая боль въ области сердца, надъ грудиной. Сердцебіеніе, трепетаніе сердца, при малѣйшемъ напряженіи, съ недостаткомъ воздуха; стѣсненіе въ груди, иногда съ кровохарканіемъ.

Глоноинъ 3—6. Приливы крови къ груди и къ головѣ, лицо набухшее и красное. Сердцебіеніе учащенное, но не сильное. Ощущеніе стягиванія въ сердцѣ. Лучше въ сидячемъ положеніи. Небольшое содержаніе бѣлка въ мочѣ. При функціональномъ пораженіи сердца, а не отъ воспаленія или порока.

Дигиталисъ × 3. Ощущеніе такое, точно сердце хочетъ остановиться, что вызываетъ сильный страхъ у больного. Ощущеніе въ груди чего то наваливающаго или стягивающаго, или чего то вообще непріятнаго, со слабостію и онѣмѣніемъ въ лѣвой рукѣ. Ощущеніе пустоты и томленія подъ ложечкой. Пульсъ замедленъ, часто медленнѣе, нежели удары сердца, что можетъ быть при слабости послѣднихъ. Малѣйшее движеніе ускоряетъ частоту пульса. Дыханіе затруднено и замедлено. Явленія застоя крови. Водяночныя состоянія.

Кактусъ × 3—3. Сердцебіеніе при малѣйшемъ возбужденіи или напряженіи, сильная боль въ области сердца, съ ощущеніемъ, какъ если-бы оно было стянуто обручемъ. Замѣтная пульсація

подъ ложечкой; бываетъ и кровохарканіе. Также при гипертрофіи, вслѣдствіе порока клапановъ.

Кали карбоник. 3. Сердцебіеніе съ стѣсненіемъ въ груди и затрудненнымъ дыханіемъ, но безъ приливовъ къ легкимъ. Перебои и замедленный пульсъ, или очень слабый и ускоренный пульсъ, а не полный и крѣпкій.

Кальмія × 3. Пульсъ слабый, мягкій, неравномѣрнаго наполненія, болѣзненное біеніе сердца. Особенно при болѣзни сердца отъ подагры или ревматизма. Ощущеніе замиранія, онѣмѣнія въ пальцахъ лѣвой руки.

Лакезисъ 6. Приливы крови къ головѣ и груди при холодныхъ ногахъ. Сердцебіеніе съ ощущеніемъ стягиванія или стискиванія въ груди, въ области сердца; одышка при пробужденіи, не дающая лежать. Водяночныя состоянія.

Спигелія × 3. Острая боль отъ сердца къ спинѣ или къ лѣвой рукѣ. Чувство давленія и тоски въ области сердца; сердцебіеніе, особенно при движеніи рукъ или всего тѣла; больному трудно лежать. Частота пульса не соотвѣтствуетъ сердечнымъ толчкамъ.

Фосфоръ 3. Приливы или застои крови; сердцебіеніе при малѣйшей неожиданности, или при волненіи, или при движеніи. Сердцебіеніе у быстро растущихъ юношей. Особенно при пораженіи правой половины сердца.

См. еще ниже характеристику лѣкарствъ при „Нервномъ сердцебіеніи“.

2. Гипертрофія и расширеніе сердца.

Гипертрофія сердца есть увеличеніе массы сердечной мышцы съ обыкновенно одновременнымъ расширеніемъ его объема; подъ расширеніемъ же сердца разумѣютъ увеличенный объемъ его полостей съ истончаніемъ сердечной мышцы.

Гипертрофія сердца развивается, когда по какой-либо причинѣ сердечная мышца вынуждена чрезмѣрно работать, причемъ наиболѣе предрасположенъ къ гипертрофіи лѣвый отдѣлъ (желудочекъ) сердца, тогда какъ правый отдѣлъ (желудочекъ) склоненъ больше къ расширенію. Къ причинамъ, ведущимъ къ гипертрофіи сердца, относятся: суженіе устья аорты, препятствія въ артеріяхъ вообще, брайтова болѣзнь и проч., также чрезмѣрная физическая работа тѣла.

Причины.

**Признаки
и проявленія
болѣзни.**

Наиболѣе выдающимся признакомъ гипертрофіи сердца является особый характеръ сердечнаго толчка. Онъ виденъ дальше книзу и влѣво, чѣмъ въ нормальномъ состояніи, и замѣтно сотрясаетъ это мѣсто грудной клѣтки, такъ что даже приподымаетъ положенную на сердце руку. Это—при гипертрофіи лѣваго желудочка. При гипертрофіи же праваго желудочка сердца сотрясение груди замѣтнѣе между верхушкой сердца и нижней частію грудины, гдѣ оно весьма сильно.

Больные, страдающие гипертрофіей сердца имѣютъ часто видъ совершенно здоровый и самочувствие у нихъ можетъ быть вполне хорошее, только цвѣтъ лица ихъ болѣе красный, а сонныя артеріи сильнѣе пульсируютъ. Чаше, однако-же, они страдаютъ приливами къ головѣ, головной болью, головокруженіями, шумомъ въ ушахъ, мерцаніемъ передъ глазами и сердцебіеніемъ; сердцебіеніе можетъ представлять самое главное проявленіе болѣзни, постоянное или обнаруживающееся лишь при волненіяхъ, тѣлесныхъ напряженіяхъ, послѣ употребленія спиртныхъ напитковъ, притомъ въ весьма мучительной степени; особенно сильно бываетъ сердцебіеніе во время засыпанія. При болѣе сильной гипертрофіи чувствуется въ области сердца тяжесть и давленіе, но безъ боли.

Расширеніе сердца сопровождается весьма частой одышкой вслѣдствіе замедленнаго кровообращенія и застоевъ крови и признаками ослабленной дѣятельности сердца. Болѣзнь эта всегда вторичная, зависящая отъ другихъ болѣзней, чаще всего отъ ожирѣнія сердца.

**Лѣченіе
гипертрофіи
сердца.**

Лѣченіе гипертрофіи сердца сводится къ тому, чтобы поддерживать правильную дѣятельность сердечной мышцы и всего организма. Необходимо воздерживаться отъ усиленныхъ тѣлесныхъ напряженій, отъ подниманія тяжестей, отъ всякаго рода возбуждающихъ веществъ, особенно отъ кофе, крѣпкаго чая, вина и куренія табака. Надо заботиться и о томъ, чтобы всѣ отправленія организма были въ порядкѣ.

Изъ лѣкарствъ чаще всего показаны при гипертрофіи сердца: *Акон.*, *Арника*, *Кактусъ*, *Кальмія*, *Арсеник.*, *Аурумъ*, *Русъ*, рѣже—*Феррумъ*, *Дигиталисъ*.

Характеристику и дѣленія см. выше.

О дозахъ и способахъ пріемовъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.

**Лѣченіе
расширенія
сердца.**

Лѣченіе вторичнаго расширенія сердца должно быть направлено противъ основной болѣзни. Хорошимъ палліативнымъ средствомъ при угрожающей слабости сердца является *Камфора* $\times 1$ или

въ видѣ *Камфора Рубини* *Θ*. Кромѣ того подходятъ *Верапр.* $\times 3$ и *Аммон. карб.* $\times 2$, также вино. Въ случаяхъ сердечной слабости съ сильнымъ общимъ возбужденіемъ показаны: *Дигиталисъ* $\times 3$ — $\times 1$, *Каннабисъ инд.* $\times 3$, *Лауроцераз.* $\times 2$, также *Отій 1*. Противъ болѣзни, какъ таковой, подходятъ: *Феррумъ*, *Хина*, *Калькар. карб.*, *Барита карбон.*, *Арсеник.*, *Фосфоръ*, *Іод.*, также—*Купрумъ* и *Плумбумъ*, *Сульфуръ*, *Аурумъ* (подробности объ этихъ средствахъ см. въ „Лѣкарствовѣдѣніи“).

3. Ожирѣніе сердца.

Ожирѣніе сердца бываетъ двоякаго рода: 1) жиръ скопляется на всей сердечной мышцѣ и отлагается также между мышечными волокнами ея (отложеніе жира), 2) сами мышечныя волокна превращаются въ жиръ (жировое перерожденіе). Первое встрѣчается у тучныхъ особъ, при чрезмѣрномъ употребленіи мучныхъ кушаній, пива, спирта, картофеля; второе, т. е. жировое перерожденіе сердечной мышцы, бываетъ слѣдствіемъ такихъ болѣзней, какъ тифъ, туберкулезъ легкихъ, родильная горячка, сильное малокровіе. Самыми характерными симптомами ожирѣнія сердца являются крайняя слабость сердечнаго толчка и сердечныхъ тоновъ и неправильный пульсъ; къ этому присоединяется затрудненное, тяжелое ~~дыханіе~~ дыханіе, особенно при ходьбѣ, при восхожденіи на гору или по лѣстницѣ; иногда дыханіе на короткое время (до полуминуты) совсѣмъ останавливается, послѣ чего еще болѣе ускоряется. Теченіе болѣзни затягивается обыкновенно на цѣлые мѣсяцы и годы. Если не принимать надлежащихъ мѣръ, то въ концѣ концовъ является водянка ногъ и всего тѣла съ сильнѣйшей одышкой, но смерть можетъ наступить и внезапно, вслѣдствіе паралича сердца. Ожирѣніе сердца влечетъ за собою часто расширеніе его (см. выше).

Лѣченіе см. выше при „Расширеніи сердца“, также при „Тучности“ въ отд. 10-мъ, гдѣ указаны и соотвѣтствующая діета и вспомогательныя мѣры.

4. Пороки сердца.

Подъ порокомъ сердца разумѣютъ такое измѣненіе сердечныхъ клапановъ, вслѣдствіе котораго послѣдніе не вполне закрываются, чтó въ свою очередь служитъ причиной неправильнаго и неравномѣрнаго кровообращенія, преимущественно—застоевъ крови

Послѣдствія
пороковъ
сердца.

въ разныхъ частяхъ тѣла. Чтобы выравнивать эту неправильность въ кровообращеніи, сердечная мышца должна усиленнѣе работать, а это ведетъ къ чрезмѣрному развитію ея, къ утолщенію или увеличенію, къ гипертрофіи сердца (см. выше). Вмѣстѣ съ утолщеніемъ сердечной мышцы происходитъ также въ большей или меньшей степени расширеніе полости сердца, которое образуется на счетъ не увеличенія, а растяженія сердечной мышцы. Застои крови влекутъ за собою заболѣванія многихъ органовъ: мозга, легкихъ, печени и другихъ пищеварительныхъ органовъ. Застои въ мозгу производятъ головокруженіе, головныя боли, шумъ въ ушахъ, но они могутъ вести также къ разрыву мозговыхъ сосудовъ, мозговому удару съ послѣдующими односторонними параличами. Печень застойная всегда увеличена. Вслѣдствіе расширенія сосудовъ желудка и кишекъ происходятъ желудочные и кишечные катарры, отсутствіе аппетита, расстройства пищеваренія и геморрой. Застои въ почкахъ ведутъ къ уменьшенному выдѣленію мочи, содержащей бѣлокъ, и водяночнымъ отеканіямъ тѣла. Застои крови въ легкихъ имѣютъ своимъ послѣдствіемъ затрудненіе дыханія (одышку), кашель, кровохарканіе и даже смертельное кровоизліяніе (вслѣдствіе разрыва кровеносныхъ сосудовъ).—Порокъ сердца чаще всего развивается изъ остраго ревматизма суставовъ, но часто также вслѣдствіе воспалительныхъ процессовъ сердца и груди. Если приложить ухо къ области сердца, то, въ случаѣ порока его, слышатся не чистые сердечные тоны, а, вмѣсто одного изъ нихъ (рѣдко вмѣсто обоихъ) шумъ.—Пороки сердца бываютъ разные, смотря по тому, какой именно клапанъ (всѣхъ клапановъ въ сердцѣ четыре: два—въ лѣвомъ и два—въ правомъ отдѣлѣ сердца—см. стр. 366) и въ какомъ родѣ онъ пораженъ; точное же опредѣленіе болѣзни можетъ дать только врачъ.

Лѣченіе можетъ быть при данной болѣзни лишь симптоматическое, такъ какъ о радикальномъ возстановленіи разъ уже испорченныхъ клапановъ вообще рѣчи быть не можетъ. Однако же, при надлежащемъ припадочномъ (симптоматическомъ) лѣченіи и правильномъ, здоровомъ образѣ жизни, сердце настолько приспосабливается къ своему пороку, что не причиняетъ сколько нибудь тягостныхъ страданій, и больной можетъ жить столько же, сколько бы онъ жилъ, имѣя здоровое сердце.

Изъ лѣкарствъ чаще всего показаны при порокахъ сердца слѣдующія. *Акон.*: сердцебіеніе при чрезмѣрной дѣятельности сердца.—*Дигиталисъ* ⅋2: сильная одышка, ускоренный, слабый

ичины
роковъ
ердца.

лѣченіе.

пульсъ.—*Кактусъ грандисфлор.* и *Кальмія латифол.*: при сильномъ сердцебіеніи съ головокруженіемъ и головной болью.—*Каликарбоник.*: сердцебіеніе съ одышкой и колотьемъ въ лѣвой сторонѣ; слабый, ускоренный пульсъ, перебои (также *Верафрумъ альб.*).—*Арсен.*: при ночномъ сердцебіеніи, сильной одышкѣ, посинѣніи лица, губъ и пр., водяночныхъ отекаіяхъ конечностей и проч., — *Аурумъ*: превосходное сердечное лѣкарство; при припадкахъ стѣсненія въ груди, маломъ, но ускоренномъ пульсѣ; боль сердца, излучающаяся въ лѣвую руку до самыхъ пальцевъ; удрученное настроеніе духа.—*Фосфоръ*: при осложненіи легочнымъ или бронхіальнымъ катарромъ, постояннымъ кашлемъ и отхаркиваніемъ слизистыхъ массъ, — *Ацид. карбол.*: при судорожномъ сжатіи сердца; сердцебіеніе особенно по утрамъ.— Кромѣ того даются также средства противъ другихъ сопутствующихъ состояній (см. Болѣзни печени, желудка, кишекъ и проч.).

Дополнительную **характеристику лѣкарствъ** см. на стр. 371, также въ „Лѣкарствовѣдніи“.

О дозахъ и способѣ приемовъ и дѣленіяхъ: ч. 1, гл. 3 и 4, также стр. 35—39.

При застояхъ вслѣдствіе пороковъ сердца играетъ весьма **вспомогатель-** важную роль отвлекающій способъ лѣченія, а именно: три раза **нѣры и** въ недѣлю ножноподмышковое обертываніе (22⁰ Р., часть продолжительности, съ горячими, въ мокрая полотенца обернутыми бутылками къ ногамъ), столько же разъ — ножная паровая ванна (20 минутъ продолжительности), съ послѣдующимъ цѣльнымъ обмываніемъ (22⁰ Р.) или полуванной (25⁰ Р. и 5—10 минутъ продолжительности), общій массажъ (влажный—20⁰ Р.) и массажъ сердца. На ночь набрюшный согрѣвающій компрессъ (22⁰ Р.), обертываніе бедеръ (20⁰ Р.), по утрамъ—цѣльное обмываніе (22⁰ Р.)—эти примѣненія суть простѣйшіе отвлекающіе способы.—Для сердечнаго больного весьма важенъ чистый, свѣжій воздухъ и умѣренное движеніе. Температура комнаты больного не должна превышать 14⁰ Р.— Что касается діеты, то слѣдуетъ значительно ограничить употребленіе въ пищу мучныхъ кушаній, картофеля, хлѣба, также суповъ и жидкостей вообще; особенно же вредны: чай, кофе, спиртные напитки. Вообще діета должна быть нераздражающая и вмѣстѣ съ тѣмъ питательная и нисколько для желудка необременительная; такъ, примѣрно, слѣдующая: утромъ, вмѣсто чая или кофе, молоко—1—2 стакана, часа 2—3 спустя—плоды (сырые или вареные), въ обѣдъ — немного мяса и много

зелени; передъ вечеромъ — опять молоко; вечеромъ — параяицъ. — Надо заботиться о ежедневномъ опорожнении кишечника (см. стр. 219).

Б. Водянка сердца.

Водянка сердца отличается отъ перикардита, какъ водянка груди — отъ жидкаго плеврита. Она никогда не является какъ самостоятельная болѣзнь, а всегда лишь какъ одинъ изъ симптомовъ болѣзней сердца, легкихъ, печени и почекъ, сопутствуя водяночному отекаю друтихъ частей тѣла.

Лѣчение должно быть направлено на причинную болѣзнь.

6. Нервное сердцебиение. Пальпитация сердца.

Тутъ рѣчь не о томъ сердцебиении, которое сопровождается описанныя выше болѣзни сердца, ни о томъ также, которое бываетъ у совершенно здоровыхъ людей, въ видѣ кратковременнаго явления, послѣ сильныхъ душевныхъ или тѣлесныхъ возбуждений. Разумѣется же подъ нервнымъ сердцебиениемъ такое усиление или учащение сердечной дѣятельности, которое является приступами безъ всякихъ опредѣлимыхъ измѣненій сердечныхъ тканей.

Причины.

Нервное сердцебиение можетъ явиться слѣдствиемъ душевныхъ аффектовъ возбуждающаго или угнетающаго свойства или такихъ состояній организма, которыя вызываютъ въ послѣднемъ слабость и нервную раздражительность; сюда относятся: малокровіе, блѣдная немочь, онанизмъ, половыя излишества, чрезмѣрныя умственныя занятія; далѣе нервное сердцебиение сопровождается часто нервныя и душевныя болѣзни (ипохондрию, истерію, неврастенію и пр.); оно бываетъ также у полнокровныхъ и у страдающихъ глистами.

Проявленія
болѣзни

Приступъ нервнаго сердцебиения является внезапно, безъ явныхъ предвѣстниковъ или по самому ничтожному поводу, и очень мучителенъ для больного. Сердце какъ бы отрывается и трепещетъ, больной ощущаетъ ужаснѣйшую тоску и безпокойство, ему кажется, что вотъ-вотъ умереть. Лицо дѣлается блѣднымъ, оно покрывается холоднымъ потомъ, взглядъ становится неподвижнымъ, ноги холодѣютъ, иной разъ теряется даже сознание. Пульсъ при этомъ малъ, часто съ перебоями. Такой приступъ продолжается обыкновенно недолго, ограничиваясь минутами, рѣдко больше. Въ другихъ случаяхъ характеръ приступа иной. Сердце бьется усиленно и учащенно, сердечныя толчки сотрясаютъ грудную клѣтку,

біеніе въ артеріяхъ очень сильно и оно мучительно ощущается больнымъ, пульсъ полный и твердый, а то и неравномѣрный. Лицо вздутое и красное, глаза блестятъ и неподвижны, тѣло то холодное, то горячее. Больной жалуется на головную боль, на головокруженіе, мерцаніе передъ глазами, стѣсненное дыханіе. Приступъ продолжается обыкновенно короткое время, но иногда и нѣсколько часовъ. Диагнозъ болѣзни ставится не на основаніи характера наблюдаемаго приступа, а на томъ состояніи, въ какомъ больной находится въ свободное отъ приступовъ время. Если въ промежуточное время сердце больного здоровое, нормальное, то приступъ можно объяснить какъ чисто нервное сердцебіеніе. Отъ грудной жабы нервное сердцебіеніе отличается отсутствіемъ боли въ сердцѣ, характерной для первой болѣзни (см. стр. 137). Степень излѣчимости при этой болѣзни зависитъ отъ общаго состоянія организма, отъ того, въ какой мѣрѣ послѣднее можетъ быть улучшено. Какъ болѣзнь, сопряженная нерѣдко съ періодомъ формировація у молодыхъ людей (съ 16 до 25 лѣтъ), нервное сердцебіеніе проходитъ постепенно само собою.

Лѣченіе во время самаго приступа нервного сердцебіенія различно, смотря по характеру приступа. Если онъ сопровождается приливомъ къ головѣ, видимымъ біеніемъ сердца и артерій, то главнымъ средствомъ является *Аконитъ 3*, также *Глоноинъ 3—6*. Далѣе надо имѣть въ виду слѣдующія средства: *Спигеля × 3*: усиленная дѣятельность сердца, неравномѣрный пульсъ, съ перебоями; холодныя конечности; глисты.—*Арсеникъ 3*: необычайно сильный и быстрый пульсъ, лишь рѣдко неравномѣрный или малоощутимый; приступы являются преимущественно ночью во снѣ; кожа на ощупь горяча. Подходить особенно, когда приступы являются периодически, или ко времени мѣсячныхъ у женщинъ; также у блѣднонемочныхъ, у страдающихъ астмой, у пьяницъ.—*Феррумъ 3—6*: при блѣдной немочи и малокровіи съ приливами крови къ лицу; также у туберкулезныхъ и слабонервныхъ; у женщинъ со скудными мѣсячными и катарромъ матки.—*Нуксъ во. 3*: сердцебіеніе вслѣдствие погрѣшности въ діетѣ, съ приливами къ головѣ и тошнотой; у привычныхъ къ вину и кофе; у страдающихъ раздражительностію спинного хребта.—*Платина 6* (или *Платина муриат. 3*): при неправильныхъ мѣсячныхъ и сильной возбудимости половой сферы. Для приливнаго нервного сердцебіенія подходятъ также: *Беллад.*, *Вератр. альб.*, *Аурумъ*, *Ацид. нитрик.*, *Фосфоръ*, *Аргентумъ*—см. „Лѣкарствовѣдніе“.

Лѣченіе.

Для той формы нервнаго сердцебіенія, которая сопровождается блѣдностію лица, мягкимъ слабымъ пульсомъ и т. д. (см. выше) показаны слѣдующія лѣкарства: *Камфора* $\times 1$ или *Камфора-Рубини* Θ , при неравномѣрномъ біеніи сердца, стѣсненіи въ груди, слабомъ пульсѣ, холодномъ на ощупь тѣлѣ. — *Глоноинъ* $\times 3$: при блѣдности лица. — *Пульсатилла* $\times 3$: сердцебіеніе при малѣйшемъ волненіи; сердцебіеніе ночью, разбужающее со сна; зябкость. Самочувствіе лучше при движеніи, на вольномъ воздухѣ. У малокровныхъ съ преобладаніемъ нервозности. Сердцебіеніе во время регуль. — *Хина* $\times 3$: сердцебіеніе у ослабленныхъ нервныхъ субъектовъ, онанистовъ, ипохондриковъ; у ослабленныхъ вслѣдствіе потерь крови или соковъ; холодная кожа, мягкій малый пульсъ. — Еще надо имѣть въ виду: *Игнація*, *Сенія*, *Нуксъ мосхата*, *Асафетида* (характеристику этихъ и еще другихъ подходящихъ лѣкарствъ см. на стр. 153—157). '

Діета и вспомогательныя мѣры какъ при „Грудной жабѣ“ (см. стр. 138) и въ соотвѣтствіи съ основнымъ болѣзненнымъ состояніемъ организма („Неврозы“, „Малокровіе“ и проч.).

7. Спазмъ сердца. Грудная жаба—см. стр. 137.

Б. Болѣзни артерій и венъ.

Содержаніе этого (Б) под-отдѣла. I. Болѣзни артерій: 1. Острое воспаленіе артерій. — 2. Хроническое воспаленіе артерій, Атеромагозъ артерій, Артеріосклерозъ. — 3. Расширенія артерій, Аневризмы. — 4. Закупорка артерій. — II. Болѣзни венъ: 1. Воспаленіе венъ. — 2. Флегмазія альба доленсъ. — 3. Расширеніе венъ. — Варикозъ.

I. Болѣзни артерій.

**Строеніе
артеріальной
стѣнки.**

Понятіе объ артеріяхъ дано уже на стр. 366. Тутъ остается еще добавить, что три слоя образуютъ стѣнку артерій: внутренній слой (эндотелій), имѣющій эластическую основу; средній слой, состоящій изъ эластической ткани въ большихъ артеріяхъ, изъ гладкихъ же мышечныхъ волоконъ, расположенныхъ кольцеобразно и продольно, въ малыхъ артеріяхъ; третій наружный слой состоитъ изъ волокнистой и эластической ткани, внутри болѣе плотной, снаружи болѣе рыхлой.

1. Острое воспаление артерій. Артеритъ.

Острое воспаление артерій очень рѣдко наблюдается; даже въ тѣхъ случаяхъ, когда артерія проходитъ черезъ полость нарыва или легочную каверну и т. п., она остается неповрежденной, благодаря тому, что она обладаетъ собственной, не зависящей отъ окружающихъ частей, кровеносной системой („сосуды сосудовъ“), помимо крѣпкой защитительной конструкции своихъ стѣнокъ. Явленія остраго воспаления артерій тѣ же, что при воспаленіяхъ вообще: ознобъ, жаръ, сильная боль (вдоль воспаленной артеріи), отекъ и покраснѣніе заболѣвшей части и проч. Теченіе всегда бурное, исходъ сомнительный вообще, при пораженіи же аорты и т. п.—смертельный. Лѣченіе противовоспалительное: примѣненіе холода, отвлекающіе компрессы и обертыванія; *Аконитъ*, *Беллад.*, *Меркур.*, *Анисъ*, *Лазезисъ*.

2. Хроническое воспаление артерій. Атероматозъ артерій.

Артеріосклерозъ.

Хроническое воспаление артерій заключается, вообще говоря, **Опредѣленіе.** въ процессъ перерожденія артеріальной стѣнки. Виды перерожденія различны, конечные же результаты одинаковы. Чаще всего происходитъ жировое перерожденіе внутренняго и средняго слоя сосудистой стѣнки, состоящее въ пропитываніи послѣдней мельчайшими жировыми каплями. Рядомъ съ ожирѣніемъ, или какъ его осложненіе, происходитъ объ извествленіе (известковое перерожденіе), каковой процессъ и есть то, что называютъ атероматозомъ артерій или артеріосклерозомъ.

Причины перерожденія артерій преимущественно механическія, ведущія къ частому или длительному повышенію кровяного давленія въ сосудахъ, какъ, напримѣръ, тяжелая работа, злоупотребленіе виномъ, разныя заболѣванія другихъ органовъ, наприм. циррозъ печени и т. п. Благодаря такимъ обстоятельствамъ, артеріальнымъ стѣнкамъ приходится преодолевать сильные напоры крови, онѣ чрезмѣрно растягиваются и подвергаются перерожденію. Перерожденіе начинается поэтому и выражено всего больше въ такихъ мѣстахъ, на которыя кровяное давленіе всего сильнѣе дѣйствуетъ, наприм. на поворотахъ и искривленіяхъ артерій, гдѣ артеріальная стѣнка даетъ кровяному току иное направленіе (дуга аорты и т. п.).

Причины.

**Старческий
склерозъ**

Затѣмъ перерождение артеріальныхъ стѣнокъ бываетъ въ слѣдствіе болѣзней питанія,—при ожирѣніи, подагрѣ, сахарной болѣзни, рактъ и т. п., также въ старости. Старческий склерозъ артерій есть, въ сущности, нормальный, неизбѣжный процессъ, степень же его и скорость образованія колеблются въ самыхъ широкихъ предѣлахъ. У лицъ же, раньше времени старѣющихъ, у такъ наз. „молодыхъ старцевъ“, кровеносная система начинаетъ старѣть особенно рано.—Изъ хроническихъ инфекціонныхъ болѣзней сифилисъ всего чаще ведетъ къ перерожденію артерій.

**Послѣдствія
перерожденія
артерій.**

Вслѣдствіе уменьшенія эластичности артерій, стѣнки послѣднихъ становятся мало податливыми проталкиваемой въ нихъ изъ сердца крови, а это ведетъ за собою, въ свою очередь, пониженіе жизнедѣятельности и выдержанности организма вообще. Атероматозъ увеличиваетъ опасности кровотеченій, наркоза, операций, вообще всякаго болѣе или менѣе тяжелаго процесса, выводящаго организмъ изъ его равновѣсія. Подъ тяжестью давленія крови артерія выпячивается въ наиболѣе перерожденномъ мѣстѣ и можетъ въ концѣ концовъ, не выдерживая напора, прорваться, какъ, напр., при мозговомъ ударѣ. Особенно опасное положеніе создается при атероматозномъ перерожденіи питающихъ сердце и въ немъ же заложенныхъ вѣчныхъ артерій. Отъ препятствія, встречаемаго кровью въ склерозированныхъ артеріяхъ, развивается гипертрофія сердечной мышцы, расширеніе сердца, венозные застои въ разныхъ органахъ (вслѣдствіе замедленнаго кровообращенія), расширеніе большихъ артерій (аневризмы), со всѣми послѣдствіями подобныхъ состояній. Такие больные выказываютъ особенно сильное пониженіе способности сопротивляться всякимъ вреднымъ внѣшнимъ влияніямъ; они необычайно слабы и вовсе не выносятъ поврежденій, инфекціонныхъ болѣзней и т. п.

Наружно склерозированныя артеріи на ощупь тверды, и на вискахъ можно часто даже глазомъ различить ихъ развѣтвленія въ видѣ какъ бы подкожныхъ шнурковъ.

Лѣченіе

Изъ всего сказаннаго о хроническомъ воспаленіи и перерожденіи артерій должно быть ясно, что такихъ средствъ, которыя бы прямо дѣйствовали на эти болѣзненные состоянія, нѣтъ и быть не можетъ; а то, что въ аллопатіи въ такихъ случаяхъ шаблонно рекомендуется іодъ, нельзя не считать недоразумѣніемъ, даже съ аллопатической точки зрѣнія; ибо невозможно себѣ представить, чтобы тутъ возможно было разсасывающее дѣйствіе іода, на которое, именно, разсчитывается. Питаніе же организма можетъ

подъ влияніемъ юда (большихъ дозъ его) только еще болѣе разстроиться, а это въ свою очередь можетъ только еще болѣе способствовать перерожденію артерій, чтó въ дѣйствительности, какъ мы полагаемъ, и происходитъ. Не можетъ быть шаблоннаго лѣченія атероматоза или склероза артерій, и на вопросъ, какія средства имѣются въ гомеопатіи противъ этихъ болѣзней, надо сказать, что средства противъ нихъ суть всѣ тѣ, именно, которыя способствуютъ улучшенію общаго состоянія организма, возможно болѣе правильной его жизнедѣятельности, устраненію, въ наивозможнѣйшей мѣрѣ, всѣхъ тѣхъ неправильностей и болѣзненныхъ состояній, какія имѣются въ каждомъ отдѣльномъ представляющемся случаѣ. Вотъ почему тутъ не могутъ быть даны опредѣленные указанія. Лѣкарства должны выбираться на основаніи имѣющихся въ каждомъ случаѣ показаній со стороны всѣхъ органовъ тѣла, руководствомъ же могутъ служить соотвѣтствующие отдѣлы этой книги. Чаше всего въ практикѣ приходится въ такихъ случаяхъ назначать *Калькар. карб., Барита карбон., Силиція, Сульфуръ, Гепаръ сульф., Аурумъ, Іод., Ацид. нитрик.* и т. п. также тѣ лѣкарства, какія указаны при сердечныхъ болѣзняхъ.

То же, что о лѣчении, надо сказать объ образѣ жизни, діетѣ и вспомогательныхъ мѣрахъ. Все, что нарушаетъ такъ или иначе, притомъ длительно, здоровье человѣка, ведетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ развитію упомянутыхъ перерожденій артерій. Нормальный образъ жизни и избѣганіе всякаго рода излишествъ служатъ лучшими предупредительными мѣрами противъ этихъ перерожденій.

Діета и вспомогательныя мѣры зависятъ въ каждомъ случаѣ отъ основнаго болѣзненнаго состоянія.

3. Расширенія артерій. Аневризмы.

Причиною аневризмъ являются перерожденія артеріальной стѣнки, о которыхъ сказано выше—атероматозъ и склерозъ артерій. Аневризмы внутреннихъ артерій (грудной и брюшной) встрѣчаются несравненно чаще, нежели наружныя (на конечностяхъ). Клинически аневризма представляется въ видѣ ограниченной твердой опухоли, обыкновенно пульсирующей, но не всегда. Диагнозъ болѣзни не всегда легокъ, и бывали случаи, когда мягкія саркомы, опухоли лимфатическихъ железъ и т. п. принимались за аневризмы. Диагнозъ можетъ быть поставленъ во всякомъ случаѣ лишь врачебнымъ изслѣдованіемъ и наблюденіемъ.

**Послѣдствія
аневризмы
аорты.**

Аневризма аорты можетъ имѣть такія послѣдствія, какъ усиленные сердечные толчки, боль подъ грудиной, одышка, бронхіяльные катарры и даже кровохарканіе при давленіи опухоли на дыхательное горло и бронхи; набуханіе шейныхъ венъ и отеки верхнихъ конечностей; затрудненное прохожденіе пищи черезъ пищеводъ, вслѣдствіе давленія аневризмы на послѣдній; застои крови въ мозгу, головная боль, головокруженіе, спячка и проч. Если аневризма находится подъ самой грудиной, то положенный въ надгрудинную ямку палецъ ощущаетъ тамъ пульсацию. Если аневризма находится глубже, близъ позвоночника, то, давленіемъ на выходящіе изъ послѣдняго нервы, она можетъ вызывать сильныя боли въ спинѣ и параличи нижней части тѣла.

Аневризма брюшной аорты представляетъ собою пульсирующую въ животѣ опухоль съ соответствующимъ сотрясеніемъ брюшной стѣнки. Слѣдствіемъ могутъ быть сильныя боли въ поясницѣ, вздутіе кишекъ, колики, пищеварительныя разстройства, онѣмніе или параличъ нижнихъ конечностей и проч.

О лѣченіи можно тутъ сказать вообще то же, что сказано выше о лѣченіи перерожденія артерій. Лѣчение можетъ быть только симптоматическое, излѣченіе же аневризмы невозможно. Оперативному вмѣшательству доступны до нѣкоторой степени лишь наружныя аневризмы, но не внутреннія.

4. Закупорка артерій. Эмболія. Тромбъ.

Закупорка наблюдается лишь въ маленькихъ артеріяхъ и происходитъ на почвѣ атероматознаго процесса или вслѣдствіе свертыванія крови въ какомъ-либо ограниченномъ мѣстѣ артеріи. Образуется въ артеріи пробка, состоящая въ первомъ случаѣ изъ продуктовъ воспаленія, во второмъ—изъ волокнистой ткани. Эмболией называется та закупоривающая сосудъ пробка, которая заносится въ него потокомъ крови (отъ сердца или изъ аорты); тромбомъ же—когда пробка образовалась отъ свернувшейся на мѣстѣ крови.

Закупорка артеріи внѣшней, напр., на нижней конечности, влечетъ за собою воспаленіе и омертвѣніе (гангрену) части тѣла, находящейся ниже мѣста закупорки, сопровождающееся сильной болью. Течение болѣзни смертельное, если не успѣетъ образоваться окружное замѣщающее кровообращеніе. Лѣчение лѣкарственное можетъ быть въ данномъ случаѣ только симптоматическое (*Беллад., Аписъ, Меркур., Хина, Арсен., Секале, Лахе-*

зисъ, Карбо); хирургическое же вмѣшательство можетъ дать болѣе существенные результаты въ тѣхъ случаяхъ, когда оно возможно по мѣсту образовавшейся закупорки, напр.—на конечностяхъ.

II. Болѣзни венъ.

1. Воспаленіе венъ. Флебитъ.

Къ воспаленію венъ могутъ вести слѣдующія обстоятельства: прямое поврежденіе сосуда, свертки крови, образующіеся по какой-либо причинѣ, проникновенье въ вену инородныхъ веществъ, вызывающихъ разложеніе крови, какъ это бываетъ, наприм., при воспаленіяхъ въ сосѣднихъ тканяхъ и органахъ, но также и въ болѣе отдаленныхъ. — Чаше всего наблюдается воспаленіе венъ на конечностяхъ, и именно послѣ пораненія, когда ранка загрязнилась какими-либо заразительными частицами, или при гнойныхъ нарывахъ. Развиваются красныя полосы, соотвѣтствующія ходу венъ, болѣзненные не только при движеніи, но и въ покоѣ. Пока еще просвѣтъ воспаленной вены нормаленъ, теченье воспаленія довольно легкое и вообще благопріятное. Въ тяжелыхъ же случаяхъ, когда воспаляются всѣ оболочки венозной стѣнки, въ томъ числѣ и внутренняя, то въ венѣ образуется тромбъ (закупоривающая вену пробка), который можетъ вести къ эмболиямъ (см. выше) и къ гнойному зараженію крови, прежде же всего къ образованію мѣстнаго нарыва.

Гнойное зараженіе крови можетъ быть также слѣдствиемъ скрытаго воспаленія венъ—половыхъ органовъ, прямой кишки и проч., что въ практикѣ выясняется иной разъ только лишь послѣ смерти, при вскрытіи.

Каждое воспаленіе венъ надо считать серьезнымъ заболѣваніемъ и поэтому отнюдь не запускать. Абсолютный покой, противовоспалительное лѣченіе, внутреннее и наружное. Внутрь: *Беллад.* $\times 3$, *Меркур. солуб.* 3, *Анисъ* $\times 3$, а въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ: *Арсеник.* 3, *Лазезисъ*, *Секале корн.*, *Фосфоръ*. Наружно—согрѣвающие компрессы или компрессы съ белладонновымъ масломъ.—Массажъ въ такихъ случаяхъ противопоказанъ, такъ какъ онъ можетъ принести большой вредъ.

2. Флегмазія альба доленсъ.

Представляетъ особый видъ флебита, могущій явиться у женщинъ въ теченье первыхъ недѣль послѣ родовъ, иногда и послѣ

какой-либо хирургической операции въ половых частяхъ. Быстро и сильно распухаетъ одна нога, достигая часто двойного противъ нормы объема. Нога при этомъ обыкновенно совершенно блѣдна, сильно отечна и очѣнь болѣзненна. Лихорадки можетъ и не быть, но температура тѣла все же неправильна. Въ такихъ случаяхъ имѣется свѣжее или старое заболѣваніе тазовой клѣтчатки, переходящее на подвздошную или бедреную вену, которая, подъ вліяніемъ, вѣроятно, ослабления тока крови, тромбозуется (закупоривается). Болѣзнь эта рѣдко ведетъ къ зараженію крови или къ развитію смертельной эмболии, но за то тянется очень долго, мѣсяцами, а то и до полугода. Даже при полномъ выздоровленіи остается склонность къ отекамъ и нарывамъ.—Лѣченіе такое же, какъ при воспаленіи венъ.

3. Расширеніе венъ. Варикозъ.

Расширеніе венъ бываетъ трубкообразное, съ соотвѣтствующими направленію вены изгибами или, рѣже, мѣшковидное, на подобіе аневризмъ (см. стр. 383). Расширеніе венозной стѣнки происходитъ вслѣдствіе ея истонченія, но при этомъ истончаются и окружающія мягкія части; даже кожа можетъ на мѣстѣ расширенной вены стать очень тонкой. Варикозъ встрѣчается часто одновременно съ другими расстройствами кровообращенія, чаще же всего у многорожавшихъ женщинъ. — Всего болѣе склонны къ расширенію большая вена нижней конечности и вена сѣменного канатика (Варикоцела), также вены прямой кишки (Геморрой). — Послѣдствіями варикоза являются расстройства питанія, застои крови (геморроидальныя шишки), хроническія воспаленія кожи, язвы и т. д. Воспаленіе варикозныхъ венъ особенно опасно въ отношеніи возможности болѣе тяжелыхъ процессовъ (эмболія, пізмія). Дальнѣйшее опасное осложненіе представляетъ кровотеченіе изъ лопнувшихъ варикозныхъ расширеній; геморроидальное кровотеченіе, часто повторяющееся, можетъ вести къ крайнему малокровію, а кровотеченіе изъ варикозовъ голени можетъ быть и смертельнымъ.

Варикозныя расширенія венъ трудно поддаются лѣченію въ смыслѣ ихъ устраненія, такъ какъ тутъ имѣется дѣло съ при рожденнымъ личнымъ предрасположеніемъ. Задержаніе же процесса расширенія, а также улучшеніе сопутствующихъ явленій и послѣдовательныхъ измѣненій возможны при надлежащемъ лѣченіи и соотвѣтствующихъ вспомогательныхъ мѣрахъ.

Вспомогательныя мѣры играютъ при этой болѣзни главную роль. Осторожный массажъ (при отсутствіи воспалительныхъ явлений—флебита), холодныя обливанія, бинтованіе (снизу вверхъ). Для бинтованія лучше пользоваться полотнянымъ бинтомъ, нежели эластическимъ, который, при долгомъ примѣненіи, плохо переносится. Необходимо слѣдить за правильной дѣятельностію кишечника, Легкая гимнастика полезна, долгое же стояніе и сидѣніе вредны. При воспалительномъ состояніи вены и при свѣжеобразовавшейся язвѣ необходимъ полный покой съ повыше положенной конечностію.

Оперативное лѣченіе варикозовъ пока не можетъ похвастаться особенно благоприятными результатами, ни перевязка венъ, ни экстирпация отдѣльныхъ кусковъ расширенной вены, ни впрыскиваніе въ вены іода и т. п.; смертельныя же эмболии вызывались такими средствами нерѣдко. Исключеніемъ являются только варикозы прямой кишки: ихъ часто удается удалить оперативнымъ путемъ навсегда, посредствомъ перевязки и прижиганія; однако, такіе варикозы проходятъ часто и безъ операции, отъ гомеопатическихъ лѣкарствъ. (Лѣченіе геморроидальныхъ шишекъ см. при геморроѣ—стр. 256).

Вообще же при варикозахъ полезны *Гаммелисъ*, *Стафизагрія*, *Ликоподій*, *Графитъ*, особенно при язвенныхъ процессахъ. Эти лѣкарства примѣняются рядомъ съ тѣми, которыя показаны общимъ состояніемъ организма, особенно же—пищеварительными его органами.

В. Болѣзни лимфатическихъ сосудовъ и лимфатическихъ железъ.

О томъ, что такое лимфатическіе сосуды и железы, см. стр. 367. Стѣнки лимфатическихъ сосудовъ имѣютъ въ общемъ такое же строеніе, какъ и кровеносные. Какъ сосуды эти, такъ и железы никогда не заболѣваютъ первично, самостоятельно, а всегда, за рѣдкими исключеніями, вторично, послѣдовательно, т. е. болѣзненные процессы въ другихъ органахъ или тканяхъ влекутъ за собою заболѣваніе и лимфатическихъ путей. При этомъ первичное, основное заболѣваніе часто настолько преобладаетъ въ картинѣ болѣзни, что сопутствующее заболѣваніе лимфатическихъ путей имѣетъ второстепенное значеніе. Такъ, напримѣръ, если при ракѣ груди припухаютъ подмышковыя железы, то, хотя и прини-

мають ихъ во вниманіе, однако самымъ главнымъ остается ракъ груди. Иначе обстоитъ дѣло въ тѣхъ случаяхъ, когда основное страданіе само по себѣ незначительно, наприм. маленькая ссадина на пальцѣ и т. п., или когда основная причина болѣзни кроется внутри организма, въ видѣ, наприм., новообразованія. Въ такихъ случаяхъ рискуютъ имѣть дѣло какъ бы только съ заболѣваніемъ железы, просмотрѣвъ первичный очагъ болѣзни. Вотъ почему, разъ появились признаки пораженія лимфатическихъ сосудовъ или железъ, надо самымъ подробнымъ образомъ осмотрѣть и изслѣдовать всю соотвѣтствующую область тѣла.

1. Воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ.

(Лимфангитъ или Лимфангоитъ).

Причины воспаления лимфатическихъ сосудовъ тѣ же, что и венъ. Воспаленіе можетъ развиваться изъ незначительной ранки на пальцѣ руки или ноги, если она недостаточно чисто содержится. Вдоль по рукѣ или ногѣ образуются продолговатыя, красныя, болѣзненные полосы, идущія вверхъ. Всегда при этомъ имѣется лихорадка и общее недомоганіе. Если воспаление по пути передается и лимфатическимъ железамъ, то и послѣднія воспаляются, нерѣдко до степени нагноенія. Гораздо серьезнѣе становится положеніе больного, когда воспалительный процессъ осложняется зараженіемъ крови (септициеміей).

Лѣченіе заключается прежде всего въ надлежащей очисткѣ пораженной части водой и мыломъ. Затѣмъ дѣлаютъ 1—2 раза въ день мѣстную теплую ванну, послѣ которой, обсушивъ, смазываютъ больную часть белладоннымъ масломъ и забинтовываютъ; послѣднее примѣненіе предпочтителнѣе, чѣмъ тепловлажные компрессы. Заболѣвшей части необходимо дать полный покой. Внутри даютъ *Белладонна* × 3, *Аписъ* × 3; если этихъ лѣкарствъ недостаточно, то еще—*Аммон. карбон.* × 3, *Ацид. нитрик.* × 3 или *Ацидъ муриатик.* × 3; въ болѣзнетрудныхъ случаяхъ—*Арсеник.* × 3, *Русъ* × 3.

Если болѣзненный процессъ почему либо затягивается, то показаны еще: *Сульфуръ*, *Аурумъ*, *Іод.*, *Силиція*, *Кальк. карб.*, *Барита карб.*, *Коніумъ* и др. (См. ниже „Воспаленіе лимфатическихъ железъ“).

2. Воспаленіе лимфатическихъ железъ.

(Лимфаденитъ).

а. Острое воспаленіе железъ является всегда вслѣдствие заразительныхъ началъ, занесенныхъ въ нихъ по лимфатическимъ сосудамъ. Такъ, наприм., незначительное на видъ поврежденіе пальца ноги осложняется острымъ воспаленіемъ бедренныхъ лимфатическихъ железъ; ссадины или язвенные процессы на половыхъ органахъ сопровождаются воспаленіемъ паховыхъ железъ; на верхнихъ конечностяхъ поражаются такимъ же путемъ подмышковыя железы. Опуханіе железъ можетъ происходить и незаразнымъ образомъ, отъ непривычно сильной работы, отъ чрезмѣрнаго утружденія соотвѣтствующихъ частей тѣла; наприм., отъ усиленной маршировки у молодыхъ солдатъ нерѣдко опухаютъ бедренныя железы, но въ такихъ случаяхъ до нагноенія дѣло не доходитъ. Возможно и вліяніе простуды.

**Острое
въ воспаленіе
железъ.**

Лѣченіе въ общемъ такое же, какъ при остромъ лимфангитѣ. *Белладонна*, внутрь и наружно, есть первое средство въ такихъ случаяхъ. Кромѣ того, *Меркурій солубликсъ* 3, для предупрежденія нагноенія, слѣдуетъ давать уже съ самаго начала попеременно съ Беллад.—При нагноеніи *Гепаръ сульф.* 3 способствуетъ скорѣйшему созрѣванію нарыва.—Послѣ вскрытія нарыва: при обильномъ жидкомъ гноѣ—*Сульфуръ* 3; если же гной скудно выделяется, и въ язвѣ имѣется много бѣловатой клѣтчатки, тогда умѣстенъ *Іод.* × 3.—На язву кладется мягкое полотно (или марля) въ нѣсколько рядовъ и гигроскопическая вата. Для обмыванія или промыванія язвы всего лучше брать растворъ изъ 1 чайной ложки *Календула* 0 въ стаканъ воды; этимъ же растворомъ полезно пропитывать полотно или марлю, употребляемая для перевязки больного мѣста.—Для скорѣйшаго заживленія образовавшейся послѣ вскрытія нарыва язвы, когда гноетеченіе уже подходит къ концу, берется *Силиція* 3—6.—Искусственное вскрытіе нарыва цѣлесообразно лишь въ томъ случаѣ, когда железа лежитъ слишкомъ глубоко, и поэтому самостоятельное вскрытіе можетъ на долго затянуться, а также когда нарывъ, хотя и поверхностный, но вполне созрѣвшій; искусственнымъ вскрытіемъ нарыва можно сразу прервать болевые страданія больного и значительно сократить процессъ заживленія. Не слѣдуетъ только, послѣ вскрытія нарыва, выполнять рану марлей и т. п., которыя, какъ инород-

**Лѣченіе
остраго
воспаленія
железъ.**

ныя тѣла, только раздражаютъ живыя ткани и задерживаютъ процессъ заживленія.

**Хроническое
воспаленіе
железъ.**

б. Хроническое воспаленіе лимфатическихъ железъ. Причиною можетъ быть мѣстное заболѣваніе или общее. Какъ мѣстное заболѣваніе—при какомъ либо хроническомъ воспаленіи въ области соответствующихъ лимфатическихъ железъ, на-прим., при воспаленіи тазобедреннаго сустава—опуханіе паховыхъ железъ соответствующей стороны. Общимъ же заболѣваніемъ можетъ быть какая нибудь хроническая инфекція, вродѣ сифилиса или туберкулеза, и при скрытомъ характерѣ этихъ болѣзней опуханіе железъ имѣетъ прежде всего важное диагностическое значеніе. Особенно въ такихъ случаяхъ характеристично, когда опухаютъ такія железы, воспаленіе которыхъ рѣдко имѣетъ мѣстное происхожденіе — на-примѣръ, локтевыя, околоушныя и т. п. Къ общимъ заболѣваніямъ, сопровождающимся опуханіемъ железъ, относятся также золотуха и бѣлокровіе (лейкемія).

**Лѣченіе
хронич. воспал.
железъ.**

При хроническомъ воспаленіи, происшедшемъ изъ остраго, главнымъ лѣкарствомъ является *Сульфур. З—б*, а если его одного оказывается недостаточно для излѣченія, то дальнѣйшими являются: *Аурумъ, Іодъ, Силиція, Калькар. карбон.*—Эти же лѣкарства и особенно еще *Барита карб.*, показаны при воспаленіяхъ железъ золотушнаго характера; также *Кали бихромик.* и *Фосфоръ*. См. еще „Сифилисъ“, „Туберкулезъ“, „Ракъ“.

ОТДѢЛЪ ДЕВЯТЫЙ.

Болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ.

Содержаніе этого отдѣла: I Болѣзни почекъ.—II. Болѣзни мочевого пузыря.—III. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ.—IV. Болѣзни беременныхъ и ро-
женицъ.—V Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ.

Предварительныя замѣтки.

**Положеніе
и строеніе
мочев. орган.**

Мочевые органы состоятъ изъ органовъ, выдѣляющихъ мочу, и изъ органовъ, выводящихъ мочу. Первые суть двѣ железы, почки, снабженныя еще надпочечными железами; вторые, мочеотводные, органы состоятъ изъ мочеточниковъ, мочевого пузыря и мочеиспускательнаго канала. — Почки имѣютъ бобовидную форму и находятся на задней стѣнкѣ полости живота, по

сторонамъ позвоночника, впереди поясничной грудобрюшной преграды. Почки находятся внѣ брюшиннаго мѣшка; по ихъ переднимъ поверхностямъ проходитъ ободочная кишка. Верхній конецъ правой почки прилегаетъ къ печени, верхній конецъ лѣвой почки — къ селезенкѣ, а внутренней и передней частію къ поджелудочной железнѣ и ко дну желудка. Каждая почка окружена жировою капсулою. Въ углубленіи внутренняго края въ почку входятъ почечная вена и почечная артерія. Внутреннее строение почки очень тонкое и сложное: кромѣ развѣтвленій кровеносныхъ сосудовъ, въ нихъ имѣется масса клубочковъ и канальцевъ, также съ очень сложнымъ разнообразнымъ строеніемъ. Все это сложное устройство приурочено къ просачиванію черезъ почки (изъ крови) мочи. — Мочеточники — ихъ также два и каждый начинается отъ почечной лоханки — идутъ косвенно сверху внизъ къ мочевому пузырю, пронизывая его заднюю стѣнку и устьями своими открываясь въ его полость. — Мочевой пузырь образуетъ мышечный мѣшокъ яйцевидной формы. Верхняя часть мочевого пузыря, когда онъ пустъ, находится на уровнѣ верхняго края лоннаго сращенія (лобка); при наполненіи же мочою мочевой пузырь поднимается болѣе или менѣе значительно надъ этимъ мѣстомъ. Позади пузыря лежатъ нижнія петли тонкихъ кишекъ, которыя наполненнымъ пузыремъ отодвигаются вверхъ; затѣмъ еще прямая кишка и, наконецъ, у мужчины сѣменные пузырьки, а у женщины влагалище и матка. Мышечная часть стѣнки мочевого пузыря состоитъ изъ наружнаго продольнаго слоя, средняго сѣтчататаго и внутренняго продольно-сѣтчататаго слоя. Въ мѣстахъ перехода пузыря въ мочеиспускательный каналъ мышцы образуютъ толстое кольцо, сжимающую мышцу (сфинктеръ) пузыря. Внутри пузырь выстланъ слизистой оболочкой. Кромѣ мышцъ въ стѣнкѣ мочевого пузыря развѣтвляются кровеносные и лимфическіе сосуды и нервы. Путемъ сокращенія своихъ продольныхъ и поперечно продольныхъ мышцъ, мочевой пузырь получаетъ возможность выдавливать изъ себя накопленную въ немъ мочу, и во время этого процесса сжимающая выходъ пузыря мышца расслабляется и даетъ ходъ мочѣ въ мочеиспускательный каналъ; въ прочее же время эта мышца сжата наглухо, давая пузырю возможность удерживать мочу во время процесса наполненія. — Подробнѣе о мочеиспускательномъ каналѣ см. ниже въ V-смъ под-отдѣлѣ.

Мочеточники.

**Мочевой
пузырь.**

**Сфинктеръ
пузыря.**

І. Болѣзни почекъ.

Общее
о симптомахъ
бол. почекъ

Въ почкахъ могутъ быть значительныя измѣненія безъ того, чтобы больной ощущалъ боль въ области ихъ. Но если боль имѣется при болѣзни почекъ, то она очень сильна, особенно при надавливании со стороны спинной или брюшной поверхности на почечную область. Боль всегда причиняютъ измѣненія капсулы почки, какъ напримѣръ, воспалительное раздраженіе, или растяженіе ея вслѣдствіе припуханія всего органа, сильную боль причиняетъ раздраженіе нервовъ почечной лоханки и мочеточниковъ, наприм — при прохожденіи почечныхъ камней. Боль имѣетъ обыкновенно характеръ тупого давленія и напряженія въ почечной области на одной или на обѣихъ сторонахъ поясничной части позвоночника. Почечная боль усиливается при малѣйшемъ сотрясеніи тѣла, при хожденіи и бѣганіи, она имѣетъ еще ту особенность, что распространяется (излучается) по направленію бедренного нерва, а у мужчинъ — на нервы сѣменного канатика, съ притягиваніемъ яичекъ къ паховому каналу. Сильныя почечныя боли вызываютъ часто рвоту у больного и даже обморочныя припадки, что обыкновенно бываетъ только при боли отъ прохожденія почечныхъ камней (см. ниже: „Почечная колика“), и такія боли являются всегда приступами съ болѣе или менѣе свободными промежутками. За исключеніемъ такихъ случаевъ, во всѣхъ прочихъ, именно въ болѣзняхъ самихъ почекъ, почечной боли либо совсѣмъ не бываетъ, либо же она является по временамъ и въ очень слабой степени. Сильныя и постоянныя боли бываютъ, кромѣ какъ при камняхъ, еще при поврежденіяхъ, при нарывѣ и при ракѣ почекъ.

Другіе мѣстные симптомы, устанавливаемые ручнымъ изслѣдованіемъ (ощупываніемъ и проч.), при болѣзняхъ почекъ гораздо меньше выражены, нежели при болѣзняхъ многихъ другихъ органовъ. Главное явленіе, какое удастся такими способами установить, это — смѣщеніе почки изъ ея нормальнаго положенія и ненормальную ея подвижность (блуждающая почка).

Объ анализѣ
мочи при
болѣзняхъ
почекъ

Особенно важны симптомы со стороны почекъ, выражающіеся въ количествѣ и качествѣ мочи. Только надлежащее специальное изслѣдованіе (анализъ) мочи можетъ сдѣлать вѣрнымъ распознаваніе многихъ почечныхъ болѣзней и дать точныя основанія для сужденія о вѣроятномъ теченіи и исходѣ болѣзни.

Моча для предстоящаго анализа должна быть возможно болѣе свѣжей. Мочу выпускаютъ въ совершенно чистую прозрачную стеклянку (черезъ горлышко и черезъ чистую стеклянную воронку) Для женщинъ и дѣтей этотъ

прямъ неудобенъ, поэтому, въ такихъ случаяхъ моча выпускается въ основательно вычищенную (мыломъ и горячей водой) посуду, изъ которой мочу немедленно переливаютъ въ приготовленную для этого стеклянку Моча, предназначенная для анализа, не должна оставаться открытой, а надо закрывать стеклянку пробкой или ватой — Для обычного анализа мочи достаточно, при болязняхъ почекъ, и небольшое количество ея, но лучше, если не меньше $\frac{1}{2}$ —1 стакана Предпочтительна моча утренняго опорожнения — Если требуется болѣе подробный анализъ мочи, то цѣлесообразнѣе, чтобы моча была сборная за цѣлыя сутки. Для того, чтобы собрать суточное количество мочи, всего практичнѣе поступить такъ первую утреннюю выливаютъ прочь, при каждомъ же слѣдующемъ мочеиспусканіи мочу выпускаютъ въ отдѣльную стеклянку, и затѣмъ изъ всѣхъ, сколько наберется, стеклянокъ сливаютъ мочу въ одну общую посуду. Последняя за сутки порція мочи должна быть та, которая въ слѣдующее утро опорожняется въ тотъ часъ, въ который наканунѣ была опорожнена моча, но вылита. Дабы во время кишечнаго испражненія не потерять части суточной мочи, надо предварительно каждый разъ выпустить мочу отдѣльно въ стеклянку Въ жаркое время года надо собираемую для анализа мочу сохранять въ прохладномъ мѣстѣ Для предохраненія мочи отъ разложенія можно вложить въ нее кусокъ камфоры (1—2 золотника), что цѣлесообразно, особенно, когда приходится пересылать мочу для анализа на далекое разстояніе Для анализа отдается все суточное количество мочи или часть, стакана два

Цѣль изслѣдованія мочи — опредѣлить количество, цвѣтъ и прочій видъ ея, удѣльный вѣсъ, химическій составъ и составныя части осадка. — О способахъ изслѣдованія мочи въ этой книгѣ можетъ быть лишь кое что упомянуто, вообще же это дѣло специальныхъ лабораторій.

Нормальное суточное количество мочи, выдѣляемое здоровымъ взрослымъ человѣкомъ и при обильномъ питъѣ, отъ 1400 до 1600 куб. сантиметровъ (7—8 чайныхъ стакановъ), а при менѣе обильномъ питъѣ 1200—1400 куб. сант. При неправильномъ образѣ жизни суточное количество мочи у здороваго можетъ колебаться отъ 1000 до 3000 куб. сент. Наблюдения показываютъ, что, обѣ ли почки дѣятельны или одна только (когда, напримѣръ, вторая по какой-либо причинѣ удалена или недѣятельна), количество выдѣляемой мочи не измѣняется, и въ этомъ отношеніи больной видимо не страдаетъ. — Далѣе, при сморщиваніи почекъ, когда, какъ надо было бы думать, количество мочи должно бы быть уменьшено, оно, напротивъ того, гораздо больше, нежели при нормальныхъ условіяхъ.

Уменьшеніе суточнаго выдѣленія мочи ниже нормы и до прекращенія можетъ быть послѣдствіемъ либо пониженія кровяного давленія, наприм., въ альгидной стадіи холеры, либо болѣзненныхъ измѣненій самихъ почекъ, либо же, наконецъ, слѣд-

**Количество
выдѣляемой
мочи**

ствиемъ нарушения проходимости мочеточниковъ, мочевого пузыря или мочевого канала, въ каковыхъ случаяхъ можетъ наступить полное прекращеніе выдѣленія.

Цвѣтъ мочи.

Цвѣтъ мочи при нормальныхъ условіяхъ соломенно-желтый, то нѣсколько свѣтлѣе, то темнѣе, что обуславливается разнымъ содержаніемъ красящихъ веществъ въ мочѣ, количество выдѣленія которыхъ, въ свою очередь, зависитъ отъ красящихъ составныхъ частей крови, образующихся подъ влияніемъ обмѣна веществъ въ организмѣ. Для сужденія о цвѣтѣ мочи, послѣднюю необходимо собрать въ сосудъ изъ безцвѣтнаго стекла.

Кровь въ мочѣ.

Кровь въ мочѣ можетъ быть въ видѣ крупныхъ свертковъ, видимыхъ и невооруженнымъ глазомъ; въ такомъ случаѣ кровь навѣрно не изъ почекъ, а откуда нибудь изъ ниже лежащихъ мочевыхъ путей. Если кровь мочи изъ почекъ, то цвѣтъ послѣдней напоминаетъ грязно-красный цвѣтъ мясного настоя, или болѣе темный при большемъ содержаніи крови; въ такой мочѣ можетъ отстаиваться зернистый красноватый или буровато-черный осадокъ.

Во многихъ болѣзняхъ почекъ моча прозрачна, особенно при обильномъ ея выдѣленіи, но бываютъ случаи болѣзней почекъ, гдѣ и при обильномъ выдѣленіи моча оказывается мутною или даетъ большіе осадки, вслѣдствіе примѣси крови, гноя, фосфорно-кислыхъ солей или большого количества цилиндрическихъ свертковъ изъ мочевыхъ канальцевъ.

Мутная моча

Мутная моча наблюдается часто въ тѣхъ болѣзняхъ почекъ, въ которыхъ количество мочи уменьшено. Мутность можетъ зависѣть отчасти отъ выдѣленія нормальныхъ частей мочи изъ ихъ раствореннаго состоянія при охлажденіи послѣдней, отъ мочекислыхъ солей, отчасти отъ примѣси красныхъ и бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ, поверхностнаго слоя внутреннихъ оболочекъ мочевыхъ путей (эпителия) и его распада или свертковъ изъ мочевыхъ канальцевъ почекъ (такъ наз. мочевыхъ цилиндровъ) Моча, содержащая большое количество такихъ примѣсей, имѣетъ часто особенно грязный цвѣтъ, замѣтный и въ хлопчатомъ осадкѣ.

Мочевые цилиндры.

Моча, содержащая много бѣлка, при испусканіи въ сосудъ, обыкновенно сильно пѣнится, и образовавшаяся пѣна можетъ въ такихъ случаяхъ долго сохраняться на поверхности.

Удѣльный вѣсъ мочи.

Удѣльный вѣсъ мочи также важенъ для распознаванія почечныхъ болѣзней. Вѣсъ этотъ скорѣе и проще всего опредѣляется особымъ приспособленіемъ — урометромъ, который опускается въ стеклянный цилиндръ, наполненный мочею. Удѣльный вѣсъ мочи

у здороваго человѣка колеблется отъ 1005 до 1030; послѣ чрезмѣрнаго питья онъ можетъ упасть до 1002, а послѣ продолжительнаго воздержанія отъ жидкостей дойти до 1040. — По удѣльному вѣсу мочи можно узнать, сколько въ ней содержится твердыхъ составныхъ частей: для этого послѣднія три цифры удѣльнаго вѣса, опредѣленнаго до четвертой десятичной цифры (0,0001) умножаютъ на число 0,233, и полученное число показываетъ приблизительно количество твердыхъ составныхъ частей въ 1000 куб. сант. мочи. Это—при условіяхъ болѣе нормальныхъ. При болѣзняхъ же удѣльный вѣсъ можетъ зависѣть, кромѣ мочевыхъ и мочекислыхъ солей, еще отъ содержанія бѣлка въ мочѣ.

Химическій составъ мочи даетъ наиболѣе вѣрныя указанія на характеръ и теченіе болѣзни не только почекъ, но часто и болѣзней вообще. Такъ, реакція мочи на лакмусовую бумагу имѣетъ второстепенное значеніе для болѣзней почекъ, и, наоборотъ, очень важное для сужденія объ условіяхъ питанія и обмѣна веществъ въ организмѣ. Въ отношеніи же почекъ реакція мочи имѣетъ большое значеніе для распознаванія болѣзней почечной лоханки и мочевого пузыря.

Химическій анализъ мочи.

Нормальная моча имѣетъ кислую реакцію т. е. моча окрашиваетъ синюю лакмусовую бумагу въ красный цвѣтъ. Если моча окрашиваетъ красную лакмусовую бумагу въ синій цвѣтъ, то реакція, значить, щелочная. Щелочная моча можетъ получиться какъ у здоровыхъ, такъ и у больныхъ, отъ обильнаго введенія углекислыхъ щелочей (наприм содовой или сельтерской воды) или растительно-кислыхъ щелочныхъ соединений (напр. лимонно-кислой бор-магнезии). Моча при испусканіи можетъ имѣть кислую реакцію, а затѣмъ, когда постоятъ и въ ней наступитъ амміачное разложеніе (какъ это бываетъ въ бѣлковой мочѣ), щелочную. Щелочная реакція свѣжеиспущенной мочи бываетъ, при исключеніи другихъ причинъ, въ болѣзняхъ почечной лоханки и мочевого пузыря, вслѣдствіе происходящаго уже въ мочевыхъ путяхъ амміачнаго разложенія мочевины. Нейтральной моча является тогда, когда ни синяя, ни красная лакмусовая бумага не измѣняются въ цвѣтъ при погруженіи въ мочу. Далѣе можетъ быть реакція слабо-или сильно-кислая, слабо-или сильно-щелочная.

Реакція мочи.

Весьма важно также количественное, а не лишь качественное, опредѣленіе составныхъ частей мочи, особенно когда уже замѣчены существенныя измѣненія въ количествѣ отдѣляемой мочи и удѣльнаго ея вѣса.

Умѣстно здѣсь коснуться и этихъ подробностей.

Мочевина.

Процентное содержаніе мочевины (конечнаго продукта обмѣна веществъ) крайне измѣнчиво въ здоровой жизни и колеблется отъ 0,8 до 6⁰/о. Моча взрослыхъ здоровыхъ людей, употребляющихъ немного питья, содержитъ въ суточномъ количествѣ мочи отъ 2 до 3⁰/о мочевины. Чѣмъ обильнѣе моча, тѣмъ меньше содержаніе мочевины, и это не только при здоровыхъ, но и при больныхъ почкахъ, при которыхъ содержаніе мочевины можетъ значительно уменьшиться, даже до $\frac{1}{2}^0$ /о, и, наоборотъ, при значительно уменьшенномъ выдѣленіи мочи у больныхъ процентъ мочевины можетъ превысить таковой у здоровыхъ.

Бѣлокъ въ мочѣ.

Самое выдающееся значеніе имѣетъ бѣлокъ въ мочѣ. Нормально бѣлокъ въ мочѣ не встрѣчается, а только при болѣзняхъ, главнымъ образомъ—почекъ. Присутствіе бѣлка въ мочѣ легко обнаружить нагрѣваніемъ до кипяченія (въ пробиркѣ надъ спиртовой лампочкой); при этомъ, если моча имѣетъ кислую реакцію (см. выше), нѣтъ надобности прибавить кислоты; въ нагрѣтой такимъ образомъ мочѣ бѣлокъ, если онъ въ ней имѣется, выдѣляется въ видѣ бѣлаго свертка или мути. Если моча нейтральна или щелочна (см. выше), то необходимо раньше, чѣмъ вскипятить, сдѣлать ее сильно кислой посредствомъ прибавленія азотной кислоты; вѣрный и вмѣстѣ съ тѣмъ общедоступный способъ опредѣленія бѣлка въ мочѣ — слѣдующій: равныя количества мочи и насыщеннаго раствора глауберовой соли нагрѣваются съ большимъ количествомъ уксусной кислоты; наступаетъ полнѣйшее свертываніе бѣлка.

Бѣлокъ въ мочѣ можетъ быть не только при болѣзняхъ почекъ, но и отъ присутствія въ мочѣ гноя при гнойныхъ процессахъ въ прочихъ мочевыхъ путяхъ. При здоровыхъ мочевыхъ путяхъ бѣлокъ въ мочѣ наблюдался часто послѣ приставленія большихъ шпанскихъ мушекъ (кантаридовъ) или внутреннихъ приѣмовъ этого вещества (поэтому Кантарисъ въ гомеопатическихъ дозахъ одно изъ главныхъ исцѣляющихъ средствъ при воспаленіи почекъ), или такихъ еще, какъ терпентинъ и т. п.

Бѣлковая моча наблюдается и при другихъ болѣзняхъ, если онъ сопровождается ненормальнымъ повышеніемъ кровяного давленія, или отъ измѣненнаго состоянія сосудистыхъ стѣнокъ, или отъ обѣихъ причинъ вмѣстѣ; чаще всего это бываетъ при сердечныхъ болѣзняхъ и при болѣзняхъ печени. Также при нѣкоторыхъ состояніяхъ слабости, наприм. у людей, перенесшихъ тя-

желые лихорадочные процессы; или же во время сильной лихорадочной болѣзни—вслѣдствіе быстрого разрушенія многочисленныхъ кровяныхъ шариковъ и т. п.

Надо еще сказать, что не всякая болѣзнь почекъ даетъ бѣловую мочу. Сюда относится, наприм., просовидная бугорчатка почекъ, гнѣздныя заболѣванія почекъ, новообразованія, простое сморщиваніе почекъ (циррозъ ихъ); при сморщенныхъ почкахъ отдѣленіе мочи очень большое, фильтрація черезъ почки происходитъ очень быстро и моча не успѣваетъ воспринять тѣ составныя части, изъ которыхъ образуется бѣлокъ.

Сахаръ въ мочѣ относится не къ болѣзнямъ почекъ, а имѣетъ къ нимъ лишь то отношеніе, что черезъ нихъ выдѣляется наружу. (О сахарѣ въ мочѣ см. при „Сахарной болѣзни“).

Не меньшее значеніе, чѣмъ химическій анализъ, имѣетъ **Микроскопическій анализъ.** для распознаванія болѣзней почекъ микроскопическое изслѣдованіе осадка мочи, заключающаго ея форменныя составныя части: кристаллы мочевоы кислоты, щавелево-кислой извести, цистина, фосфорнокислыхъ солей и проч., примѣси составныхъ частей крови, эпителий (см. выше), мочевоы цилиндры.

Первыя изъ перечисленныхъ веществъ находятся въ нормальной мочѣ въ растворѣ, но своимъ количествомъ и формой, въ какихъ онѣ выдѣляются, могутъ служить поводомъ къ заболѣванію мочевоыхъ органовъ; переходя въ почкахъ изъ своего раствореннаго состоянія въ твердое (песокъ, камни), они дѣлаются причиною воспаленія мочевоыхъ путей, а вторично — и почекъ. Если въ свѣже выпущенной мочѣ находятся, наприм., кристаллы фосфорнокислой амміакъ-магнезіи, то это всегда указываетъ на амміачное разложеніе крови внутри мочевоыхъ путей или вслѣдствіе выстилающей ихъ слизистой оболочки, или вслѣдствіе проникновения бродиль въ мочевоы пузырь. Моча здороваго чело- вѣка можетъ стать временно щелочною, наприм. отъ обильныхъ приѣмовъ соды, но при этомъ щелочныя земли остаются въ мочевоы жидкости въ растворѣ; при болѣзни же эти соли выдѣляются въ видѣ бѣлаго осадка.

Прочія перечисленныя составныя части находятся только въ болѣзненно измѣненной мочѣ, насколько болѣзнь зависитъ отъ почекъ. Особенно важное значеніе имѣетъ присутствіе мочевоыхъ цилиндровъ.

Разстройства въ отпазвленіяхъ почекъ могутъ имѣть обратное **Послѣдствіи бол. почекъ.** дѣйствіе на составъ крови и вмѣстѣ съ тѣмъ на состояніе общаго

питанія всего организма и на всю его жизнедѣтельность, особенно же на отправленія нервной системы.—Послѣдствіемъ недостаточнаго выдѣленія воды изъ крови является прежде всего водянка, къ которой изъ болѣзней почекъ ведутъ тѣ, именно, которыя сопровождаются большими потерями бѣлка съ мочою (водянка при сердечныхъ или печеночныхъ болѣзняхъ происходитъ отъ застою крови)

Уремія.

Затѣмъ послѣдствіемъ болѣзней почекъ могутъ быть такія состоянія, которыя обусловливаются недостаточнымъ очищеніемъ крови отъ конечныхъ продуктовъ обмѣна азотистыхъ веществъ въ тѣлѣ, отъ специфическихъ составныхъ частей мочи, мочевины и проч. Изъ такихъ состояній главнымъ и самымъ опаснымъ является уремія, отравленіе крови „мочою“, болѣзнь, при острой формѣ, отражающаяся въ высшей степени на нервную систему, вызывая, именно, падуцеобразныя судороги, ведущія къ смерти неминуемо, если не будетъ въ скорости устранена основная причина, т. е. задержка мочи въ крови.

При хронической или въ медленно развивающейся уремій судорогъ такихъ можетъ совсѣмъ не быть, или же онѣ являются лишь въ видѣ подергиваній въ отдѣльныхъ группахъ мышцъ. Эта форма уремій выражается усиливающейся сонливостію, апатіей и помраченіемъ сознанія до полнаго его угасанія. Этому состоянію могутъ предшествовать расстройства пищеваренія и упорная некротимая рвота, причемъ рвотныя массы имѣютъ нерѣдко щелочную реакцію вслѣдствіе обильнаго содержанія углекислаго амміака, присутствіе котораго замѣтно даже для обонянія. При хронической уремій бываютъ обыкновенно и мучительный зудъ кожи и разнаго рода еще другія расстройства, какъ астматическіе припадки, временами даже приступы общихъ судорогъ.

1. Острое воспаленіе почекъ.

(Острый нефритъ).

Причины.

Причины остраго нефрита: сильная простуда, острая мочегонныя и слабительныя средства, копейскій бальзамъ, терпентинъ и проч., особенно же шпанскія мухи (кантариды)—не только при внутреннемъ, но и при наружномъ примѣненіи (въ видѣ пластыря); затѣмъ почки воспаляются часто во многихъ заразныхъ болѣзняхъ, какъ скарлатина, дифтеритъ, тифъ, холера, оспа, корь, рожа, а также послѣ остраго суставнаго ревматизма.

Симптомы болѣзни: ознобъ и жаръ, боли въ поясницѣ, особенно въ области почекъ, очень чувствительной къ давленію, уменьшенное выдѣленіе мочи, въ которой при кипяченіи образуется болѣе или менѣе густая муть (осадокъ), не растворяющаяся послѣ прибавленія азотной кислоты, иначе говоря — бѣлокъ. Кромѣ бѣлка въ мочѣ имѣются при нефритѣ также слизи, кровяные шарики и мочекислыя соли. Вскорѣ появляются и водяночныя опуханія — лица, рукъ, ногъ, мошонки. При надлежащемъ лѣченіи болѣзнь проходитъ въ 1—2 недѣли; въ тяжелыхъ случаяхъ она осложняется заболѣваніями легкихъ, сердца, брюшины, или является отравленіе мочей (мочевиною), такъ называемая уремія (см. выше).

Симптомы.

Акон.: въ началѣ болѣзни, если причиной является простуда. — *Беллад.* $\times 3$: боль при нажиманіи въ области почекъ. — Главными средствами однако являются *Аписъ* $\times 3$ (или *Апизинъ* $\times 4$) и *Кантарисъ* $\mathcal{Z}$. Затѣмъ *Ацид. нитрик.* $\mathcal{Z}$: при очень темной мочѣ. — Когда жаръ и боль уменьшились, но въ мочѣ содержится много бѣлка, даютъ *Гепаръ-сульфур.* $\mathcal{Z}$. Если этого недостаточно, то — *Калькар.-арсеникоза* $\times 4$, или *Калькар.-карбон.* $\mathcal{Z}$ и *Арсен.-альб.* $\mathcal{Z}$, особенно когда мочи мало и по ночамъ имѣется сильное сердцебіеніе. — *Фосфоръ* $\mathcal{Z}$: моча кислая, бѣлка мало, но за то большое количество кровяныхъ шариковъ въ ней; также головныя боли, сонливость; особенно, когда присоединяется бронхіальный катарръ. При угрожающей уреміи: *Нитрумъ* $\times 2$. Смотря по симптомамъ, могутъ понадобиться: *Геллебор.*, *Русъ*, *Кали-йодат.*, *Беллад.*, *Дулькам.*, *Теребинтина*, *Каннабисъ*. — При нефритѣ беременных — мочегонныя въ нисшихъ дѣленіяхъ: *Нитрумъ* $\times 2$, *Цепа* $\times 2$, *Сицилла* $\times 2$, *Бензо-ацид* $\times 2$.

Лѣченіе.

Въ началѣ шестислойные холодныя (12—15° Р.) компрессы на область почекъ, смѣняемые черезъ каждыя 15 — 20 минутъ, особенно при кровавой мочѣ. Кромѣ того ежедневно постельная паровая ванна съ послѣдующимъ вытираніемъ (24° Р.) всего тѣла, или полуванна (26° Р.) съ общимъ массажемъ (втеченіи 20 минутъ). Въ прочее время 24-градусныя ножноподмышковыя обертыванія (каждое продолжительностью 2 часа), равно какъ часто смѣняемая обертыванія бедеръ съ согрѣвающими, если надо, бутылками. Если въ постельной паровой ваннѣ ноги не согрѣваются, то дѣлаютъ еще короткое обертываніе (24° Р., на 2 часа), съ прикладываніемъ теплыхъ бутылокъ къ ногамъ. — Діета какъ при лихорадочныхъ болѣзняхъ (стр. 67).

Вспомогательныя мѣры.

2. Хроническое воспаленіе почекъ.

(Брайтова болѣзнь, хроническій нефритъ).

- Причины.** Хроническое воспаленіе почекъ составляетъ часто послѣдствие остраго воспаленія, но оно можетъ развиваться и самостоятельно подѣ влияніемъ сырости и холода, злоупотребленія спиртными напитками, туберкулеза, беременности и проч., равно какъ
- Симптомы.** послѣ скарлатины, оспы, дифтерита, холеры. Симптомы вполне развившейся болѣзни вообще тѣ-же, что и при остромъ нефритѣ; не имѣется лишь жара тѣла и болей въ поясницѣ. Въ мочѣ содержится довольно много бѣлка, который обнаруживается при кипяченіи ея съ добавленіемъ азотной кислоты, (см. стр. 396); при микроскопическомъ изслѣдованіи мочи, въ ней находятъ измѣненные кровяные шарики и цилиндрическія образованія. Больные чувствуютъ себя слабыми, худѣютъ и жалуются на отсутствіе аппетита и расстройства пищеваренія. Жалобы эти, если еще не развились водяночныя явленія, а моча не изслѣдовалась, могутъ вести, и часто дѣйствительно ведутъ, къ ошибочному опредѣленію болѣзни, къ принятію почечной болѣзни за желудочную, что, конечно, не безразлично въ отношеніи лѣченія. Поэтому никогда не слѣдуетъ упустить химическаго изслѣдованія мочи у больныхъ, жалующихся на слабость, исхуданіе, разстроенное пищевареніе, особенно если имѣется еще частый позывъ на моченіе, тѣмъ болѣе — ночью, или уменьшенное отдѣленіе мочи. Въ дальнѣйшемъ теченіи хроническаго нефрита развивается водянка тѣла, вслѣдствие водянистости крови, которая съ своей стороны происходитъ отъ выпаденія изъ послѣдней бѣлка; затѣмъ появляются застои въ кровообращеніи съ ихъ послѣдствіями: катарромъ желудка и кишекъ, набуханіемъ печени, увеличеніемъ сердца и проч. Съ уменьшеніемъ мочеотдѣленія можетъ наступить отравленіе крови мочевиной (уремія, см. стр. 398). Теченіе хроническаго нефрита иногда быстрое, иногда же онъ тянется годами и даже десятками лѣтъ. На излѣченіе можно надѣяться, пока почки еще не сморщены (атрофированы) и сердце не увеличено.
- Лѣченіе** *Арсен.-альб.*, 3: мочеотдѣленіе уменьшено, бѣлокъ въ мочѣ; стѣсненіе въ груди, значительная водянка. Если этого лѣкарства недостаточно, то дають послѣ него *Кальк.-арсеникоза* — 3×4. — *Гепаръ-сульф.* 3: водянка незначительная, то является, то исчезаетъ; моча содержитъ много бѣлка. — *Нитри-ацидъ* × 3: большая слабость; моча съ примѣсью крови. — *Фосфоръ* 3 и *Ликопод.* 3:

значительное малокровие; катарры дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ. — Когда водянка достигла большихъ размѣровъ, нельзя давать сильныхъ мочегонныхъ средствъ, такъ какъ они могутъ весьма ухудшить состояние больного; вмѣсто нихъ даютъ *Нитрумъ* $\times 2$, *Натръ сульф.* $\times 2$, *Кали карбон.* $\times 3$, *Коккусъ какти* $\times 2$, *Цена* $\times 2$, *Сицлла* $\times 2$, *Бензо-ацид.* $\times 2$, *Кали iodat.* $\times 1$ — $\times 2$ и друг. — При сморщенныхъ почкахъ (которые врачъ узнаетъ по значительно увеличенному отдѣленію мочи, болѣе легкому удѣльному ея вѣсу, по незначительному количеству содержащихся въ ней бѣлка и цилиндровъ, по увеличенію сердца и измѣненіямъ сѣтчатой оболочки глаза), подходятъ всего больше іодистыя лѣкарства (*Арсеник.-iodat.*), *Фосфоръ*, а также вообще приведенныя выше почечныя, равно какъ сердечныя средства.

Содержать тѣло въ теплѣ, тепло одѣваться, носить теплый **Вспомогательный шѣры** набрюшникъ. Ежедневно постельная паровая ванна (продолжительностью $1\frac{1}{2}$ —2 часа) со вложеніемъ 3—7 горячихъ, въ мокрая полотенца завернутыхъ бутылокъ. Если такая ванна не вызываетъ достаточнаго потѣнія, то принимаютъ горячую ванну (32° Р., про- долж. $\frac{1}{2}$ часа) съ послѣдующимъ общимъ обмываніемъ (22° Р.) и массажемъ. — Очень благотворно также дѣйствуютъ песочныя паровыя ванны (40° Р.), равно какъ солнечныя. Больнымъ, страдающимъ брайтовой болѣзнію надо совершенно избѣгать спиртныхъ и бродильныхъ напитковъ, крѣпкаго чая и кофе, и лишь при значительной слабости, или тѣмъ, которые привычны къ спиртнымъ напиткамъ, можно разрѣшить малыя количества вина, разведеннаго водой. Самое лучшее пищевое вещество — молоко, которое при почечныхъ болѣзняхъ славится даже какъ цѣлебное средство. Оно можетъ употребляться во всѣхъ видахъ (цѣльное, простокваша, пахтанье; также кефиръ). Затѣмъ: молочныя каши и слизистые отвары (мучные или изъ пшенной, овсяной и проч. крупы), побольше плодовъ и зеленыхъ овощей, вообще пища вегетарианская (растительная), которая при болѣзняхъ почекъ еще болѣе важна и необходима, чѣмъ при другихъ болѣзняхъ.

3. Водянка. Отеки.

Эти состоянія происходятъ вслѣдствіе застоевъ въ венахъ и лимфатическихъ сосудахъ, путемъ просачиванія черезъ нихъ кровяной сыворотки въ ткани или въ замкнутыя полости тѣла. Такимъ образомъ происходятъ отеки, напримѣръ — верхнихъ или нижнихъ конечностей, лица и проч. или общій отекъ (водянка, гидрокс) тѣла.

Водянка или отекъ никогда не представляетъ собою самостоятельной болѣзни а всегда есть лишь симптомъ, признакъ, или, вѣрнѣе сказать, одинъ изъ признаковъ какой либо болѣзни. Не говоря о тѣхъ случаяхъ, когда водяночное опуханіе или отекъ является мѣстнымъ страданіемъ вслѣдствіе закупорки венъ и воспаления лимфатическихъ сосудовъ, наиболѣе частыя причины отековъ и водянокъ кроются въ болѣзняхъ сердца (пороки сердца), легкихъ, почекъ и печени, особенно же въ упадкѣ сердечной дѣятельности. Поэтому и лѣченіе водянки или отековъ будетъ различное, смотря по основной болѣзни.

4. Кровавая моча.

Причины. Кровь, выводимая наружу мочей, можетъ имѣть различные источники происхожденія: она является изъ почекъ или мочеточниковъ, изъ мочевого пузыря или мочеиспускательнаго канала. У женщинъ къ мочѣ примѣшивается нерѣдко кровь изъ влагалища, что можетъ подать поводъ къ ошибочному опредѣленію болѣзни. Источникъ кровотеченія опредѣляется въ каждомъ данномъ случаѣ по характеру сопутствующихъ симптомовъ. Для болѣе же точнаго діагноза надо обратиться къ врачу, равно какъ справиться въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ этой книги (см. Болѣзни почекъ, мочевого пузыря и проч.). Кровавая моча можетъ быть также, какъ явленіе отравленія шпанскими мухами (даже при наружномъ употребленіи) и терпентиномъ.

Лѣченіе. Во время кровотеченія: *Нитрумъ* $\times 2$, кромѣ того *Арника* $\times 3$ (при кровотеченіи вслѣдствіе механическихъ поврежденій, напримѣръ — при введеніи катетра въ мочеиспускательный каналъ). — *Гамамел.* $\times 2$, *Гидраст.* $\times 2$ и *Инекак.* $\times 3$. — При сопутствующей рѣзѣ въ мочево́мъ каналѣ — *Кантарисъ* 3. (При кровавой мочѣ, какъ послѣдствіи отравленія кантаридами — шпанскими мухами — *Камфора* и обильное питье тепловатой воды). — Полезны противъ кровавой мочи также: *Миллефол.* $\times 1$, *Ува - урси* $\times 1$, особенно, если вмѣстѣ съ кровію отходить слизь и имѣются тягостные позывы на мочу, и при запорѣ. Последнее средство можно давать въ видѣ отвара листьевъ толокнянника (*folia Uvae Ursi*) въ водѣ, въ пропорціи 1:10.

Холодные компрессы на область мочевого пузыря (нижнюю часть живота 12—15° Р., а также сидячія ванны 20—22° Р. (продолжительностію 5 минутъ); отвлекающіе способы (обертываніе голей и ножныя ванны).

5. Почечная колика. Почечные камни.

Каждая изъ обѣихъ имѣющихся у человѣка почекъ (см. стр. 390) соединена съ мочевымъ пузыремъ посредствомъ трубочки, называемой мочеточникомъ; по мочеточникамъ моча протекаетъ изъ почекъ въ мочевой пузырь. Вслѣдствіе ненормальнаго питанія или болѣзней почекъ образуется въ мочѣ такъ называемый мочевой песокъ, изъ скопленій котораго въ свою очередь образуются мочевые камни (см. стр. 397). Послѣдніе, если объемъ ихъ превышаетъ просвѣтъ мочеточника, закупориваютъ его на своемъ пути въ мочевой пузырь и вызываютъ самыя жестокія боли въ области соотвѣтственной почки (въ поясницѣ), а также въ направленіи къ мочевому пузырю. При этомъ имѣются часто запоръ и желудочныя разстройства, вслѣдствіе чего можетъ произойти ошибка въ распознаніи болѣзни. Надо поэтому всегда въ подобныхъ случаяхъ изслѣдовать мочу, не найдется ли въ ней камешковъ, песку, иной разъ и крови. Изслѣдованіе мочи слѣдуетъ вообще всегда дѣлать при всякомъ страданіи брюшныхъ органовъ, особенно если случай болѣзни сколько нибудь сомнителенъ; такимъ образомъ не разъ уже открывалась болѣзнь почекъ, когда симптомы указывали на другія повидимому страданія. (Изслѣдованіе мочи дѣлается въ специальныхъ лабораторіяхъ, также въ аптекахъ и врачами см. стр. 392).

Причины.

Лѣченіе

Такихъ средствъ, которыя растворили бы проходящій черезъ мочевые пути камень, не имѣется, для уменьшенія же боли, сопряженныхъ съ прохожденіемъ камня, съ нѣкоторой пользой примѣняются *Кантарисъ 3*, *Колоцинтъ* × 3, *Нуксъ вомика 3*, *Белладонна* × 2 или *Атропин. сульф.* × 4. Кромѣ того — обильное теплое питье, горячіе или паровые компрессы вокругъ поясницы, теплая полуванна (29 — 30°). Въ крайнемъ случаѣ приходится прибѣгнуть и къ такому болеутоляющему паллиативу, какъ *Морфій* (по рецепту врача).—Для предупрежденія образованія мочевыхъ камней также неизвѣстны прямо на камни дѣйствующія лѣкарства, хотя, какъ таковыя, рекомендуются *Кальк.-карб.* *Натр. муриат.*, *Силиція*, *Сульфур.*, *Петролеумъ*. Гораздо цѣлесообразнѣе стараться достигнуть этой цѣли путемъ регулированія общей жизнедѣятельности организма, какъ лѣкарствами, такъ особенно соотвѣтствующей діетой.

Діета.

Пища должна быть, именно, нездражающая и легкая, при томъ — преимущественно растительная: молоко, каши, фрукты (осо-

бенно—виноградъ), зелень, жидкіе отвары изъ ячменной, овсяной и проч. крупъ; никакихъ пряностей и возможно меньше соли.

Цѣлесообразны и минеральныя воды: Эмсъ, Виши, Карлсбадъ и т. п., для предупрежденія образованія камней.

6. Сахарное мочеизнуреніе—см. въ Отд. 10-мъ при „Сахарной болѣзни“.

7. Аддисонова (бронзовая) болѣзнь.

Болѣзнь эта очень рѣдкая. Хотя при ней находятъ измѣненія надпочечныхъ железъ, но основная причина ея не въ послѣднихъ, а въ разстройствѣ дѣятельности нервной системы, влекущемъ за собою глубокое нарушеніе питанія всего организма и гибель его послѣ 1—1½ лѣтъ продолжительности болѣзни. Кожа больного принимаетъ вначалѣ дымчатосѣрый цвѣтъ, который позднѣе переходитъ въ бронзовожелтый; при этомъ бѣлки глазъ остаются бѣлыми, чѣмъ бронзовая болѣзнь отличается отъ нѣкоторыхъ формъ желтухи.

Болѣзнь эта вообще трудноизлѣчимая. Лѣкарства выбираются по общей картинѣ болѣзни, по тѣмъ отклоненіямъ отъ нормы, какія замѣчаются въ каждомъ случаѣ ея.

Главными лѣкарствами являются: *Туя, Беллад., Калькарея карб., Натр. мур., Іод., Фосфор., Арсен., Арсен. іодат.* *Эвлевія* см. стр. 35—39.

II. Болѣзни мочевого пузыря.

1. Острый катарръ мочевого пузыря.

(Острый циститъ).

Причины. Причинами катарра мочевого пузыря могутъ быть: простуда живота, промокание привычно-холодныхъ ногъ, раздраженія—прямая (катетеризація, камни мочевого пузыря) и косвенныя (холодные напитки, особенно молодое пиво; лѣкарственные вещества, какъ копайскій бальзамъ, кубеба, терпентинъ и т. п.); затѣмъ катарръ мочевого пузыря является часто послѣдствіемъ перелоя (триппера) мочевого канала, а также встрѣчается при различныхъ болѣзняхъ (родильная горячка, тифъ, скарлатина). **Симптомы.** Симптомы: лихорадочное состояніе (въ острыхъ случаяхъ), боль въ области мочевого пузыря (въ нижней части живота), усиливающаяся при давленіи и излучающаяся также въ промежность и въ разныя стороны живота; болѣзненно-судорожное напирание мочи

(мочерѣзъ) съ частыми позывами, причемъ каждый разъ выпускается лишь крайне малое количество красной или же дѣйствительно кровью окрашенной мочи; иногда моча и совсѣмъ задерживается; при мочеиспускании жгучая боль въ мочевомъ каналѣ, съ рѣзью въ его отверстіи. Моча мутная, въ началѣ болѣзни — кислая, и содержитъ лишь малыя количества слизи, въ дальнѣйшемъ же теченіи слизь увеличивается, а моча становится щелочной, съ болѣе или менѣе вонючимъ запахомъ, (какъ узнать, кислая ли моча или щелочная, см, стр. 395). При надлежащемъ лѣченіи, болѣзнь, если только она незаразнаго характера, а причины ея устранимы, проходитъ въ нѣсколько дней (до двухъ недѣль) безъ всякихъ болѣзненныхъ послѣдствій, въ противномъ же случаѣ, или если запускается, она переходитъ въ хроническое состояніе. Особенно опасной является эта болѣзнь для тѣхъ, которые страдаютъ параличной слабостію мочевого пузыря, именно— въ виду возможности полного задержанія мочи съ послѣдующей уреміей, т. е. отравленіемъ крови мочевиной.

Беллад. × 3: при непрестанномъ мочерѣзѣ съ задержаніемъ мочи. — *Кантарисъ* 3: жестокое напираніе мочи съ крайне болѣзненными позывами, причемъ каждый разъ испускается лишь нѣсколько капель темной мочи; рѣзъ или колотье въ мочевомъ каналѣ и его отверстіи, промежности, яйчикахъ; также одна или обѣ почки болѣзненны при надавливаніи. — *Каннабисъ* × 2: при подобныхъ же признакахъ, попеременно съ Кант. или послѣ него. — *Нуксъ-вом.* × 3: при катаррѣ вслѣдствіе молодого пива, вообще у неумѣренно пьющихъ. — *Колоцинт.* 3: мутная моча, нитевидный осадокъ. — *Дулькамара* × 3: моча густая, бѣловатая, слизистая. — *Ликопод.* 3: постоянные позывы на моченіе, мутная моча, клочковатая, также съ кровью. — *Калькар.-карб.* 3: моча зеленоватая, вонючая, съ обильной слизью. Жженіе и рѣзъ. — Также *Пульсат.* × 3, *Ува-урси* × 1, *Камфора* × 1 и друг. Наружно — смазывать животъ белладона-масломъ, а промежность — камфорнымъ масломъ или камфорнымъ спиртомъ. При трипперномъ катаррѣ мочевого пузыря: *Меркур.-карроз.* × 3, рядомъ съ вышеприведенными.

Лѣченіе.

Діета: молоко, каши, плоды, зеленые овощи, слизистые отвары (ячменный, овсяный), напротивъ того, запрещается все соленое и острое. Поясное обертываніе, 22° Р., черезъ каждые 2 часа смѣняемое, позднѣе же — лишь на ночь. Больной долженъ оставаться въ постели впредь до полного выздоровленія.

Діета и вспомогат. мѣры.

2. Хроническій катарръ мочевого пузыря. (Хроническій циститъ).

**Опредѣленіе
и симптомы.**

Хроническій катарръ мочевого пузыря представляетъ собою болѣзнь часто довольно упорную, а иной разъ и совсѣмъ лѣкарствами неизлѣчимую, именно — у старыхъ людей, страдающихъ увеличенной предстательной железой, или когда катарръ вызывается и поддерживается суженіемъ (стриктурой) мочевого канала, мочевыми камнями и другими, подлежащими хирургіи болѣзнями. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда хроническій катарръ развивается изъ остраго, или вслѣдствіе такихъ вредныхъ моментовъ, которые переходящи или легко устранимы, предсказаніе гораздо благопріятнѣе. — За исключеніемъ лихорадки, симптомы хроническаго катарра вообще тѣ же, что и при остромъ, только болѣзненные ощущенія гораздо слабѣе. Моча всегда мутная, щелочная или нейтральная (различіе см. стр. 395) и при стояніи даетъ похожій на студень осадокъ. Часто, вслѣдствіе простудныхъ вліяній, погрѣшностей въ діетѣ и т. п., являются ухудшенія, ожесточенія болѣзни съ задержаніемъ мочи, требующимъ обыкновенно искусственнаго выпусканія ея катетромъ. — Когда хроническій катарръ идетъ на выздоровленіе, то моча все болѣе просвѣтляется, получаетъ кислую реакцію, и всѣ страданія мало по малу исчезаютъ.

Лѣченіе.

Вообще лѣченіе какъ при остромъ катаррѣ. Чаше тутъ употребляется *Ува-урси* $\times 2$; затѣмъ, въ болѣе свѣжихъ случаяхъ, *Колоцинт.* 3, *Дулькамара* $\times 3$, въ болѣе старыхъ: *Ликопод.* 3 (при запорѣ); — при увеличенной предстательной железѣ: *Селен.* $\times 4$. Кромѣ того: *Арсен.-альб.* 3, *Сульфур.* 3, *Гепар-сульф.* 3, *Графитъ* 3, *Кальк.-карб.* 3, *Фосфори-ацид* $\times 3$ и друг. — Въ упорныхъ случаяхъ приходится прибѣгать и къ мѣстному лѣченію, именно — при чрезмѣрномъ образованіи слизи и гнойномъ катаррѣ. Мѣстное лѣченіе состоитъ въ искусственномъ опорожненіи и промываніи мочевого пузыря особымъ приспособленнымъ для этого аппаратомъ. Для промыванія берется растворъ вяжущихъ или дезинфицирующихъ веществъ, но очень полезенъ для этого также растворъ *Гидрастисъ* Θ , 1 часть на 200 чч. воды или *Календула* Θ (1:300).

Кромѣ примѣненій, указанныхъ при остромъ катаррѣ, тутъ полезенъ легкій массажъ мочевого пузыря. Діета легкая, не раздражающая, преимущественно молочная и растительная.

Минеральныя воды: умѣренное пользованіе водами *Виши*, *Карлсбадъ*, *Маріенбадъ*, *Вильдунгенъ*.

3. Камни мочевого пузыря. Лѣченіе, какъ при катаррѣ мочевого пузыря и почечныхъ камняхъ. — При большихъ камняхъ часто необходима операція камнебѣженія.

4. Кровотеченія изъ моч. пузыря. См. „Кровавая моча“, стр. 402.

5. Параличъ мочевого пузыря.

Параличъ поражаетъ либо мышцу, имѣющую своимъ назначеніемъ изгонять мочу, причемъ она сокращается, стягивается, либо же—кольцевидную, смыкающую мышцу, въ здоровомъ состояніи не дающую мочѣ непрерывно вытекать изъ мочевого пузыря. Въ первомъ случаѣ больной не чувствуетъ, какъ пузырь все болѣе наполняется мочей и расширяется, иногда до такой степени, что переходитъ даже границу пупка; моченіе тутъ возможно лишь при отчаянномъ натуживаніи и то лишь въ крайне малыхъ количествахъ. Во второмъ случаѣ больной не въ состояніи удерживать мочу, которая вытекаетъ непрерывными каплями. Болѣзнь эта встрѣчается часто у старыхъ людей, а также у душевныхъ больныхъ и у страдающихъ болѣзнями спинного мозга.

Беллад. × 3: въ обоихъ случаяхъ паралича. — *Фосфоръ* × 3, *Ликопод.* × 3 и *Натр.-мур.* 3: когда парализована мышца, изгоняющая мочу. — *Дулькам.* × 3: при усиленіи страданія въ сырую погоду. — *Нукс. вом.* × 3: у неумѣренно пьющихъ или пившихъ. — *Графитъ* 3: при запорѣ (также *Натр. мур.* и *Ликопод.*).

Изъ вспомогательныхъ мѣръ надо прежде всего упомянуть объ искусственномъ опорожненіи мочевого пузыря катетромъ, являющемся часто необходимымъ при задержаніи мочи въ такихъ случаяхъ. При произвольномъ же мочеиспусканіи поясныя обертыванія съ послѣдующими холодными обмываніями живота и поясницы приносятъ нѣкоторую пользу. Въ обоихъ случаяхъ показанъ массажъ живота, также электричество. Необходима нераздражающая, очень умѣренная діета, преимущественно растительная.

6. Судорога мочевого пузыря.

Внезапно наступающія, весьма жесткія стягивающія боли въ шейкѣ мочевого пузыря, излучающіяся въ яички (у мужчинъ) или яичники у (женщинъ), до отверстія мочевого канала и до бедеръ. Къ этому присоединяется часто рвота, дрожаніе и даже обморочное состояніе. Моча отходитъ каплями или задержана. Послѣ нѣсколькихъ такихъ припадковъ моча выходитъ, наконецъ, въ обильномъ количествѣ. Страданіе это встрѣчается у особъ, вообще нерв-

Опредѣленіе
и симптомы.

Лѣченіе.

Симптомы.

ныхъ, чаще у женщинъ, чѣмъ у мужчинъ, а также при органическихъ болѣзняхъ мозга, головного и спинного.

Лѣчение
судороги
моч. пузыря.

Беллад. $\times 3$ или *Нукс* $\times 3$: при отхожденіи мочи каплями (судорога мочеизгоняющей мышцы); *Гіосціам.*: при полной задержкѣ мочи (когда и смыкающая мышца поражена). — Также *Русъ* $\times 3$, *Кольхик.* 1, *Теребинтина* 3, *Сарсапарилла* 1. — Надо имѣть въ виду еще; *Кантар.*, *Аписъ*, *Каннаб.*, *Камфора*, *Дулькам.*, *Капсик.*, *Копайва*, *Кубеба*, *Петрозелин.*, *Туя* и пр. (См. „Лѣкарствовѣдніе“).

Сидячія паровыя ванны, припарки (паровые компрессы) на область мочевого пузыря, съ послѣдующей сидячей ванной (24⁰ R., 10 минутъ); кромѣ того дѣйствуютъ благотворно ножноподмышковое обертываніе и постельная паровая ванна

7. Недержаніе мочи у дѣтей.

Встрѣчается чаще всего въ видѣ непроизвольнаго (во снѣ) мочеиспусканія и зависитъ не отъ дурной привычки, а отъ ненормальнаго состоянія нервныхъ центровъ, которое въ свою очередь можетъ зависѣть отъ разныхъ причинъ, отъ такихъ, именно, какъ раздраженіе глистами, нервная слабость, малокровіе, онанизмъ, также ненормальное питаніе (раздражающія пища, возбуждающіе напитки, чрезмѣрное питье жидкостей).

Такъ какъ эта болѣзнь сопровождается почти всегда слишкомъ глубокимъ сномъ, то лѣченіе слѣдуетъ всегда начинать съ *Опиумъ* $\times 3$, который дается ребенку разъ въ сутки, передъ отходомъ ко сну. Прежде чѣмъ положить ребенка спать, его надо заставить (добромъ, конечно) основательно опорожнить свой мочевой пузырь и затѣмъ черезъ $\frac{3}{4}$ — 1 часъ его слѣдуетъ будить и предложить опять помочиться. Въ слѣдующую ночь поступаютъ точно такъ же, только будятъ ребенка нѣсколькими минутами позже, и такъ продолжаютъ постепенно до тѣхъ поръ, пока, несмотря на первый 2—3 часовой сонъ, ребенокъ не будетъ выпускать подъ себя мочи. Надо конечно заботиться и о томъ, чтобы по крайней мѣрѣ часа за два до сна ребенокъ уже ничего не пилъ. Втеченіи дня даютъ 2 — 3 раза *Атропин.-сульф.* $\times 4$, особенно — у мальчиковъ, или же *Беллад.* $\times 3$; у дѣвочекъ — *Пульсат* $\times 3$ и *Сенія* 3. Кромѣ того рекомендуется также: *Платина муриат.* 3, *Плантаго* $\times 3$. При слабости, малокровіи, золотушности: *Фосфоръ*, *Сульфуръ*, *Арсен.*, *Калькар. карб.*, и т. д.

III. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ.

Предварительныя замѣтки.

Болѣзней женской половой сферы вообще много, но очень немного такихъ, въ которыхъ самопомощь болѣе или менѣе возможна. Причина этого заключается въ томъ, что распознаваніе громаднаго большинства женскихъ болѣзней возможно на основаніи лишь специальныхъ способовъ изслѣдованія, недоступныхъ профанамъ, и никакое подробное изложеніе симптомовъ не замѣнить тутъ такого изслѣдованія. Вотъ почему нагроможденіе массы болѣзней и подробное ихъ описаніе составили бы только излишній балластъ для этой книги и только заслонили бы собою тѣ болѣзни, въ которыхъ самопомощь до нѣкоторой степени возможна. При этомъ надо помнить, что даже въ такихъ болѣзняхъ самопомощью не слѣдуетъ ограничиться ни въ какомъ случаѣ, а надо, если отъ самопомощи не становится въ скорости же лучше, непремѣнно обратиться къ врачу, прежде всего — для постановки точнаго диагноза болѣзни.

Предѣлы
самопомощи
при женскихъ
болѣзняхъ.

Женскіе половые органы суть слѣдующіе: яичники, яйцепроводы (или такъ наз. Фаллотіевы трубы), матка, это—внутреннія половыя части, соединяющіяся, черезъ посредство влагалища, съ наружными половыми частями, между которыми открывается также мочеиспускательный каналъ.

Яичники — ихъ два — лежатъ въ маломъ тазу по бокамъ матки въ складкѣ задней пластинки широкихъ маточныхъ связокъ и связкою каждый изъ нихъ прикрѣпленъ къ дну матки. Яичники покрываются брюшиной. Они имѣютъ сложное строеніе, прировненное къ образованію въ нихъ производительныхъ яицъ. Яйцо, выходя изъ яичника, попадаетъ черезъ яйцепроводы въ матку.

Матка представляетъ собою грушеобразное тѣло, сплющенное спереди къзади и обращенное вверхъ широкимъ концомъ (дномъ), и имѣетъ внутри полость. Матка находится посрединѣ малаго таза между мочевымъ пузыремъ и прямою кишкою. Нижняя, болѣе узкая часть этого органа называется шейкой матки, а нижній отдѣлъ шейки, окруженный влагалищемъ, называется влагалищной частью матки. Внутреннее устье шейки матки называется внутреннимъ маточнымъ рыльцемъ, а устье, открывающееся во влагалище, наружнымъ маточнымъ рыльцемъ, которое имѣетъ видъ поперечной щели, вслѣдствіе каковой образуются двѣ не совсѣмъ равныя по величинѣ маточныя губы. Вещество матки состоитъ изъ трехъ слоевъ, а именно: изъ неполнаго брюшиннаго покрова, изъ мышечной основы и изъ слизистой оболочки, выстилающей полость. Видъ и величина матки, также ея полости, значительно измѣняются во время беременности, не только вслѣдствіе растяженія самаго органа, но и отъ дѣйствительнаго умноженія и разраженія тканей, его составляющихъ.

Влагалище или маточный рукавъ представляет собою болѣе или менѣе широкой перепончатый мѣшокъ, прилегающій къ вогнутой передней стѣнкѣ прямой кишки и соединяющійся вверху съ маткой, а внизу съ наружными половыми частями. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ влагалище охватываетъ шейку матки, образуется такъ наз. сводъ влагалища, а внизу оно оканчивается въ преддверьи, позади устья мочеиспускательнаго канала, кругловатымъ отверстіемъ—входомъ влагалища, который у дѣвственницъ обыкновенно закрытъ въ задней своей части складкой—дѣвственной плевой, имѣющей или полулунный видъ съ свободнымъ краемъ или видъ кольца; свободный край иногда усаженъ ворсистыми утолщеніями. Вслѣдствіе ли совокупленія или по другой причинѣ дѣвственная плева разрывается, и на ея мѣстѣ остается нѣсколько плоскихъ возвышеній—мировидныя складки.

Влагалище состоитъ изъ наружнаго слоя соединительной ткани, средняго слоя—мышечнаго и внутренняго—слизистой оболочки. Слизистая оболочка влагалища имѣетъ на передней и задней стѣнкахъ многочисленныя поперечныя складки и вся выстлана многослойнымъ эпителиемъ (поверхностнымъ слоемъ слизистой оболочки). Наконецъ, на передней стѣнкѣ входа во влагалище имѣется вверху замѣтное возвышеніе—влагалищный бугорокъ. Если это возвышеніе развито болѣе обыкновеннаго и тѣсно срастается съ плевой, то послѣдняя имѣетъ форму кольцеобразную или даже вовсе лишено отверстія.

Къ наружнымъ женскимъ половымъ частямъ относятся: большія и малыя половыя (срамныя) губы, клиторъ и преддверье.

Большія половыя губы суть двѣ толстыя складки кожи, обросшія по наружной сторонѣ волосами; прилегая другъ къ другу, онѣ образуютъ продольную щель и переходятъ спереди въ лонное возвышеніе (мостъ Венеры), соединенныя въ этомъ мѣстѣ спайкой, а къзади, къ промежности, находитъ другая спайка, повыше которой имѣется тонкая поперечная складка—уздечка срамныхъ губъ; между этой и мировидными складками имѣется поперечная ладьеобразная ямочка.

Малыя половыя губы (нимфы) суть двѣ болѣе короткія и болѣе тонкія складки кожи и закрыты большими губами.

Клиторъ (похотникъ), напоминаетъ мужской членъ по строенію своему, но не по своей несравненно меньшей величинѣ, и не содержитъ въ себѣ частей, свойственныхъ мочеиспускательному каналу. Клиторъ находится въ верхнемъ переднемъ углу наружныхъ половыхъ частей и состоитъ изъ двухъ пещеристыхъ тѣлъ (подобно мужскому уду), оканчивающихся закругленной верхушкой—головкой, покрытой крайней плотью; эта крайняя плотъ образуется изъ продолженія малыхъ губъ.

Преддверье лежитъ между обѣими малыми губами; тутъ же, въ этомъ пространствѣ, имѣется отверстіе мочеиспускательнаго канала и входъ во влагалище

Женскій мочеиспускательный каналъ находится близко надъ входомъ во влагалище, на разстояніи приблизительно дюйма отъ головки клитора

Промежность есть та часть тѣла, которая находится между наружными половыми частями и заднимъ проходомъ; она обща обоимъ поламъ, но у женщинъ она больше и толще, чѣмъ у мужчинъ. Промежность состоитъ, помимо кожи, изъ массы мышцъ и жесткихъ пластинокъ (фасцій), связокъ, сосудовъ и проч.

1. Менструація и ея неправильности.

Менструаціей (регулами) называются періодически повторяющіяся кровотечения (мѣсячныя очищенія) изъ матки. Менструированіе есть признакъ наступившей половой зрѣлости, т. е. способности къ зачатію. Половая зрѣлость у женщины продолжается отъ 13—14 до 48 лѣтъ съ нѣкоторыми уклоненіями въ одну и другую сторону, въ зависимости отъ климата, образа жизни и проч. Неопредѣленную величину представляютъ собою также какъ количество менструальной крови, такъ и продолжительность каждой менструаціи. Бываетъ, что женщины крѣпкаго тѣлосложенія теряютъ лишь мало крови, слабыя же, наоборотъ, большія количества ея. Среднія количества теряемой крови колеблются между 2 и 8 унціями (60—240 граммъ). Продолжительность равняется въ среднемъ 5 днямъ, но можетъ спуститься до 2 и доходить до 8—9 дней. Одна и та же менструація происходитъ часто кратковременными перерывами. Въ большинствѣ случаевъ мѣсячныя приходятъ черезъ каждые 28 дней, рѣже—промежутки болѣе короткіе или болѣе длинныя (до 30 дней). — Вопросъ о томъ, находится ли менструація въ причинной зависимости отъ періодическаго созрѣванія яйца въ яичникахъ и перемѣщенія его въ матку, считается все еще спорнымъ и даже очень сомнительнымъ, такъ какъ наблюдаются въ практикѣ факты, не согласующіеся съ такимъ воззрѣніемъ, а, именно, случаи, когда послѣ удаленія обоихъ яичниковъ, женщины тѣмъ не менѣе продолжали правильно менструировать; затѣмъ извѣстно, что освобождение согрѣвшаго яйца происходитъ какъ до наступленія половой зрѣлости, такъ и въ климактерическомъ періодѣ, между тѣмъ регуль въ этихъ двухъ случаяхъ не бываетъ; созрѣвшее яйцо освобождается и въ промежуткахъ между менструаціями—важный доводъ въ пользу возможности зачатія во всякое время, даже во время кормленія грудью, при отсутствіи регуль.

Нормальная
менструація.

Во время регуль разстраивается и общее состояніе здоровья женщины, въ однихъ случаяхъ—едва замѣтно, въ другихъ, наоборотъ, въ довольно сильной степени.

Какъ уже сказано, женщина менструируетъ вообще до 48 лѣтняго возраста. Колебанія въ этомъ отношеніи очень значительны. Бываютъ случаи, правда очень рѣдкіе, что женщины и за 55 лѣтъ продолжаютъ еще правильно менструировать, тогда какъ другія, наоборотъ, теряютъ регулы уже около своихъ 40 лѣтъ. Не зави-

сятъ такіе случаи ни отъ начала менструированія, ни отъ тѣло-
сложенія женщины, ни отъ числа зачатій, ни отъ какихъ либо
болѣзненныхъ состояній.

Условія пра-
вильнаго
менструиро-
ванія.

Прежде чѣмъ перейти къ изложенію неправильностей мен-
струаціи, нелишне привести тѣ обстоятельства, которыми обусло-
вляется возможно большая правильность этого крайне важнаго
для женщины отправленія ея организма. Насколько для женщины
важно внѣ времени регулъ дѣлать достаточно движенія на свѣ-
жемъ воздухѣ, настолько для нея важно во время наступившихъ
регулъ соблюдать большій, чѣмъ обыкновенно покой; особенно же
вредны въ эту пору движенія, сопряженныя съ разгоряченіемъ тѣла
наприм., танцы; вредны тяжелыя мучныя блюда, особенно свѣже
испеченный хлѣбъ; вредны сильныя душевныя волненія, половыя
сношенія, слабительныя средства, ванны. Во время регулъ слѣ-
дуетъ побольше пить жидкостей, избѣгая однако, крѣпкаго кофе
или крѣпкаго чая или вина; лучше всего пить молоко, если оно
хорошо переносится, цѣльное или съ кипяткомъ или съ какао;
можно и обыкновенную воду или легкую минеральную. Одежда
должна быть совершенно свободная; малѣйшая тѣснота платьевъ
нарушаетъ правильность кровообращенія и особенно вредна во
время менструаціи; излишне прибавить, какой вредъ можетъ по-
лучиться въ данномъ случаѣ отъ шнурованія груди и живота, отъ
корсета. Очень важно правильное опорожненіе кишечника, каждый
день въ опредѣленный часъ. Наконецъ, надо заботиться о сколь
возможно чистомъ содержаніи половыхъ частей, для чего служатъ
частыя обмыванія тепловатой водой, сидячія тепловатыя ванны,
промыванія съ помощью Эсмарховой кружки или клизопомпа. Когда
регулы уже кончились, промыванія такія можно дѣлать и съ болѣе
прохладной водой, что, кстати сказать, и вообще полезно для жен-
щинъ въ интересахъ здоровья не только половыхъ органовъ, но
и всего организма.

Неправильности менструацій могутъ быть слѣдующія: мен-
струаціи могутъ совсѣмъ отсутствовать, могутъ быть слишкомъ
скудными или слишкомъ обильными, повторяться слишкомъ рѣдко
или слишкомъ часто; выдѣленія могутъ быть водянистыя, слизи-
стыя и вонючія; неправильность можетъ заключаться и въ сопут-
ствующихъ явленіяхъ, какъ именно: боли, общее недомоганіе, нерв-
ные припадки и т. д.

а. Аменоррея.

Подъ аменорреей разумѣютъ собственно полное отсутствіе регуль въ возрастѣ половой зрѣлости. Аменоррея очень рѣдко наблюдается у во всемъ прочемъ вполне здоровыхъ женщинъ, причемъ бывають женщины, ни разу не менструировавшія и тѣмъ не менѣе рожаящія. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ, однако, появленіе регуль въ періодѣ половой зрѣлости должно считаться серьезной ненормальностью, могущею имѣть для здоровья женщины болѣе или менѣе неприятыя и даже опасныя послѣдствія. Поэтому во всѣхъ такихъ случаяхъ необходимо прежде всего путемъ спеціального изслѣдованія удостовѣриться, не является ли причина этого обстоятельства какой нибудь порокъ развитія, закрытіе устья матки или влагалища; причиной можетъ быть и недоразвившаяся матка. Въ случаѣ порока развитія о лѣкарственномъ лѣченіи не можетъ быть рѣчи.

Отсутствіе
регуль.

Но причиной аменорреи можетъ быть, и чаще всего бываетъ ненормальность со стороны крови, а именно: малокровіе, особенно—хлорозъ (блѣдная немочь), золотуха и проч.

Аменоррея можетъ быть неполная, а лишь относительная, и выражающаяся въ запаздываніи мѣсячныхъ или въ томъ, что послѣ того, какъ они раньше вообще бывали, перестали, вдругъ являться, при отсутствіи подозрѣнія на зачатіе (объ отсутствіи регуль во время беременности или кормленія грудью тутъ не говорится). Причиною такихъ случаевъ могутъ быть простуда и сильныя душевныя волненія, а также и особенно какое либо заболѣваніе матки; послѣдствіями же: заболѣваніе легкихъ, печени, селезенки, мозга или же общее нервное расстройство, боль или круженіе головы и проч., также кровотеченія изъ другихъ органовъ изъ легкихъ, носа, кишекъ и проч.

Запаздываніе
и прекраще-
ніе регуль.

Такъ какъ аменоррея, вообще говоря, не есть болѣзнь самостоятельная, а есть лишь симптомъ какихъ либо другихъ болѣзненныхъ состояній, то лѣченіе должно быть направлено на эти послѣднія, если устраненіе ихъ вообще возможно. Чаще всего приходится брать такіа лѣкарства, какъ *Пульсат.* $\times 3$: при малокровіи и блѣдной немочи, тошнотѣ, отсутствіи аппетита, сердцебіеніи, головокруженіи; наклонность къ поносамъ, бѣли; — *Калькар.-карбон.* $\mathcal{Z}$: у золотушныхъ дѣвицъ, страдающихъ головными болями, тяжестью въ ногахъ, болями въ поясницѣ и крестцѣ, сердцебіеніемъ, расстройствами пищеваренія; — *Ферр. карбон.* $\times 3$: при

Лѣченіе.

малокровіи съ сердцебіеніемъ, головокруженіемъ и обморочными состояніями; — *Сульфуръ* $\times$ 3: какъ вставочное лѣкарство (также *Купрумъ*) и т. д.

б. Маточныя кровотеченія.

(Меноррагія. Метроррагія).

Нормальное, періодическое, маточное кровотеченіе (менструація, регулы) рассмотрѣно выше. Ненормальныя же маточныя кровотеченія могутъ быть слѣдующія:

Меноррагія.

а) Слишкомъ обильныя регулы, или регулы, повторяющіяся въ болѣе короткіе, чѣмъ слѣдуетъ, промежутки времени, или, наконецъ, слишкомъ долго продолжающіяся регулы. Точную границу между нормальными и слишкомъ обильными регулами трудно провести, и вопросъ сводится въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ къ тому, имѣется ли уклоненіе отъ прежняго нормальнаго состоянія и зависятъ ли имѣющіяся страданія отъ усиленныхъ или часто повторяющихся или долго продолжающихся мѣсячныхъ кровотеченій. Эта форма маточнаго кровотеченія называется Меноррагіей. Причинами могутъ служить душевныя волненія, чрезмѣрныя тѣлесныя напряженія, поврежденія, пороки сердца, также тѣ обстоятельства, которыя поименованы ниже при метроррагіи.

Метроррагія

б) Маточное кровотеченіе, не зависящее отъ періода регулъ, хотя и могущее съ послѣднимъ совпадать (Метроррагія). Причинами могутъ быть: приливы крови къ маткѣ, воспаленія матки, грибовидныя разрастанія слизистой оболочки матки, полипы, фибромы и другія новообразованія въ маточной полости, также загибы матки, заболѣванія яичниковъ. Чаше же всего бываетъ метроррагія при родахъ и выкидышѣ. Къ ненормальнымъ кровотеченіямъ изъ матки ведутъ и общія заболѣванія, измѣняющія значительно составъ крови (цынга, оспа, скарлатина, тифъ и т. п.).

Послѣдствіемъ ненормально-большихъ потерь крови является обезкровленіе организма (малокровіе), также разжиженіе крови (гидремія); послѣднее можетъ быть и причиною кровотеченій.

Лѣченіе.

Во время кровотеченія. — *Сабина* 3: у крѣпкихъ и полнокровныхъ особъ; кровотеченію предшествуютъ напирająca, схватывающія боли въ поясницѣ, крестцѣ и въ низу живота. — *Гаммелисъ* $\times$ 2: тѣ же боли и алая кровь. — При болѣе сильномъ кровотеченіи также горячія (35 — 40° Р.) влагалищныя промыванія, причемъ въ 5 стаканахъ воды разводятъ 2 столовыя ложки

Гаммелись Θ , *Гаммелись-экстрактъ*.—*Инекакъ*: яркочерная болѣе водянистая кровь и сопровождающія страданія желудка.—*Секалекорн.* $\times 1$ — $\times 2$: большое ослабленіе, сердцебиеніе, обморочное состояніе, холодная кожа; кровь темная, почти не сгущающаяся.—*Гидраст.* $\times 2$: темная кровь, фонтаномъ бьющая, съ упомянутыми схватывающими болями.—Послѣ остановки кровотеченія—*Хина* $\times 3$, также—*Ферр. муриат.* 3 (малокровнымъ цѣлесообразно давать послѣднія 2 лѣкарства и во время кровотеченія).—Въ переходномъ (климактерическомъ) періодѣ, но также и въ другихъ случаяхъ, *Крокусъ* $\times 2$, особенно при темныхъ и тягучихъ кровяныхъ сгусткахъ. См. еще „Беременность“, „Выкидышъ“, „Роды“.

Необходимо въ каждомъ случаѣ выяснить основную причину кровотеченія и принять мѣры къ ея устраненію. Основные болѣзненные состоянія матки должны подлежать соответствующему лѣченію—(см. „Болѣзни матки“ и проч.).

Изъ вспомогательныхъ мѣръ требуется прежде всего при кровотеченіи спокойное горизонтальное лежаніе въ постели и легкая, невозбуждающая пища, для питья—лишь холодная вода. На животъ холодные компрессы. При не останавливаемомъ скоро кровотеченіи можетъ потребоваться тампонада маточнаго рукава и проч., что можетъ быть сдѣлано только врачомъ.

в. Менструальная колика.

(Дисменоррея).

Подъ менструальной коликой разумѣютъ крайне сильныя боли въ животѣ и крестцѣ, являющіяся либо передъ наступленіемъ или же втеченіи регулъ. Часто къ нимъ присоединяются еще другія страданія: головныя боли, сердцебиеніе, летучій жаръ, тоска, тошнота, дрожаніе, зябкость, запоръ, безуспѣшныя позывы на низъ и напираніе мочи. Дисменоррея встрѣчается при разнаго рода болѣзняхъ матки и яичниковъ, но бываютъ случаи, когда такого рода болѣзни отсутствуютъ, и тогда говорятъ о чисто нервной менструальной коликѣ, наблюдаемой чаще всего у истеричныхъ женщинъ.

Симптомы.

Различаютъ еще перепончатую форму дисменорреи, которая сопровождается изверженіемъ изъ матки болѣе или менѣе большихъ перепончатыхъ лоскутьевъ, соединенныхъ иногда вмѣстѣ въ видѣ какъ бы точнаго слѣпка маточной полости. Перепончатая дисменоррея почти всегда обуславливаетъ безплодіе, не сама по себѣ, а скорѣе вслѣдствіе послѣдовательнаго воспаленія матки и яичниковъ.

Перепончатая — дисменоррея.

Механическая дисменоррея. Дисменоррея бываетъ еще и механическаго происхожденія, отъ неполнаго, именно, закрытія канала маточной шейки, отъ суженія его, вслѣдствіе ли катаррального набуханія слизистой оболочки или отъ рубцовъ послѣ операций, отъ ѣдкихъ веществъ, отъ грибовидныхъ разрастаній, отъ полиповъ, отъ ненормальныхъ положеній или состояній матки (искривленіе) или отъ прирожденной узкости шейки матки съ слишкомъ малымъ наружнымъ зѣвомъ. Послѣдняя причина служитъ самой частой причиной безплодія — Диагнозъ той или другой причины можетъ быть поставленъ только путемъ specialнаго врачебнаго изслѣдованія. — Симптомы — сильная боль въ области матки и разстройства со стороны нервной системы — вообще тѣ же при механической дисменорреѣ, какъ и при прочихъ формахъ, съ той лишь разницей, что при первой боль выступаетъ гораздо болѣе сильно и имѣетъ характеръ пароксизмовъ и потугъ.

Лѣченіе Лѣченіе дисменорреи должно быть направлено противъ основной болѣзни, которая должна быть по возможности опредѣлена и устранена. Симптоматически же примѣняются слѣдующія лѣкарства. *Беллад.* $\times 3$ (или *Атропин. сульф.* $\times 4$): боли съ напираниемъ на низъ и приливомъ къ правой сторонѣ головы. — *Аммон. карбон.* 2: потужныя боли. — *Каннаб.-индика* 2: болѣзненное напирание на низъ и мочерѣзъ. — *Кали карбон.* 3: общее возбужденіе, летучій жаръ, боль головы съ біеніемъ въ вискахъ, сильнѣйшее сердцебіеніе. — *Анисъ* $\times 3$: при тѣхъ же симптомахъ, и когда кровь сгущена. — *Коккулусъ* $\times 3$, стѣсненіе въ груди, икота. — *Вибурнумъ опулусъ* 1. — *Игнація* $\times 3$ и *Пульсатилла* $\times 3$: у нервныхъ и малокровныхъ. — *Хаомилла* 1 $\times$ — Θ — у нервныхъ, раздражительныхъ особъ.

Вспомогательныя мѣры Вспомогательныя мѣры и діета должны быть также сообразны съ основной болѣзнію. При приливной дисменорреѣ — тепловлажныя обертыванія, теплыя сидячія ванны, имѣющія цѣлью вызвать наружу крови и тѣмъ доставить больной облегченіе. Въ промежуткахъ — мѣры противъ полнокровія: движеніе и легкая діета. При наступленіи регулъ — возможно болѣе спокойное положеніе; первые дня два всего лучше лежать въ постели. То же полезно и при другихъ формахъ дисменорреи, также при нервной. — Наружно — компрессы съ белладоннымъ масломъ; облегчаютъ боль также суппозитории съ Белладонной или Акониномъ (или съ Аконитиномъ). Лѣченіе механической дисменорреи можетъ быть только оперативное; особенно необходимо оперативное вмешательство

при прирожденномъ или приобретенномъ сужуженіи или полномъ закрытіи влагалища или шейки матки.

4. Невральгія матки.

(Гистеральгія, нервная боль матки).

О нервной боли матки можно говорить лишь въ томъ случаѣ, когда съ достовѣрностію исключены всѣ механическія и воспалительныя измѣненія въ ткани матки и боль нельзя объяснить иначе, какъ чрезмѣрнымъ раздраженіемъ маточныхъ нервовъ, ихъ гиперэстезіей. Болѣзнь эта — рѣдкая и выражается въ постоянной боли матки, продолжающейся непрерывно въ течение многихъ лѣтъ и отравляющей больнымъ жизнь. Боль жгучая, какъ бы отъ раскаленнаго угля, глубоко въ тазу, и излучающаяся, при движеніи, въ спину и животъ. Малѣйшее дотрагиваніе къ маткѣ вызываетъ въ ней невыносимую боль, а во время приступа боли не переносится ни малѣйшее движеніе. Въ высшей степени чувствителенъ къ дотрагиванію и весь животъ. Регулы при этой болѣзни обыкновенно совершенно правильны и не отражаются на боли. Течение болѣзни хроническое, излѣченіе же бываетъ; она исчезаетъ обыкновенно при наступленіи климактерическаго періода, иной же разъ и послѣ замужества. — Изъ лѣкарствъ больше всего подходятъ: *Актеа рацемота, Игнація, Коккулусъ, Хамомила, Колоцинтъ, Платина, Арсеник*. — Изъ вспомогательныхъ мѣръ: теплыя ванны, паровые компрессы, успокаивающія втиранія (изъ белладонны, аконитина и т. п.) въ низъ живота и въ крестцовую область, также шарики или суппозитории изъ такихъ средствъ. Въ упорныхъ случаяхъ можно еще испытать электрическій токъ (гальваническій) съ положительнымъ полюсомъ на поверхность матки или въ ея полость. — Болѣзнь эту надо отличать отъ вагинизма, о которомъ сказано ниже при болѣзняхъ влагалища.

Опредѣленіе

Симптомы

Лѣченіе и
вспом. мѣры.

5. Воспаленіе слизистой оболочки матки.

(Катарръ матки. Эндометритъ. Маточныя бѣли).

а) Острый катарръ матки. Начинается лихорадочнымъ состояніемъ и сопровождается болями внизу живота, въ спинѣ, особенно же въ области крестца, чувствомъ полноты и тяжести, напираниемъ на низъ и расстройствами пищеваренія. Характеристическимъ же признакомъ катарра слизистой оболочки матки является выдѣленіе изъ матки (бѣли), въ началѣ сывороточное, липкое, вре-

Острый эндо-
метритъ

менами окрашенное кровью; спустя же 8—12 дней выдѣленіе становится густымъ, сливкообразнымъ, и содержитъ слизистыя и гнойныя тѣльца, также эпителий (поверхностный слой слизистой оболочки). При благопріятныхъ условіяхъ болѣзнъ оканчивается въ 3—4 недѣли, при неблагопріятныхъ же условіяхъ, особенно при осложненіи периметритомъ (см. ниже), она можетъ принять хроническую форму.

Причинами острого катарра матки могутъ быть: простуда, особенно—ногъ, передъ регулами или при ихъ наступленіи; механическія и химическія раздраженія, бурное соитіе, зараженіе гонорейнымъ ядомъ; острый катарръ матки можетъ послѣдовать отъ острого катарра влагалища или сопровождать острые сыпныя заболѣванія.—Діагнозъ болѣзни можетъ быть поставленъ ручнымъ изслѣдованіемъ и посредствомъ маточнаго зеркала.

**Лѣченіе
острого
катарра
матки.**

При простудномъ катаррѣ—*Аконитъ* $\times 3$, но только въ самомъ началѣ болѣзни; въ дальнѣйшемъ же теченіи подходитъ больше *Белладонна* $\times 3$. При катаррѣ отъ механическаго раздраженія (отъ ношенія маточнаго кольца, отъ соитія, отъ онанированія)—*Арника* $\times 3$. У онанистокъ—*Нуксъ вомика* $\times 3$, также *Калькарея карбоника* 3. Эти средства показаны при склонности къ частымъ половымъ сношеніямъ и вообще сильно развитой похотливости; въ такихъ случаяхъ показаны также *Платина муриатика* 3 и *Сенія* 3. При жидкомъ, остромъ, ѣдкомъ выдѣленіи, также при гонорее, дается *Меркур. солуб.* 3, или въ болѣе рѣзко выраженныхъ случаяхъ, *Меркур. коррозив.* $\times 3$. Когда выдѣленіе стало густымъ, желтымъ или желто-зеленымъ, умѣстны *Гепаръ сульф.* 3, *Нитриацид.* 3, *Туя* $\times 3$. При мочерѣзѣ—*Кантарисъ* 3 и *Каннабисъ инд.* 1.

Вспом. шѣры.

Изъ вспомогательныхъ мѣръ полезны теплыя сидячія и полныя ванны, влажныя теплыя обертыванія, влагалищныя промыванія (спринцеванія) тепловатымъ растворомъ *Арника* Θ , *Календула* Θ , *Гидрастисъ* Θ (изъ 1 чайной ложки въ 2 стаканахъ воды, 2—3 раза въ день). Діета—легкая, нераздражающая (какъ при лихорадочныхъ болѣзняхъ, стр. 67).

**Хроническій
эндо метритъ.**

б) Хроническій катарръ матки. Причины тѣ же, что острого катарра, изъ котораго хроническій въ большинствѣ случаевъ развивается, при чемъ острый періодъ нерѣдко проходитъ незамѣтно для больной, если бѣли умѣренные, и тогда выходитъ, что хроническій катарръ явился какъ бы самостоятельно. Катарръ можетъ поражать слизистую оболочку шейки матки, что чаще бываетъ, или слизистую оболочку тѣла матки, что бываетъ рѣже; встрѣчается и совмѣстный катарръ той и другой части матки.

При катарральномъ воспаленіи шейки матки таковая пред-
 ставляется слегка разрыхленною, покраснѣвшею, зернистою и изъ-
 ѣденною. Маточное рыльце закупорено слизистой пробкой, кото-
 рая съ трудомъ извлекается и тянется въ нити. Выдѣленіе въ
 началѣ нормальное стекловидное, позднѣе—болѣе гноевое. Обще-
 симптомы болѣзни вообще тѣ же, что при остромъ катаррѣ, но ме-
 нѣе сильно выражены.

Хроническій катаррѣ слизистой оболочки тѣла матки встрѣ-
 чается сравнительно рѣже, чѣмъ катаррѣ шейки, по той причинѣ, что
 слизистая оболочка тѣла матки рѣже подвергается внѣшнимъ вред-
 нымъ вліяніямъ; катаррѣ же шейки матки скорѣе распространяется
 внизъ на влагалище, чѣмъ вверхъ въ полость матки.—Самыя ча-
 стыя причины такого катара суть: роды, именно же—выкидышъ,
 простуда, механическія раздраженія, задержка мѣсячныхъ очищен-
 ній, полипы; воспаленіе тѣла матки, также гоноррейное зараженіе
 и общія болѣзни питанія. Если задержка менструаціи является при-
 чиною болѣзни, то она должна считаться первымъ симптомомъ ея.
 Затѣмъ симптомы могутъ годами не обращать на себя вниманія
 больныхъ, пока не появятся такія тягостныя явленія, какъ дисме-
 норрея (см. выше) и неправильныя менструаціи, заставляющія
 больныхъ искать врачебной помощи; въ эту пору имѣются уже и
 обильныя, клееобразныя, а то и гнойныя бѣли. Въ позднѣйшихъ
 стадіяхъ болѣзни, когда слизистая оболочка перерождается, послѣд-
 няя выдѣляется часто при кровотеченіяхъ въ видѣ цѣлыхъ пере-
 пончатыхъ лоскутьевъ (см. выше „Перепончатая дисменоррея“).—
 Діагнозъ можно поставить лишь при осмотрѣ маточнымъ зерка-
 ломъ: если въ маточномъ зѣвѣ не оказывается признаковъ катара
 шейки матки, то упомянутого рода бѣли и болѣзненные явленія при-
 ходится съ большою вѣроятностію отнести на счетъ заболѣванія
 внутриматочной полости. — Предсказаніе тѣмъ неблагоприятнѣе,
 чѣмъ запущеннѣе болѣзнь. Больше надежды на выздоровленіе
 имѣется при слизистыхъ бѣляхъ, меньше — при кровянистыхъ,
 всего же меньше—при гнойныхъ. Большое вліяніе на предсказаніе
 въ отношеніи излѣченія имѣютъ причинныя и сопровождающія
 обстоятельства. Упорнѣе протекають тѣ случаи, которые обуслови-
 ваются застоями крови или сопровождаются заболѣваніемъ самой
 ткани матки, перегибами и опущеніемъ послѣдней и проч. При
 блѣдной немочи, золотухѣ и т. п. улучшеніе со стороны матки за-
 виситъ отъ улучшенія общаго состоянія, крови и питанія.

Лѣченіе должно быть сообразно съ причинами, съ характеромъ бѣлей, съ сопровождающими заболѣваніями и общимъ состояніемъ организма.

Лѣченіе хроническаго натарра матки.

При бѣляхъ бѣлыхъ, молочнаго цвѣта: *Пульсатилла* (безъ боли); *Калькар. карб.* (съ сильнымъ зудомъ въ половыхъ частяхъ, иногда и съ жженіемъ и колотьемъ); *Феррумъ* (кусающія бѣли).

При бѣляхъ густыхъ, желтыхъ: *Ликоподій* (также красноватая бѣли); *Меркурій солуб.* (съ зудомъ и жженіемъ и приторно-сладкаго запаха; воспалительная припухлость наружныхъ половыхъ частей; гоноррейное зараженіе); *Сенія* (обильныя, не острые бѣли); *Гепар. сульф.* (то-же); *Карбо аним.* или *вегетаб.* (бѣли жгучія, густыя, желтоватыя или съ кровью смѣшанныя); *Алюмина* (то-же).

При разѣдающихъ бѣляхъ: *Натрумъ муриат.* (бѣли обильныя, ослабляющія, густоватыя, бѣлыя или желтоватыя, причиняющія зудъ); *Сульфуръ* или *Графитъ* (желтовато-зеленая бѣли); *Кали бихромик.* и *Туя* (то же, особенно—гоноррейнаго происхожденія), также *Ацид. нитрик.* (съ гнилостнымъ запахомъ); *Креозотъ* (цвѣтъ мясного настоя, или желтая, желтозеленая бѣли, ѣдкія съ зудомъ); *Іод.* (то-же, въ случаяхъ болѣе застарѣлыхъ); *Арсеникъ*, *Бовиста*, *Хина*, *Сабина*.

Во многихъ случаяхъ хроническихъ бѣлей часто полезно *Матико Θ* — $\times 1$, которое слѣдуетъ принимать продолжительное время, особенно когда онѣ гоноррейнаго происхожденія.

Если имѣются завалы въ кишечникѣ, иначе говоря—хроническая вялость кишекъ, ведущая къ застою крови въ брюшныхъ органахъ, слѣдовательно и въ маткѣ, назначается, смотря по общему состоянію, *Нуксъ-вом.*, или *Натр.-муриат.*, или *Ликопод.*, *Калькар. карб.*, *Карбо вегетаб.* — При болѣзняхъ легкихъ: *Фосфоръ*, *Сульфуръ*, *Арсен.* (также *Натр. мур.*, *Карбо вегетаб.*, *Ликопод.*). У сердечныхъ больныхъ: *Кали карб.*, *Пульсат.*, *Арсен.*, *Лазезисъ*. Малокровнымъ и блѣдно-немочнымъ даются: *Ферр. мет.*, *Хина*, *Калькар.*, *Пульсат.*; въ болѣе упорныхъ случаяхъ: *Арсен.*, *Хинин* или *Хинин. арсеникоз.*

При золотухѣ: *Калькар. карб.*, *Сульф.*, *Гепаръ сульф.*, *Іод.*, *Фосфоръ*, *Силица*, *Графитъ*, *Натр. мур.* и проч. — При изъязвленіяхъ шейки матки даются: *Калькар. карб.*, *Гепаръ сульф.*, *Сульф.* или *Силица*. — При кровоточащихъ язвахъ: *Сенія*, *Меркур. солуб.*, *Креозотъ*.

Дѣленіе—см. стр. 35 — 39, **о дозахъ и пріемахъ**—ч. 1, гл. 3 и 4. Характеристику лѣкарствъ см.—въ „Лѣкарствовѣдѣніи“.

гдѣ слѣдуетъ обратить вниманіе еще на слѣдующія лѣкарства, могущія оказаться полезными при катаррѣ и болѣзняхъ матки вообще, а именно: *Аргент.*, *Аурумъ*, *Гелоніасъ*, *Лиліумъ*, *Мурексъ*, *Секале*, *Сенеціо*, *Станнумъ*.

Для влагалищныхъ промываній — водные растворы *Кален-Вспом. мѣры.*
дула Θ , *Гидрастисъ* Θ ; цѣлесообразны также растворы (1—2⁰/о) изъ квасцовъ, сѣрнокислога цинка, хлористаго цинка, таннина и т. п. Промыванія эти дѣлаются 2—3 раза въ день, при улучшеніи же—рѣже, посредствомъ эсмарховой кружки или, еще лучше, клизопомпа. Количество воды для одного промыванія — 2—3 стакана, температура послѣдней—25—26⁰ Р. Полезны сидячія ванны (24—25⁰ въ теченіе 10 минутъ)—днемъ, а вечеромъ—поясное обертываніе (22⁰ Р.), по утрамъ же цѣльное обмываніе (22⁰ Р.). Пища должна быть нераздражающая, но питательная. Надо заботиться о достаточномъ ежедневномъ опорожненіи кишечника (см. „Запоръ“). Достаточное пользованіе свѣжимъ воздухомъ, умѣренныя движенія, легкая гимнастика—дополняютъ вспомогательныя мѣры. Въ случаяхъ особенно упорныхъ показаны желѣзистыя, соляныя и морскія ванны.

6. Воспаленіе мышечной ткани матки.

(Метритъ).

Острое и хроническое воспаленіе мышечной ткани матки представляютъ собою не стадіи одного и того же болѣзненнаго процесса, а двѣ различныя болѣзни, какъ по симптомамъ, такъ и по теченію и исходамъ, при чемъ острый метритъ встрѣчается гораздо рѣже хроническаго.

Общее у этихъ двухъ формъ—лишь сопровождающее всегда воспаленіе слизистой оболочки матки.

а. Острый метритъ встрѣчается очень рѣдко, за исключеніемъ послѣродового метрита. Причины: простуда передъ наступленіемъ регуль, сильныя душевныя волненія, бурныя совокупленія, или же механическое или химическое раздраженіе (внутриматочными пессаріями; поврежденія зондомъ, внутриматочныя всприскиванія); наконецъ, большее или меньшее воспаленіе самой ткани матки имѣется всегда при воспаленіи слизистой оболочки ея, что вызываетъ коликообразныя боли.—Воспаленіе матки начинается внезапно сильной тяжестью и жестокой болью внизу живота, которая сопровождается мучительными позывами на испражненіе и

Острое
воспаленіе
матки.

моченіе, также лихорадочнымъ состояніемъ. Начавшіяся было регулы прерываются или, наоборотъ, является обильное, но не продолжительное кровотеченіе изъ матки. При ручномъ изслѣдованіи, которое очень болѣзненно при этой болѣзни, ощупывается увеличенная, крайне болѣзненная матка; маточный рукавъ горячъ. — Спустя 5—6 дней острый воспалительный процессъ оканчивается, но для полного выздоровленія можетъ потребоваться еще долгое время.

Возможенъ переходъ и въ хроническій метритъ.

**Лѣченіе
остраго
метрита.**

Какъ при всѣхъ острыхъ воспаленіяхъ, и при остромъ метритѣ прежде всего показана *Белладонна* × 3 попеременно съ *Меркур. солюб.* × 3. — Если причиною было сильное душевное потрясеніе, то добавочными лѣкарствами являются *Хамомила* × 3 и *Игнація* × 3. — При сильномъ кровотеченіи — *Сабина* 3. — При сильныхъ тенезмахъ мочевого пузыря — *Кантарисъ* 3; при тенезмахъ прямой кишки — *Колоцинтъ* 3 и *Гвако* × 3.

Вспом. мѣры.

Въ началѣ холодные компрессы на животъ, часто смѣняемые, но если они усиливаютъ боль, то ихъ замѣняютъ тепло-влажными обертываніями и получасовыми сидячими ваннами; теплыя влагалищныя промыванія чистой водой или растворомъ *Гаммелиса* Θ или *Календула* Θ. Діета — легкая, какъ при лихорадочныхъ болѣзняхъ.

**Хроническое
воспаленіе
матки.**

б. Хроническій метритъ. Воспаленіе поражаетъ либо всю матку, либо часть ея, чаще всего — шейку.

Воспаленіе маточной шейки является обыкновенно вторичнымъ заболѣваніемъ, а именно — осложненіемъ или слѣдствіемъ воспаленія слизистой оболочки канала шейки. Поэтому и причины болѣзни тутъ тѣ же, что и тамъ (см. стр. 419). Шейка матки представляется увеличенной, рыхлой, дряблой, мягкой, какъ бы губчатой, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ ровную поверхность, чѣмъ отличается отъ шейки матки, пораженной новообразованіемъ, когда поверхность узловата, дольчата. Признаки эти могутъ быть опредѣлены лишь съ помощью маточнаго зеркала. Излѣченіе получается тѣмъ скорѣе, чѣмъ менѣ застарѣла болѣзнь. — Очень часто воспаленіе маточной шейки сопровождается образованіемъ на ней язвъ, поверхностныхъ и разныхъ формъ, величиною отъ булавочной головки до копѣчной монеты, съ бархатистой, зернистой поверхностью, легко кровоточащей и покрытой незначительнымъ гнойнымъ отдѣленіемъ. Сифилитическая язва отличается отъ этихъ язвъ тѣмъ, что первая, встрѣчаясь очень рѣдко на

шейкѣ матки, представляетъ глубокое изъязвленіе съ острыми краями и сальнымъ дномъ.

Воспаленіе шейки матки сопровождается болями внизу живота, общей слабостью, упадкомъ питания, малокровіемъ и рядомъ нервныхъ симптомовъ (истеріей). Обильныя бѣли имѣются во всѣхъ случаяхъ воспаленія матки или шейки матки. Регулы отличаются неправильностію.

Хроническое воспаленіе всей матки бываетъ обыкновенно слѣдствіемъ эндо-или периметрита и отличается равномернымъ увеличеніемъ (гипертрофіей) всѣхъ частей матки, при чемъ поверхность ея гладка, тверда и болѣзненна. Маточное дно прощупывается черезъ брюшную стѣнку болѣе или менѣе надъ лобкомъ. Больные испытываютъ полноту, тяжесть и напирание на низъ, боли въ спинѣ и крестцѣ, затрудняющія движеніе. Частые позывы на испражненіе и на мочеиспусканіе; при послѣднемъ имѣется также жженіе; моча мутная съ обильнымъ осадкомъ солей, фосфатовъ и слизи. Регулы неправильны и имъ предшествуютъ боли въ области яичниковъ. Перепончатая дисменорея (см. стр. 415) является обыкновенно слѣдствіемъ именно хроническаго воспаленія матки.

Всѣ страданія усиливаются отъ болѣе или менѣе сильныхъ движеній и особенно тягостны слабымъ и нервнымъ больнымъ. Страданіе усугубляется еще отъ смѣщенія (опущенія) хронически-воспаленной матки.

Болѣзнь можетъ тянуться всю жизнь, къ врачу же попадаютъ случаи обыкновенно болѣе или менѣе уже застарѣлые. Болѣзнь эта сопровождается обыкновенно безплодіемъ. Въ тѣхъ же рѣдкихъ случаяхъ, когда такія больныя забеременѣваютъ, бываетъ иной разъ самостоятельное излѣченіе послѣ родильнаго періода; оно наблюдается также послѣ климактерическаго періода.

Лѣченіе хроническаго метрита во всѣхъ случаяхъ продол- **Лѣченіе**
жительное и требуетъ большой выдержанности со стороны боль- **хрон. метрита.**
ной и врача. При обостреніяхъ болѣзни примѣняются тѣ средства, какія указаны при остромъ метритѣ и эндометритѣ. Вообще же выборъ приходится дѣлать изъ слѣдующихъ лѣкарствъ: *Селіа, Аурумъ, Ликоподій, Платина, Коніумъ, Графитъ, Арсеник., Гидрастисъ, Натр. муріатик., Сульфуръ* и др. (см. „Лѣкарствовѣдніе, также при „Эндометритѣ“).

Вспомогательныя мѣры и діета, какъ при хроническомъ эндо- **Вспом. мѣры.**
метритѣ. Во многихъ случаяхъ полезны горячія (30—32° Р.) про-
мыванія маточнаго рукава, вызывающія сокращеніе матки и этимъ

самымъ—уменьшеніе приливовъ съ послѣдующимъ ускореннымъ всасываніемъ. Холодныя промыванія вызываютъ коликообразныя боли; но, если постепенно къ нимъ привыкнуть, они въ концѣ концовъ дѣйствуютъ очень благотворно, значительно облегчая всѣ страданія, сопряженныя съ этой болѣзнію. Полезны и сидячія прохладныя ванны.

7. Периметритъ и Параметритъ.

Симптомы и течение.

Такъ называются воспаленія тканей, окружающихъ матку и ея придатки, а именно—прилегающей части брюшиннаго покрова (периметритъ) и околوماتочной соединительной ткани (параметритъ). Симптомы этихъ болѣзней въ высшей степени сходны между собою, да и сами болѣзни являются обыкновенно совмѣстно. На периметритъ указываютъ: жестокая боль внизу живота, лихорадка, иногда рвота, тошнота, чувство стѣсненія и тоска. Вначалѣ матка, хотя болѣзненна, но еще подвижна при ручномъ изслѣдованіи, съ увеличеніемъ же воспалительнаго выпота, она становится неподвижной, и тогда уже можно ощупать въ тазу болѣзненную плотную опухоль. Выпотъ, пока всосется, можетъ продержаться въ теченіе многихъ недѣль; до нагноенія рѣдко доходитъ дѣло. Отъ перитонита периметритъ отличается гораздо меньшей бурностью всѣхъ явленій. Отъ параметрита же отличить его очень трудно. Теченіе болѣзни обыкновенно благопріятное, лишь при нагноеніи и изліяніи гноя въ брюшную полость оно неблагопріятно. Послѣ параметрита остаются часто на всю жизнь сращенія матки съ сосѣдними органами, смѣщенія ея, разрушеніе или хроническое воспаленіе яичниковъ, кистовидное перерожденіе ихъ, также разстройства мѣсячныхъ и безплодіе.

Причины.

Причины периметрита: параметритъ, метритъ, особенно эндометритъ, гоноррея, разстройство мѣсячныхъ вслѣдствіе простуды, травматическія (оперативныя) поврежденія матки, общія болѣзни (бугорчатка, ракъ и проч.). Причиной параметрита въ большинствѣ случаевъ является родильный періодъ, нечистое или нецѣлесообразное содержаніе роженицы, также простуда. Кромѣ того къ образованію тазовыхъ нарывовъ могутъ вести воспаленія матки и проч., какъ и при периметритѣ.

Лѣченіе периметрита.

Лѣченіе въ началѣ противовоспалительное: въ самомъ началѣ—*Аконитъ* $\times 3$, а затѣмъ — *Белладонна* $\times 3$, *Бріонія* $\times 3$, *Меркур. солуб.* $\times 3$; при запорѣ—*Нуксъ-вомика* $\times 3$; при сильныхъ

боляхъ — *Колоцинтъ 3.* — При очень бурныхъ симптомахъ, при сильной рвотѣ, поносѣ, при горячемъ туловищѣ, но холодныхъ конечностяхъ, и при холодномъ потѣ на лицѣ — *Вератр. альб. x 3.* Кромѣ того могутъ быть показаны еще въ остромъ періодѣ болѣзни: *Русъ, Секале, Арсеник., Фосфоръ, Дигиталисъ*, а въ дальнѣйшемъ теченіи — тѣ лѣкарства, какія указаны при метритѣ, также *Иод., Силиція.*

Въ начальномъ періодѣ болѣзни холодные компрессы на Вспом. мѣры. животъ, спокойное положеніе въ постели и легкая діета. Надо избѣгать всякаго прямого мѣстнаго воздѣйствія на матку, чтобы не вызвать общаго перитонита. Надо заботиться о надлежащемъ опоражниваніи кишечника и мочевого пузыря, при надобности — клистиромъ, катетромъ. Тепловлажныя обертыванія показаны лишь послѣ того, какъ острые воспалительныя явленія прошли. Искусственного вскрытія абсцессовъ надо остерегаться, такъ какъ при этомъ можно поранить оболочку, отгораживающую ихъ отъ брюшной полости. — Хроническій периметритъ тянется годами и лѣчится такъ же какъ хроническій метритъ.

Параметритъ лѣчится въ общемъ такъ же, какъ периметритъ, только тутъ, при образовавшемся абсцессѣ, искусственное Лѣченіе параметрита. вскрытіе его меньше грозитъ опасностію перитонита, чѣмъ при периметритѣ; во всякомъ случаѣ самостоятельное вскрытіе (въ маточный рукавъ или наружу черезъ брюшную стѣнку) предпочтительнѣе искусственнаго, и такового слѣдуетъ выжидать, пока нѣтъ угрожающихъ признаковъ общаго перитонита. Но такіе вопросы могутъ быть рѣшаемы только врачами въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.

8. Неправильныя положенія, искривленія и опущенія матки.

Эти состоянія матки являются послѣдствіемъ ослабленія и Причины и послѣдствія. вялости околomаточныхъ связокъ и встрѣчаются у очень многихъ женщинъ. Предрасполагающимъ моментомъ, кромѣ общей слабости организма, служатъ также роды, особенно — повторные, послѣ которыхъ очень часто остается перемѣщеніе (наклоненіе) матки кзади, равно какъ, вслѣдствіе разрыва промежности, опущенія ея внизъ, во влагалище. Послѣдствіями измѣненныхъ положеній матки являются катарры ея, воспаленія, изъязвленія, съ болями въ животѣ и поясницѣ. Наболѣе сильны, однако, страданія въ тѣхъ случаяхъ, когда во время регулъ кровь не находитъ свободнаго,

безпрепятственного выхода изъ матки, что бываетъ въ случаяхъ искривленій ея; жестокія потугообразныя боли, излучающіяся до крестца и поясницы, достигаютъ такой степени, что доводятъ больныхъ до отчаянія. При наклоненіяхъ и искривленіяхъ матки кзади и опущеніяхъ ея больныя жалуются на постоянную тяжесть въ животѣ, на ощущеніе, точно внутренности выпираются книзу, и на сильныя кровотеченія во время регулъ. Въ этихъ также случаяхъ, но еще чаще при наклоненіи матки впередъ, вслѣдствіе давленія на мочевой пузырь, имѣются болѣзненные ощущенія со стороны мочевого пузыря (напирание мочи, мочерѣзь и проч.). Во всѣхъ этихъ случаяхъ въ большей или меньшей степени страдаетъ вся нервная система (нервозность, истерія), состояніе которой, какъ уже выше указывалось, находится въ самой тѣсной связи съ маточной сферой.

Лѣченіе. Гомеопатическое лѣченіе въ этихъ случаяхъ можетъ быть лишь симптоматическимъ, облегчающимъ тѣ или другія припадочныя страданія. При неправильностяхъ кишечной дѣятельности примѣняются *Натр.-мур.*, *Нуксъ вом.*, *Ликопод.* и пр.; при катаральныхъ явленіяхъ (бѣляхъ) соответственное лѣченіе (см. „Катарръ матки“), особенно же *Коніумъ*, *Аурумъ муріат.*, даваемая попеременно съ другими лѣкарствами, равно какъ *Платина муріат.*, *Сенія*.

Вспом. мѣры. Въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ неправильныя положенія матки зависятъ отъ слабости и вялости маточныхъ связокъ и вообще сосѣднихъ тканей, рекомендуется укрѣплять послѣднія не ношеніемъ маточныхъ колецъ, а соответственной гимнастикой, массажемъ матки, который долженъ производить лишь врачъ; затѣмъ той же цѣли служатъ прохладные (18° Р.) удерживаемые клистиры (изъ $\frac{1}{2}$ стакана воды), ночныя поясныя обертыванія (22° Р.), цѣльныя обмыванія (22° Р.) по утрамъ и т. п. Очень полезны также ежедневныя сидячія ванны (24° Р., 10 минутъ продолжительности) съ обливаніемъ живота 20-градусной водой. Ношеніе стягивающаго корсета вредно.

9. Новообразованія, опухоли матки.

Къ доброкачественнымъ новообразованіямъ относятся слизистыя полипы (папилломы и аденомы), фиброміомы (или фибромы, фиброиды); къ злокачественнымъ: ракъ и саркома.

Гомеопатическое лѣченіе этихъ болѣзней очень ограничен-

ное и въ большинствѣ случаевъ лишь облегчаетъ, но не излѣчиваетъ болѣзни, особенно когда новообразованіе или опухоль уже вполнѣ развились.

Причиною папилломъ и аденомъ является катарръ слизистой оболочки матки или ея шейки. Опухоли эти ведутъ къ болѣе частымъ и обильнымъ кровотеченіямъ и бѣлямъ съ такими послѣдствіями, какъ малокровіе, слабость и нервная раздражительность. Если они не проходятъ отъ *Калькар. карб.*, *Туя*, *Гидрастисъ*, *Гидрокотиле*, *Аурумъ муриат.* и др., то ихъ можно устранить лишь хирургическимъ путемъ.

Доброкачественныя опухоли.

Причины фиброміомъ неизвѣстны, поэтому трудно сказать что либо опредѣленное о предупрежденіи ихъ появленія. Нѣкоторые авторы видятъ причину въ пораненіяхъ при родахъ, въ насильственномъ обрываніи дѣтскаго мѣста, въ усиленныхъ движеніяхъ (танцахъ) во время регулъ, въ простудѣ въ эту же пору. Небольшія фиброміомы могутъ существовать въ маткѣ всю жизнь, не вызывая никакихъ болѣзненныхъ явленій; въ другихъ же случаяхъ онѣ ведутъ къ закупоркѣ шейки матки, къ разстройствамъ регулъ, кровотеченію и бѣлямъ, съ послѣдующимъ ослабленіемъ организма. Ростъ этихъ опухолей очень медленный, онѣ могутъ и на много лѣтъ или навсегда останавливаться въ своемъ развитіи, онѣ могутъ и совсѣмъ всосаться, что наблюдалось послѣ родовъ. Но если опухоли велики и давятъ на мочевой пузырь и мочеточники, и на кишки и проч., то могутъ развиваться такія послѣдствія, какъ болѣзни почекъ, закрытіе проходимости кишечнаго канала, водянка живота, расширение венъ нижнихъ конечностей съ отекомъ послѣднихъ. Превращеніе фиброидныхъ опухолей въ ракъ не наблюдалось.

Такъ какъ маточныя фиброміомы принадлежатъ къ доброкачественнымъ опухолямъ и опасны лишь своими послѣдствіями, то пока такой опасности не имѣется, надо воздерживаться отъ оперативнаго удаленія опухоли, особенно когда она внутри маточной стѣнки и близка къ брюшинѣ, такъ какъ оно сопряжено съ большою опасностію для жизни больной. Сравнительно не опасно удаленіе лишь полипообразныхъ опухолей, находящихся въ полости матки, а не въ ея стѣнкѣ.—Гомеопатическое лѣчение можетъ оказывать не только симптоматическую, но и болѣе существенную помощь. Большую пользу приносятъ, какъ при хроническомъ воспаленіи, такъ и при міомахъ матки, *Аурумъ муриат.* и *Гидрастисъ*. При бѣляхъ даютъ, вмѣсто послѣдняго, *Туя*. —

Лѣчение.

Если Аурумъ мур. недостаточно дѣйствуетъ, то прибѣгаютъ къ *Аурумъ іодат.*, а также *Платина мур.*, *Кальк. карбон.*, *Ликопод.* или *Натр. мур.* (при запорѣ); *Сенія* (при болѣзненности мышцъ нижнихъ конечностей, улучшающей отъ хожденія), *Митчела репенсъ* $\times 2$ и проч.—При сильномъ кровотеченіи дѣйствуетъ успѣшно, хотя лишь палліативно, *Секале корнут.*, которое въ такихъ случаяхъ дается въ болѣе вещественныхъ дозахъ (1-е растираніе). См. также „Слишкомъ обильныя регулы“ (стр. 114). При упорныхъ запорахъ: *Подофиллин.* $\times 2$, или *Коллинсон.* $\times 3$, или же несильное слабительное средство (тамаринды, ревень, касторовое масло); см. также „Запоръ“.

Злокачествен. Ракъ матки. Начальное развитіе рака обыкновенно про-
опухоли матки. сматривается, такъ какъ оно никакими особенно тягостными симптомами не даетъ о себѣ знать, а иногда, хотя и узнанное, просто запускается, такъ что врачамъ приходится обыкновенно приступать къ лѣченію рака матки тогда, когда истечение изъ нея гнилостное или кровяное, или даже только ужъ гнилостное и съ запахомъ падали. Отсутствуя или будучи лишь незначительными въ первое время, боли въ животѣ, при дальнѣйшемъ развитіи рака, становятся крайне жестокими, колющими, отдающими въ поясницу и въ нижнія конечности. Быстротечное исхуданіе и истощеніе наступаетъ лишь въ послѣдніе мѣсяцы болѣзни. Продолжительность болѣзни колеблется между 1 и 2 годами.

Общій взглядъ на лѣчение раковыхъ болѣзней гомеопатическими лѣкарствами см. въ отд. 10-мъ. Оперативное удаленіе раковой матки считается пока единственнымъ радикальнымъ средствомъ въ томъ лишь случаѣ, когда раковое перерожденіе не перешло еще на сосѣднія окружающія матку ткани. Въ послѣднемъ случаѣ оперативное вмѣшательство всегда лишь ускоряетъ роковой исходъ. Гомеопатическое лѣченіе можетъ не только облегчать страданія несчастныхъ больныхъ, но и продлить ихъ жизнь въ значительной мѣрѣ.

Лѣченіе. Противъ сильныхъ маточныхъ кровотеченій: *Ацид. сульф.* 1 или *Ацид. нитр.* 1, *Секале* 1 или *Эрготинъ* 1.—При кровотеченіи съ сильной болью въ маткѣ: *Беллад.* $\times 3$, *Сабина* $\times 3$.—При сильныхъ боляхъ: *Атропин. сульф.* $\times 4$, *Коніумъ* $\times 3$, *Фосфоръ* 3, *Арсеник.* 3; въ крайнемъ случаѣ: *Оній* 1 или *Морфій* 1.—Противъ сопровождающихъ разстройствъ и слабости примѣняются соотвѣтствующія лѣкарства и мѣры на общихъ основаніяхъ.

Саркома матки, по своимъ симптомамъ, походить вначалѣ на фиброміомы, но въ дальнѣйшемъ теченіи отличается отъ послѣднихъ очень сильными кровотечениями, раковиднымъ распадомъ, постоянными крайне жестокими болями и общимъ истощеніемъ. Исходъ неблагопріятный даже послѣ оперативнаго удаленія опухоли, такъ какъ рецидивъ обыкновенно не заставляеть себя долго ждать. Лѣченіе какъ при ракѣ.

10. Воспаленіе яичника.

(Оофоритъ).

Острое воспаленіе присоединяется часто къ маточнымъ заболѣваніямъ въ послѣродовомъ періодѣ. Хроническое воспаленіе сопровождается нерѣдко болѣзни влагалища и матки, особенно происшедшія отъ триппернаго зараженія. Но воспаленіе можетъ произойти также отъ простуды, возбужденій, слишкомъ частыхъ и бурныхъ совокупленій. Симптомы: тупыя, часто мучительныя боли, съ правой или лѣвой стороны матки, появляющіяся приступами и усиливающіяся отъ всякаго напряженія и при каждахъ регулахъ, равно какъ при запорахъ. Эти же симптомы, но въ болѣе сильной степени, имѣются также при воспаленіи маточно-яичниковыхъ трубъ („Сальпингитъ“).

Спокойное положеніе въ кровати во время приступовъ, половое воздержаніе, забота о правильныхъ ежедневныхъ испражненіяхъ, равно какъ мѣстное и внутреннее лѣченіе имѣющихъ болѣзней матки и влагалища. Противъ болѣе *Беллад.* или *Апи-зинъ*. Наружно очень полезно втираніе *белладонной мазью* (1 ч. тинктуры на 8 чч. масла и жира). Кромѣ того прохладные (15° Р.) компрессы на животъ, смѣняемые черезъ каждыя 15 минутъ, затѣмъ набрюшный компрессъ (22° Р., втеченіи 2 часовъ), обертываніе бедеръ (20° Р., втеченіи 3—4 часовъ), 1—2 раза въ день сидячая ванна (25° Р., 10 минутъ), удерживаемый клистирь (20° Р., 1/2 стакана) послѣ испражненія.

11. Киста (водянка) яичника.

Начало развитія кисты яичника проходитъ часто совершенно безболѣзненно и можетъ достигнуть даже довольно большихъ размѣровъ, не причиняя больной сколько нибудь тягостныхъ страданій, за исключеніемъ развѣ лишь нѣкоторыхъ разстройствъ мо-

чеотдѣленія и испражнений. При дальнѣйшемъ ростѣ опухоли страданія усиливаются. — Радикальное излѣченіе возможно лишь хирургическимъ путемъ, и надо сказать, что операція, благодаря теперешней весьма усовершенствованной техники, не представляетъ вообще опасности; въ смыслѣ же уменьшенія опухоли или задержки ея дальнѣйшаго роста приносятъ иногда пользу *Апизин.*, *Аурумъ іодат.*, *Аурум. муріат.*, *Калькар. карбон.*, *Туя* и проч., равно какъ умѣренный и вообще нормальный образъ жизни, нераздражающая пища и воздержаніе отъ половыхъ сношеній. Особья примѣненія какъ при воспаленіи яичника.

В. Болѣзни влагалища.

1. Воспаленіе влагалища.

Колпитъ или Вагинитъ.

**Катарръ
влагалища.**

а. Катарральное воспаленіе (катарръ) влагалища бываетъ острое и хроническое. Главный признакъ—бѣли, подъ каковыми разумѣютъ выдѣленіе болѣе или менѣе густой, свѣтложелтой жидкости, похожей на сливки или гной, являющееся вмѣсто нормальнаго безцвѣтнаго (слизистаго) выдѣленія. При остромъ катаррѣ влагалище на ощупь горячо и болѣзненно, слизистая оболочка набухшая. Боль судорожная, стягивающая и сопровождается часто мучительными позывами на испраженіе и мочу и сильнымъ зудомъ. Хроническій катарръ влагалища выражается гораздо менѣе рѣзкимъ проявленіемъ симптомовъ; боль либо незначительна, либо ея совсѣмъ не бываетъ; но своимъ часто упорнымъ и продолжительнымъ теченіемъ онъ можетъ подрывать общее здоровье больной. Влагалищныя бѣли могутъ по виду своему ничѣмъ не отличаться отъ маточныхъ бѣлей, поэтому для постановки точнаго діагноза требуется во всякомъ случаѣ изслѣдованіе съ помощью маточнаго зеркала. Обыкновенныя бѣли очень трудно, часто и невозможно отличить отъ гоноррейныхъ (трипперныхъ) бѣлей.—Къ причинамъ остраго катарра влагалища относятся: простуда, особенно—ногъ, частое совокупленіе (отсюда постоянныя бѣли у проституттокъ), онанизмъ, маточныя кольца, аскариды, иногда беременность. Хроническій катарръ можетъ произойти отъ остраго катарра, или же самостоятельно отъ малокровія, блѣдной немочи, золотухи и другихъ разстройствъ питанія.

6. Гоноррея или трипперъ влагалища представляетъ собою катарральное воспаленіе, происшедшее отъ заноса триппернаго яда и только этимъ и заразительностію своею отличающееся отъ простого, описаннаго выше катарра.

Гоноррея
влагалища.

Гоноррейное воспаленіе, если его не лѣчить надлежащимъ образомъ съ самаго начала, можетъ затянуться на многіе годы и перейти даже на матку и ея придатки, вызывая продолжительныя и тяжелыя страданія. Гоноррея можетъ принять и скрытую форму и обостряться вслѣдствіе какихъ либо раздраженій *).

Въ началѣ остраго воспаленія влагалища—*Белладонна* $\times 3$, а затѣмъ, когда выдѣленіе стало обильнѣе, и оно острое и ѣдкое—*Меркур. солуб.* $\times 3$.—При неѣдкомъ выдѣленіи — *Пульсатилла* $\times 3$.—При усиленномъ половомъ возбужденіи—*Каннабисъ индика* $\times 3$.—При рѣзи въ мочевомъ каналѣ—*Кантарисъ* 3 . Когда выдѣленіе желтое и густое, умѣстно *Гепаръ сульф.* 3 ; когда оно болѣе жидкое—*Ацид. нитрик.*

При острой гонорреѣ примѣняются тѣ же лѣкарства, только, вмѣсто Меркур. солуб., *Меркур. корроз.* $\times 3$, а по минованіи острыхъ симптомовъ, рядомъ съ Гепаръ или Ацид. нитр., *Туя* $\times 3$ (или болѣе низкое дѣленіе).

При хроническомъ катаррѣ соотвѣтствующія лѣкарства должны приниматься долгое время, выборъ же ихъ дѣлается на основаніи больше общихъ признаковъ, нежели мѣстныхъ. Лѣкарства вообще тѣ же, которыя указаны при катаррѣ слизистой оболочки матки (см. стр. 417).—Тѣ же и вспомогательныя мѣры.

2. Неврозы влагалища.

Вагинизмъ, Нимфоманія и Афродизія.

Подъ вагинизмомъ понимаютъ чувствительность влагалищнаго канала, которая выражается своеобразнымъ болѣзненнымъ ощущеніемъ въ немъ зуда и щекотанія; при этомъ половое влеченіе можетъ совершенно отсутствовать или быть лишь въ слабой степени, но за то имѣется непреодолимое желаніе расчесывать и растирать зудящія мѣста влагалища, отъ чего зудъ еще болѣе усиливается, и кромѣ того появляется мѣстное жженіе и общее раздраженіе

Вагинизмъ.

*) Мягкій шанкръ и твердый (сифились) у женщинъ выражаются вообще такъ же, какъ у мужчинъ, и одинаковымъ же образомъ лѣчатся (см. V-ый подъотдѣлъ этого же отдѣла).

Нимфоманія. организма, а также чрезмѣрная похотливость, до степени нимфоманіи (безстыднаго поведенія, вытекающаго изъ непреодолимой половой похотливости). Въ другихъ случаяхъ совсѣмъ нѣтъ зуда, ни полового возбужденія, а имѣется лишь крайне болѣзненная чувствительность влагалища, заставляющая больныхъ избѣгать совокупленія и даже съ отвращеніемъ думать о немъ (Афродизія).

Афродизія. Это нерѣдко бываетъ не только отъ нижеприводимыхъ причинъ, но и у новобрачныхъ, послѣ первыхъ неправильныхъ и неудачныхъ попытокъ къ совокупленію. Афродизія, т. е. отсутствіе всякаго полового влеченія встрѣчается впрочемъ у женщинъ и безъ всякаго мѣстнаго пораженія половыхъ органовъ. Вагинизмъ имѣетъ часто также связь съ невральгіей матки. Причинами вагинизма являются далѣе: мастурбація (онанизмъ, рукоблудіе), къ которой можетъ вести чтеніе скабрёзныхъ книгъ, слишкомъ частыя да къ тому еще неудовлетворяющія совокупленія, ѣдкія истеченія изъ матки, неподходящія маточныя кольца, аскариды или другія раздражающія вещества (пыль, грязь), попавшія во влагалище, неправильныя положенія матки. Судорожное сжатіе влагалища при вагинизмѣ вызываетъ иногда судорожное смыканіе мочевого канала или задняго прохода, вслѣдствіе чего можетъ произойти задержка въ опорожненіи пузыря и кишки.

Лѣченіе. Рядомъ съ устраненіемъ причинъ, даются, при отсутствіи похотливаго возбужденія, слѣдующія лѣкарства. *Сульфуръ* или *Графитъ*: первое — при жгучемъ характерѣ зуда, второе — при ощущеніи кусанія во влагалищѣ. При сухости послѣдняго, а также жаръ — смазывать слизистую оболочку его *белладоннымъ масломъ*, а внутрь: *Натр. муриат.* и *Беллад.*, 2 — 3 приема въ день. Если зудъ и цекотаніе сопровождаются усиленіемъ половой страсти, то главнымъ лѣкарствомъ является *Нуксъ вом.*, особенно если при этомъ имѣется общая нервная возбудимость, болѣзнь матки, вздутіе живота газами и вялость испражнений; также при влеченіи къ онанизму. Полезна также въ такихъ случаяхъ *Каннаб. индика*, особенно если имѣются еще разстройства мочеиспусканія. — *Калькар. карбон.*: зудъ съ сладострастіемъ, а послѣ возбужденія крайняя усталость и блѣдность. — *Цинк. металл.* — важное средство, если симптомы эти появляются во время регуль. — *Меркур. солуб.*: зудъ ограничивается лишь наружными частями влагалища. — Если болѣзнь доходитъ до степени нимфоманіи, то надо выбрать между *Кали бромат.*, *Барита карб.*, *Нуксъ вом.*, *Игнація*, *Платина мур.*, *Цинк. метал.*, *Коніумъ*, *Нуксъ мо-*

схата, Стафизагрія. Противъ болѣзненности вагины во время совокупленія: *Арника, Кантарисъ.*—При болѣзненности съ отсутствіемъ полового влеченія: *Ферр. муріат.*—При полномъ отвращеніи къ совокупленію (афродизіи): *Фосфоръ, Фосфори ацид., Пульсатилла,* также *Камфора, Агнусъ каст.* Кромѣ того требуется удаленіе причинъ, вызывающихъ или поддерживающихъ страданіе, въ томъ числѣ и соотвѣтственныхъ болѣзней матки.

Ежедневно 2 сидячія ванны (20—22° Р., втеченіи 15—20 минутъ), предварительно промыванія влагалища (25° Р.); время отъ времени, прежде чѣмъ сѣсть въ сидячую ванну, полезно принять сидячую паровую ванну; къ ночи—поясное обертываніе.

3. Болѣзни влагалища, не устранимыя лѣкарственнымъ путемъ.

1. Выпаденія и грыжи влагалища. Выпаденіе или опусканіе внизъ, ко входу во влагалище, разслабленной слизистой оболочки можетъ произойти отъ такихъ причинъ, какъ хроническій катарръ влагалища, беременность и роды, разрывы промежности, растяженіе дна мочевого пузыря при частомъ, слишкомъ долгомъ задерживаніи мочи, растяженіе прямой кишки скопленіемъ каловыхъ массъ. — Грыжа влагалища можетъ образоваться отъ внѣдренія въ разслабленную влагалищную стѣнку (и выпячиванія ея на подобіе мѣшка) мочевого пузыря, прямой кишки и кишечной петли. Діагнозъ ставится на основаніи спеціальнаго изслѣдованія. Ущемленіе влагалищныхъ грыжъ не наблюдалось. Помощь можетъ быть только хирургическая.

2. Новообразованія, опухоли влагалища. Аденомы (слизистые полипы), фибромы, фиброміомы, кистомы и карциномы (раковая опухоль). Карциномы влагалища крайне рѣдко бываютъ самостоятельными, а обыкновенно лишь какъ вторичное явленіе при ракѣ матки или другихъ сосѣднихъ частей, и не поддаются радикальному лѣченію (см. въ отд. 10-мъ „Раковая болѣзнь“).

3. Разрывы и свищи влагалища, равно какъ пороки развитія (отсутствіе, суженіе) его, принадлежать всецѣло къ области хирургіи.

Г. Болѣзни наружныхъ половыхъ частей у женщинъ.

1. Катарральное воспаленіе слизистой оболочки большихъ и малыхъ половыхъ губъ (Вульвитъ)—простое и гонорейное (трипперное). Причины простого вульвита: неопрятное со-

держаніе половыхъ частей, беременность, катарръ влагалища, бѣли вообще, сыпи. Признаки: краснота слизистой оболочки и ощущение жара въ ней, въ началѣ густое слизистое, а затѣмъ гнойное отдѣленіе. Лѣченіе: частыя обмыванія теплой водой, или настоемъ ромашки, или растворомъ изъ 30 — 40 капель *Календула* Θ въ стаканѣ воды; внутрь *Беллад.* 3 и *Меркур. солуб.* 3 въ началѣ, а затѣмъ—*Пульсат.* $\times$ 3 и *Гепарь-сульф.* 3.

Гоноррейный вульвитъ обыкновенно сопровождается гоноррею слизистой оболочки влагалища. Лѣчение то-же, что при послѣдней формѣ болѣзни (см. стр. 431).

2. Воспаленіе сальныхъ железъ большихъ и малыхъ половыхъ губъ вызываетъ на послѣднихъ маленькіе красные узелки, которые переходятъ въ гнойнички съ сильнымъ зудомъ. Сыпи всевозможнаго рода поражаютъ обыкновенно лишь большія половыя губы и, по характеру своему и теченію, не отличаются отъ тѣхъ же сыпей на кожѣ тѣла вообще; онѣ сопровождаются всегда катарральнымъ вульвитомъ. Сюда относятся эритема, экзема, герпесъ, пруриго и проч. (см. эти болѣзни и ихъ лѣченіе въ отдѣлѣ накожныхъ болѣзней).

3. Простыя язвы вслѣдствіе запущеннаго вульвита или же венерическія. Лѣченіе по общимъ правиламъ (см. „Язвы“ въ отд. Болѣзней кожи; венерическія язвы—въ слѣдующемъ под-отдѣлѣ).

4. Опухоли и новообразованія наружныхъ половыхъ частей относятся къ области больше хирургіи, чѣмъ лѣкарственнаго лѣченія. Изъ нихъ главныя суть слѣдующія: Папилломы — маленькія бородавчатые разраженія сосочковъ слизистой оболочки безъ отдѣленія и воспалительныхъ явленій; бываютъ у старыхъ женщинъ на большихъ и малыхъ губахъ, на дѣвственной плевѣ и т. д.—Расширеніе венъ въ видѣ узловатыхъ утолщеній послѣднихъ.—Кровяная опухоль (гематома) большихъ половыхъ губъ происходитъ отъ разрыва мѣстнаго веннаго сплетенія вслѣдствіе ушиба, паденія, мышечнаго напряженія (наприм. при натужномъ испраженіи), родового акта, и образуетъ подкожную большей или меньшей величины опухоль, синюю, мягкую, зыблущуюся. Лѣченіе: холодныя примочки изъ раствора *Арника* Θ , также внутрь *Арника* $\times$ 3. Небольшія кровяныя опухоли всасываются скоро отъ такого лѣченія. Большія же и запущенныя могутъ быть устранены лишь хирургическихъ путемъ.—То же надо сказать о грыжахъ, фибромахъ, кистомахъ, элефан-

тіазъ (сильное разращеніе—гипертрофія—кожи и соединительной ткани большихъ и малыхъ губъ; встрѣчается рѣдко).

Раковыя новообразованія (эпителиомы) рѣдко развиваются самостоятельно на наружныхъ половыхъ частяхъ, а бываютъ при ракъ влагалища или матки. Лѣчение какъ при ракъ вообще (см. отд. 10-ый). — Кондиломы, плоскія или чаще заостренныя опухоли, всегда сифилитическаго происхожденія. Лѣчение противосифилитическое. — Отекъ наружныхъ половыхъ частей—вслѣдствіе прижатія или ушиба, часто у беременныхъ. Проходитъ отъ теплыхъ примочекъ свинцовой водой, отъ смазыванія аписнымъ масломъ; внутрь—*Арника* и *Аписъ*.

5. Зудъ наружныхъ половыхъ частей въ большей или меньшей степени бываетъ при большинствѣ сыпныхъ заболеванийъ ихъ, но нерѣдко и безъ видимыхъ мѣстныхъ измѣненій, имѣя характеръ нервнаго зуда. Отъ непреодолимой же потребности расчесыванія образуются при этомъ явленія раздраженія и воспаленія кожи. Частой причиной зуда, особенно у дѣтей, служатъ мелкіе глисты (см. стр. 291), заползающіе изъ задняго прохода въ половыя части; онъ бываетъ также очень часто при сахарномъ мочеизнуреніи и общемъ нервномъ зудѣ тѣла. — Зудъ половыхъ частей облегчается отъ обмыванія растворомъ буры и внутреннихъ приемовъ *Бораксъ* $\times 2$, также *Русъ*, *Игнація*, *Аписъ*.

Д. Болѣзни грудныхъ железъ.

1. Воспаленіе грудной железы см. въ слѣдующемъ под-отдѣлѣ, стр. 445.

2. Новообразованія и опухоли грудной железы.

Бываютъ новообразованія и опухоли доброкачественныя и злокачественныя. Къ доброкачественнымъ относятся: жиры (липомы), растущіе медленно и безболѣзненно, фибромы (твердыя, волокнистыя опухоли, встрѣчающіяся рѣдко), аденомы (разростанія железистой ткани, величиной отъ грецкаго орѣха до куриного яйца, не причиняющія никакихъ страданій, но могущія превратиться въ злокачественныя опухоли); къ злокачественнымъ опухолямъ относятся: саркомы (мягкія и твердыя) и ракъ.

Главные признаки злокачественныхъ опухолей суть слѣдующіе: 1) сравнительно быстрый ростъ, 2) колющіе боли, 3) пере-

ходъ болѣзненнаго процесса и на ближайшія ткани, наприм., на кожу (втянутый сосокъ), 4) опуханіе сосѣднихъ железъ, 5) пропитываніе клѣтчатки и нерѣзкія очертанія границъ опухоли. При ракъ всѣ эти признаки должны быть въ наличности, при саркомахъ же и аденомахъ одни изъ нихъ могутъ быть, другіе—нѣтъ; на основаніи этого можно говорить до нѣкоторой степени о доброкачественности или злокачественности послѣднихъ. Во всякомъ случаѣ, пока всѣхъ этихъ признаковъ не имѣется на лицо, не слѣдуетъ спѣшить съ операцией, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ, если опухоль злокачественная, бываетъ довольно скоро рецидивъ, причиняющій всегда гораздо худшія страданія, нежели опухоль въ первоначальномъ состояніи. Подробнѣе объ этомъ сказано въ 10-мъ отдѣлѣ, въ статьѣ „Раковая болѣзнь“. Тамъ же—и о лѣченіи рака.

3. Нервная боль грудной железы.

(Мастодинія).

Характеризуется приступами боли передъ наступленіемъ менструацій или во время таковыхъ и сопровождается часто межреберной невралгіей, при чемъ въ тканяхъ грудной железы не обнаруживается никакихъ измѣненій. Боль молніеносная и лучистая отдается въ подмышковую впадину, плечо и т. д. Встрѣчается всего чаще у малокровныхъ и блѣдноточныхъ женщинъ. Лѣченіе такое же, какъ при невралгіяхъ вообще (см. стр. 121).

IV. Болѣзни беременныхъ и роженицъ.

Нормально протекающая беременность не сопровождается никакими болѣзненными расстройствами и продолжается около 40 недѣль (280—288 дней), чаще всего—280 дней, и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ роды наступаютъ позднѣе 288-го дня на 5—7 дней. Днемъ зачатія можетъ считаться восьмой день послѣ дня появленія послѣдней менструаціи, или же такъ: для опредѣленія мѣсяца и дня предстоящихъ родовъ отсчитываютъ 3 мѣсяца отъ начала послѣдней менструаціи и къ полученному такимъ счетомъ сроку прибавляютъ 7 дней.

всего удобнѣе—посредствомъ грудного насоса, съ послѣдующимъ каждый разъ обмываніемъ тепловатымъ растворомъ *Арника* Θ (1 ч. Θ въ 2 частяхъ воды). Половыхъ сношеній, особенно — во второй половинѣ беременности, лучше всего совсѣмъ избѣгать, такъ какъ они могутъ имѣть для беременной и плода вредныя послѣдствія.

I. Разстройства и болѣзни беременныхъ.

1. Разстройства пищеваренія у беременныхъ.

При незначительномъ позывѣ на рвоту и тошнотѣ полезно бываетъ выпить 8—10 капель коньяку въ полъ-рюмкѣ свѣжей воды. Изъ лѣкарствъ принимаются *Натрум. муриат.* $\mathcal{Z}$ (утромъ и вечеромъ) при слюнотеченіи и запорѣ.—*Сенія* $\mathcal{Z}$ (также *Нуксъ-вомика* $\mathcal{Z}$): при желудочныхъ коликахъ (или спазмахъ), 2—3 раза въ день.—*Арсеник. альб.* $\mathcal{Z}$: при чрезмѣрномъ аппетитѣ, послѣ утоленія котораго появляется изжога и тошнота (2—3 раза въ день).—*Пульсат.* при тошнотѣ послѣ печеній и жирной пищи; *Пульсат.*, принятая непосредственно послѣ ѣды, быстро успокаиваетъ желудочныя разстройства. Если же наступаетъ при этомъ рвота, то нужно принять *Ипекакуана* $\mathcal{Z}$.

При изжогѣ во время беременности, когда ни *Арсеник.*, ни *Нуксъ-вомик.*, ни *Пульсат.* не помогаютъ, надо принять *Магнезія-муриат.* $\times 1$.

Запоры наилучше проходятъ при употребленіи тепловатыхъ клистировъ, а также при цѣлесообразной діетѣ, въ которую входятъ, между прочимъ, пахтанье, яблочный взваръ, компотъ изъ чернослива и проч. Кромѣ того, вышеуказанныя лѣкарства дѣйствуютъ вообще на урегулированіе пищеваренія, особенно *Нуксъ вомик.*, *Бріон.* или *Сенія*.

Поносы появляются большею частью въ началѣ беременности, позднѣе — довольно рѣдко. И здѣсь слѣдуетъ соблюдать извѣстную діету. Если поносъ безболѣзненный, то давать *Пульсат.* При поносѣ съ болью—*Сенія* $\mathcal{Z}$. Если этого недостаточно, то — *Сульфуръ* $\mathcal{Z}$.

Движеніе плода въ маткѣ часто причиняетъ боль и даже нарушаетъ сонъ беременной. Въ такихъ случаяхъ принимаютъ *Крокъсъ* $\mathcal{Z}$.

Объ упомянутыхъ разстройствахъ см. также въ отдѣлѣ болѣзней пищеварительныхъ органовъ.

2. Разстройства мочеотдѣленія у беременныхъ.

Беременная матка давить на мочевой пузырь и тѣмъ самымъ вызываетъ различныя разстройства его, какъ то: болѣзненное мочеиспусканіе, или задержку его, или же непроизвольное испусканіе мочи.

При задержкѣ мочи, продолжающейся болѣе 12 часовъ, нужно принимать *Беллад.* 3; если же это не оказываетъ дѣйствія, то слѣдуетъ призвать врача для катетеризаціи, послѣ чего принимать *Ликопод.* 3, 2 раза въ день.

При болѣзненномъ мочеиспусканіи нужно, въ первыхъ, избѣгать мочегонныхъ напитковъ, затѣмъ полезно принять полную ванну въ 28°, и кромѣ того *Пульсат.* 3, каждые 1—2 часа, или же *Гіосціам.* 3.

При непроизвольномъ мочеиспусканіи (недержаніи мочи): *Фосфор. ацид.* × 3, также *Пульсат.* 3; если моча является при кашлѣ, то 3 раза въ день *Феррумъ фосфорик.* 3, *Каннабисъ* × 3, *Каустик.* × 3.

3. Головная боль у беременныхъ.

Аконитъ: если боль сопровождается краснотой лица и жаромъ головы.—*Беллад.* 3: при общей, тупой, стучащей боли головы и при ощущеніи, точно голова готова лопнуть, при шумѣ въ ушахъ и головокруженіи. — *Кали карбон.* 3: боль головы сопровождается сердцебіеніемъ.—Если головныя боли обусловлены нервозностью или малокровіемъ, при блѣдности лица, то онѣ требуютъ примѣненія *Пульсат.* 3, особенно если одновременно разстроены желудокъ и имѣется плаксивое настроеніе духа; также *Феррумъ* 3. Кромѣ того подходятъ еще: *Арсен. альб.*, *Калькар. карбон.*, *Натр. карбон.* и *Гельзем.* (послѣднее въ томъ случаѣ, если имѣется краснота или блѣдность одной половины лица). Часто лучше всѣхъ прочихъ лѣкарствъ дѣйствуетъ при головной боли у беременныхъ *Сетія* 3.

Особый родъ головной боли при беременности вызывается болѣзнію почекъ. При изслѣдованіи мочи (кипяченіемъ, см. стр. 396) находятъ въ ней бѣлокъ. Такія головныя боли сопровождаются обыкновенно свѣтобоязнью, головокруженіемъ, а часто также и судорогами, и если не предпринять во время надлежащаго лѣченія почекъ, то могутъ наступить общія конвульсіи съ обморокомъ (э к л а м-

псія, см. стр. 130). По счастью, болѣзнь эта является рѣдко, разъ на 500 беременностей. Въ подобныхъ случаяхъ необходима помощь врача, за отсутствіемъ котораго нужно давать *Анисъ* $\times$ 3 или *Анизинъ* $\times$ 3. (см. также о судорогахъ стр. 125 и проч.).

4. Зубная боль у беременных.

Если зубная боль происходитъ отъ испорченныхъ, каріозныхъ зубовъ, то необходимо обратиться къ помощи зубного врача, ибо каріозъ во время беременности быстро развивается, вслѣдствіе чего много зубовъ окончательно погибаютъ. Боль же цѣлага ряда зубовъ является на нервной почвѣ и продолжается первыя 20 недѣль. *Спигелія* $\times$ 3: при молніеобразной, стучащей боли, особенно ночью, съ сердцебіеніемъ при ухудшеніи отъ пищи и холодной воды.—*Пульсат.* 3: если боль ухудшается въ комнатѣ, и облегчается при давленіи на щеку, или на вольномъ воздухѣ.—*Гельзем.* 3: если боль очень сильная и происходитъ отъ жеванія. Кромѣ того: *Фосфоръ*, *Арсеник. альб.*, *Натр. муриат.* (послѣднее, если имѣются еще кишечныя разстройства); см. еще стр. 186.

Появляющаяся иногда во второй половинѣ беременности зубная боль бываетъ большею частью приливнаго (конгестивнаго) характера и сопровождается опуханіемъ и кровоточивостью десенъ. Въ такихъ случаяхъ подходит *Беллад.* 3, а если она не помогаетъ, то даютъ *Хина* $\times$ 3: при появляющихся регулярно днемъ или ночью припадкахъ зубной боли, которая временно успокаивается сильнымъ сжиманіемъ челюстей.—*Сенія* 3: при колющей и стучащей боли, ухудшающейся при жеваніи и холодѣ, на воздухѣ, и при входѣ въ теплую комнату. Далѣе могутъ быть полезны: *Пульсат.* 3: у малокровныхъ и страдающихъ блѣдной немочью женщинъ; *Аконитъ* или *Кодффеа*: при стучащей боли и жарѣ головы.

5. Расширеніе венъ у беременных.

При расширеніи венъ: *Ликопод.* (3 раза въ день). Если черезъ нѣсколько дней незамѣтно улучшенія, то слѣдуетъ принимать *Гаммелисъ-экстрактъ*, 3 раза въ день по 5 капель. Рекомендуются также бинтованіе ноги полотнянымъ (безъ швовъ) бинтомъ. Бинтовать слѣдуетъ отъ пальцевъ вверхъ къ колѣну, равномерно накладывая бинтъ безъ складокъ и промежутковъ. Въ случаѣ вскрывшейся (лопнувшей) вены, необходимо тотчасъ

же обратиться къ врачу, а если его нѣтъ подъ рукою, то слѣдуетъ наложить на рану, сколько надо, кровоостанавливающей ваты, желѣзной, или гаммелисъ-ваты, или Пенгаваръ-жамби. Резиновые подвязки должны быть совершенно устранены. См. „Болезни венъ“, стр. 385.

6. Кровотеченіе изъ беременной матки.

Выкидышъ.

а. Кровотеченіе въ первые семь мѣсяцевъ беременности — выкидышъ. До прибытія врача или акушерки, а также послѣ того, если рѣшено было воздерживаться отъ мѣстнаго ручного вмѣшательства, принимаютъ: *Арника* × 3: если крови открылись вслѣдствіе механическаго поврежденія, удара, паденія или насады или быстрыхъ движеній (также *Русъ*).—*Хамомилла* × 3: послѣ сильнаго гнѣва или огорченія; также *Акон.* × 3, особенно при ускоренномъ дыханіи и полномъ пульсѣ.—*Анисъ* × 3: при этихъ же симптомахъ и боляхъ въ грудяхъ.—*Беллад.* × 3: при боляхъ во всемъ животѣ.—*Кали карбоник.* × 3: при боляхъ, идущихъ отъ спины до бедра.—*Хина* × 3: у слабыхъ; обморочное состояніе.—*Крокусъ* × 3: кровь тягучая, черная; головокруженіе.—*Вибурнумъ* × 2: кровотеченіе при сильныхъ боляхъ въ животѣ.—*Секале* × 3: жестокія схватки, темная кровь; если больная страдала раньше разстройствами регулъ.—*Ипекак.* × 3: ярко-красная кровь; тошнота, слабость, обморочное состояніе.

Холодные компрессы на животъ, смѣняемые каждыя 15 минутъ; спокойное лежаніе въ постели, на матрацѣ, въ прохладномъ помѣщеніи. Пищу принимать лишь легкую, нераздражающую и въ небольшихъ количествахъ. Жидкостей—возможно меньше. Вина, чая и кофе совсѣмъ не пить, пока угрожаетъ выкидышъ.

**Преждевремен.
роды.**

б. Кровотеченіе изъ матки въ послѣдніе 3 мѣсяца беременности, также во время родовъ до изгнанія плода—преждевременные роды. Причина кровотеченія въ послѣдніе три мѣсяца — преждевременное отдѣленіе послѣда отъ стѣнокъ матки, а также, что рѣдко бываетъ, центральное у выхода матки положеніе его (что всегда крайне опасно для родящей); затѣмъ самый актъ родовъ, при неправильномъ его теченіи, можетъ сопровождаться обильнымъ кровотеченіемъ изъ матки; далѣе, кровотеченіе можетъ наступить сейчасъ или въ первое время спустя послѣ родовъ, вслѣдствіе ли слабости матки, недостаточно сокращающейся, или отъ того, что послѣдъ не весь вышелъ, а въ маткѣ остался

большій или меньшій кусокъ его; наконецъ кровотеченіе можетъ быть также отъ поврежденія родовыхъ путей или, что рѣдко бываетъ, отъ выворота матки.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ надо немедленно послать за врачомъ или акушеркой, такъ какъ можетъ понадобится специальная ручная помощь. До прибытія же ихъ поступать какъ сказано при выкидышѣ.

II. Разстройства и болѣзни во время и послѣ родовъ.

Ложныя родовыя потуги, являющіяся у нѣкоторыхъ женщинъ, особенно у первородящихъ, иногда задолго (за нѣсколько недѣль) до разрѣшенія, проходятъ отъ нѣсколькихъ приемовъ *Беллад.* $\times 3$, или же, смотря по особенностямъ случая, отъ *Хамомила*, *Пульсат.*, *Нукс. вом.*

При настоящихъ, но слишкомъ слабыхъ потугахъ: *Пульсат* $\times 3$; при полномъ отсутствіи потугъ: *Пульсат.* или *Беллад.*, попеременно съ *Секале корнут.* $\times 3$; также *Кали фосфорик.* 3.

При очень сильныхъ, спазматическихъ, но тѣмъ не менѣе безуспѣшныхъ потугахъ: *Гельзем.* $\times 3$, также *Магнез. фосф.* $\times 3$.

Непосредственно послѣ разрѣшенія слѣдуетъ всегда давать *Арника* $\times 3$; если имѣются сильныя послѣродовыя боли или сильное безпокойство, то кромѣ того даютъ *Коффеа* $\times 2$, *Хамомила* $\times 3$, также *Секале корн.* и *Пульсат.*

При сильныхъ кровотеченияхъ во время и послѣ разрѣшенія: кромѣ Арники, еще *Хина*, *Секале*, *Сабина* (см. выше „Кровотеченіе изъ беременной матки“).

При конвульсіяхъ (эклампси) у роженицъ поступаютъ какъ указано выше и при судорогахъ вообще.

При молочной лихорадкѣ: *Акон.* $\times 3$; если при этомъ имѣется безпокойство и бессонница, даютъ *Коффеа* $\times 3$.

Послѣродовая лихорадка: см. стр. 68.

Воспаленіе груди (грудница): см. ниже.

Ссадины и трещины сосковъ: см. тамъ же.

При недостаткѣ молока въ грудяхъ: *Хамотил.* и *Пульсат.*, также *Агнусъ каст.* и *Калькар. карб.*, *Каустик.*, *Уртика.*

При чрезмѣрномъ истеченіи молока: *Беллад.* и *Бріон.* эти же средства полезны, когда чрезмѣрное истеченіе является при необходимости прекращенія кормленія или послѣ отнятія ребенка

отъ груди. Въ этихъ случаяхъ полезны также *Кали іодат.* 1—2 и *Кониумъ* 3.

Запоръ въ первые 3—4 дня послѣ родовъ есть явленіе нормальное и поэтому не требуетъ противъ себя никакихъ особыхъ мѣръ, слабительныя же противъ него средства могутъ скорѣе повредить, чѣмъ пользу принести.

Послѣ родовыя очищенія продолжаются приблизительно дней 40, у кормящихъ же грудью они оканчиваются раньше. Въ началѣ эти очищенія смѣшаны съ кровью, съ 3—4 дня они имѣютъ видъ мясного настоя, а съ 8—10 дня они молочно-бѣлаго цвѣта. При всякомъ уклоненіи отъ этихъ нормъ, необходимо выяснять причину его и принять соотвѣтствующія мѣры (см. „Болѣзни матки“ и проч.).

Диета и уходъ въ первое время послѣ родовъ.

Часа черезъ два послѣ разрѣшенія отъ бремени, когда роженица успѣла отдохнуть, ей даютъ немного бульона или отвара изъ крупъ. Для утоленія имѣющейся у роженицы жажды лучше всего служить молоко или подогрѣтая фруктовая вода. Ромашковый чай вреденъ. Затѣмъ можно давать сухарики, а также каши изъ риса, манны и т. п. Если роженица почему либо не кормить грудью, то она должна быть очень умѣренна въ пищѣ, во избѣжаніе чрезмѣрнаго накопленія молока въ грудяхъ. Съ 8—9 дня послѣ разрѣшенія пища можетъ быть ужъ поплотнѣе (легкіе сорта мяса, и проч.) и мало по малу стать обычной. Вредны какъ для роженицы такъ и для ребенка, котораго она кормитъ, спиртные напитки, (исключая немного легкаго вина), затѣмъ кофе, крѣпкій чай, все острое, очень соленое, кислое, копченое.

Въ первые 8 дней роженица ни въ какомъ случаѣ не должна вставать съ кровати, такъ какъ это служитъ часто причиной смѣщеній и заболѣваній матки, а также простуды организма. Поэтому для совершенія естественныхъ надобностей каждая роженица должна пользоваться спеціальнымъ подкладнымъ судномъ. Послѣродовое потѣніе нормально и необходимо, поэтому надо стараться не прерывать его какимъ либо образомъ, такъ какъ отъ этого могутъ произойти серьезныя заболѣванія роженицы; съ другой же стороны не надо и очень кутать ее въ одѣяла, такъ какъ потѣніе этимъ лишь напрасно усиливается, что ведетъ къ ослабленію организма.

Роженица нуждается въ возможно большемъ покоѣ; поэтому всякія продолжительныя посѣщенія участливыхъ кумушекъ и разговоры вредно отзываются на ея здоровьи въ первые дни послѣ разрѣшенія.

Чистота во всемъ, равно какъ чистый, свѣжій воздухъ безусловно необходимы для роженицы; однако, во избѣжаніе простуды, провѣтриваніе должно производиться изъ смежной комнаты, а не изъ той, въ которой находится роженица.

Воспаленіе грудной железы. Грудница.

Эта болѣзнь развивается особенно часто вскорѣ послѣ родовъ, затѣмъ также во время дальнѣйшаго кормленія грудью, равно какъ послѣ отнятія ребенка, и въ тѣхъ случаяхъ, когда по какой либо причинѣ роженица не можетъ или не хочетъ кормить грудью. Въ первыхъ двухъ случаяхъ наиболѣе частой и ближайшей причиной являются трещины или ссадины на соскахъ (вслѣдствіе сосанія), черезъ которыя вредныя вещества проникаютъ въ грудь и производятъ въ ней воспаление; въ другихъ случаяхъ причиной являются застои молока, влекущіе за собою большія или меньшія затвердѣнія, чувствительныя при давленіи. Затвердѣнія эти обыкновенно расходятся, иногда же воспаляются, краснѣютъ и нарывають, нагнаиваются.

Причины.

Пока имѣется лишь затвердѣніе безъ красноты, при повышеннѣй температурѣ тѣла, можно разсчитывать, что оно разойдется (всосется) при употребленіи *Беллад.* $\times 3$ и *Меркур.* *солуб.* $\mathfrak{z}$; если причина—застой молока, то больше подходятъ *Пульсат.* $\times 3$ и *Коніумъ* $\times 3$, также *Іод.* $\times 3$ или *Кали іодат.* 1.—Наружно примѣняются: частыя обмыванія сосковъ растворомъ *Календула* Θ (также *Гиперикумъ* Θ или *Гидрастисъ* Θ ; *Арника* Θ (при трещинахъ и ссадинахъ), а на самое затвердѣніе класть *Белладонна-масло* или мазь изъ *Коніумъ*, *Іод.*, *Фитолакка*. Согрѣвающіе компрессы съ прибавленіемъ тинктуры (Θ) *Гидрастисъ* или *Фитолакка*.—Какъ только нагноеніе наступило, что даетъ себя знать ознобомъ и повышеніемъ температуры тѣла, даютъ *Гепаръ-сульф.* и *Силицію*, пока нарывъ вскрыется, и продолжаютъ эти же лѣкарства до тѣхъ поръ, пока еще показывается гной, а затѣмъ принимаютъ *Силицію* до полного выздоровленія (рядомъ съ *Коніумъ*, *Кальк. карб.*, *Іод.*). Когда нарывъ вскрылся, кладутъ на рану мягкую марлю, въ достаточномъ количествѣ смоченную

Лѣченіе.

растворомъ *Календула* Θ (чайн. лож. на стаканъ воды) и слегка выжатую, а поверхъ нея слой гигроскопической ваты и забинтовываютъ. Въ самую рану втискивать марлю не слѣдуетъ. Такую перевязку дѣлають 2 раза въ сутки.

Флегмазія альба доленсъ см. стр. 385.

ДОБАВЛЕНІЕ КЪ ЭТОМУ IV-му ПОД-ОТДѢЛУ.

Болѣзни новорожденныхъ.

**О кормленіи
грудью.**

Первое молоко роженицы имѣетъ слабительное свойство для выведенія первороднаго кала изъ кишечника новорожденнаго, и нѣтъ надобности давать для этой цѣли какія либо искусственныя слабительныя средства, которыя могутъ принести тутъ только вредъ. Если при этомъ въ первые дни кишечникъ у ребенка не очищается раза три въ день, то ужъ лучше прибѣгнуть къ клистирику изъ тепловатой воды, съ прибавленіемъ щепотки столовой соли. Вредно для ребенка также, особенно въ первые дни, вставлять въ ротъ соску и т. п., или поить ромашкой или какой бы то ни было другой жидкостію. Единственно здоровая, естественная пища для новорожденнаго есть молоко матери, и поэтому первая обязанность каждой матери—кормить собственной грудью своего ребенка. Это не только для ребенка благо, но и для самой матери. Послѣродовые процессы, происходящіе въ маткѣ, совершаются нормально, какъ слѣдуетъ, только въ томъ случаѣ, когда дѣятельность грудей идетъ нормально. Тоже надо сказать и о всемъ организмѣ кормящей матери, прежде всего о самихъ грудяхъ. Если мать сама не кормитъ своего ребенка съ первыхъ же дней его рожденія, то въ грудяхъ накапливается молоко, слѣдствіемъ чего могутъ явиться воспаленіе и нагноеніе ихъ, или же послѣродовая лихорадка или всевозможныя другія заболѣванія. Вотъ почему необходимо принять всѣ мѣры къ тому, чтобы кормленіе грудью шло съ самаго начала правильно въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣятельность эта задерживается по какой либо причинѣ. О заблаговременномъ приготовленіи грудей и грудныхъ сосковъ къ безпрепятственному кормленію уже сказано выше (стр. 438). И теперь, когда дѣло уже дошло до кормленія, а сосокъ оказывается слишкомъ малымъ для этого, его надо повторно вытягивать и пальцами и груднымъ насосомъ; это надо

дѣлать настойчиво, пока не будетъ достигнуть удовлетворительный результатъ.

Если женщина по какой либо причинѣ не въ состояніи или не должна кормить своего ребенка грудью, то на это надо смотрѣть какъ на несчастіе и приходится искать способовъ и средствъ, которые замѣнили бы ребенку материнское молоко. Къ причинамъ, противопоказующимъ кормленіе грудью, относятся прежде всего туберкулезъ, золотуха и сифилисъ. Далѣе, сильная нервная слабость и нервныя потрясенія могутъ быть причиной частой порчи молока въ грудяхъ и тѣмъ вызывать опасныя заболѣванія у ребенка, или подѣ влияніемъ нервныхъ аффектовъ отдѣленіе молока можетъ прекратиться совсѣмъ, и тогда приходится уже поневолѣ прекратить кормленіе грудью. Кормленіе можетъ быть невозможнымъ изъ за недѣятельности грудныхъ железъ или недостаточно развитыхъ грудныхъ сосковъ; то и другое является часто слѣдствіемъ сильнаго шнурованія груди въ дѣвичество и недостаточной заботливости о надлежащемъ развитіи груди во время беременности (см. стр. 438). Воспаленіе грудной железы можетъ сдѣлать невозможнымъ кормленіе, если оно захватываетъ обѣ железы, или одну при недостаточности другой для цѣли кормленія.

Въ такихъ случаяхъ приходится вскармливать ребенка искусственно или черезъ кормилицу. Хорошую и вполне подходящую кормилицу достать очень трудно, не говоря ужъ о томъ что содержаніе ея въ громадномъ большинствѣ случаевъ сопряжено съ большими неудобствами, а то и совсѣмъ невозможно, и приходится держаться исключительно искусственнаго кормленія коровьимъ молокомъ или его суррогатами.—Хорошая кормилица должна быть не моложе 20 и не старше 30 лѣтъ; въ противномъ случаѣ молоко будетъ не надлежащаго качества. Она должна быть совершенно здорова и правильнаго тѣлосложенія, не очень полна и не худая. Она должна имѣть чистые глаза, красныя губы, хорошіе зубы и здоровыя десны. Кормилица, впервые родившая, предпочтительнѣе многократно рожавшей. Груды должны быть вполне развиты, также и грудные соски, молоко изъ груди должно отдѣляться свободной струей и имѣть здоровый видъ. Кормилица должна имѣть хорошій, добрый, веселый нравъ и добросовѣстно выполнять свою обязанность.

Кормилица

Кромѣ всего этого, полное здоровое состояніе кормилицы внутреннее и наружное (кожа и проч.) должно быть удостовѣрено по-

дробнымъ врачебнымъ осмотромъ Но все это легче сказать, чѣмъ на дѣлѣ осуществить. Наконецъ, кормилица должна быть разрѣшившеюся въ то же приблизительно время, какъ и мать ребенка, къ которому берется кормилица, иначе рискуютъ давать послѣднему не такое молоко, какое ему нужно; она должна имѣть и въ достаточномъ количествѣ молоко въ грудяхъ. И если даже допустить, что идеальная кормилица найдена, то остается еще вопросъ о вліяніи перемѣны въ ея образѣ жизни на ея молоко, когда, на примѣръ, изъ деревни она переходитъ въ условія городской жизни,—перемѣны, которая можетъ неблагоприятно отозваться и на здоровьи кормилицы вообще и на составѣ ея молока.

Искусствен-
ное корм-
леніе.

Въ конечномъ результатѣ и для большинства случаевъ вытекаетъ отсюда заключеніе, что уже лучше, по всѣмъ мотивамъ, искусственно вскармливать, нежели съ кормилицей возиться. Наиболѣе подходящимъ и цѣлесообразнымъ питательнымъ веществомъ, которое можетъ всего больше замѣстить материнское молоко, является молоко коровье. Козье молоко менѣе пригодно для этого, такъ какъ оно жирнѣе коровьяго. Молоко сборное отъ нѣсколькихъ коровъ предпочтительнѣе, нежели молоко отъ одной коровы. Въ первые 3 мѣсяца ребенка молоко дается не въ цѣльномъ, а въ разведенномъ видѣ Для разведенія молока цѣлесообразно брать отваръ изъ 1 чайной ложки овсяной или ячменной муки (непросѣянной) на 2—2¹/₂ стакана воды съ прибавленіемъ еще чайной ложки молочнаго сахара. Отваръ такой готовится ежедневно свѣжій, въ жаркое время года—не разъ, а два раза въ день. Эта смѣсь прибавляется къ кипяченому молоку въ слѣдующихъ пропорціяхъ:

до 3-ей недѣли—1 часть молока и 3 части смѣси;

съ 3-ей до 12-ой недѣли—1 ч. молока и 1 ч. смѣси;

съ 13-ой до 20-ой недѣли—2 ч. молока и 1 ч. смѣси;

съ 21-ой недѣли переходятъ постепенно къ цѣльному молоку, къ которому продолжаютъ прибавлять немного молочнаго сахара передъ кипяченіемъ.

Молоко должно быть всегда хорошее и свѣжее, нисколько не скисшее. Малѣйшую кислотность молока легко обнаружить, погруживъ въ него синюю лакмусовую бумагу: отъ кислоты эта бумага окрашивается въ красный цвѣтъ.

Какъ часто
кормить.

Нормальнымъ надо считать кормленіе, вообще говоря, съ 3 или 4-часовыми промежутками; при такой частотѣ грудное молоко обладаетъ наиболѣе доброкачественныя свойства. Большая ошибка при-

кладывать ребенка каждый разъ, какъ только онъ заплачетъ. Необ- Причины
ходимо всегда хорошенько выяснить, отъ какой причины ребенокъ плача у груд-
плачетъ. Если онъ незадолго передъ тѣмъ высосалъ грудь, то не ного ребенка.
голодь является причиной. Ребенокъ можетъ плакать отъ болѣзни
или отъ того, что неудобно или мокро лежить, или ему слишкомъ
жарко или холодно, или его что либо давить или колеть, или на-
сѣкомое какое нибудь не даетъ ему покоя.

Въ подобныхъ случаяхъ прикладываніе къ груди или вообще
кормленіе не принесетъ никакой пользы; какъ лишнее же, оно мо-
жетъ и повредить ребенку, особенно при болѣзни послѣдняго, тѣмъ
болѣе при болѣзни желудка или кишекъ, которая отъ излишняго
кормленія можетъ только еще болѣе ухудшиться. Случается, на-
конецъ, что ребенокъ кричитъ отъ того, что у него является
просто потребность покричать. Мать, умѣющая наблюдать своего
ребенка, научается понимать характеръ плача у него, такъ какъ
отъ разной причины ребенокъ и разное плачетъ; она и инстинк-
томъ своимъ чувствуетъ часто, отъ голода ли или отъ другой причины
ребенокъ плачетъ. Такъ или иначе, но большое благо для ребенка
и для матери, если кормленіе совершается въ возможно болѣе нор-
мальные промежутки времени. Особенно вредно для нихъ обоихъ
частое прикладываніе въ ночное время. Наиболѣе нормальнымъ надо
считать, если съ 10 часовъ вечера ребенокъ болѣе не прикладывается
до часовъ 6 утра, и къ этому надо приучать ребенка. Если онъ въ
это время плачетъ, то надо пытаться унимать его парой ложекъ
сахарной воды. Такимъ образомъ въ нѣсколько дней удастся обык-
новенно урегулировать кормленіе, если это дѣлать настойчиво, въ
тѣхъ случаяхъ, когда ребенокъ уже приученъ къ болѣе частому
кормленію. Очень вредно прикладывать ребенка къ груди въ то вре-
мя, когда онъ спитъ или давать у груди ему уснуть; помимо того,
что ребенку прививается этимъ вредная привычка вообще, молоко
во рту спящаго ребенка застаивается, киснетъ, и, раздражая слизи-
стую оболочку, ведетъ къ ея воспаленію, къ плѣсневкѣ и проч.

Вредно и даже опасно оставлять ребенка при матери, когда
она спитъ; не разъ уже случалось отъ этого сдавленіе ребенка
до удушенія.—Кормить ребенка грудью достаточно до 9—10 мѣ-
сяцевъ. Прикармливаніе излишне, если въ груди матери доста-
точно молока; во всякомъ случаѣ о немъ не надо думать въ пер-
вые 4—5 мѣсяцевъ ребенка.

При искусственномъ вскармливаніи промежутки между кор-
мжками могутъ быть такіе же, какъ при кормленіи грудью. Съ

4—5-го мѣсяца можно давать уже, кромѣ чистаго молока, также отвары изъ овсяной муки или общеизвѣстной Нестле и т. п. Температура дѣтской пищи должна быть отъ 28 до 20 градусовъ по Реомюру. Чистота посуды, рожковъ и проч. разумѣется сама собою.—Отнятіе отъ груди должно совершаться всегда постепенно, а не сразу.

**О купаніи
ребенка.**

Купать ребенка необходимо съ перваго дня его рожденія и именно каждый день; температура воды въ первое время 29° по Реомюру; съ 3—4 недѣли слѣдуетъ постепенно понижать ее, доводя ее къ 3—4-му мѣсяцу до 26 градусовъ, съ послѣдующимъ еще обливаніемъ болѣе прохладной водой. Не слѣдуетъ только сажать ребенка въ такую ванну прямо изъ теплой постели, а тогда, когда онъ ужъ нѣсколько остылъ. Съ 5—6 мѣсяцевъ можно купать ребенка черезъ день, а позднѣе еще рѣже, но не менѣе двухъ разъ въ недѣлю.

Ниже приводятся нѣкоторыя болѣзни новорожденныхъ съ указаніемъ первыхъ показанныхъ лѣкарствъ. Лѣкарства такимъ маленькимъ всего лучше давать въ видѣ крупинокъ, растворяя ихъ въ водѣ, напр.—5 круп. въ 10 чайныхъ ложечкахъ воды; давать по чайной ложечкѣ черезъ 2—3 часа. При болѣе рѣдкихъ пріемахъ можно давать и по 1—2 крупинки на разъ. О дозахъ и способахъ пріемовъ см. еще стр. 23.

Мнимая смерть новорожденныхъ.

Новорожденный, какъ только онъ вышелъ изъ чрева матери, издаетъ крикъ, происходящій отъ перваго проникновенія воздуха въ его легкія. Но нерѣдко случается, что ребенокъ не кричитъ, а производитъ впечатлѣніе какъ бы мертваго. Происходитъ это отъ различныхъ причинъ: отъ чрезмѣрнаго накопленія слизи во рту, отъ замедленныхъ или слишкомъ продолжительныхъ родовъ, отъ обмотавшейся вокругъ шейки младенца пуповины и т. д. Въ подобныхъ случаяхъ должны быть приняты соотвѣтствующія мѣры, при чемъ лучше всего обратиться къ помощи врача или акушерки, такъ какъ можетъ потребоваться искусственное дыханіе, а человекъ неопытный въ этомъ дѣлѣ можетъ только повредить. Нужно пошлепать ребенка по задку или по спинкѣ, или пощекотать носикъ перышкомъ, положить ребенка въ теплую ванну, или брызнуть на грудку тонкой струей воды.

Воспаленіе глазъ у новорожденныхъ.

Воспаленіе глазъ должно быть причислено къ самымъ опаснымъ болѣзнямъ новорожденныхъ, такъ какъ оно очень часто является причиной потери зрѣнія на всю жизнь. Первой причиной воспаленія глазъ младенца является засореніе родовыми водами родильницы или бѣями (особенно опасно трипперное зараженіе), пылью, также рѣзкій свѣтъ и механическія раздраженія. Рядомъ съ удаленіемъ причины, надо тщательно очищать глаза отъ слизи, дѣлать примочки изъ *Эвфразія* Θ (5 капель на 2 столов. ложки воды), а внутрь дать въ самомъ началѣ воспаленія *Акон.* 3, а затѣмъ *Аписъ* 3 и *Меркур.* солуб. 6; при слизи, разѣдающей кожу: *Меркур.* корроз. 3, затѣмъ *Гепар.-сульф.* 6, *Калк.* карбон. 6; (см. также „Глазныя болѣзни“). Для предупрежденія зараженія глазъ бѣями слѣдуетъ всегда передъ родами сдѣлать нѣсколько промываній влагилица чистой водой или растворомъ *Календула* Θ , 2 столовыхъ ложки на кружку воды.

Желтуха у новорожденныхъ.

Въ первые часы жизни ребенка нерѣдко бываетъ, что все тѣлце, вмѣсто краснаго или тѣлеснаго цвѣта, имѣетъ желтый цвѣтъ. Происходитъ это вслѣдствіе задержанія въ кишечникѣ первороднаго кала, препятствующаго свободному прохождению желчи изъ желчнаго мѣшка въ кишечникъ, что въ свою очередь ведетъ къ скопленію желчи въ крови и разлитію ея по всему тѣлу. Болѣзнь эта продолжается большею частью 3—4 дня, иногда же и 8 дней. Внутрь: *Меркур.* сол. 6. Если въ 24 часа незамѣтно улучшенія, то, съ *Меркур.* попеременно, *Хамомила* 3. Въ случаѣ, если цвѣтъ тѣла не измѣнится въ 3—4 дня, то даютъ *Хина* 3 и *Нуксъ* вои. 6; при жарѣ *Беллад.* 3.

Опуханіе грудныхъ сосочковъ у новорожденныхъ.

Опуханіе грудныхъ сосочковъ у новорожденныхъ происходитъ отъ невѣжественныхъ повивальныхъ бабокъ, которыя считаютъ нужнымъ выдавливать сосочки у новорожденныхъ, вслѣдствіе чего они и воспаляются. Наружно—примочки изъ раствора *Арника* Θ . Внутрь: *Акон.* 3 и *Хамомила* 3, попеременно; *Беллад.* 3 и *Бріон.* 3 — при сильной краснотѣ; при нагноеніи — *Гепаръ-сульф.* 6.

Пупочная грыжа у новорожденныхъ.

Если, по отпадении засохшей пуповины у младенца, пупочное отверстие не закрылось (не зажило), то вслѣдствие напряженія при крикѣ образуется пупочная грыжа, которая при спокойномъ состояннн ребенка мягка на ошупь и легко поддается внутрь при нажиманнн. Если положить палецъ на отверстие, то ощущается движеніе напнрающихъ кишекъ. Для излѣченія этого необходимо держать кишечки такъ, чтобъ онѣ не выпнрались и тѣмъ дали бы возможность отверстию зарости. Для этого лучше всего, вправнвъ грыжу, наложить на пупочекъ кусокъ полотна, свврхъ него половину лѣснаго орѣха выпуклой стороной къ грыжевому отверстию, а свврхъ всего — кусочекъ полотна, и залѣпить все это липкимъ пластыремъ, при чемъ нужно слѣднть за тѣмъ, чтобъ орѣхъ аккуратно лежалъ надъ пупкомъ. Если пластырь отстанетъ, то нужно все это возобновнть. Мѣдныя монеты нецѣлесообразны, благодаря своей тяжести, какъ и всякіе резиновые бандажи. Внутрь даютъ *Нуксз вом. 3*, сперва каждыя 3 — 4 дня, а затѣмъ разъ въ недѣлю. Если этого недостаточно, то попеременно съ *Нуксз вом.*, еще и *Хамомила 3*.

Конвульсіи у новорожденныхъ. Родимчнкъ, см. стр. 129.

Судорожное сжатіе челюстей, см. стр. 133.

Насморкъ у новорожденныхъ.

Насморкъ самъ по себѣ можетъ быть и не опасенъ, но, при развитнн его и переходѣ въ хроническую форму, онъ можетъ на столько заложнть носнкъ ребенка, что сосанне становится невозможнымъ, такъ какъ оно препятствуетъ свободному дыханію носикомъ. Для предупрежденія насморка необходимо оберегать ребенка отъ простуды, въ то же время закаляя его организмъ (см. о купаннн ребенка на стр. 450). Внутрь противъ насморка. *Хамомила. 3*; при изъязвленнн ноздрей: *Пульсат.* (2 раза въ день); при струпьяхъ въ носу (коркахъ) *Арсен.-альб. 3*.—При одновременномъ лихорадочномъ состояннн—вышеуказанныя средства, попеременно съ *Беллад. 3*. См. еще о насморкѣ на стр. 297.

Кашель у новорожденныхъ.

При простудномъ кашлѣ употребляется *Хамомила 3* (попеременно съ *Аконнт. 3*, если имѣется и лихорадочное состоя-

ніе).—*Беллад.* 3: при потрясающемъ кашлѣ.—*Брион.* 3: при усиленіи кашля въ теплой комнатѣ.—*Натр. муриат.* 3: при одновременномъ съ кашлемъ мочеиспусканіи (рядомъ съ *Пульсат.*), и *Ипекакуана* 3: при кашлѣ, сопровождаемомъ рвотой. См. еще „Болѣзни дыхательныхъ органовъ“.

Икота у новорожденныхъ

Икота у новорожденныхъ появляется отъ сильнаго плача, общей простуды, переполненія желудка, слишкомъ холоднаго или горячаго питья, или если ребенокъ лежитъ въ мокромъ. Не будучи опасной сама по себѣ, икота тогда лишь требуетъ лѣченія, когда повторяется помимо или при устраненіи вышеуказанныхъ причинъ. Лѣчение: *Нуксѣ-вом* 3, *Пульсат.* 3, *Игнація* 3. См. еще стр. 192.

Лихорадка у новорожденныхъ.

Лихорадка у новорожденныхъ узнается по повышенной температурѣ, выше 37,5°, быстрому, горячему дыханію, обложенному языку, по беспокойству, жару. Появляется сильная жажда, отсутствие сна, беспокойство и плачъ.

Всегда необходимо выяснить основную причину лихорадки, соотвѣтственно которой и давать лѣкарства. Первое и главное средство, во всякомъ случаѣ, *Аконит.* 3, который слѣдуетъ давать попеременно съ тѣмъ лѣкарствомъ, которое показано основнымъ или сопровождающимъ разстройствомъ. См. еще „Лихорадочныя болѣзни“.

Рвота у новорожденныхъ.

Рвота у новорожденныхъ бываетъ двухъ родовъ: 1) чистымъ молокомъ непосредственно послѣ кормленія, когда ребенокъ насосался больше, чѣмъ вмѣщаетъ его желудочекъ; въ такомъ случаѣ рвота даже полезна; 2) свернувшимся молокомъ спустя нѣкоторое время послѣ кормленія. Въ послѣднемъ случаѣ, равно какъ при слишкомъ частой рвотѣ чистымъ молокомъ, надо найти причину несваренія (слабость пищеваренія, дурное молоко, болѣзни матери и т. д.) и удалить ее, ребенку же давать: *Хамомилл* 3, а черезъ 2—3 часа *Ипекакуана* 3.—При рвотѣ чистымъ молокомъ; *Этуза* x 3.

При искусственномъ вскармливаниіи случается, что рвота происходитъ отъ слишкомъ жирнаго молока; тогда давать *Пуль-*

сам. 3 и позаботиться о лучшемъ молокѣ. Если же причина рвоты слишкомъ сильное качаніе, то должно это оставить, а ребенку дать *Роккулусъ 3*. См. еще стр. 206.

Запоръ у новорожденныхъ.

Въ виду того, что пищевареніе у новорожденныхъ значительно отличается отъ пищеваренія у взрослыхъ, то и испражненія у нихъ чаще, не менѣе двухъ разъ въ сутки. Если же оно происходитъ рѣже, то слѣдуетъ прибѣгнуть къ помощи клизмы. Дѣлать ее нужно изъ тепловатой воды, или молока и немножко меду, или же прибавивъ мыла и прованскаго или миндальнаго масла. Не слѣдуетъ однако слишкомъ часто ставить клистиры, ибо дѣти привыкають къ нимъ и ужъ не могутъ иначе испражняться. Внутрь давать 1 — 2 раза въ сутки *Сульф. 3* или *Нуксъ-вом. 3*; если не помогаетъ, то попеременно съ *Бріон. 3*.

Поносъ у новорожденныхъ.

До появленія зубовъ испражненія ребенка бываютъ вообще жидки и часты (3—4 раза въ день). Если же они появляются чаще, то это служить доказательствомъ какого нибудь расстройства. Большею частью причиной поноса служить простуда, причиняемая нерѣдко неразумными матерями или кормилицами, когда онѣ вынимають ребенка голенькаго изъ теплой постельки, не завернувъ его въ теплое одѣяльце. Дальнѣйшей причиной бываетъ переполненіе желудка, нездоровое молоко матери или кормилицы, плохое молоко коровье, особенно если таковое доставляется съ фермъ, гдѣ коровъ кормятъ брагой, общая слабость ребенка, прорѣзываніе зубовъ, неудобоваримая пища, наконецъ, злоупотребленіе слабительными.

Противъ поноса показаны слѣдующія лѣкарства. *Хамомила 3*: испражненія похожи на рубленныя яйца, водянисты, слизисты, зеленоваты; при большомъ безпокойствѣ ребенка, при урчаньи въ животѣ и притягиваніи ребенкомъ ножекъ къ животу, или испражненія имѣють запахъ гнилыхъ яицъ. — *Ипекакуана 3*: если *Хамомила* въ день-два не помогаетъ, особенно же при блѣдномъ лицѣ, синихъ кругахъ подъ глазами. — *Реумъ x 3*: попеременно съ *Хамомила*, при очень кисломъ запахѣ испражнений. — *Меркур. солуб. 6*: при шумномъ и порывистомъ (внезапномъ) поносѣ кровянистаго или бѣлаго цвѣта, при изъязвле-

ни задняго прохода.—*Арсен.-альб. З.* попеременно съ *Меркур.*, при большой слабости ребенка, холодной кожѣ, особенно холодныхъ членахъ, при совершенно водянистыхъ испражненіяхъ. — *Пульсат. З.* при жирномъ молокѣ, производящемъ одновременно разстройство мочеиспусканія.

Поносы у новорожденныхъ часто вызываются молокомъ отъ коровъ, получающихъ кислый кормъ. Тогда слѣдуетъ послѣдній переменить. Кромѣ того вредны для маленькихъ дѣтей всякіе сухарики, булочки, сладости, которыхъ слѣдуетъ совершенно избѣгать. Кормящая мать или кормилица должны отказаться отъ ѣды всего того, что, перейдя въ молоко, можетъ повредить ребенку. Подобные поносы никогда не излѣчиваются, если продолжать питаніе молокомъ. Слѣдуетъ давать нежирные супы съ овсянкой, манной, или салепомъ, или аррорутъ на водѣ съ сахаромъ, или эмульсію изъ яичнаго желтка до тѣхъ поръ, пока испражненія въ теченіе сутокъ будутъ нормальны, затѣмъ только опять молоко съ примѣсью ежедневно 2 ложечекъ Гумми-арабик.

Выпаденіе заднепроходной кишки у новорожденныхъ—см. стр. 251.

Разстройство мочеиспусканія у новорожденныхъ.

Задержаніе мочи и болѣзненное мочеиспусканіе проходятъ отъ *Акон. З.*; если этого недостаточно, даютъ *Пульсат.*; при крикѣ ребенка во время мочеиспусканія—*Кантарисъ З.*

Обопрѣлость у новорожденныхъ.

У новорожденныхъ часто замѣчается обопрѣлость въ мѣстахъ, гдѣ имѣются складки кожи, какъ-то, на шейкѣ, межъ ножками и подъ колѣнцами. Обопрѣлость сама по себѣ не опасна, но при небрежности она можетъ захватить большое пространство и дойти до изъязвленія кожи. Во избѣжаніе этого, самое радикальное средство—чистота: необходимо какъ можно чаще наблюдать за тѣмъ, чтобъ ребенокъ лежалъ сухо, всегда въ свѣжихъ, чистыхъ пеленкахъ. Всякіе порошки, присыпки должны быть совершенно устранены, особенно-же мази, такъ какъ онѣ причиняютъ нерѣдко большой вредъ.

Нужно послѣ cadaго купанья обмыть обопрѣлыя мѣста прохладной (18° Р.) водой, выжимая ее изъ губки, затѣмъ осторожно разнять складки кожи и прижать тонкой полотняной тряпоч-

кой, отнюдь не вытирая, а только прикладывая, затѣмъ положить немного гигроскопической ваты. Внутрь давать *Меркур. солуб. 6*. При ссаднении задняго прохода, вслѣдствие остраго поноса, давать *Арсен.-альб. 3*. При появлении просовидной сыпи—*Сульф. 3* (см. „Экзема“).

Приращеніе языка у новорожденныхъ.

Нерѣдко приходится наблюдать, что у новорожденнаго язычекъ не совсѣмъ свободно двигается, что особенно замѣтно при сосании. Происходитъ это отъ слишкомъ короткой уздечки подъ язычкомъ. Если этотъ недостатокъ на столько выраженъ, что ребенокъ совсѣмъ не можетъ сосать, то слѣдуетъ предоставить врачу сдѣлать надрѣзъ. Но если ребенокъ все таки сосать въ состояніи досыта, то лучше не трогать его, а предоставить природѣ самой выровнять этотъ маленький недостатокъ, тѣмъ болѣе, что надрѣзать никогда не поздно, тогда какъ слишкомъ глубокій надрѣзъ, сдѣланный неумѣлой рукой, ведетъ въ послѣдствіи къ шепелявости, не говоря ужъ о возможности обильнаго кровотеченія.

Опухоль на головѣ у новорожденныхъ.

При слишкомъ большой продолжительности родовъ на предлежащей части головки новорожденнаго образуется, вслѣдствие затека, мягкая опухоль, которая черезъ нѣкоторое время проходитъ обыкновенно сама собою. Для ускоренія этого полезно прикладывать къ опухоли тепловатыя примочки изъ раствора *Арника 0* или *Гиперикумъ 0* (чайная ложечка на стаканъ воды.)

Болѣзни полости рта—см. стр. 170 и пр.

V. Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ. *)

Тутъ разсматриваются главнымъ образомъ такъ называемыя венерическія болѣзни: гоноррея (трипперъ), шанкръ и сифилисъ. Кроме того—еще нѣкоторыя половыя разстройства у мужчинъ.

*) Дополненіемъ къ этой статьѣ можетъ служить отдѣльная брошюра, („Трипперъ, Шанкръ и Сифилисъ во всѣхъ видахъ и формахъ“) составленная авторомъ этого лѣчебника и изданная въ 1909 году. Цѣна ея 50 коп. съ пересылкой 61 коп.).

Мужские половые органы состоятъ изъ железистыхъ органовъ, производящихъ производительное вещество (сѣменную жидкость, сперма), именно — яичекъ и ихъ придатковъ, и изъ снарядовъ, выводящихъ это вещество; наружные отдѣлы этихъ снарядовъ суть органы совокупления. Яички и придатки ихъ заключены въ мошонку. Нижний конецъ придатка, загнѣваясь вверхъ, переходитъ въ сѣменной протокъ, который, будучи заключенъ въ сѣменной канатикъ, восходитъ вверхъ къ паховому каналу и далѣе къ задней поверхности мочевого пузыря. у дна послѣдняго оба сѣменные протока сближаются посрединѣ и соединяются съ выводными протоками сѣменныхъ пузырьковъ, образуя выбрасывающіе протоки: послѣдніе прободаютъ предстательную железу и открываются на сѣменномъ бугоркѣ въ мочеиспускательный каналъ. Сѣменные пузырьки суть трубкообразные полые органы и находятся между основаниемъ пузыря и прямой кишкой по наружной поверхности сѣменныхъ протоковъ, съ которыми соединяются ихъ выводные протоки. Предстательная железа (прѣстата), плоской формы, длиною около дюйма, шириною немного меньше, лежитъ впереди прямой кишки у основанія мочевого пузыря, обхватывая начальную (внутреннюю) часть полового члена. Въ половомъ (мужскомъ) членѣ различаютъ корень, прилегающій къ лонной части таза, среднюю часть или тѣло и передній конецъ—головку. Основу члена составляютъ губчатая или пещеристая тѣла, изъ которыхъ одно окружаетъ мочеиспускательный каналъ и находится посрединѣ, оба же другія составляютъ боковыя части члена. Край головки члена называется вѣнчикомъ ея, а непосредственно находящаяся круговая борозда—шейкой головки. Кожа члена отличается большою подвижностью и полнымъ отсутствіемъ подкожнаго жира; при переходѣ на головку она образуетъ длинную складку—крайнюю плоть (препуцій), окружающую головку со всѣхъ сторонъ. Крайняя плоть и головка соединены между собою посредствомъ складки—такъ наз. уздечки плоти. Внутренняя поверхность крайней плоти, а также шеика головки, снабжены сосочками и салными железами, выдѣляющими творожистую неприятнаго запаха смазку—смагму (у евреевъ и магометанъ обрядъ „обрѣзанія“ состоитъ въ удаленіи крайней плоти мужского члена) Въ отношеніи болѣзней мужского мочеиспускательнаго канала практически важно знать отдѣльные участки послѣдняго. Мужской мочеиспускательный каналъ (уретра) беретъ свое начало изъ нижняго отдѣла мочевого пузыря (пузырное устье уретры) и тутъ же вѣдѣрется въ предстательную железу (простатовая часть), проходитъ затѣмъ на нѣкоторомъ протяженіи между мышцами (перепончатая часть уретры) и подъ лонною дугою проникаетъ въ свое пещеристое тѣло (пещеристая часть уретры), проходитъ черезъ головку члена (головчатая часть) и оканчивается отвѣсною щелью (кожное отверстіе канала) на верхушкѣ ея. Начиная съ пузырянаго устья, мочеиспускательный каналъ постепенно суживается до перепончатой части, въ началѣ же пещеристой части представляетъ расширение нижней стѣнки; отсюда каналъ ужъ не измѣняется въ толщинѣ до головки, въ которой опять имѣется расширение на нижней (задней) стѣнкѣ (ладьеобразная ямка). Мочеиспускательный каналъ выстланъ слизистой оболочкой со множествомъ продольныхъ складокъ и маленькихъ слизистыхъ железокъ.

1. Перелой (Трипперъ. Гоноррея.) *).

**Симптомы
и теченіе
болѣзни.**

Перелой происходитъ вслѣдствіе зараженія специфической трипперной матеріей. Болѣзнь обнаруживается спустя 1—3—8 дней послѣ заразнаго совокупленія. Вначалѣ появляется щекочущее ощущеніе въ отверстіи канала, а затѣмъ начинается выдѣляться изъ него бѣловатожелтая или зеленоватая слизь. Вскорѣ присоединяется боль или рѣзь при мочеиспусканіи, также жженіе въ каналѣ. Больные жалуются часто на крайне болѣзненные по ночамъ эрекціи (напряженія члена). Спустя 1—2 недѣли послѣ начала заболѣванія боли мало по малу уменьшаются, а выдѣленіе изъ канала продолжается еще нѣкоторое время, недѣли двѣ, послѣ чего также становится все меньше и меньше, и наконецъ къ 4—6 недѣлѣ совсѣмъ исчезаетъ. Это обыкновенное теченіе часто нарушается неправильнымъ лѣченіемъ или погрѣшностями въ образѣ жизни, и описанная острая форма триппера переходитъ въ хроническую, въ такъ называемый послѣдовательный, х р о н и ч е с к і й т р и п п е р ь, который можетъ продолжаться еще много недѣль и даже лѣтъ, или же болѣзнь осложняется воспаленіемъ паховыхъ железъ (б у б о н ь), катарромъ мочевого пузыря, кровотеченіями изъ мочевого канала, воспаленіемъ и опуханіемъ яичекъ, воспаленіемъ предстательной железы, опуханіемъ крайней плоти въ такой степени, что она либо не оттягивается за головку (ф и м о з ь, „н е з а л у п а“), либо же, будучи оттянута, защемляется за головкой, и не можетъ быть снова на нее надвинута (п а р а ф и м о з ь, „у д а в к а“); наконецъ, встрѣчаются еще трипперное изъязвленіе самой головки и бородавчатые на ней наросты (к о н д и л о м ы), суженіе мочевого канала (с т р и к т у р а). Если трипперная матерія попадетъ какимъ нибудь образомъ въ глазъ, то въ послѣднемъ появляется перелойное воспаление, болѣзнь крайне опасная для глаза.

Возбудителями гонорреи являются гонококки, которые имѣются всегда въ гоноррейномъ выдѣленіи и опредѣляются особымъ способомъ посредствомъ микроскопа. Для изслѣдованія берется нѣсколько капель выдѣленія, а если послѣдняго очень мало, то—первая порція мочи въ количествѣ нѣсколькихъ кубическихъ сантиметровъ, откуда выуживаются обрывки, нити. Въ каждомъ случаѣ гонорреи, до тѣхъ поръ, пока не исчезнутъ совершенно гонококки, не можетъ

*) О перелой у женщинъ сказано при женскихъ болѣзняхъ. Внутреннее лѣченіе одинаково при перелой какъ мужчинъ, такъ и женщинъ.

быть рѣчи о достигнутомъ излѣченіи, до тѣхъ поръ трипперный больной заразить женщину при половомъ сношеніи. Большая часть женскихъ болѣзней берется, именно, отъ этой причины.

Уничтожить гонококковъ въ самомъ началѣ ихъ развитія не представляется возможнымъ даже впрыскиваніемъ въ каналъ крѣпкого раствора ляписа и т. п. При рѣшеніи вопроса, спринцевать ли вообще и какимъ способомъ это дѣлать, или вовсе воздерживаться отъ спринцеванія, принимается во вниманіе въ острыхъ случаяхъ, имѣется ли воспаленіе передней, т. е. пещеристой части канала (передній уретритъ) или задней, т. е. перепончатой части (задній уретритъ), находящейся между пещеристой частію и мочевымъ пузыремъ и заключающей въ себѣ устья сѣменныхъ протоковъ и предстательной железы; когда въ эту заднюю часть канала попадаютъ и развиваются гонококки, тогда получается источникъ всевозможныхъ осложненій этой болѣзни.

Имѣется простой способъ для распознаванія того, имѣется ли задній уретритъ или нѣтъ, это — проба съ двумя стеклянками. Больной выпускаетъ первую болѣе обильную порцію мочи въ одну стеклянку и затѣмъ, удержавъ въ себѣ мочу на нѣсколько секундъ, выпускаетъ нѣкоторое количество второй порціи въ другую стеклянку. Если вторая моча чистая, тогда какъ первая мутная, то задняго уретрита нѣтъ; если же и вторая порція мутная, то задній уретритъ имѣется.

Передній уретритъ поддается гораздо легче и скорѣе излѣченію, нежели задній.

При уретритѣ, пока имѣются острые воспалительныя явленія, надо отъ спринцеваній воздерживаться и принимать лишь внутрь *Аконитъ* $\times 3$ (въ самомъ началѣ) и *Белладонна* $\times 3$ — *Меркурій корроз.* $\times 3$ (попеременно съ Беллад.), когда имѣется болѣзненная припухлость члена или крайней плоти. — *Каннабисъ индика 1*: при болѣзненномъ напираніи на мочу или при гнущей боли во время мочеиспусканія. — *Кантарисъ* $\times 3$ (вмѣсто Каннабисъ), когда боль при мочеиспусканіи сильно колющая, жестокая, невыносимая, также при болѣзненныхъ эрекціяхъ; послѣднія служатъ часто причиной перехода болѣзни въ заднюю часть уретры. *Пульсатиалла* $\times 2$: при болѣе умѣренныхъ симптомахъ и незначительныхъ явленіяхъ раздраженія (попеременно съ *Меркур. солуб.* $\times 3$). — *Гепаръ сульф.* 3 : послѣ 8—10-го дня болѣзни, когда острые явленія раздраженія прошли, но гнойное истеченіе не прекращается.

Лѣченіе
остраго
перелоя.

**Дієта
при остр.
перелетѣ.**

При такомъ лѣченіи острый трипперъ принимаетъ обыкновенно благопріятное теченіе и кончается въ 4—5 недѣль выздоровленіемъ и безъ всякихъ спринцеваній, если только больной соблюдаетъ должную дієту и не предается никакимъ излишествамъ. Онъ долженъ избѣгать въ пищу всякихъ раздражающихъ веществъ, къ которымъ относятся: перецъ, горчица, рѣдька, лукъ, чеснокъ, петрушка, сельдерей, кислая пища, острые сыры, колбасы, копченое мясо, соленья; эрекціямъ могутъ способствовать яйца, икра, устрицы, спаржа, трюфели, и поэтому ихъ надо избѣгать при трипперѣ; избѣгать также кофе и крѣпкаго чая и совершенно воздерживаться отъ всякихъ спиртныхъ напитковъ. Пить можно такимъ больнымъ молоко, лимонадъ; особенно полезенъ отваръ льняного сѣмени; вообще, однако, пить немного, такъ чтобы не требовалось болѣе 3—4 разъ въ день мочиться.

Образъ жизни надо вести возможно болѣе спокойный, меньше ходить, не ѣздить верхомъ или на велосипедѣ.

Спринцеванія.

Если къ 3—4-ой недѣлѣ выдѣленіе изъ канала еще довольно замѣтное, то можно съ пользой примѣнять спринцеваніе, для каковой цѣли употребляются вяжущіе и дезинфицирующие растворы. Если имѣются гонококки, то наиболѣе цѣлесообразенъ растворъ *Протаргола*. Начинаютъ $\frac{1}{4}\%$ -ымъ растворомъ, 1—2 раза въ день и каждый разъ 2 впрыскиванія подъ рядъ: при первомъ впрыскиваніи удерживать растворъ въ каналѣ минутъ 5, при второмъ—минутъ 10. Впрыскиваніе производится, сидя, обычной трипперной спринцовкой; предварительно надо помочиться. Въ упорныхъ случаяхъ растворы протаргола берутся болѣе крѣпкіе: $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ — 1% , но только въ томъ случаѣ, если не имѣется явленій раздраженія. Въ послѣднемъ случаѣ лучше дѣйствуютъ растворы: изъ азотнокислаго висмута и резорцина по полдрахмѣ на 3 унціи воды, или сѣрнокислаго цинка или хлористаго цинка ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ — 1%) и т. п., также изъ *Календула* Θ , *Гидрастисъ* Θ (1 — 2%).

Съ 4—5 недѣли умѣстны *Туя* 1, попеременно съ *Меркуръ* солѣб., также *Силиція*, *Сенія*, *Сульфуръ*. Въ болѣе упорныхъ случаяхъ, именно при хроническомъ трипперѣ, показаны: *Копайва* $\times 3$, *Матико* $\times 1$, *Мезереумъ* $\times 3$, *Ацид. нитрик.* $\times 3$, *Сап-сапарилла* и др. (см. ниже — осложненія); при обостреніяхъ хроническаго триппера лѣченіе такое же, какъ при острой формѣ его.

При заднемъ уретритѣ (см. выше) показаны спринцеванія болѣе глубокія, которыя должны производиться опытнымъ врачомъ, а не самимъ больнымъ.

Внутреннее лѣчение то же, что при переднемъ уретритѣ. Во всѣхъ случаяхъ триппера необходимо съ самаго начала носить суспензорій для предупрежденія заболѣванія яичекъ.

Осложненія триппера.

Воспаленіе придатка яичекъ. Эпидидимитъ. Начинается лихорадочнымъ состояніемъ. Выдѣленіе изъ канала прекращается. Придатокъ опухаетъ, онъ твердъ и болѣзненъ. Воспаленіе поражаетъ часто одновременно и оболочку яичка. Лихорадочный жаръ спустя нѣсколько дней проходитъ, припухлость же и затвердѣніе лишь медленно проходятъ, оставаясь часто въ одномъ положеніи мѣсяцами и годами. Возвраты и обостренія болѣзни часты. Поражается обыкновенно лишь одинъ придатокъ. При пораженіи обоихъ придатковъ является безплодіе. Само яичко рѣдко поражается этой болѣзнію.

Лѣчение: въ началѣ покой, холодные компрессы. Спринцеванія должны быть прекращены. Главныя лѣкарства — *Пульсатилла 1* и *Аписъ* $\times 3$. — При жарѣ: *Аконитъ* $\times 3$, *Беллад.* $\times 3$ и *Меркур.* солюб. 3. — При дальнѣйшемъ теченіи болѣзни: *Фитолакка 1*, *Клематисъ* $\times 3$, *Рододендронъ* $\times 3$. Противъ остающагося затвердѣнія: *Калькар. карб.*, *Калькарея іодата*, *Сульфур.*, *Аурумъ мур.* и *іодат*. — Ношеніе хорошо приложеннаго суспензорія. — Наружно можно примѣнять еще съ пользой масло белладонны, пульсатиллы, аписа.

Воспаленіе Куперовыхъ железокъ узнается по боли и затвердѣнію въ области промежности. Лѣчение: теплые компрессы, припарки, теплыя сидячія ванны, масло белладонны. Внутрь: *Белл.*, *Меркур.*, *Гепаръ*, *Силиція*, *Аписъ* и проч., какъ при нарывахъ. При нагноеніи можетъ потребоваться оперативное вскрытіе нарыва.

То-же лѣчение при воспаленіи въ другихъ мѣстахъ члена, напримѣръ — Тисонской железки у устья канала.

Воспаленіе предстательной железы. Железа увеличена, что узнается при изслѣдованіи пальцемъ черезъ задній проходъ. При остромъ воспаленіи она очень болѣзненна, не даетъ ни ходить, ни стоять, ни даже лежать на спинѣ съ протянутыми ногами. Всего лучше еще переносится лежаніе на боку съ согнутыми бедрами. Выдѣленіе мочи затруднено и болѣзненно. Болѣзненные позывы на низъ и сильная боль во время акта испраж-

ненія. Возможно и нагноеніе железы; теченіе болѣзни тогда очень бурное. Лѣченіе: *Беллад.* $\times 3$ (или *Атропин.* *сульф.* $\times 4$), *Сульфуръ* $\times 3$, *Меркур.* *солюб.* 3, *Гепар.* *сульф.* 6. При наступившемъ нагноеніи, о которомъ возвѣщаетъ потрясающій ознобъ, дается Гепаръ *сульф.* въ низкомъ дѣленіи. При образованіи нарыва не слѣдуетъ медлить съ искусственнымъ вскрытіемъ черезъ промежность.

При хроническомъ простатитѣ полезенъ бываетъ массажъ чрезъ прямую кишку, а внутрь: *Калькарея карб.*, *Іод.*, *Пульсат.*, *Селен.*, *Аурумъ*, *Сульфуръ*, *Туя*, *Фитолакка*, *Коніумъ* и проч.

Воспаленіе паховыхъ железъ при трипперѣ (трипперный бубонъ) рѣдко встрѣчается и никогда не ведетъ къ нагноенію. Лѣченіе то же, что при прочихъ воспаленіяхъ.

Папилломы или заостренные кандиломы, „чижи“ въ видѣ бородавчатыхъ разраженій. Они очень заразительны. Лѣченіе: смазываніе *Туя* Θ или *Сабина* Θ ; внутрь—*Туя* 3—6. Удаленіе хирургическимъ путемъ.

Трипперный ревматизмъ. Поражается преимущественно колѣнный суставъ съ окружающими его сухожиліями, съ мышцами и нервами. Лѣченіе: теплые компрессы, теплыя ванны, втираніе масла белладонны (въ видѣ легкаго массажа); внутрь: *Беллад.*, *Анисъ*, *Меркур.*, *Русъ*, *Бріонія*, *Туя*, *Силиція*, *Сульфур.*

Стриктура (сѣуженіе мочеиспускательнаго канала) требуетъ механическаго расширенія твердыми бужами при одновременныхъ пріемахъ внутрь *Клематисъ*, *Петролеумъ*, *Силиція*, *Барита карбоника*, *Ацид.* *флуорик.*

Общее трипперное состояніе организма, конституціональный трипперъ, Сикозъ Ганемана. Начинаясь уже триппернымъ ревматизмомъ, общій, конституціональный трипперъ можетъ знаменоваться цѣлымъ рядомъ болѣзненныхъ явленій со стороны различнѣйшихъ органовъ и тканей, въ томъ числѣ и нервной системы. Полученныя такимъ образомъ болѣзненные измѣненія и предрасположенія могутъ передаваться и потомству.

О дозахъ, способѣ пріемовъ и дѣленіяхъ см. ч. 1, гл. 3 и 4. **О дѣленіяхъ**—еще стр. 35—39.

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ откошеніи конституціональнаго триппера.

Аргент. *нитрик.* Застарѣлые катарры зѣва съ охриплостью. Бородавчатая новообразованія. Кондиломы. Утолщеніе

слизистой оболочки у голосовыхъ связокъ; параличъ голосовыхъ связокъ, безголосье.

Калькар. карб. и Генаръ сульф. Бѣлые, слизистые полипы въ гортани, безголосье, хриплость; пораженія кожи и слизистыхъ оболочекъ. Бородавки.

Ирисъ верзиколор. При трипперномъ ишіасѣ (также Коло-цинтъ).

Найя. При тяжелыхъ пораженіяхъ сердца вслѣдствіе триппернаго суставнаго ревматизма.

Кали бихромик. Зловонный насморкъ съ желтовато-зеленымъ выдѣленіемъ изъ носа и носоглотки. Ощущеніе сильной сухости въ носу. Ревматическія боли облегчаются въ теплой комнатѣ.

Меркур. солуб. Воспаленіе глазъ. Воспаленіе головки полового члена; зеленоватое истеченіе изъ канала. Ухудшеніе ревматизма отъ потѣнія и постельной теплоты.

Натр. сульфурик. Разстройства нервныя и душевныя. Зудъ тѣла по вечерамъ. Пораженія кожи, особенно на рукахъ, на ладоняхъ; пузырьчатая сыпь. Сикозъ подбородка. Ухудшеніе по утрамъ, ухудшеніе отъ холоднаго воздуха. Поносъ по утрамъ. Зеленыя выдѣленія изъ слизистыхъ оболочекъ. Боли затылка и позвоночника, рѣжущія, особенно между лопатками. Упорный бронхитъ, одышка, кашель съ обильной мокротой. Лѣкарству этому подобна Туя.

Ацид. нитрик. Подобно Туѣ при кондиломахъ. Изъязвленія съ разорванными краями; опуханіе миндалевидныхъ железъ на почвѣ триппера. Трещины задняго прохода (также Туя). Катарръ головки полового члена; жидкое зеленое истеченіе. Боли въ костяхъ (въ большомъ берцѣ, въ грудной кости, въ черепѣ). Малокровіе, общая слабость. Особенно, когда къ сикозу примѣшанъ и сифилисъ.

Стафизагрія. Кровоточивыя десны, порча зубовъ, выпаденіе ихъ. Мокнушіе, зудящіе лишай. Кондиломы. Угнетенность духа. Костные симптомы. Вонючій потъ.

Каустик. Золотушныя явленія, преимущественно — кожи; ревматизмъ, съ укороченіемъ сухожилій; охриплость.

Пульсатилла. Противъ послѣдствій заглушеннаго триппера. Ревматизмъ съ ухудшеніемъ ночью, въ тепломъ помѣщеніи и улучшеніемъ на вольномъ воздухѣ. Придавленность духа. Катарры глазъ гоноррейнаго происхожденія у дѣтей.

Силиція. Одышка съ отдѣленіемъ обильныхъ мокротъ, ослизненіе груди. Подобно Натр. сульфурик. Блѣдное восковидное

лицо, малокровіе, большая слабость, жажда. Дѣйствуетъ въ такихъ случаяхъ глубже, нежели Арсеникъ. При застарѣломъ сикозѣ или у дѣтей сикозныхъ родителей. Астматическіе припадки вслѣдствіе вогнаннаго внутрь триппера. Малѣйшее напряженіе вызываетъ сильную усталость.

Сульфур.—подобно Силиціи.

Сарсапарилла. При хроническихъ заболѣваніяхъ на почвѣ смѣшанной порчи крови: сикоза, сифилиса, чесотки (псоры). Преобладаніе нѣкоторыхъ поражений, особенно мокнущаго характера.

Манганумъ. Особенно при ревматическихъ страданіяхъ ногъ и колѣнъ. Крапивоподобныя сыпи.

2. Мягкій шанкръ.

Особенности
болѣзни

Представляетъ собою язву, имѣющую заразительное свойство до тѣхъ поръ, пока изъ нея выдѣляется матерія. Язва эта можетъ появиться не только на половомъ органѣ, но и на всякомъ другомъ мѣстѣ тѣла при попаданіи шанкернаго яда въ ссадину или ранку или т. п. поврежденное мѣсто кожи или слизистой оболочки. Обыкновенно же шанкръ появляется на половыхъ частяхъ путемъ зараженія при совокупленіи, особенно когда на нихъ имѣются ссадины и т. п. До тѣхъ поръ, пока мягкій шанкръ протекаетъ безъ осложнений, онъ является лишь мѣстной болѣзнію. Перенесшій разъ мягкій шанкръ можетъ вновь его получить при повторномъ зараженіи. Мягкій шанкръ можетъ быть одновременно съ трипперомъ и сифилисомъ. Мягкій шанкръ, зараженный сифилитическимъ ядомъ (при совокупленіи съ сифилитической особой), можетъ превратиться въ твердый, или же послѣдній обнаруживается послѣ заживленія перваго; это — формы смѣшаннаго шанкра.

Признаки
и теченіе.

Мягкій шанкръ обнаруживается на 2—3—4-ый день послѣ зараженія, но бываетъ, что и позднѣе—черезъ 14—30 дней, а потому для діагностики время появленія язвы не имѣетъ рѣшающаго значенія. Важнѣе въ этомъ отношеніи видъ язвы и теченіе болѣзни вообще. Язва глубока, воронкообразна, край рѣзко очерченъ, какъ бы изъѣденъ, нѣсколько подрытъ.

Язва, при полномъ ея развитіи, имѣетъ желтоватый или зеленовато-сѣрый, сальный видъ, и она болѣзненна; она кровоточитъ при нажатіи или при стираніи выдѣленія. Окружность близъ края язвы бываетъ нѣсколько затвердѣлой, но эта твердость от-

личается тѣмъ, что постепенно, безъ рѣзкихъ очертаній, переходитъ въ сосѣднюю здоровую ткань (противоположное—при твердомъ шанкрѣ). Въ большинствѣ случаевъ имѣется не одна мягкая язва, а одновременно двѣ и больше. Помѣщается язва чаще на крайней плоти, рѣже у отворстія канала (у женщинъ—на внутренней поверхности срамныхъ губъ или на задней спайкѣ влагалища). Заживленіе шанкерной язвы происходитъ путемъ постепеннаго рубцеванія.

Осложненія при мягкомъ шанкрѣ суть слѣдующія:

Язва можетъ распозаться вширь и вглубь (разъѣдающій или фагеденический шанкръ) или поразиться антоновымъ огнемъ (омертвѣлый или гангренозный шанкръ); язва можетъ принять и видъ дифтеритическій. Когда язва помѣщается у уздечки члена, то имѣется опасность разъѣденія проходящей здѣсь артеріи съ кровотеченіемъ изъ послѣдней.—Далѣе, можетъ развиваться фимозъ или парафимозъ, равно какъ воспаленіе головки члена (баланитъ). Часто наблюдается осложненіе воспаленіемъ паховыхъ железъ (бубонъ), вызываемое мѣстнымъ раздражающимъ лѣченіемъ язвы или такими механическими причинами, какъ сдавливаніе или треніе объ узкіе брюки, чрезмѣрное хожденіе или ѣзда на велосипедѣ и т. п.; къ причинамъ осложненій относятся также половыя сношенія во время болѣзни и употребленіе спиртныхъ напитковъ. Бубонъ мягкаго шанкра переходитъ часто въ нагноеніе.

Меркур. корроз. есть главное лѣкарство, которымъ вполне и скоро излѣчивается мягкій шанкръ; даютъ его въ 3-емъ десятичномъ дѣленіи, въ порошковомъ видѣ или въ капляхъ, три раза въ день. Язву надо содержать въ крайней чистотѣ, ежедневно обмывать тепловатой водой и мыломъ; очень полезно также купать ежедневно, 2 раза, дѣтородный членъ въ тепловатой водѣ (для женщинъ—обмыванія), въ которой растворяютъ *Календула* (тигистуру, въ пропорціи чайной ложечки на стаканъ), или дѣлаютъ согрѣвающие компрессы изъ того же раствора. *Календула* дѣйствуетъ въ данномъ случаѣ лучше раствора сулемы, карболки или присыпки іодоформомъ и т. п. При воспаленіи (краснотѣ и опухлости вокругъ язвы) дается еще *Беллад.* $\times 3$, помимо Меркурія. Если бы оказалось, что Меркур. корроз. въ теченіе 2 недѣль не далъ значительнаго улучшенія, то даютъ *Ацид. нитр.* 1— $\times 3$, особенно при разъѣдающей язвѣ, а спустя недѣлю можно опять перейти къ меркуріальнымъ препаратамъ, а именно къ *Циннабарису* $\times 2$ или *Мер-*

Осложненія
мягк. шанкра.

Лѣченіе
мягк. шанкра.

кур. преципит. руберъ × 3.—Полное излѣченіе мягкаго шанкра достигается въ 6—8 недѣль.

При разѣдающемъ и гангренозномъ шанкрѣ, если отъ повторнаго примѣненія меркуріальныхъ лѣкарствъ не получается замѣтнаго улучшенія, переходятъ опять къ *Ацид. нитр.*, попеременно съ *Арсеник. 3.* или *Хинин. арсеникоз. × 4.* и принимаютъ 2—3 недѣли подъ рядъ, по 2—3 приѣма въ день. Послѣ того, вмѣсто *Ацид. нитр.*, *Ацид. флуорик. 3.* также *Секале*, *Лаксизсъ*, *Карбо вегетабилисъ*.—При бубонѣ лѣченіе такое же, какъ при воспаленіи лимфатическихъ желѣзъ вообще (см. стр. 389).

3. Твердый шанкръ. Сифилисъ.

Признаки и
теченіе.

Твердый шанкръ, въ видѣ первичной язвы, является спустя 17—21 день послѣ происшедшаго зараженія специфическимъ сифилитическимъ ядомъ, послѣ проникновенія послѣдняго въ кожу и слизистую оболочку черезъ совсѣмъ, быть можетъ, незамѣтную ссадину или ранку. На мѣстѣ зараженія образуется плоскій бугорокъ, который изъязвляется и выдѣляетъ не гнойную, какъ при мягкомъ шанкрѣ, а мутную, клейкую жидкость, ссыхающуюся въ корку. Твердый шанкръ не болѣзненъ самъ по себѣ. Не болѣзненны и опухающія при этомъ железы въ паху. Опухшія железы при твердомъ шанкрѣ тверды и очень рѣдко нагнаиваются. Съ опуханіемъ желѣзъ начинается нарушаться и общее состояніе здоровья больного. Являются головныя боли, тяжесть въ членахъ; затѣмъ чечевичеобразная сыпь на кожѣ, часто и мокнущіе лишай съ образованіемъ корокъ на кожѣ головы, также боль въ зѣвѣ и языкѣ съ затрудненнымъ глотаніемъ. Но сифилисъ слѣдуетъ уже съ самаго начала болѣзни считать общимъ заболѣваніемъ. Первичное затвердѣніе надо поэтому считать и первымъ видимымъ признакомъ общаго сифилиса. Попытки удаленія этого затвердѣнія, и даже паховыхъ желѣзъ, оперативнымъ путемъ не предупреждали общаго зараженія. Первичная язва бываетъ всегда лишь въ единственномъ числѣ, а не въ двойномъ или множественномъ, какъ при мягкомъ шанкрѣ. Всѣ первоначальныя явленія сифилиса проходятъ постепенно при надлежащемъ лѣченіи и правильномъ образѣ жизни, для чего требуется отъ 1½ до 2 лѣтъ. Первичная язва заживаетъ, не оставляя послѣ себя никакого рубца, остается развѣ лишь темноватое пятно. Дальнѣйшія вспышки болѣзни, именно на кожѣ и слизистыхъ оболочкахъ (вторичный періодъ), повторяются

обыкновенно через каждые приблизительно 3 мѣсяца, болѣзнь имѣетъ какъ бы перемежающійся характеръ. При лѣченіи ртутью эти вспышки становятся все менѣе значительными, здоровые промежутки все болѣе удлиняются, и къ концу третьяго года можно считать болѣзнь излѣченной. Разъ перенесшій сифилисъ повторно имъ не заболѣваетъ.

Если во вторичномъ періодѣ сифилисъ не излѣченъ, то наступаетъ третичный періодъ съ болѣе серьезными разстройствами; не смотря на то, болѣзнь въ этомъ періодѣ не имѣетъ уже заразныхъ свойствъ. Разстройства въ третичномъ періодѣ не имѣютъ той періодичности, какъ во вторичномъ, а появляются какъ попало или вовсе безъ перерыва. Бываетъ и такъ, что сифилисъ очень долгое время, длинный рядъ лѣтъ, находится въ скрытомъ состояніи и затѣмъ обнаруживается самыми тяжелыми третичными формами. Такъ, онъ производитъ разрушенія въ мягкихъ частяхъ рта, зѣва, носа, гортани; появляются сифилитическія измѣненія въ глазахъ, особенно въ радужной и сосудистой оболочкахъ; или сифилисъ поражаетъ кости, особенно черепныя; при этомъ образуются утолщенія костей, сопровождающіяся сильнѣйшей болью и, предоставленныя собственной участи, нагнаиваются и разрушаются (костоѣда); происходитъ западаніе носа, прободеніе нѣба и т. д. Затѣмъ слѣдуютъ сифилитическія измѣненія въ суставахъ, въ печени, въ головномъ и спинномъ мозгу, въ яичкахъ, въ мышцахъ, причиняющія жестокія страданія и ведущія къ полному разрушенію организма, также къ сифилитическому истощенію (кахексіи).

Въ новѣйшее время нашли, что въ тканяхъ и органахъ сифилитиковъ третичнаго періода водятся особаго рода бациллы, такъ называемые спирохеты. Находясь долгое время въ скрытомъ, недѣятельномъ состояніи, спирохеты, по неизвѣстной причинѣ, становятся дѣятельными, разрушительными. Способствующими обстоятельствами считаются тутъ алкоголизмъ, малярія, упадокъ питанія, туберкулезъ. Окажутся ли спирохеты дѣйствительными возбудителями третичныхъ, отчасти и вторичныхъ, какъ полагаютъ, сифилитическихъ измѣненій, покажетъ будущее. Пока же не во всѣхъ случаяхъ несомнѣнныхъ сифилитическихъ измѣненій находятъ спирохетовъ. Извѣстно же, что раньше, до спирохетовъ, выставлялись, какъ возбудители сифилиса, разные микроорганизмы, которые сходили со сцены подъ вліяніемъ критики; сюда относятся: тѣльца Лестофера, смегмобациллы Лустгарта, ложнодифтеритическія ба-

Спирохеты.

циллы Пюрковскаго и др. Впрочемъ, спирохеты имѣютъ за собою гораздо болѣе подтверждающихъ данныхъ.

О реакціи
Вассермана.
и „606“.

Дальнѣйшимъ приобрѣтеніемъ новѣйшаго времени въ распознаваніи сифилиса является серодіагностика Вассермана. Реакціей Вассермана возможно опредѣлить имѣющійся сифилисъ даже въ случаяхъ клинически-сомнительныхъ. Въ случаѣ положительности результата, реакція эта указываетъ на сифилисъ несомнѣнно, и въ этомъ ея серьезное значеніе, но отрицательный результатъ еще не служитъ достаточнымъ доказательствомъ отсутствія сифилиса, такъ какъ и такой результатъ возможенъ у сифилитиковъ. Поэтому, отрицательный результатъ Вассермановской реакціи не можетъ служить порукой, что сифилисъ излѣченъ. Вассермановской реакціей, принятой всѣмъ врачебнымъ міромъ, доказано, что сифилисъ можетъ существовать въ скрытномъ состояніи, выступая лишь подъ маской какой либо другой болѣзни.

Этому училъ 100 лѣтъ тому назадъ Ганеманъ, духомъ своимъ чувшій ту истину, для познанія которой цѣлому ряду поколѣній врачей нужны были столѣтнія изысканія. Теперь мы видимъ, какъ несправедливы были врачи, называвшіе въ теченіе десятковъ лѣтъ его ученіе о латентности сифилиса презрительнымъ словомъ „Ганемановщина“, а врачей, признававшихъ это ученіе, безмозглыми послѣдователями его. Между тѣмъ сколько выиграло бы человечество въ здоровьи своемъ, если бы уже давно, до Вассермановской реакціи, врачи слѣдовали ученію Ганемана! И такъ во всемъ, касающемся болѣзни, а не только сифилиса, прежде же всего въ отношеніи лѣченія сифилиса, этого по истинѣ бича человечества. Тогда ясно было бы уже давно, что, исходя изъ закона подобія, нельзя примѣнять при сифилисѣ въ большихъ дозахъ ртуть и іодъ, такъ какъ въ такихъ дозахъ лѣкарства эти только ухудшаютъ болѣзнь, разрушая въ то же время больной организмъ. Это ясно и съ точки зрѣнія спирохетовой. Если ртуть убиваетъ спирохетовъ, то, безъ сомнѣнія, насыщеніе организма этимъ веществомъ давало бы наилучшіе результаты. Но этого отнюдь на дѣлѣ не бываетъ. Наоборотъ, слишкомъ часто мы видимъ возвраты (рецидивы) сифилиса какъ разъ во время или непосредственно послѣ ртутнаго лѣченія, притомъ въ наихудшей формѣ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не жалѣли ртути. Это доказываетъ, что лѣченіе это не только не излѣчиваетъ, но еще ослабляетъ присущую организму исцѣляющую самостоятельность (способность самообороны) въ борьбѣ съ болѣзнію. И это привело къ тому, что въ господствующей школѣ врачей стали давать сифилитикамъ ртуть лишь со времени появленія сыпи, на что ужъ можно смотрѣть какъ на маленькій шагъ въ сторону гомеопатическаго лѣченія и гомеопатическаго принципа. Лѣченіе препаратомъ „606“ претерпитъ, надо полагать, ту же эволюцію, что и ртуть, въ лѣченіи сифилиса. Въ „606“ главнымъ дѣйствующимъ веществомъ является препаратъ мышьяка (арсеник.) особаго состава; въ гомеопатии арсеникъ всегда примѣнялся съ пользой въ нѣкоторыхъ проявленіяхъ третичнаго сифилиса. Возможно, что „606“ окажется полезнымъ въ такихъ случаяхъ. Но что на дѣлѣ онъ пока далеко не оправдываетъ возлагающихся на него надеждъ, это мы

видимъ хотя бы изъ того, что врачи - аллопаты сплошь и рядомъ считаютъ нужнымъ рядомъ съ „606“ примѣнять и ртуть, и іодъ, и сѣрные ванны и проч. по прежнему обычаю. Мы же, гомеопаты, можемъ сказать относительно этого средства пока только одно: поживемъ, увидимъ, а до тѣхъ поръ будемъ примѣнять и при этой болѣзни только гомеопатическій методъ лѣченія, какъ наиболѣе дѣйствительный и цѣлесообразный.

При твердомъ шанкрѣ всего успѣшнѣе дѣйствуетъ *Кали-Лѣченіетверд.*
*іодат. 1, **) по 5 капель, 2 — 3 раза въ день, прибавляя черезъ *шанкра.*
каждые три дня по одной капль до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ размягченія отвердѣвшихъ частей, что совершается обыкновенно недѣли въ 3—4. Затѣмъ дается *Меркур.-іодат. × 3*, по 2 приема въ день, прибавляя черезъ каждые 3 дня по приему, до явнаго улучшенія, послѣ чего дозы постепенно, въ томъ же порядкѣ, уменьшаются, или же берется дѣленіе повыше ($\times 4$). Въ случаѣ чрезмѣрнаго дѣйствія ртути (мѣстное ухудшеніе или слюнотеченіе), слѣдуетъ на короткое время прекратить приемы его и вмѣсто него брать антидотъ ртути—*Гепаръ сульф. × 3*. Наружно не прикладывается ничего раздражающаго; цѣлесообразны же и благотворно дѣйствуютъ, напротивъ того, примочки и согрѣвающіе компрессы изъ раствора въ водѣ *Фитолакка Ө*, чайн. лож. на стаканъ, также *Туя*, *Гамamelисъ*, *Гидрастисъ*, *Календула* (особенно—при гангренозномъ шанкрѣ, при которомъ внутренно дается *Арсен. альб.*, *Секале корн.*, *Лазезисъ*, *Нитри ацид.* — см. выше при мягкомъ шанкрѣ).

Диѣта должна быть легкая, нераздражающая съ полнымъ исключеніемъ спиртныхъ напитковъ; необходимо избѣгать утомительныхъ движеній и физическихъ работъ для предупрежденія бубоновъ и осложнений.

При вторичномъ сифилисѣ съ наилучшими результатами примѣняется *Меркур. корроз.* тѣмъ способомъ, какой указанъ при мягкомъ шанкрѣ. Если же больной получалъ уже передъ тѣмъ ртуть въ большихъ дозахъ, и состояніе болѣзни не улучшилось, то даютъ *Кали іодат.* тѣмъ способомъ, какой указанъ при твердомъ шанкрѣ. Въ этомъ случаѣ лучше брать вмѣсто 1-го сотеннаго дѣленія 1-е десятичное въ видѣ водно-спиртнаго раствора: 1,0 іодистаго калия и по 4,5 воды и виннаго спирта; при-

**Лѣченіе
вторичнаго
сифилиса.**

*) Дѣленіе это цѣлесообразно приготовить не какъ чисто - водный растворъ, а беря воду и винный спиртъ по равной части, наприм. по 1 драхмъ, и растворяя въ полученной смѣси 1½ грана іодистаго калия, каковому раствору соотвѣтствуетъ приблизительно 1-е сотенное дѣленіе.

нимать, начиная съ 2 капель на разъ и увеличивая черезъ каждые 3 дня на 1 каплю, доходя до 10 капель на приѣмъ, и затѣмъ такимъ же порядкомъ обратно. Если же и это средство не дало бы, спустя недѣли три, замѣтнаго улучшенія, то переходятъ къ *Нитри ацид.* 1, черезъ 2 часа по приѣму.—При кондиломахъ то же лѣченіе; наружно ихъ смазываютъ *Туя* Θ или *Сабина* Θ .—При изъязвленіи или трещинахъ слизистой оболочки задняго прохода, угловъ рта или ноздрей: *Меркур. преципитатъ руберъ* $\times 2$, утромъ и вечеромъ по гомеопатической лопаточкѣ, и черезъ каждые 4—5 дней увеличивать дозу на полъ-лопаточки; наружно—мазь изъ этого же лѣкарства ($1/2^0/0$).—При сифилитическомъ пораженіи радужной оболочки: *Меркур. солуб.* $\times 3$, 3—4 приѣма въ день, а въ високъ втирать упомянутую меркуріальную мазь; кромѣ того *Беллад.* $\times 3$ внутрь.—При изъязвленіяхъ въ полости рта или носа превосходнымъ промежуточнымъ средствомъ является *Фитолакка* $\times 2$, а также полосканіе или промываніе носа воднымъ растворомъ *Фитолакка* Θ (чайная ложка на стаканъ воды).—При явленіяхъ третичнаго сифилиса на первомъ планѣ стоятъ іодныя лѣкарства (*Кали іодат.*), также меркуро-іодныя; *Меркур. биіодат.* и *-іодат.* Кромѣ того, особенно въ застарѣлыхъ случаяхъ, весьма важными лѣкарствами являются: *Арсеник.*, *Арсеникъ іодат.*, *Аурумъ муріат.*, *Аурумъ іодат.*, *Циннабарисъ*, *Кали бихромикъ.*, *Флуор. ацид.*, *Мезереумъ*, *Сарсапарилла* и др. Само собою разумѣется, что, кромѣ упомянутыхъ специфическихъ противъ сифилиса лѣкарствъ, приходится, во время лѣченія его, примѣнять еще лѣкарства промежуточные противъ побочныхъ или сопровождающихъ болѣзненныхъ явленій.

Лѣченіе
третичнаго
сифилиса.

Когда сифилитическія явленія проходятъ, слѣдуетъ выжидать, принимая лишь время отъ времени *Сульфуръ* и такія лѣкарства, какія показаны общимъ состояніемъ организма. При возвратѣ болѣзни берутъ опять прежнія лѣкарства, прежде всего меркуро-іодныя. Кромѣ того полезны ванны—паровыя, свѣтовые, солнечныя. Противъ позднѣйшихъ третичныхъ формъ главное лѣкарство *Іод.*, особенно при пораженіяхъ сердца, при гуммозныхъ опухоляхъ спинного мозга и нервовъ, при заболѣваніи костей и суставовъ, при разрушительныхъ кожныхъ процессахъ. Гепаръ сульф. есть антидотъ не только ртути, но и іода.

4. Наслѣдственный (врожденный) сифилисъ.

Если оба супруга сифилитики, то послѣдствія въ отношеніи потомства въ большинствѣ случаевъ слѣдующія. Первая беременность кончается выкидышемъ въ 3 — 4-омъ мѣсяцѣ; вторая — въ 7—8-омъ; третья—рожденіемъ недозрѣвшаго или слабаго ребенка, жизнеспособнаго или вскорѣ послѣ рожденія заболѣвающего сифилисомъ и умирающаго отъ него; четвертая беременность даетъ ребенка выношеннаго и крѣпкаго, но обнаруживающаго въ первомъ или второмъ мѣсяцѣ легкоизлѣчимыя сифилитическія явленія; пятая и шестая беременность ведутъ къ рожденію уже здоровыхъ дѣтей. Такъ же обстоитъ дѣло, когда лишь одна мать сифилитичка.

Когда же только отецъ сифилитикъ, тогда беременность можетъ протекать такъ, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда оба родителя (или же только мать) сифилитики. Чаше, однако, имѣются абортъ или рождаются слабыя дѣти, безъ видимыхъ признаковъ сифилиса, но скоро умирающія.

Самыми пагубными для потомства являются первые 3 года послѣ зараженія; чѣмъ дальше, тѣмъ опасность все болѣе уменьшается, но не всегда.

Женщина, беременная сифилитическимъ плодомъ (отъ сифилитика), обыкновенно и сама заболѣваетъ сифилисомъ, не всегда въ явной, а чаще въ скрытой формѣ. Серодіагнозъ рѣшаетъ этотъ вопросъ.

Прививочные опыты показали, что мать, кормящая своего сифилитическаго ребенка, можетъ это дѣлать безъ вреда для себя. Бываютъ, однако, часто случаи, что у такихъ матерей сифилитическія явленія обнаруживаются въ позднѣйшее время, по большей части, впрочемъ, легкія. Тутъ имѣется, стало быть, скрытая форма сифилиса.

Если женщина во время беременности заражается сифилисомъ, то опасность переноса на плодъ тѣмъ болѣшая, чѣмъ въ болѣе ранней стадіи беременности произошло зараженіе. Послѣ 5 мѣсяца опасности такого переноса уже нѣтъ, и родившійся не заражается отъ вскармливанія его грудью сифилитической матери. Наблюдаются, однако, и исключенія изъ этого правила.

При сифилитическомъ выкидышѣ плодъ пораженъ третичной формой этой болѣзни. Ребенокъ, родившійся живымъ, но уже съ явленіями сифилиса, имѣетъ старческій видъ и покрытъ блѣдно-

**Признаки
врожденного
сифилиса.**

желтой папулезной сыпью. На ладоняхъ рукъ и ступняхъ ногъ имѣются пузыри, наполненные желтымъ гноемъ, лопающіеся и образующіе раны на этихъ мѣстахъ. Спустя нѣсколько дней ребенокъ желтѣетъ, получаетъ водянку живота и умираетъ.—Если явленія сифилиса обнаруживаются лишь послѣ рожденія, обыкновенно въ первые дни, то прежде всего оказывается носъ заложеннымъ. Края ноздрей и верхняя губа опухши и желтоокрашены. Начидающееся выдѣленіе изъ носа жидкое, перемѣшанное съ кровью. Вскорѣ появляются на ладоняхъ и ступняхъ темнокрасныя пятна, превращающіяся въ папулы и желтые гнойные пузыри, ведущіе въ свою очередь къ отслоенію кожи. Обычный въ такихъ случаяхъ исходъ—смерть ребенка на второй или третьей недѣлѣ.—Если сифилисъ появляется на 3—4-ой недѣлѣ, то онъ начинается воспаленіемъ слизистой оболочки носа. Въ углахъ рта и глазъ появляются ссадины, надрывы. Затѣмъ—сифилитическія измѣненія на кожѣ: розеолы, папулы, кондиломы. Ко второму году всѣ эти вторичныя явленія могутъ пройти; нерѣдко, однако, они замѣняются и третичными. Послѣднія могутъ появиться и безъ предшествующихъ явныхъ признаковъ вторичнаго сифилиса; въ этихъ случаяхъ предсказаніе абсолютно неблагоприятно.

**Лѣченіе
врожденнаго
сифилиса.**

Лѣченіе наследственнаго сифилиса въ однихъ случаяхъ безнадёжно, въ другихъ же даетъ и хорошіе результаты. Прежде всего его возможно предупредить энергичнымъ ртутнымъ лѣченіемъ больной, сифилитической матери. Если ребенокъ уже съ сифилитическими явленіями родился, или послѣднія появились уже въ первые дни послѣ рожденія, то никакое лѣченіе не поможетъ. Результаты лѣченія тѣмъ лучше, чѣмъ позднѣе сифилисъ обнаруживается. Все зависитъ здѣсь отъ способа кормленія ребенка, причемъ самымъ лучшимъ является материнское молоко. Если ребенка вскармливаетъ здоровая кормилица (мамка), то при первыхъ проявленіяхъ у него сифилиса, она должна быть отстранена отъ кормленія, такъ какъ неизбежно и сама заразится сифилисомъ. Лѣченіе и у дѣтей, какъ и у взрослыхъ, состоитъ въ примѣненіи ртутныхъ (меркуріальныхъ) лѣкарствъ, но не въ слишкомъ низкихъ дѣленіяхъ. Втираніе сѣрой ртутной мази у дѣтей опасно, оно вызываетъ экземы и фурункулы. Третичныя формы у дѣтей требуютъ, какъ и у взрослыхъ, *Йода*. При воспаленіи глазъ (роговой оболочки)—*Меркурій*. При пораженіи костей, при во-

нучемъ насморкѣ, при язвахъ зѣва — *Иод.* и *Меркур.* При мозговыхъ явленіяхъ—энергичное примѣненіе *Меркурія*.

5. Не-венерическія болѣзни предстательной железы, яичекъ и сѣменного канатика.

Гипертрофія прѣстаты.

Болѣзнь эта состоитъ въ увеличеніи объема предстательной железы (прѣстаты) вслѣдствіе разрастанія ея ткани на почвѣ измѣненнаго питанія. Ее нужно отличать отъ увеличенія прѣстаты вслѣдствіе воспаленія ея ткани, чтѣ бываетъ втеченіи и послѣ трипперной болѣзни. Гипертрофія прѣстаты встрѣчается лишь у пожилыхъ мужчинъ, послѣ 50-лѣтняго возраста. Симптомы: разстройства мочеиспусканія, болѣзненные позывы на низъ съ твердыми испражненіями, прекращеніе половыхъ ощущеній. При изслѣдованіи черезъ задній проходъ пальцемъ ощупывается увеличенная железа. Задержки въ мочеотдѣленіи даютъ часто поводъ къ развитію хроническаго катарра мочевого пузыря и дѣлаютъ необходимымъ введеніе катетра для опорожненія послѣдняго. Болѣзнь эта крайне упорная. Облегченіе приносятъ слѣдующія лѣкарства: *Туя*, *Силиція*, *Селеніумъ*, равно какъ средства, указанныя при болѣзняхъ мочевого пузыря.

Водяная грыжа. Гидроцеле.

Подъ водяной грыжей разумѣютъ скопленіе жидкости въ оболочкѣ яичка, доходящее обыкновенно до такой степени, что въ мошонкѣ образуется, растягивая ее, большая напряженная, но не болящая опухоль. Болѣзнь эта встрѣчается не только у взрослыхъ, но и у мальчиковъ. Отъ другихъ опухолей яичекъ, гидроцеле отличается своей прозрачностію, обнаруживаемой изслѣдованіемъ ея при проникающемъ свѣтѣ. Опухоль эта, особенно въ молодомъ возрастѣ, часто уменьшается отъ внутренняго употребленія *Кали іодат.* × 2, *Рододендр.*, *Русъ*, *Бріон.* и *Арсен.* Радикальное же удаленіе возможно лишь оперативнымъ путемъ.

Грыжа сѣменныхъ протоковъ. Сперматоцеле.

Этимъ названіемъ обозначаютъ одностороннее набуханіе сѣменного канатика и придатка яичка вслѣдствіе чрезмѣрнаго скопленія въ нихъ сѣмени; эрекція въ такихъ случаяхъ сопровождается тянущей болью, которая проходитъ лишь послѣ опоро-

женія этихъ частей отъ раздражающаго ихъ сѣмени. Поэтому такіе больные часто прибѣгаютъ къ онанизму, а супружество совсѣмъ освобождаетъ отъ этого страданія. Облегченіе достигается также ношеніемъ суспензорія (поддерживающаго мѣшечка), употребленіемъ внутрь *Пульсатиллы* и сидячими ваннами (25⁰—22⁰ R).

Расширеніе венъ сѣменного канатика. Варикоцеле.

Эта болѣзнь сопровождается часто болью въ канатикѣ, а также въ придаткѣ яичка и въ самомъ яичкѣ, если одновременно и вены послѣднихъ расширены. При медленномъ сдавливаніи набухшаго канатика расширеніе временно какъ бы исчезаетъ, равно какъ оно уменьшается за ночь, а втеченіи дня опять появляется (какъ при расширеніи ножныхъ венъ). Причина этой болѣзни — застои крови въ венозной системѣ, поэтому и лѣченіе должно быть направлено противъ послѣднихъ. — *Намф. муриат.*, *Нуксв. вом.*, *Кардуусъ маріан.* и проч. (См. „Болѣзни венъ“, стр. 386).

6. Половые разстройства у мужчинъ.

Поллюціи. Онанизмъ.

Поллюціей называется изверженіе сѣмени (плоти) внѣ полового акта, повторяющееся, при напряженіи члена, въ неопредѣленные промежутки времени, во время сна, подъ вліяніемъ сладострастныхъ сновидѣній или совпаденіемъ такихъ представляющихся во снѣ обстоятельствъ, которыя вызываютъ въ половомъ органѣ состояніе раздраженія. Если поллюція случается не часто, разъ въ 8—14 дней, у достигшихъ половой зрѣлости мужчинъ при воздержаніи ихъ отъ половыхъ сношеній, то она естественна и, вообще говоря, не вредна, и не требуетъ specialнаго лѣченія. Такая поллюція случается тѣмъ рѣже, чѣмъ меньше ихъ фантазія занята половыми представленіями. — Если поллюція случается чаще, то она влечетъ за собою вредныя послѣдствія, прежде всего въ сферѣ нервной и душевной, и тѣмъ большія, чѣмъ моложе страдающій ея субъектъ, особенно въ періодѣ созрѣванія его, отъ 14 до 24 лѣтъ. Сѣменная жидкость имѣетъ въ организмѣ своимъ назначеніемъ не только продолженіе рода, но, главнымъ образомъ, питаніе нервно-мозговой ткани. Вотъ почему эта ткань, отъ состоянія которой зависитъ и душевное состояніе, начинаетъ страдать, вслѣдствіе частыхъ потерь сѣмени, прежде всего, гораздо раньше, чѣмъ другія, болѣе грубыя части организма. — Чаще всего поллюція бываетъ у

тѣхъ, которые, для удовлетворенія половой страсти, прибѣгаютъ къ онанизму, въ видѣ ли рукоблудія или другого какого либо неестественнаго способа вызыванія плотейизверженія. Въ какомъ бы видѣ этотъ порокъ ни проявлялся, послѣдствія его всегда раньше или позже обнаруживаются и всегда пагубны.—Послѣдствія чрезмѣрныхъ потерь сѣмени бываютъ не только отъ онанизма, но и отъ излишествъ естественной половой жизни.—Послѣдствія, о которыхъ идетъ тутъ рѣчь, суть слѣдующія: разстройства нервно-мозговой и душевной системы, ослабленіе памяти, головокруженіе, головныя и спинныя боли, душевная раздражительность, угнетенность духа, судорожныя и параличныя состоянія; затѣмъ—общее исхуданіе, разслабленность тѣла, блѣдность лица, темные круги у глазъ и проч., также узловатыя утолщенія сѣменныхъ канатиковъ, перерожденіе яичекъ.—Очень частымъ послѣдствіемъ является постоянное вытеканіе сѣмени (сперматоррея), а также и половое безсиліе.

Особенно опасенъ своими послѣдствіями онанизмъ въ дѣтскомъ возрастѣ. Причинами тутъ служатъ между прочимъ мелкіе глисты (см. стр. 291), вызывающіе зудъ въ половыхъ частяхъ, лишайныя, зудящія сыпи на крайней плоти или головкѣ члена и т. п., чаще же всего—развращенность среды, окружающей дѣтей.

Если причина поллюцій—предшествовавшее рукоблудіе (онанизмъ): *Нуксъ вом. 3—6*; если больной, съ виду довольно здоровый, тѣмъ не менѣе страдаетъ частыми поллюціями, сопровождающимися сладострастными снами; или же онъ ипохондрически настроенъ, апатиченъ, забывчивъ; чрезмѣрно возбудимъ и страдаетъ безсонницей, особенно послѣ кофе, чая или спиртныхъ напитковъ, а къ утру, заснувъ, имѣетъ поллюцію; легко возбуждается при чтеніи скабрёзныхъ книгъ; возбудимость такъ сильна, что при малѣйшемъ поводѣ является истеченіе сѣмени, безъ эрекции (напряженія члена); диспепсія и запоръ; спазматическое напряженіе члена съ неопреодолимымъ влеченіемъ къ онанизму; послѣ поллюціи ощущеніе холода и слабости въ ногахъ. Въ такихъ случаяхъ *Нуксъ вом.* дѣйствуетъ благотворно, что замѣчается уже послѣ 6—12 пріемовъ: поллюціи являются гораздо рѣже, и даже пагубное влеченіе къ онанизму укрощается.—*Кальк. карбон. 3—6* примѣняется при тѣхъ же симптомахъ, особенно же, когда послѣ поллюціи имѣются давящія боли въ головѣ и спинѣ, между лопатками; усталость и слабость въ ногахъ; при малѣйшемъ напряженіи обильное потѣніе; тѣлесная слабость съ дрожаніемъ

Лѣченіе.

рукъ.—Послѣ Калькареа карб. дается *Сульфуръ*, если отъ первой незамѣтно улучшенія.—*Меркур. солуб. 3*: жгучія боли въ спинѣ, истеченіе сѣмени безъ эрекции или безъ похоти, или при болѣзненной эрекции и кровью окрашенномъ сѣмени; послѣ поллюціи втеченіи всего дня холодныя какъ ледъ руки, нерасположенность къ работѣ и крайняя удрученность духа.—*Стафизагрія* × 3: истеченію сѣмени предшествуетъ продолжительная эрекция; оно сопровождается сладострастными снами; послѣ поллюціи чрезмѣрная слабость въ рукахъ; глубокозапавшіе и съ темными кругами глаза, мутный взглядъ, ипохондрическое, удрученное настроеніе.—*Фосфоръ 3* или *Фосфори ацид.* × 3: при такихъ послѣдствіяхъ онанизма, какъ слабость и вялость вообще; блѣдность лица, запавшіе глаза, удрученность духа, отсутствіе аппетита, и при всемъ томъ крайне сильная половая возбудимость (похотливость).—Всѣ эти средства, особенно послѣднія два, весьма дѣйствительны и, въ подходящихъ случаяхъ, уже въ короткое время останавливаютъ поллюціи и устраняютъ страсть къ онанизму, въ то же время улучшая общее состояніе организма.—Если бы дѣйствіе ихъ было неполное, то послѣ нихъ слѣдуетъ дать *Сульфурисъ ацид.* × 3. Всѣ эти средства даются по 2 — 3 раза въ день.—*Хина* × 1: при поллюціяхъ вслѣдствіе ослабленія послѣ тяжелыхъ болѣзней (черезъ 2—3 часа по приему); если такіе больные малокровны: *Ферр.-металл. 2*.—У нервныхъ, страдающихъ сердцебіеніемъ: *Дигитал. 1*.—При осадкѣ въ мочѣ: *Ликопод.* (съ *Фосфори ацид.*).—Надо имѣть также въ виду: *Агнусъ кастусъ, Каладіумъ, Купрумъ, Коніумъ, Платина муріат., Камфора, Діоскореа, Селен.* (см. „Лѣкарствовѣдѣніе“).—Поллюцій не надо смѣшивать съ истеченіемъ слизи изъ простаты (предстательной железы), которое ничего опаснаго въ себѣ не заключаетъ. Противъ этого рекомендуются: *Кальк. карб., Сепія, Туя, Селен., Силицеа*.—Поллюціи, бывающія у воздержныхъ мужчинъ 1 — 2 раза въ 8 — 14 дней, какъ уже сказано не вредны и не требуютъ лѣченія.

Діета должна быть нераздражающая, вегетаріанская. Страдающій ночными поллюціями долженъ по вечерамъ сѣдять лишь кусокъ хлѣба съ масломъ или немного каши и ничего жидкаго; слѣдуетъ передъ отходомъ ко сну опорожнять мочевой пузырь, спать на матрацѣ, а не на перинѣ, не на спинѣ, а на боку и при открытомъ окнѣ; дѣлать достаточно движеній (пилить дрова, плавать, бѣгать на конькахъ, заниматься гимнастикой). Кромѣ того 2 раза въ

день цѣльныя обмыванія (20—22° Р.), обмыванія спины (18° Р.) ежедневно втеченіи 10 минутъ сидячая ванна (24° Р.), 3 раза въ недѣлю втеченіи 1 часа ножноподмышковое обертываніе (22° Р.) съ послѣдующей полуванной (25° Р., втеченіи 10 минутъ), а также каждый день послѣ испражненія прохладный (18° Р.) удерживаемый клистиръ изъ полустакана воды. (Лучшее средство противъ болѣзненныхъ истеченій сѣмени—нормальная половая жизнь).

Импотенція.

Половое слабосиліе.

Импотенція бываетъ относительная (временная) и абсолютная (постоянная). Первая, по устраненіи вредныхъ причинъ, ее вызывающихъ и поддерживающихъ, и при надлежащемъ лѣченіи, проходитъ; вторая же, напротивъ того, съ трудомъ поддается лѣченію или совсѣмъ не поддается, какъ, на примѣръ, импотенція врожденная, или же развившаяся вслѣдствіе трудно излѣчимой болѣзни спинного или головного мозга, или на почвѣ глубокой неврастеніи.

Прежде всего необходимо устранить причину импотенціи: онанизмъ, чрезмѣрныя поллюціи, общую слабость, слишкомъ большую возбудимость и проч. Средства въ этихъ случаяхъ тѣ же, которыя выше приведены при „Поллюціи“. Впредь до укрѣпленія здоровья больной долженъ воздерживаться отъ половыхъ сношеній и избѣгать вообще поводовъ къ половому возбужденію. При ослабленіи полового органа вслѣдствіе половыхъ излишествъ, особенно если послѣднія сопровождались искусственными, помощью рукъ, раздраженіями его, надо прежде всего бросить навсегда эту вредную привычку, а лѣкарства принимать слѣдующія: *Хина 1*, или *Хинин. 1*, или *Фосфоръ, Фосфори ацид., 2* — 3 приѣма въ день. Даже уже отчаявшіеся, потерявшіе всякую надежду больные могутъ рассчитывать на восстановленіе ослабленной или потерянной половой способности, если втеченіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени будутъ воздерживаться отъ совокупленія и принимать упомянутыя лѣкарства, или еще *Калькар. карб., Нуксъ вом., Каладіумъ, Агнусъ кастусъ, Діоскореа, Антимон. круд., Графитъ, Натр. муріат., Селеніумъ, Сульфуръ.* Само собой разумѣется, что рядомъ съ спеціальнымъ лѣченіемъ надо стараться устранять и другія болѣзненные состоянія въ организмѣ, если таковыя въ немъ имѣются, равно какъ заботиться

объ общемъ укрѣпленіи его нормальнымъ образомъ жизни и со-
отвѣтственными вспомогательными мѣрами. Временная импотен-
ція является часто не вслѣдствіе глубокаго разстройства этой спо-
собности, а лишь неувѣренности въ своихъ силахъ послѣ одной
или двухъ неудачъ, какъ это наблюдается у новобрачныхъ муж-
чинъ. Въ этихъ случаяхъ помогаетъ у болѣе молодыхъ *Лактука*
сатива *Ө*, принимаемая ежедневно по 5 капель, въ течение 8
дней до женитьбы, а у пожилыхъ—*Даміана* *Ө*.

Вспомогательныя мѣры тѣ же, какія указаны противъ пол-
люцій.—Морскія купанья; для малокровныхъ бываютъ очень по-
лезны желѣзистыя ванны.

ОТДѢЛЪ ДЕСЯТЫЙ

Болѣзни крови и лимфы.

Содержаніе этого отдѣла I. Болѣзни крови и кровотворящихъ органовъ:
1. Малоковіе и Блѣдная немочь —2. Кровоточивость --3. Кровепятнистая бо-
лѣзнь — 4. Цынга — 5. Раковая болѣзнь — II Болѣзни лимфы и обмѣна ве-
ществъ: 1 Золотуха.—2 Туберкулезъ.—3 Проказа —4. Волчанка —5. Ожи-
рѣніе -- 6 Худошавость.—7. Сахарная болѣзнь.—8 Английская болѣзнь —
9 Размягчение костей —10 Артрить. Подагра.

Предварительныя замѣтки.

О кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудахъ сказано на стр.
366—368. Лимфа (пасочная жидкость), образуясь въ крови, вы-
ступаетъ, фильтруется изъ кровеносной системы (изъ капил-
ляровъ) въ ткани тѣла и изъ послѣднихъ по лимфатическимъ
сосудамъ обратно возвращается въ кровь. Лимфа, выдѣляемая изъ
крови въ нормальномъ количествѣ и поступающая въ ткани тѣла,
омываетъ ихъ отдѣльныя составныя части, соприкасаясь непо-
средственно съ ихъ мельчайшими, клѣточными частицами; лимфа
приноситъ имъ матеріалъ для питанія, для пополненія убыли и
для обновленія; кромѣ того лимфа выполаскиваетъ ткани, уда-
ляя при этомъ продукты обмѣна веществъ, тканевой распадъ,
случайно попавшія въ ткани инородныя вещества и т. п. — Нор-
мальный составъ крови и лимфы и нормальное ихъ обращеніе въ
организмъ обусловливаютъ нормальный обмѣнъ веществъ въ немъ.

Все, что нарушает эти нормальныя условия, ведетъ къ болѣзнямъ организма; напริมѣръ: чрезмѣрное образованіе или застои лимфы ведутъ къ отекамъ, къ выпотамъ, къ водянкамъ; разжиженіе крови, или обѣднѣніе ея кровяными шариками или общимъ количествомъ, неправильный или испорченный составъ ея — все это является послѣдствіемъ вредныхъ обстоятельствъ и порождаетъ всевозможныя болѣзненныя состоянія. — Несмотря, однако, на тѣсную связь между кровью и лимфой, приходится, на основаніи наблюденій, признавать возможность заболѣванія лишь крови или лишь лимфы, говорить о кровяномъ (сангвиническомъ, отъ слова *sanguis*—кровь), или же о лимфатическомъ тѣлосложеніи, также о смѣшанномъ—сангвино-лимфатическомъ; или, выражаясь болѣе точно, говорить о тѣлосложеніи (конституціи) организма сангвиническомъ, лимфатическомъ или смѣшанномъ.

Конституции
тѣлесныя.

Это надо понимать въ томъ смыслѣ, что каждому организму отъ рожденія присуща либо лимфатическая, либо сангвиническая конституція, и пока условия его жизнедѣятельности находятся въ равновѣсіи, пока взаимоотношенія между кровью и лимфой нормальны, до тѣхъ поръ организмъ чувствуетъ себя здоровымъ; если же, подъ влияніемъ вредныхъ обстоятельствъ, равновѣсіе это нарушается, то являются болѣзненныя состоянія, которыя различны въ зависимости отъ того, на почвѣ ли лимфатизма или сангвинизма они являются, т. е., иначе говоря, лимфатики имѣютъ предрасположеніе къ такимъ болѣзнямъ, къ которымъ не предрасположены сангвиники, и наоборотъ. Та и другая конституція организма въ чистомъ своемъ видѣ наблюдается лишь у дѣтей, чѣмъ старше становится организмъ или чѣмъ чаще онъ болѣлъ тѣмъ чаще выступаетъ смѣшанность тѣлосложенія: лимфатикъ получаетъ примѣсь сангвиническихъ свойствъ или сангвиникъ—примѣсь свойствъ лимфатическихъ.

Лимфатизмъ предрасполагаетъ особенно къ жирной золотухѣ и ко всевозможнымъ накожнымъ болѣзнямъ, также къ болѣзнямъ суставовъ и костей и къ малярии. Сангвиники имѣютъ склонность къ тощей золотухѣ, къ острымъ заболѣваніямъ дыхательныхъ органовъ и кишекъ, также къ острымъ заразнымъ болѣзнямъ, къ кровотечениямъ и острымъ воспаленіямъ.

На почвѣ смѣшаннаго тѣлосложенія развиваются болѣе упорныя, болѣе тяжелыя болѣзни печени, кишекъ (упорные запоры), легкихъ (астма), также подагрическія состоянія, нервныя и душевныя болѣзни.

Вотъ почему гомеопаты считаютъ необходимымъ и при такъ назыв. наружныхъ болѣзняхъ, назначать, кромѣ наружнаго, также внутреннее лѣчение.

Взглядъ такой на тѣлесныя конституціи вытекаетъ изъ ученія Ганемана о роли крови и лимфы организма въ происхожденіи и теченіи болѣзней и имѣетъ весьма важное значеніе въ отношеніи лѣченія таковыхъ. Врачи старой школы, со времени возвѣщеннаго Вирховымъ клѣточного ученія о болѣзняхъ (целлюлярной патологии), перенесли центръ тяжести на разстройства плотныхъ и подвижныхъ клѣтокъ, изъ которыхъ построенъ организмъ, допуская лишь возможность послѣдовательныхъ измѣненій—правда, въ большинствѣ лишь случаевъ, а не во всѣхъ—циркулирующихъ въ организмѣ соковъ, особенно въ вопросѣ о происхожденіи опухолей (см. ниже „Раковая болѣзнь“) Впрочемъ, единогласія въ этомъ вопросѣ нѣтъ среди этихъ врачей, что происходитъ отъ невозможности въ концѣ концовъ и для нихъ проникнуть до первоначальныхъ причинъ болѣзней, которыя также глубоко темны, какъ и первоначальная причина жизни. Разъ первоначальная причина болѣзней остается скрытой какъ для врачей старой школы, такъ и новой (гомеопатовъ), то нѣтъ никакого основанія, ни для однихъ, ни для другихъ, сводить болѣзни лишь къ мѣстнымъ разстройствамъ, къ заболѣванію „клѣтки“, а надо помнить—и это ужъ не подлежить никакимъ сомнѣніямъ,—что организмъ образуетъ одно цѣлое, части котораго находятся въ такой же тѣсной зависимости отъ него, въ какой оно само—отъ свойствъ и правильной дѣятельности этихъ частей Такой взглядъ на болѣзни лежитъ въ основѣ гомеопатическаго лѣченія, прямо и обязательно вытекающаго изъ гомеопатическаго лѣкарствовѣдѣнія. Аллопаты же сплошь и рядомъ дѣйствуютъ на части, мало заботясь о цѣломъ, а отсюда—лишь специализация, доведенная до крайней узости.

I. Болѣзни крови и кровотоворящихъ органовъ.

1. Малоокровіе и Блѣдная немочь

(Анэмія и Ллорозъ).

Причины и
послѣдствія

Подъ малоокровіемъ разумѣютъ такое состояніе крови, при которомъ количество красныхъ кровяныхъ шариковъ болѣе или менѣе уменьшено, вслѣдствіе чего кровь является блѣдной и измѣненной въ своихъ свойствахъ. Причиною могутъ быть значительныя потери крови или соковъ организма или же недостаточная дѣятельность кровотоворящихъ органовъ. Въ первомъ случаѣ (первичное малоокровіе), результаты лѣченія бываютъ болѣе скорые или лучше, нежели во второмъ (вторичное малоокровіе). Въ случаяхъ давнихъ и запущенныхъ или когда вредныя причины не перестаютъ дѣйствовать, могутъ получаться такія послѣдствія, какъ разжиженіе (водянистость) крови или разложеніе ея (злокачествен-

ное малокровіе), судорожныя или параличныя состоянія, распады тканей, общее истощеніе.

**Блѣдная
немочь**

При блѣдной немочи имѣется уменьшеніе самаго красящаго вещества красныхъ кровяныхъ шариковъ, вслѣдствіе чего является крайняя блѣдность больныхъ; это состояніе сопровождается обыкновенно отсутствіемъ или скудостью регулъ и встрѣчается между 14 и 24 годами жизни. Вызывающими или поддерживающими анэмію или хлорозъ моментами надо отмѣтить, кромѣ упомянутыхъ выше, еще слѣдующіе: разстройства въ половой сферѣ (отъ вступленія въ супружество эти болѣзни часто проходятъ), онанизмъ или вынужденное воздержаніе, чрезмѣрное возбужденіе фантазіи, недостаточное движеніе, малопитательная пища, душевныя потрясенія или угнетенія, ношеніе тѣсныхъ, затрудняющихъ кровообращеніе и дыханіе, корсетовъ.—Большія дозы желѣза, даваемаго противъ малокровія и блѣдной немочи, могутъ также лишь поддерживать и ухудшать эти состоянія, такъ какъ онѣ портятъ пищеварительную дѣятельность желудка.

Симптомы.

Симптомы анэміи и хлороза въ общемъ одинаковы. Прежде всего и во всѣхъ случаяхъ бросается въ глаза блѣдный цвѣтъ слизистыхъ оболочекъ губъ, десенъ и глазъ. Кромѣ того больные жалуются на слабость ногъ, сердцебиеніе, одышку, головокруженіе, припадки потемнѣнія зрѣнія, часто и на боли подъ ложечкой и несвареніе, даже на рвоту; иногда наблюдается склонность ко всему кислому, особенно къ уксусу и къ пожиранию мѣла, песка, бумаги и проч. Общее сложеніе можетъ быть и полное, но всегда имѣется вялость, дряблость мышцъ. Общее настроеніе болѣе или менѣе раздражительное. Регулы при хлорозѣ, какъ сказано, либо очень слабы, либо ихъ совсѣмъ нѣтъ; при анэміи, наоборотъ, онѣ часто даже обильны, хотя и неправильны.

Лѣченіе.

Въ болѣе легкихъ случаяхъ: *Пульсат.*; особенно когда регулы отсутствуютъ, или онѣ очень слабы, и имѣется разстройство пищеваренія; также послѣ чрезмѣрнаго употребленія желѣза въ большихъ дозахъ; принимать втеченіи нѣкотораго времени, раньше приемовъ другихъ лѣкарствъ.—*Хина*: если причиной являются потери крови или истощающіе моменты (попеременно съ *Ферр. фосф.*).—Желѣзные препараты примѣняются и въ гомеопатіи, но въ гораздо меньшихъ дозахъ, чѣмъ въ аллопатіи, а именно: *Ферр. карбон.* $\times 2$, при кислотности желудка, кислой отрыжкѣ; въ этихъ же случаяхъ и при отсутствіи аппетита и рвотѣ пищей: *Ферр. цитрик.* $\times 2$ съ *Нуксъ вом*, попеременно.—При пустой отрыжкѣ и запорѣ даютъ

Ферр. сульфурик.×2, или *Ферр. муриат.*×2.—Если предыдущие желѣзные препараты не переносятся, то слѣдуетъ давать *Ферр. лак-тик.*×2. Если желѣзо приноситъ пользу, то его надо продолжать еще и послѣ того, какъ наступило облегченіе.—Въ случаяхъ запущенныхъ или неподдающихся желѣзу полезно отъ времени до времени давать, въ качествѣ промежуточнаго лѣкарства, *Сульфуръ*.—Въ такихъ случаяхъ приноситъ также пользу *Купрумъ ацетик.*×3, или же, при подходящихъ условіяхъ, *Арсен. альб.*, особенно когда имѣется постоянная боль желудка и влеченіе къ кислому, равно какъ худоба. Для дряблыхъ и склонныхъ къ тучности дѣвушекъ больше подходитъ *Калькар. карбоника*. Прочія разстройства, сопровождающія анемію или хлорозъ, лѣчатся соотвѣтственнымъ образомъ (см. Болѣзни пищеварительн. органовъ и проч.).

**Діета и
вспом. мѣры
при
малокровіи.**

Пища должна быть легкая, но питательная, и составляется изъ нѣжныхъ сортовъ мяса (разъ въ день), кашъ, пудинговъ, молока, простокваши, пахтанья, яицъ, также зелени, овощей и фруктовъ. Наклонные къ тучности должны дѣлать достаточно движенія и значительно ограничить употребленіе жидкостей для питья. Всѣ раздражающія вещества должны быть устранены изъ режима такихъ больныхъ, а именно: кофе, чай и спиртные напитки, острые пряности, уксусъ. Въ примѣненіяхъ воды и другихъ вспомогательныхъ мѣръ надо придерживаться извѣстныхъ предѣловъ и соблюдать вообще осторожность. Такъ, напримѣръ, вредны слишкомъ холодныя примѣненія воды и продолжительное паренье. Для способствованія обмѣну веществъ полезно по утрамъ, прямо съ постели, дѣлать цѣльное обмываніе (24° R.) или влажное обтираніе тѣла съ послѣдующимъ сухимъ растираніемъ. Полезны также тепловатыя ванны (раза два въ недѣлю), лѣтомъ—купанье въ рѣкѣ или въ морѣ.

2. Кровоточивость. Гемофилія.

Подъ кровоточивостью разумѣется такое состояніе, при которомъ трудноостановимое кровотеченіе является при малѣйшемъ поврежденіи и даже безъ видимыхъ поводовъ. Причины кровоточиваго предрасположенія еще мало выяснены. Въ однихъ случаяхъ замѣчается наслѣдственность, въ другихъ оно объясняется слѣдствіемъ родственнаго брака или такихъ семейственныхъ болѣзней, какъ чахотка, золотуха, ревматизмъ, артритизмъ. Въ прежнія времена, болѣе 100 лѣтъ назадъ, болѣзнь эта почти не была извѣстна. Мало по малу къ ней привело, надо думать, ослабленіе чело-
вѣ-

ческой расы. Отъ цыгнги гемофилия отличается тѣмъ, что при послѣдней не имѣется разрыхленія и изъязвленія десенъ; отъ кровенятнистой же болѣзни Верлгофа—своей длительностью и упорствомъ.

Изъ лѣкарствъ главныя при этой болѣзни—слѣдующія: препараты желѣза (*Феррумъ*) въ гомеопатическихъ дозахъ, также—*Калькар. фосфорика*, *Плумб. ацетик.*, *Фосфори ацид*. При кровотеченіи примѣняются средства, указанные при кровотеченіяхъ изъ отдѣльныхъ органовъ (см. „Алфавитный указатель“); тамъ же и вспомогательныя мѣры. Гемофиличкамъ не слѣдуетъ вступать въ бракъ изъ опасенія истеченія кровью во время родовъ.

3. Кровенятнистая болѣзнь Верлгофа.

Женщины болѣе предрасположены къ этой болѣзни, чѣмъ мужчины, и въ болѣе молодомъ возрастѣ (15—20 лѣтъ) она чаще встрѣчается, чѣмъ въ прочихъ возрастахъ; на сѣверѣ, особенно у моря, чаще, чѣмъ въ болѣе южныхъ мѣстахъ; чаще и въ зимніе мѣсяцы, чѣмъ въ лѣтніе. Ближайшія причины неизвѣстны, если не предположить простудныхъ вліяній, сырыхъ жилищъ, плохого питанія и т. п. Болѣзнь преходяща и является внезапно, или ей предшествуютъ предвѣстники: общая разбитость, расстройство пищеваренія, головокруженіе и легкая лихорадка. Изъ симптомовъ самой болѣзни являются подкожные кровоподтеки въ видѣ темно-красныхъ пятнышекъ, какъ бы отъ укуса блохъ, сначала на нижнихъ конечностяхъ, и именно—на голеняхъ, затѣмъ на туловищѣ и верхнихъ конечностяхъ. Лицо остается обыкновенно пощаженымъ. Величина кровоподтечныхъ пятенъ можетъ достигать и величины гороха или боба, рѣдко еще больше. Одновременно или скорѣе затѣмъ является кровотеченіе изъ слизистыхъ оболочекъ, изъ носа, изъ полости рта и проч., иногда—въ опасной степени. Общее состояніе организма иной разъ очень мало страдаетъ, въ другихъ же случаяхъ больныя лихорадятъ, жалуются на общій упадокъ силъ, страдаютъ головокруженіемъ, сердцебіеніемъ и проч. Продолжительность болѣзни отъ 2 до 6 недѣль. Возможны возвраты, равно какъ послѣдовательныя болѣзни (наприм. параличи вслѣдствіе кровоизліянія въ мозгъ). Отъ цыгнги отличается отсутствующимъ пораженіемъ десенъ; отъ простыхъ подкожно-кровянистыхъ пятенъ (пурпура)—являющимися кровотечениями.

Лѣкарства: *Кали фосфорик.*, *Фосфоръ*, *Ацид. сульфурик.*, *Ацид. фосфорик.*, *Арсеник.*—При кровотеченияхъ—средства, указанныя при кровотеченіи изъ отдѣльн. органовъ, главнымъ образомъ — *Гаммелисъ* $\times 2$, *Секале* $\times 1$, *Натр. нитрик.* $\times 2$ и др. Діета, какъ при лихорадкахъ (стр. 67).

4. Цынга, Скорбутъ.

Причины.

Подъ скорбутомъ или цынгой разумѣютъ болѣзненное измѣненіе въ организмѣ, происходящее отъ разжиженія крови и ненормальнаго ея состава; то и другое въ свою очередь вызывается крайнимъ недостаткомъ въ пищѣ минеральныхъ солей, иначе говоря—свѣжихъ растительныхъ веществъ. Цынготное измѣненіе организма заключается главнымъ образомъ въ дряблости и легкой разрываемости мелкихъ кровеносныхъ сосудовъ, вслѣдствіе чего кровь выступаетъ подъ кожу, въ слизистыя оболочки, въ болѣе глубокія ткани, хрящи и кости, равно какъ и въ полости тѣла.—

Признаки и течение.

Болѣзнъ начинается крайнимъ недомоганіемъ, поблекlostію и сухостію кожи, болями въ членахъ. Десны распухаютъ, становятся синевато-красными и кровоточатъ при малѣйшемъ прикосновеніи; зубы расшатываются и выпадаютъ. На тѣлѣ выступаютъ меньшія или бѣльшія кровоподтечныя пятна (петехіи и экхимозы), а изъ разныхъ органовъ появляются кровотечения. Въ болѣе легкихъ случаяхъ скорбутъ продолжается 4—6 недѣль и переходитъ въ выздоровленіе. Въ болѣе тяжелыхъ же онъ продолжается до 3—6 мѣсяцевъ и дольше и оставляетъ послѣ себя неизлѣчимыя пораженія костей и суставовъ. Наконецъ, многіе случаи оканчиваются смертію обыкновенно вслѣдствіе кровавистаго перикардита (стр. 368) или плеврита (стр. 357) и т. п.

Лѣченіе.

Главное при лѣченіи этой болѣзни—цѣлесообразная, здоровая пища, которая тутъ еще болѣе необходима, чѣмъ во всѣхъ прочихъ разстройствахъ крови, и того, что сдѣлаетъ свѣжая и въ достаточномъ количествѣ растительная и вообще здоровая пища, нельзя достигнуть никакими лѣкарствами; но кромѣ того необходимо требуются и благопріятныя условія жизни, прежде всего—здоровое, сухое, свѣтлое и теплое жилище, не сырое, холодное и безсвѣтное, какъ все это часто бываетъ въ бѣднѣйшемъ классѣ населенія, особенно въ голодные годы.—Изъ гомеопатическихъ лѣкарствъ излѣченію способствуютъ *Меркур.-солюб.* 3, также *Мерк. корроз.* 2; кромѣ того *Фосфоръ*, *Арсен.*, *Ацид. муріат.*, *Хина* 1

и *Кам-фосф. З.* Тамъ, гдѣ не имѣется свѣжихъ овощей, зелени и фруктовъ, можно отчасти возмѣстить ихъ свѣжимъ лимоннымъ сокомъ, считая его на человѣка по крайней мѣрѣ 15 граммъ (1 столов. ложку) въ день. Въ запасъ, для перевозки на далекія разстоянія и для употребленія во время путешествія на морѣ, гдѣ обыкновенно чувствуется недостатокъ въ свѣжей зелени, можно лимонный сокъ сохранять продолжительное время, если прибавить къ нему умѣренное количество алкоголя (1 : 10); для употребленія берутъ 15—20 граммъ этого раствора, разводятъ въ полустаканѣ воды и пьютъ втеченіи дня глотками.—При кровотеченіяхъ примѣняются средства, указанныя при кровотеченіи изъ отдѣльныхъ органовъ (см. соответствующія мѣста книги).

5. Раковая болѣзнь.

Ракъ есть новообразованіе, основная причина котораго еще не выяснена наукой. На этотъ счетъ возникали и возникаютъ лишь разнаго рода предположенія. Болѣе или менѣе опредѣленно говорить о вліяніи раздраженій на возникновеніе и ростъ раковыхъ новообразованій, при чемъ раздраженія эти могутъ быть внутреннія и внѣшнія. Внѣшнія раздраженія могутъ быть механическія и химическія. Такъ, ракъ шейки матки можетъ произойти отъ частаго дѣторожденія, особенно съ надрывами шейки, ракъ желудка на почвѣ рубца отъ язвы желудка; ракъ языка вслѣдствіе испорченныхъ съ острыми краями зубовъ; ракъ грудной железы отъ частаго механическаго воздѣйствія (шнурованіе груди) или отъ удара, ушиба.

Причины
внѣшнія.

Химическимъ раздраженіемъ надо объяснить появленіе рака губы или языка у страстныхъ курильщиковъ и у жующихъ табакъ, у рабочихъ, производящихъ парафинъ или анилинъ. Наблюдалось появленіе рака отъ продолжительнаго примѣненія рентгеновыхъ лучей.

Въ большинствѣ случаевъ, однако, не удастся установить съ достовѣрностію внѣшнюю причину рака и приходится съ большою вѣроятностію предположить внутреннюю причину, безъ которой, надо полагать, невозможно было бы появленіе рака и отъ внѣшнихъ раздраженій. Теоретически внутренняя причина рака сводится къ ядамъ, развивающимся въ кишечникѣ; развитіе такихъ ядовъ идетъ рука объ руку съ уклоненіями отъ естественныхъ условій жизни, отъ слишкомъ плохого или слишкомъ роскошнаго питанія,

Причины
внутреннія

отъ преобладающаго или чрезмѣрнаго употребленія мясной пищи. У народовъ, питающихся растительной пищей, ракъ очень рѣдко наблюдается, и то преимущественно ракъ языка у тѣхъ, которые жуютъ табакъ. Что табакъ въ развитіи рака губы играетъ выдающуюся роль, доказываетъ то, что ракъ губы встрѣчается въ 10 разъ чаще у мужчинъ, нежели у женщинъ.

Нѣтъ пока никакихъ основаній для признанія паразитнаго происхожденія рака и никакихъ сколько нибудь основательныхъ доводовъ въ пользу его заразительности.

Ракъ есть
общее забо-
лѣваніе.

Несомнѣннымъ, на основаніи клиническихъ наблюденій, надо считать то, что ракъ или вообще злокачественное новообразованіе (саркома) есть не мѣстное заболѣваніе, а общее всего организма (конституціональное), хотя видимыхъ признаковъ именно такого характера его въ началѣ его развитія обыкновенно не замѣчается. Нѣтъ достаточныхъ доказательствъ и въ пользу наслѣдственности, которая была бы такъ несомнѣнна, какъ при туберкулезѣ. Въ пользу того, что какія либо особыя внутреннія условія въ организмѣ необходимы для развитія рака, говоритъ хотя бы тотъ фактъ, что ракъ есть болѣзнь болѣе поздняго возраста, пожилого стараго, а не болѣе молодого. Замѣчено еще и то, что заболѣвающие ракомъ въ молодости своей не переносили никакихъ острыхъ инфекціонныхъ болѣзней; значить такія болѣзни какъ бы предохраняютъ организмъ отъ заболѣванія раковой болѣзнію, видоизмѣняя его тѣлосложеніе.

Способы лѣченія раковыхъ новообразованій.

Оперативный
способъ.

Въ пользу оперативнаго удаленія рака хирурги приводятъ между прочимъ свою статистику. Такъ, напримѣръ, такимъ путемъ излѣчивается: въ 24 случаяхъ изъ ста оперированныхъ—ракъ шейки матки, въ 40⁰/₀—ракъ груди, въ 50⁰/₀—ракъ кишекъ. Однако, подобныя исчисленія мало доказательны. Прежде всего упускаются тутъ изъ виду тѣ раки, которыхъ и не пытаются оперировать въ виду ихъ безнадежности. Далѣе, часто просматривается рецидивъ (возвратъ), какъ причина смерти, когда имъ, подъ видомъ другой болѣзни или въ другомъ, а не оперированномъ мѣстѣ, поражается организмъ. Наконецъ, не во всѣхъ оперированныхъ случаяхъ рака послѣдній доказанъ микроскопическимъ изслѣдованіемъ, и возможно, что, напримѣръ, невинная аденома груди сошла за ракъ.

Затѣмъ считается, что результаты операціи тѣмъ лучше, чѣмъ раньше она сдѣлана. При этомъ упускается изъ виду, что злокачественность раковъ бываетъ различная. Такъ, ракъ тѣмъ злокачественнѣе, чѣмъ онъ болѣе мягокъ; кожные раки и твердые раки груди болѣе доброкачественны, чѣмъ злокачественны, и растутъ часто очень медленно; наконецъ, извѣстны же и случаи самостоятельнаго частичнаго или полнаго излѣченія рака, какъ и такіе, которые отличаются такой быстротечностію, что, несмотря на раннюю операцію, больные очень скоро погибаютъ отъ рецидива.

Поэтому нѣтъ достаточнаго основанія для приведеннаго сужденія хирурговъ. Во всякомъ случаѣ, тѣмъ меньше слѣдуетъ спѣшить съ операціей, чѣмъ старѣе больной. Если не говорить объ исключеніяхъ, надо сказать, что ракъ тѣмъ болѣе доброкачественъ, чѣмъ старѣе носитель его. Такъ, у старыхъ женщинъ ракъ груди держится нерѣдко 10 — 15 лѣтъ безъ того, чтобы онъ отъ этого сколько нибудь замѣтно страдал. Въ подобныхъ случаяхъ благоразумнѣе, прежде чѣмъ рѣшиться на операцію, испытать всѣ прочіе способы лѣченія—лѣкарствами, рентген-лучами и т. п.

Рентген-лучи даютъ аллопатамъ часто успѣшные результаты при лѣченіи раковыхъ пораженій кожи, и это неудивительно, такъ какъ лучи эти, **лѣченіе** при продолжительномъ ихъ воздѣйствіи, сами могутъ вызывать типичный ракъ; стало быть, лучи эти являются гомеопатичными въ отношеніи рака, потому и излѣчиваютъ его.—Другимъ довольно дѣйствительнымъ противъ рака кожи средствомъ является мышьякъ (Арсеникъ), примѣняемый аллопатами наружно, въ видѣ ли смазыванія растворомъ его, или въ видѣ мышьяковой мази, или впрыскиванія нѣкоторыхъ его препаратовъ въ опухоль; хорошіе результаты получались и отъ внутреннихъ приѣмовъ Фаулера раствора мышьяка. И тутъ для гомеопата ясно, почему мышьякъ даетъ такіе результаты и въ рукахъ аллопатовъ: потому что 1) мышьякъ, какъ извѣстно, при чрезмѣрныхъ примѣненіяхъ, самъ вызываетъ ракоподобную болѣзнь; стало быть, онъ гомеопатиченъ къ раку; 2) мышьякъ имѣетъ избранное сродство именно къ раковымъ клѣткамъ, поражая ихъ, но не здоровыя клѣтки организма.—Гомеопатически дѣйствующимъ надо считать и новѣйшее средство Канкроинъ, также Канкроидинъ или „Антимеристемъ“.—Рекомендуется со стороны аллопатовъ противъ рака и растворъ муравьиной кислоты (Ацид. формикумъ) въ разведеніи 1 на 1.000.000 для впрыскиваній, и т. д. Общее у всѣхъ этихъ попытокъ лѣчить ракъ не оперативнымъ, а лѣкарственнымъ путемъ, есть то, что въ основаніи ихъ лежитъ не сознаваемый гомеопатическій принципъ—лѣчить подобное подобнымъ. Въ этомъ гомеопаты не могутъ не черпать для себя значительнаго удовлетворенія и увѣренности въ томъ, что они на правильномъ пути въ лѣченіи и такой болѣзни, какъ ракъ и ему подобныя злокачественныя новообразованія.

Этимъ не сказано, что упомянутыми неоперативными способами, равно какъ чистго гомеопатическими лѣкарствами возможно вообще и навѣрняка излѣчивать ракъ. Нельзя не признать въ концѣ концовъ, что если принять въ среднемъ даже лишь 20⁰/₀ оперативныхъ излѣченій рака, хотя бы лишь относительныхъ, а не коренныхъ излѣченій, то врядь-ли такимъ же результатомъ можетъ похвалиться въ настоящее время какое бы то ни было неоперативное лѣчение. Поэтому мы не огульно отрицаемъ оперативный способъ и не ставимъ вопроса, что лучше—операция или внутреннее лѣчение, а считаемъ болѣе правильной такую постановку вопроса: какой изъ этихъ способовъ общааетъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ лучшие результаты.

**Лѣчение рака
гомеопатіей.**

Фактически вѣрно, что много разъ уже достигалось при ракъ излѣчение или улучшение гомеопатическими лѣкарствами. Если даже допустить, что далеко не во всѣхъ такихъ случаяхъ возможно считать діагнозъ рака несомнѣннымъ, то даже болѣе рѣдкія излѣченія дѣйствительнаго рака должны поддерживать стремленіе къ дальнѣйшимъ примѣненіямъ гомеопатическихъ лѣкарствъ при этой болѣзни.

Гомеопатическое лѣченіе слѣдуетъ, вообще говоря, предпочесть при медленно растущемъ ракъ у старыхъ людей; то же надо сказать о ракъ, при которомъ не можетъ быть и рѣчи о радикальной операци; въ такихъ случаяхъ послѣ операци и вслѣдствіе таковой состояніе болѣзни всегда въ значительной мѣрѣ ухудшается.

Гомеопатическое лѣченіе умѣстно до и послѣ операци, съ цѣлью предупрежденія возврата болѣзни. Оно умѣстно и во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ. Въ интересахъ больного во всякомъ случаѣ лучше быть излѣченнымъ отъ опухоли хотя бы и невыясненнаго характера, чѣмъ подвергнуться операци изъ за предположительно-о-раковаго ея характера.

**Выборъ
лѣкарствъ
и дѣленія.**

Выборъ лѣкарства долженъ производиться по гомеопатическому закону подобія, при чемъ вниманіе слѣдуетъ обращать не только на мѣстныя измѣненія, но и на прочіе болѣзненные признаки больного, объективные (видимые со стороны) и субъективные (чувствуемые самимъ больнымъ). Обыкновенно приходится назначать такимъ больнымъ не одно, а два или нѣсколько лѣкарствъ въ одно время. Что касается дѣленій лѣкарствъ противораковыхъ, болѣе дѣйствительными оказываются низкія дѣленія ихъ и даже чистыя тинктуры; приемы же лѣкарствъ—болѣе рѣдкіе; въ высшихъ дѣленіяхъ цѣлесообразнѣе давать лѣкарства конституціональныя, т. е. дѣйствующія не такъ на раковую опухоль, какъ на общее тѣлосложеніе больного.

Характеристика главѣйшихъ лѣкарствъ въ отхощеніи рака и злокачественныхъ новообразованій вообще.

Арсеникъ × 3. Преимущественно при нахожномъ ракъ, когда онъ представляется въ видѣ язвы и имѣются острые, жгучія боли. Также при ракъ желудка: сильное исхуданіе, слабость, потеря аппетита, жажда, утоляемая малыми глотками холодной воды. Рвота водой и пищей, или кровью. При ракъ матки: жгучія боли; сухость рта, жажда. Поносъ. Жидкія, разѣдающія бѣли. Общее истощеніе. Въмѣсто Арсеника дается съ пользой и *Арсеникъ іодат*.

Аргент. нитрик. × 3. Особенно при ракъ матки: изъязвленіе шейки матки, острые бѣли, кровотеченія, боли въ крестцѣ и поясницѣ. Симптомы нервного угнетенія.

Аурумъ 3 или *Аурумъ muriat.* × 3. Затвердѣнія разнаго рода. Особенно при ракъ носа, губъ, языка, матки. Важны душевные симптомы этого лѣкарства.

Коніумъ × 3. Затвердѣніе, особенно послѣ травмы (ударъ или ушибъ грудной железы); затвердѣніе железъ, безболѣзненное или съ рѣжущей болью. Кровотеченіе изъ носа, внутреннія язвы. Боли желудка со рвотой. Ощущеніе судорожнаго стягиванія въ пищеводѣ и желудкѣ, ощущеніе поднимающагося жара въ груди, колющія, рвущія боли въ области печени, въ животѣ. Маточныя кровотеченія съ болями, идущими въ бедра. Ёдкія маточныя бѣли. Нервный зудъ влагалища. Послѣ Коніума или попеременно съ нимъ—*Силиція*.

Гидрастисъ × 1. Катарральныя явленія со стороны желудка. Опухоль печени, желтуха. Маточныя страданія: изъязвленіе шейки, кровотеченія изъ вялой матки; желтыя, клейкія, также водянистыя бѣли. Накожныя язвы, легко кровоточащія.

Хелидоній × 1—0. При ракъ печени, желудка, губъ, кожи. Исхуданіе, упадокъ силъ, желтизна кожи; языкъ желтообложенъ съ отпечатками зубовъ; дурной запахъ изо рта, тягучая слизь; сильное вздутіе живота, рвота, облегчаемая питьемъ горячей воды; сильная боль подъ ложечкой и въ области печени; опухоль печени. Накожныя язвы съ зловоннымъ отдѣленіемъ.

Фосфоръ 3. Общая слабость, нервная раздражительность. Кожа блеклая, изжелтащярая. Наклонность къ кровотеченіямъ. Язвы, легко кровоточащія, губкообразныя, ночные поты. Примѣнялся преимущественно при ракъ желудка и матки.

Карбо вегетабил. З или *Карбо анимал. З*. При затвердѣніяхъ железъ разнаго рода. Примѣнялись съ пользою при ракъ кожи, желудка, при твердомъ ракъ грудной железы съ синевато-сѣрой кожей, жженіемъ и тянущей болью до самой подмышки, затвердѣніемъ подмышковыхъ железъ.

Меркур. солуб. × 3 или *Меркур. корроз. × 4*. Особенно при ракъ на почвѣ сифилиса. Съ успѣхомъ примѣнялись при ракъ кожи, языка, груди (при наступившемъ изъязвленіи), половыхъ органовъ.

Ацид. нитрик. × 3. При ракахъ съ глубокими разѣдающими язвами, особенно рта, языка, матки.

Фитолакка × 1. Примѣнялся съ пользою при ракъ груди. Хроническое затвердѣніе грудной и подмышковыхъ железъ. Синеватый видъ кожи; боли, расходящіяся по всему тѣлу.

Силиція З. Хроническія язвы съ затвердѣлыми краями, свищи, хроническія опуханія железъ: Язвы очень болѣзненны, съ улучшеніемъ отъ тепла. Особенно при ракъ груди и кожи.

Туя × 3. Губчатая, переполненная кровью опухоли, также твердая, бородавчатая кожныя новообразованія.

Въ литературѣ имѣются сообщенія о другихъ еще лѣкарствахъ, съ пользою примѣнявшихся при ракахъ; здѣсь приводятся главнѣйшія изъ нихъ:

Ацид. ацетик. (ракъ желудка); *Анисъ* (ракъ груди, яичниковъ); *Астериасъ рубенсъ* (старинное маточное средство; при ракъ груди; втянутый сосокъ, изъязвленіе); *Белладонна* (затвердѣнія разнаго рода); *Бромъ* (то-же); *Буфо* (ракъ груди и матки); *Химафилла* (ракъ груди); *Цистусъ канадензисъ* (кровоточащій ракъ нижней губы, ракъ груди); *Клематисъ* (затвердѣніе груди, матки, яичекъ); *Кондуранго* (ракъ желудка, кожи, груди) *Кроталусъ* (ракъ языка, матки; наклонность къ кровотечениямъ); *Элапсъ* (ракъ матки, темная кровь); *Графитъ* (ракъ шейки матки); *Гепаръ сумф.* (раковая язва); *Кали цианат.* (ракъ языка); *Кали хлорик.* (то-же); *Креозотъ* (ракъ желудка и матки); *Лазезисъ* (подобно Кроталусъ); *Ланисъ альб.* (затвердѣніе груди и железъ); *Мезереумъ* (ракъ желудка); *Мурексъ* (ракъ матки); *Орни-тогѣл. умбеллат.* (въ Ө, по 1 капль и въ рѣдкихъ приемахъ дало излѣченіе въ одномъ несомнѣнномъ случаѣ рака желудка).

II. Болѣзни лимфы и обмѣна веществъ.

1. Золотуха.

Опредѣленіе
болѣзни.

Золотуха есть болѣзнь, развивающаяся на почвѣ лимфатическаго тѣлосложенія; она имѣетъ близкое отношеніе къ „псорѣ“ Ганемана, которою она обусловливается.

Псору Ганемана ошибочно смѣшиваютъ съ чесоточной болѣзью, которую будто бы самъ Ганеманъ считалъ за псору. Псора или, точнѣ ска-

затѣ, та порча соковаго организма, которую Ганеманъ называлъ псорой, есть по его словамъ, мать всѣхъ хроническихъ болѣзней, не только чесотки, но и многихъ другихъ упорныхъ болѣзней. Псорическое состояніе должно быть уже въ наличности для того, чтобы болѣзни тѣ могли развиваться; это—почва, но не причина болѣзней.

Золотуха есть главная изъ болѣзенныхъ формъ, развивающихся на почвѣ псорической конституціи, которую можно назвать и лимфатической именно потому, что золотушнымъ измѣненіямъ подвергается главнымъ образомъ лимфатическая система.

Нѣкоторые врачи отождествляютъ золотуху съ туберкулезомъ (бугорчаткой) на томъ основаніи, что золотушные часто заболѣваютъ туберкулезомъ. Но изъ этого еще нельзя заключить, что болѣзни эти тождественны. Развиться же онѣ несомнѣнно могутъ на одной и той же почвѣ, на почвѣ псорической испорченности лимфы.

Испорченность лимфы можетъ быть врожденная и приобрѣтенная. Золотуха сама по себѣ не можетъ быть ни врожденной, ни приобрѣтенной.

По наслѣдственности передается или же приобрѣтается лишь **Происхожденіе золотухи.** предрасположеніе къ золотухѣ, тѣлосложеніе или конституція организма, но не сама болѣзнь. Кожная сыпь въ первые дни послѣ рожденія не есть еще золотушная, если вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣется опухоли железъ; таковая же въ эту пору рѣдко наблюдается.

Главной причиной приобрѣтеннаго предрасположенія къ золотухѣ является неправильное или плохое питаніе: обиліе мучной и крахмалистой пищи (между прочимъ—картофель), перекармливаніе дѣтей, преимущественно мясное питаніе; плохая питьевая вода, недоброкачественное молоко и т. д., недостаточно чистое содержаніе тѣла, испорченный воздухъ, плохое жилище. Далѣе, острыя заразныя болѣзни въ дѣтскомъ возрастѣ, прививки всевозможныя и т. п. вредности ведутъ къ порчѣ лимфы, а черезъ нее и крови (см. выше — „смѣшанное тѣлосложеніе“, стр. 479).

Золотуха обнаруживается у дѣтей всего больше между вторымъ и пятымъ годами жизни. Полныя, жирныя, набряклыя дѣти гораздо больше предрасположены къ этой болѣзни, нежели мускулистыя и болѣе стройныя дѣти.

Различаютъ торпидную (вялую) и эретическую (раздражительную) золотуху.—Признаки вялой золотухи: вздутость, набряк- **Вялая или жирная золотуха.** лость покрововъ; предрасположеніе къ отложенію жира, иногда и къ чрезмѣрной худобѣ; всегда малокровіе; кожа блѣдная, склонная къ высыпанью; грубыя черты лица съ тупымъ выраженіемъ; носъ и губы толсты; костный остовъ крѣпкій; большая голова,

большой животъ; ноги сравнительно худы и съ просвѣчивающими венами; такія дѣти вялы, мышцы ихъ слабыя, настроеніе капризное и равнодушное; умственные способности ослаблены; аппетитъ либо отсутствуетъ, либо усиленъ до степени обжорливости, иногда своеобразный (влечение къ пожиранию угля, мѣла, извести, бумаги и т. п.); кожные страданія, сильная простужаемость, катарры слизистыхъ оболочекъ. Характеристичны для торпидной золотухи: вялое, ослабленное кровообращеніе, умственная и тѣлесная слабость.—Признаки эретической золотухи: нѣжное тѣлосложеніе, стройность, худощавость; блѣлая, тонкая, нѣжная кожа, предрасположенная, однако, къ образованію пятенъ и къ экземѣ; волосы тонки и нѣжны, рѣсницы длинны; щеки и губы красны, цвѣтъ лица легко мѣняется; ясно просвѣчивающія вены; кожа тѣла такъ нѣжна и сосуды подкожныя такъ легко раздражимы, что уже отъ легкаго веденія ногтемъ по груди или спинѣ получаютъ на нихъ слѣды въ видѣ красныхъ полосъ; дѣти имѣютъ большіе, съ блескомъ, глаза, нѣжныя кости, слабыя мышцы; очень склонны къ потѣнію при малѣйшемъ напряженіи; скоро устаютъ и при малѣйшемъ поводѣ заболѣваютъ; страдаютъ одышкой, сердцебіеніемъ, пугливостью; умственные способности обыкновенно очень хороши; характеръ живой, бодрый, настроеніе легко мѣняющееся; плохо переносится влажный воздухъ, сырая, холодная погода, купанье и т. п. Характеристичны для эретической золотухи: раздражительность кровообращенія и нервной системы, безпокойство, возбужденность, повышенная мозговая дѣятельность.

Золотуха выражается въ заболѣваніяхъ кожи, слизистыхъ оболочекъ, железъ, костей, суставовъ, и осложняется или сопровождается часто такими болѣзнями, какъ малокровіе, блѣдная немочь, рахитъ, глисты, онанизмъ, туберкулезъ, водянка головы, воспаленіе мозга, спазмъ гортани, крупъ, коклюшъ, бронхитъ, катаральное воспаленіе легкихъ, плевритъ, катарры кишекъ и проч.

Теченіе болѣзни хроническое, упорное; болѣе или менѣе благоприятно оно только при гомеопатическомъ лѣченіи; при этомъ лѣченіи наблюдается часто и полное, прочное излѣченіе, т. е. исправленіе лимфы, если только условія жизни въ достаточной мѣрѣ благоприятствуютъ этому.

Отдѣльныя формы золотухи требуютъ слѣдующихъ основныхъ лѣкарствъ. Торпидная золотуха: *Калк. карб.*, *Сульф.*, *Гепаръ сульф.*, *Кали іод*, *Барита карб.*, *Ферр. іодат.*, *Ликоподій*.

дражичная или ошущающая отуха.

Теченіе золотухи.

Лѣченіе.

Эретическая золотуха: *Меркур.*, *Иод.*, *Фосф. ацид.*, *Ликопод.*
Ферр. карб., *Барита карб.*, *Калькар. фосф.*, *рыбій жиръ.*

Объимъ формамъ соотвѣтствуетъ *Арсеник.*

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отноше- ніи золотухи.

Калькареа карбоника 6—30. Признаки торпидной золотухи. Наклонность къ потѣнію отдѣльныхъ частей тѣла, особенно головы (во время сна) и ногъ; потъ холодный; ноги всегда холодныя и мокрыя. Увеличенныя железы. Наклонность къ кислотности желудка. Разстройства пищеваренія, по большей части поносъ. Обжорливость, аппетитъ особенно на яйца, жажда. Наклонность къ катаррамъ слизистыхъ оболочекъ, къ воспаленію ушей.

Прочія калькареа-препараты подобны въ общемъ предыдущему. Изъ нихъ: *Калькареа ацетика*—особенно при безболѣзненныхъ, обильныхъ, не истощающихъ поносахъ; *Калькар. флуорика* (затвердѣлыя железы, испорченные зубы, костныя опухоли, мягкія кости, костоѣда, расширенныя вены, опуханія суставныхъ сумокъ); *Калькар. іодата* (увеличеніе миндалинъ, катарры зѣва, упорныя опуханія железъ, зобъ, хроническая течь изъ ушей, нагноенія костей); *Калькар. фосфорика* (вялый, ненапряженный животъ, зеленый водянисто-слизистый поносъ, вонючіе газы, тонкія кости, упорно гноящіяся. Влеченіе къ соли и копченьямъ. Рекомендуются особенно—*Калькареа гипофосфороза*).—Всѣ Калькареа-препараты, кромѣ Кальк. карбон., цѣлесообразнѣе давать въ нисшихъ растираніяхъ (1 до 3) и чередовать ихъ съ Кальк. карб. высокаго дѣленія (послѣднее давать въ рѣдкихъ пріемахъ, достаточно по разу въ день).

Сульфуръ. Главное лѣкарство при золотухѣ, особенно въ началѣ и у больныхъ раздражительнаго темперамента. Потѣніе головы, особенно во время сна. Наклонность къ кожнымъ страданіямъ, къ болѣзнямъ костей. Ребенокъ ѣстъ много, но усваиваетъ мало. Исхудалость. Частичные вонючіе поты. Зудъ тѣла. Ноги холодныя, темя горячее. Катарры. У слабыхъ дѣтей, при отсутствіи рѣзковыраженныхъ симптомовъ, но при псорѣ въ роду, для предупрежденія развитія золотухи; въ такихъ случаяхъ давать это средство въ высшемъ дѣленіи; при появившихся уже симптомахъ золотухи цѣлесообразнѣе бываетъ давать нисшія дѣленія, или въ видѣ *Сульфуръ іодат.* × 3.

Генаръ сульф. 3—6. Торпидная золотуха. Большая чувствительность пораженныхъ частей, наклонность къ образованію выпотовъ (крупъ) и къ нагноеніямъ. Преимущественное заболѣваніе кожи и слизистыхъ оболочекъ, также железъ,

Іодъ и его препараты. Торпидная золотуха. Исхудалость, не смотря на хорошій аппетитъ. Постоянный голодъ. Железы увеличены, но не болѣзненны. Наклонность къ катаррамъ при малѣйшей простудѣ. Іодъ дѣйствуетъ всего лучше въ низкихъ и среднихъ дѣленіяхъ. Полезно бываетъ часто мѣнять препараты іода: *Ферр. іодат.*, *Барита іодат.*, *Аурумъ іодат.*, *Калькар. іодат.*, *Сульф. іодат.*, *Кали іодат.*, *Спонгія*.

Меркурій солюб. (и другіе препараты Меркурія) $\times 3$ —3. Эретическая золотуха. Большая голова, слабыя кости, вонючіе, окрашивающіе, жирные поты, особенно на ногахъ. Мокнущая экзема за ушами съ обильнымъ выдѣленіемъ. Воспаленіе железъ съ наклонностію къ нагноенію. Катарры слизистыхъ оболочекъ, особенно зѣва, ушей, глазъ. Костныя боли, особенно ночныя.

Фосфоръ 3 — 6. Особенно при эретической золотухѣ, съ наклонностію къ туберкулезу легкихъ и костей. Быстрый ростъ, узкогрудость, нѣжное сложеніе, тонкая кожа. Наклонность къ кровотеченіямъ. Обильные ночные поты. Железы мало поражаются, а больше слизистыя оболочки дыхательныхъ органовъ. Слабое и позднее развитіе костей и преимущественное ихъ заболѣваніе. Дополненіе свое Фосфоръ имѣетъ въ Силиціи.

Силиція 3 — 6. Особенно при слабомъ развитіи костей, съ искривленіемъ ихъ. Наклонность къ нагноеніямъ костей, къ образованію свищей. Гнойныя и язвенныя пораженія кожи и слизистыхъ оболочекъ. Силиція есть средство противъ послѣдствій скрывшихся выдѣленій (ножного пота, гноетеченія). Вонючій потъ головы и ногъ. Больныя части, особенно язвы, очень болѣзненны при дотрагиваніи; улучшеніе отъ тепла, ухудшеніе отъ холода. Силицію дополняетъ Калькар. карб. Нисшія дѣленія подходятъ для увеличенныхъ, безъ нагноенія, железъ; при наклонности къ нагноенію—высшія дѣленія (30-e).

Графитъ 6 — 30. Увеличенныя твердыя железы. Запоры съ скопленіемъ газовъ, временами смѣняющіеся поносами, Жесткая, сухая кожа, ломкая и трескающаяся, особенно въ углахъ рта и глазъ. Наклонность къ полнотѣ тѣла. Пузырчатая сыпь. Графитъ полезенъ противъ послѣдствій скрывшихся сыпей, ка-

ковья вызываетъ опять наружу. При упорномъ запорѣ предпочтительнѣе самыя низкія дѣленія.

Арсеникъ 3. Хроническіе катарры съ острымъ, ѣдкимъ выдѣленіемъ, накожныя сыпи, исхуданіе, малокровіе, отекъ ногъ; отсутствіе аппетита, сильная жажда, опуханія железъ (Арсеникъ іодат.).

Діета и
вспом. мѣры
при золотухѣ

Золотушные больные должны употреблять пищу въ очень умѣренныхъ количествахъ и не слишкомъ часто, притомъ же въ равномерныя промежутки времени. Пища должна быть легкая и не раздражающая: молоко, легкіе сорта мяса (кура, телятина, дичь), яйца, овощи, зелень, фрукты; избѣгать картофеля, свѣжеиспеченнаго хлѣба, чернаго хлѣба, стручковыхъ плодовъ, сладостей, печеній и т. п. Чистый воздухъ въ помѣщеніи, чистое содержаніе тѣла, возможно частое пребываніе на вольномъ воздухѣ необходимы. Излѣченію въ значительной мѣрѣ способствуютъ частыя ванны, гимнастика и вообще движеніе и тѣлесныя упражненія. Полезны соленыя ванны: начинаютъ съ 1 фунта и постепенно доходятъ до 4 фунтовъ на дѣтскую ванну, смотря по возрасту и по силамъ больного. Температура ванны 26—28° R., продолжительность постепенно удлиняемая (10—15—20—30 мин.). 2—3 ванны въ недѣлю, курсъ—20—40 ваннъ. Рыбій жиръ заключаетъ въ себѣ въ гомеопатической дозѣ іодъ; давать его съ пользою можно лишь при эретической, тощей золотухѣ, но не при жирной.

2. Туберкулезъ. Бугорчатка.

Болѣзнь заключается въ образованіи бугоркообразныхъ клѣточныхъ очаговъ и вызывается зараженіемъ особаго рода бациллой (коховской „палочкой“), имѣющей 1½—4 миллиметра длины и въ десять разъ меньшую толщину. Для заболѣванія бугорчаткой требуется извѣстное предрасположеніе, наслѣдственное или пріобрѣтенное (подъ вліяніемъ неблагоприятныхъ условий жизни или вообще вредныхъ вліяній). Противоустойчивость организма обуславливается химическимъ составомъ крови и лимфы и, лишь послѣдовательно, пожирающей бациллъ дѣятельностью особаго рода клѣтокъ организма (фагоцитовъ).

Въ началѣ поражается какая либо отдѣльная часть организма (легкія, железы, кишечникъ, кожа) и ею только ограничивается, или же болѣзнь распространяется по всему организму (общій про-

совидный туберкулезъ—см. стр. 349). Болѣзненный процессъ заключается въ распадѣ непрерывно образующихся бугорковъ и въ гибели тканей, въ которыхъ этотъ процессъ происходитъ. Пока болѣзнь ограничивается однимъ мѣстомъ, возможно отгороженіе послѣдняго рубцовой тканью, причемъ бугорковый очагъ обызвѣствляется и теряетъ способность къ распаду.

Объ отношеніи туберкулеза къ золотухѣ сказано выше (см. стр. 491).

Чаще всего туберкулезъ поражаетъ легкія и гортань, о чемъ подробно изложено выше въ отдѣлѣ болѣзней дыхательныхъ органовъ (стр. 349). Мимоходомъ упоминается о туберкулезѣ при описаніи болѣзней и другихъ органовъ. Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ у дѣтей (стр. 110) чаще всего происходитъ на почвѣ туберкулеза).

Общій взглядъ на лѣченіе туберкулеза.

Всѣ до сихъ поръ производившіяся попытки внутренними пріемами антисептическихъ средствъ дѣйствовать уничтожающимъ образомъ на туберкулезную бациллу въ тканяхъ тѣла, а не въ химической репортѣ, не привели въ этомъ отношеніи ни къ какому положительному результату. Дольше всего славой такого дѣйствія пользовались Креозотъ и производныя его по той причинѣ, что, соотвѣтствуя болѣзни въ нѣкоторыхъ случаяхъ гомеопатически (по закону подобія), средства эти приносили нѣкоторую пользу. Безплодными оказываются также стремленія тѣхъ врачей, которые разсчитываютъ найти противъ туберкулеза почти специфическое лѣкарство вродѣ ртути и іода при сифилисѣ или хины при малярии. Такія стремленія тщетны, потому что характеръ болѣзней совершенно различный. При сифилисѣ и маляріи о личномъ предрасположеніи не можетъ быть рѣчи, и съ уничтоженіемъ циркулирующаго въ крови болѣзнетворнаго яда прекращается и болѣзнь. Не то бугорокъ, лишенный даже кровеносныхъ сосудовъ, по которымъ къ нему могло бы проникнуть специфическое средство, хотя бы и такое, какъ *Туберкулинъ* (средство изопатическое, см. стр. 18). Нѣтъ и гомеопатическихъ лѣкарствъ, которыя могли бы имѣть прямое воздѣйствіе на бугорокъ. И это понятно, потому что борьба съ туберкулезной бациллой и ея продуктомъ-бугоркомъ можетъ быть лишь посредственной, а не прямой, и именно черезъ воздѣйствіе на весь организмъ, на всю его жизнедѣятельность, черезъ усиленіе его самообороны и способности самовозстановленія. Этого же немислимо достигнуть однимъ какимъ либо лѣкарствомъ или одинаковыми для всѣхъ случаевъ и для всѣхъ стадій болѣзни лѣкарствами. Единственно цѣлесообразный способъ борьбы противъ туберкулеза намъ данъ въ выборѣ лѣкарствъ по гомеопатическому закону подобія и въ соотвѣтствующихъ вспомогательныхъ мѣрахъ.

Лѣченіе наиболѣе частой формы туберкулеза, именно — легочной, см. стр. 353. Вообще же говоря, противъ туберкулезныхъ поражений организма подходятъ, на основаніи гомеопатическихъ правилъ, главнымъ образомъ, *Арсеникъ*, *Іод.*, *Калькареа*-препараты, *Фосфоръ* и *Силиція*.

О дозахъ, способахъ пріемовъ и дѣленіяхъ см. ч. 1, гл. 3 и 4, о дѣленіяхъ—также стр. 35—39.

Арсеникъ и его препараты. Жгучій характеръ болей; лихорадочное состояніе, обусловливаемое не туберкулезомъ, какъ таковымъ, а воспаленіемъ, изъ него вытекающимъ или его осложняющимъ; раздражимость, сангвиническій темпераментъ; чувствительность къ холоду и улучшение отъ тепла; жажда, тоска, безпокойство; глубокое пораженіе крови съ сильными мѣстными воспаленіями и склонностію къ разрушенію.

Іод. и его препараты (особенно — *Арсеникъ іодат.*). Пораженія слизистыхъ оболочекъ гортани и бронховъ; увеличеніе, затвердѣніе, даже гнойный распадъ железъ, эретическое состояніе духа (стр. 492) со страхомъ и тоской при вялости и безболѣзненности больной части; худѣніе тѣла несмотря на обиліе охотно принимаемой пищи.

Калькареа и ея препараты. Хроническія разстройства обмѣна веществъ, особенно въ костяхъ, железахъ и слизистыхъ оболочкахъ. Малокровіе; исхуданіе всего тѣла, раньше полнаго, за исключеніемъ живота, остающагося большимъ и твердымъ, особенно у дѣтей, вслѣдствіе опуханія железъ. Приливъ крови къ груди и головѣ при холодныхъ ногахъ; обильныя, ослабляющія регулы. Больше всего подходятъ: *Калькар. фосфорика* при туберкулезѣ легкихъ, *Калькар. флуорика* — при туберкулезѣ костей, *Калькар. карбон.*—при золотухѣ.

Фосфоръ. Пораженія костей, особенно — нижней челюсти, бедреннаго и колѣннаго сустава; пораженіе легкихъ, особенно у молодыхъ особъ, быстро растущихъ. Раздражительная слабость, эретическое тѣлосложеніе (см. стр. 492).

Силиція (Кремнеземъ) есть важнѣйшій скрѣпляющій элементъ въ организмѣ, дѣлаетъ ткани болѣе твердыми, устойчивыми противъ вредныхъ вліяній, и этимъ противодѣйствуетъ развитію туберкулезнаго процесса.

Кромѣ этихъ главныхъ лѣкарствъ требуются обыкновенно еще и другія лѣкарства, соотвѣтственно особенностямъ cadaго

отдѣльнаго случая (см. соотвѣтствующія статьи въ другихъ мѣстахъ книги).

Объ острой просовидной бугорчаткѣ см. стр. 349. Эта болѣзнь поражаетъ преимущественно дѣтей, что объясняется гораздо меньшей устойчивостью сосудовъ дѣтскаго организма и предрасположеніемъ, вызываемыми остро-заразными болѣзнями, особенно—корью и коклюшемъ. Отсюда же понятно, почему медицина вообще безсильна противъ уже развившейся общей просовидной бугорчатки, протекающей въ острой формѣ. Лѣченіе то же, что при туберкулезѣ вообще.

Діету и вспомогательныя мѣры при туберкулезѣ см. при „легочной чахоткѣ“ и въ другихъ мѣстахъ книги, при описаніи болѣзней отдѣльныхъ органовъ.

3. Проказа. Лепра.

Проказа есть хроническое пораженіе кожи, производимое особаго рода бациллой, но заражается ли человѣкъ посредственно или непосредственно, играетъ ли тутъ роль наслѣдственное предрасположеніе, а также каковы условія жизни и развитія лепрозной бациллы—все это вопросы, пока еще спорные. Во всякомъ случаѣ въ настоящее время проказа далеко не такъ распространена и вообще не такъ часта, какъ это было въ прежнія времена, когда она свирѣпствовала почти во всей Европѣ. Постоянно проказа теперь бываетъ только еще на сѣверѣ и югѣ Европы (преимущественно въ Россіи), равно какъ на югѣ и другихъ странъ свѣта.—Послѣ предшествующаго продолжительнаго недомоганія съ повторнымъ высыпаніемъ на кожѣ большихъ или меньшихъ красныхъ пятенъ, появляются въ послѣдней бугорки, особенно на лицѣ, на рукахъ и подошвахъ, вначалѣ красноватые, величиною отъ чечевицы до лѣснаго орѣшка, гроздевидными группами, отъ чего лицо обезображивается, а затѣмъ они становятся сѣро-желтыми или коричневыми и часто изъязвляются, покрываясь сухими, коричневыми корками, по отпаденіи которыхъ остаются бѣловатые толстоволокнистые рубцы. Эта форма проказы называется бугорковой и отличается отъ такъ называемой гладкой проказы, при которой кожа остается гладкой. Гладкая проказа начинается жестокими болями въ кожѣ, въ опредѣленныхъ нервныхъ областяхъ, съ послѣдующей полной нечувствительностію (анэстезіей), или же являются пятнистыя измѣненія кожи. За-

**Признаки
и теченіе.**

тѣмъ образуются либо пемфигинозные пузыри (см. „Пузырная сыпь“) съ свойственнымъ имъ теченіемъ, либо неостанавливающееся омертвѣніе кожи и тканей. Процессъ этотъ идетъ однако очень медленно, такъ что больные достигаютъ зачастую глубокой старости. Для лепрозныхъ устраиваются спеціальныя заведенія, гдѣ они влчатъ свое жалкое существованіе.—Вполнѣ вѣрнаго и надежнаго способа лѣченія этой болѣзни пока еще не знаютъ. Испанскіе врачи-гомеопаты очень хвалятъ лѣкарство *Мадаръ 2—3*, считая его специфическимъ противъ лепры, а на востокѣ съ большой пользою примѣняется *Меркур. биодат.* рядомъ съ малыми дозами морфія при невыносимо сильныхъ боляхъ. Даютъ также, какъ промежуточные лѣкарства, *Арсен. альб.*, *Гепаръ сульф.* *Фосфоръ*, *Анакардій*, *Секале*, *Устилаго* и др.

Лѣченіе.

Пробовали и пробуютъ при этой болѣзни и сывороточное лѣченіе, также туберкулинъ (въ виду сходства лепрабациллы съ туберкулезной), но безуспѣшно.

4. Волчанка. Лупусъ

Болѣзнь эта поражаетъ всего чаще носъ, губы и щеки. Хотя она и безболѣзненно протекаетъ, но теченіе ея крайне упорное, а послѣдствія—ужаснѣйшія обезображенія лица. Волчанка начинается образованіемъ узелковъ (бугорковъ), величиною отъ булавочной головки до коноплянаго зерна, желтаго, желто-коричневаго или коричнево-краснаго цвѣта, вначалѣ сидящихъ глубоко въ кожѣ, а впослѣдствіи возвышающихся надъ ея поверхностью, достигая величины гороха. Сливаясь вмѣстѣ, группы узелковъ образуютъ болѣе объемистые, гладкіе, блестящіе узлы. Узелки и узлы либо подвергаются обратному развитію, либо же они размягчаются, вскрываются и образуютъ язвы, плоскія, съ заостренными краями, и покрытыя темно-желтыми струпьями; язвы эти не выказываютъ склонности къ заживленію, а, напротивъ того, расплзаются, все болѣе и болѣе разъѣдая сосѣднія ткани. Этотъ процессъ разрушенія идетъ не быстро, а продолжается мѣсяцы и годы и, если въ концѣ концовъ язвы заживаютъ, то оставляютъ послѣ себя тягостные и обезображивающіе рубцы.—Волчанка считается въ новѣйшее время туберкулезомъ кожи.

Признаки и теченіе.

Лѣченіе преимущественно хирургическое и особенно свѣтовое (лучи радія). Настойчивое примѣненіе гомеопатическихъ лѣкарствъ даетъ нерѣдко хорошіе результаты. Главное средство *Арсен.*

Лѣченіе.

іодат., которое слѣдуетъ принимать продолжительное время. мѣняя дѣленія, по 1 приему въ день (утромъ), и кромѣ того *Гидрокотиле азіат.* $\times 2$, также по 1 приему въ день (вечеромъ).—Другія еще средства, которыя показаны при этой болѣзни, суть слѣдующія: *Меркурій біод.*, *Ликопод.*, *Кальк. карб.*, *Гепаръ сульф.*, *Сульф.*, *Графитъ*, *Аурумъ муріат.*, *Фосфоръ*, *Туя* и др.

5. Тучность. Ожирѣніе.

Причины.

Главная причина тучности или ожирѣнія кроется въ ненормальномъ обмѣнѣ веществъ, заключающемся въ томъ, что въ тѣлѣ отлагается жиръ въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ онъ расходуется. Эта ненормальность поддерживается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что тучные, или къ тучности предрасположенные, слишкомъ много ѣдятъ, при томъ и самый составъ ихъ пищевого режима является совершенно нецѣлесообразнымъ, и количество выпиваемыхъ ими жидкостей чрезмѣрно. Поэтому, какъ только сердце начинаетъ слабѣе работать, количество мочи уменьшается, а въ тканяхъ появляется избытокъ воды вслѣдствіе чрезмѣрной водянистости крови.

Предрасположеніе къ ожирѣнію наслѣдственно, развитіе же его зависитъ несомнѣнно отъ ненормальнаго, несоотвѣтственнаго питанія и образа жизни вообще. Способствующими моментами являются: 1) пища, богатая бѣлками, жиромъ и углеводами и бѣдная минеральными солями, 2) употребленіе спиртныхъ и бродильныхъ (пиво) напитковъ, такъ какъ алкоголь не даетъ сгорать жиру въ тѣлѣ, отсюда ожирѣніе пьяницъ, 3) слишкомъ недостаточная умственная и тѣлесная дѣятельность, 4) ослабленіе половыхъ отправленій. Опасность ожирѣнія тѣла заключается главнымъ образомъ въ томъ, что раньше или позже, если не принять надлежащихъ мѣръ, оно ведетъ къ ожирѣнію сердца (см. стр. 375) съ ослабленіемъ и упадкомъ его дѣятельности.—При ожирѣніи на первомъ планѣ должно ставить регулированіе образа жизни, съ примѣненіемъ специальныхъ вспомогательныхъ мѣръ.

Лѣченіе.

Гомеопатическія лѣкарства могутъ въ значительной мѣрѣ способствовать болѣе правильному обмѣну веществъ, дѣйствуя на кровь, на пищевареніе и вообще на всѣ отправленія организма. Въ этомъ отношеніи большую пользу приносятъ всѣ тѣ лѣкарства, которыя находятъ свое подобіе въ болѣзненномъ состояніи вообще того или другого тучнаго больного. Главнымъ образомъ при-

ходится употреблять слѣдующія лѣкарства: *Феррумъ-препар.*, *Барита карбон.*, *Калькар. карб.*, *Карбо вегетаб.*, *Ликопод.*, *Кониумъ*, *Подофил.*, *Антим. круд.*, *Сульфуръ* и пр. Весьма важнымъ лѣкарствомъ при слабости сердца является *Арника*, также *Кали карб.* и *Верат. альб.* О дозахъ, пріемахъ и дѣленіяхъ см. ч. 1, гл. 3 и 4.—Лѣкарствами, прямо препятствующими отложенію жира въ тѣлѣ, считаются *Фукусъ везикулозусъ* *Θ*, принимать 2—3 раза въ день по 20 капель въ водѣ, также *Кальк. ацет. солута* *Θ*, утромъ и вечеромъ по 5 капель.

Слѣдуетъ значительно ограничить употребленіе мучныхъ ве- Діета и воспом.
ществъ, особенно же — картофеля: полезны же, напротивъ того, мѣры.
зеленые овощи, съѣдобныя травы, салатъ, спаржа, шпинатъ, зеленые бобы, тощее мясо, яйца, много фруктовъ и т. п. Хлѣбъ слѣдуетъ употреблять лишь въ очень маломъ количествѣ, точно такъ же жидкости: утромъ — чашку ячменнаго кофе, вечеромъ — стаканъ простокваши, 2 раза въ день не болѣе полустакана вина — краснаго винограднаго — но ни пива, ни водки, а также никакихъ суповъ, ни пряностей; соли лишь въ очень маломъ количествѣ. — Для извлеченія изъ тѣла жидкости рекомендуется: ежедневно полная (камерная) паровая ванна (въ продолженіи 20 минутъ), постельная паровая или солнечная ванна съ слѣдующей затѣмъ полуванной (25° Р., втеченіи 10 минутъ); далѣе массажъ всего тѣла (втеченіи 30 минутъ).—При запорѣ: отваръ изъ сливъ съ отрубями и другія мѣры (см стр. 219, 231).— Движеніе: 2—3 раза въ день по часу гулять, по возможности — по горамъ; пиленіе дровъ, работа огородная или садовая, подвижныя игры (крокетъ, кегли), верховая ѣзда, плаваніе, катаніе на конькахъ. (Послѣобѣденнаго сна больной долженъ избѣгать). Кромѣ того свободныя и съ палкой упражненія, гимнастика дыханія (3 раза въ день, напримѣръ, дѣлать по 30 глубокихъ вдыханій; кромѣ того два раза въ день, втеченіи $\frac{1}{4}$ часа, восходя на гору, 3 шага дѣлать при полномъ выдохѣ, 1 шагъ при глубокомъ вдохѣ); гимнастика вообще и съ спеціальными аппаратами; ежедневно массажъ всего тѣла.—При слабости сердца: 15-градусные компрессы на сердце, смѣняемые черезъ каждыя 15 минутъ.

6. Худощавость.

Тутъ разумѣется не худоба, вслѣдствіе бывшей или имѣющейся тяжелой болѣзни, а та, при которой организмъ вообще здоровъ. Состояніе это подчасъ весьма нежелательное съ эстетической точки зрѣнія, особенно у

молодых особъ женскаго пола, можетъ быть до нѣкоторой степени поправлено усваиваемыми и въ то же время способствующими образованію и отложенію жира пищевыми веществами. Для этой цѣли худощавымъ рекомендуется ѣсть много свѣжеиспеченнаго бѣлаго хлѣба, а не черстваго. Около 8 час. утра хорошій хлѣбъ или мучной супъ, не слишкомъ густой, съ достаточнымъ количествомъ свѣжаго масла, или большая чашка шоколада (со сливками). Къ завтраку яичница съ котлетой, паштетомъ и т. п. Обѣдъ 2½ — 3 часа послѣ завтрака (послѣ послѣдняго, для ускоренія пищеваренія, слѣдуетъ погулять). Для обѣда выбираютъ супъ, мясо или рыбу (по желанію), рисовыя блюда, макароны, сладкое печеніе, сладкіе кремы, яблочный пирогъ, пряники; для питья пиво или красное бордосское или сладкое вино. Кислотъ, равно какъ кислыхъ винъ, слѣдуетъ избѣгать; точно такъ же — прохладныхъ ваннъ. Совѣтовать можно сладкіе фрукты, особенно виноградъ, персики, абрикосы, цукаты. Для ужина: мясо съ хлѣбомъ, но не сыръ; — пиво. — Вредно слишкомъ поздно ложиться спать, равно какъ много танцевать или чрезмерно заниматься умственной работой. Приведенная упитывающая діета возможна, конечно, лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда пищевареніе вполне хорошее, и имѣется соотвѣтствующій аппетитъ. Для улучшенія пищеваренія принимаютъ, незадолго передъ пищей, *Панайотинъ* 2 на кончикъ ножа, или столько же *Пепсина*. Если вслѣдствіе обильнаго употребленія сладостей появляются кислоты въ желудкѣ, то послѣ ѣды принимаютъ около полчайной ложечки соды (или *Аммоніакумъ гумми* 1, 10 капель въ рюмкѣ воды). Но если дѣло дошло до того, что приходится прибѣгать къ такимъ мѣрамъ, то надо перейти на болѣе легкую діету.

7. Сахарная болѣзнь. Діабетъ сахарный.

Сущность бо-
лѣзни.

Сахарная болѣзнь, иначе называемая — сахарное мочеизну-
реніе происходитъ отъ разнообразныхъ причинъ. Нѣкоторыя изъ
нихъ упомянуты ниже. Сущность же болѣзни заключается въ томъ,
что въ печени, являющейся мѣстомъ образованія сахара въ орга-
низмѣ, вырабатывается, вслѣдствіе болѣзнетворной причины, чрез-
мѣрное количество этого вещества, что въ свою очередь ведетъ
къ ненормально большому накопленію его въ крови и послѣ-
дующему переходу въ мочу.

Симптомы и
теченіе.

Такое измѣненіе въ питаніи организма влечетъ за собою
длинный рядъ болѣзненныхъ явленій. Является потребность въ
обильномъ питѣѣ, выражающаяся сильнѣйшей жаждой, при чемъ,
соотвѣтственно выпиваемымъ жидкостямъ, увеличивается и моче-
отдѣленіе, превышая обычное суточное количество мочи въ нѣ-
сколько разъ. Моча блѣдно-зеленовато-желтая; она имѣетъ осо-
бый специфическій запахъ и высокій удѣльный вѣсъ. Рядомъ съ
жаждой появляется прожорливость преимущественно на мучныя,
крахмалистыя и сахаристыя вещества, съ отвращеніемъ къ мясу.

Моча блѣдна или зеленовата и содержитъ сахаръ, который обнаруживается спеціальнымъ изслѣдованіемъ *). Пищевареніе разстроено, съ сухостію во рту и запорѣмъ; голосъ придавленъ, кожа суха. Въ дальнѣйшемъ теченіи исчезаютъ половыя ощущенія; разрыхляются десны; появляются чирьи и карбункулы, иногда и катаррактныя помутнѣнія зрѣнія. Наконецъ, присоединяются чахотка, упорные поносы, ведущіе къ смерти, или больные погибаютъ отъ истощенія. Теченіе болѣзни отъ 2 до 10 лѣтъ, но извѣстны случаи, гдѣ она продолжалась 20—30 лѣтъ. Болѣзнь имѣетъ по-видимому тѣсную связь съ нервной системой, такъ какъ она особенно часто наблюдается какъ послѣдствіе половыхъ излишествъ, чрезмѣрныхъ умственныхъ напряженій, душевныхъ волненій и потрясеній, особенно послѣ глубокой печали и заботъ; затѣмъ она бываетъ послѣ поврежденій печени и сотрясеній мозга.

Причины.

Главнымъ лѣкарствомъ является *Крезотъ* $\times 3$, 2—3 раза въ день по 5 капель; или *Аква креозота*, особенно при болѣзненности нижнихъ позвонковъ; усталость, желудочныя разстройства; принимаютъ въ первый день 1 каплю, на другой день—2 капли и т. д. до 7 капель; затѣмъ идутъ обратно тѣмъ же порядкомъ, т. е. каждый день принимаютъ одной каплей меньше; послѣ этого круга пріемовъ начинаютъ съ 2 капель и, увеличивая ежедневно дозу на 2 капли, доходятъ до 14 и обратно, и затѣмъ, послѣ еще 2 такихъ круговъ, возвращаются постепенно къ первоначальному кругу.—*Арсен. альб.* 3: при исхуданіи, упадкѣ силъ, при образованіи чирьевъ.—*Уран. муриат.* (или *нитр.*) $\times 2$: при обилии кислотъ въ желудкѣ.—*Ацид. лактик.* $\times 2$, 3 раза въ день: при обжорливости съ одновременнымъ разстройствомъ пищева-

Лѣченіе.

*) Для опредѣленія присутствія сахара въ мочѣ можетъ служить слѣдующій простой способъ (проба Троммера): Въ пробирную стклянку съ нѣкоторымъ количествомъ мочи прибавляютъ до $\frac{1}{4}$ ея объема калийнаго или натронаго щелока и по каплямъ умѣренно-насыщенного (1:5) раствора мѣднаго купороса. Если моча свободна отъ бѣлка и содержитъ сахаръ, то при встряхиваніи стклянки большее или меньшее количество мѣднаго купороса превращается въ свѣтлую синюю жидкость. Затѣмъ осторожно нагрѣваютъ почти до кипѣнія верхнюю часть столба жидкости въ пробиркѣ, пока не появится здѣсь желтовато-красное помутнѣніе, распространяющееся вскорѣ на всю мочу и, смотря по количеству сахара, образуетъ большій или меньшій осадокъ выдѣлившейся закиси мѣди. Такимъ образомъ обнаруживается сахаръ въ мочѣ при количествѣ его даже до 0,3 %. При меньшемъ содержаніи сахара, а иногда и при болѣе значительномъ, образовавшаяся закись мѣди не осаждается, а остается въ растворѣ.

нія — *Фосфори ацид.* × 3: при преобладающей общей слабости и исхуданіи; сильная жажда съ частымъ и обильнымъ выдѣленіемъ водянистой мочи. — *Ацид. сульфурик.* × 3: очень сильная жажда съ кислой рвотой; общая разбитость, слабость; неутолимый голодъ. — *Карбо вегетаб.* 3: жгучая жажда, обложенный языкъ, зудъ кожи, вонючій, липкій потъ; слабость; частое и обильное мочеотдѣленіе съ жженіемъ въ мочевомъ каналѣ; вздутый животъ, поносныя острыя испражненія, разѣдающія задній проходъ. — Кромѣ того, смотря по симптомамъ: *Беллад.*, *Меркур.*, *Нуксъ вом.*, *Сульфур.*, *Лакезисъ* (подобно Арсенику; стѣсненіе и тоска въ груди, сильная сухость рта), *Теребинтина*, *Натр. сульф.*, *Туя*.

Діета при
сахарной бо-
лѣзни.

Діабетики должны употреблять такую пищу, которая всего меньше даетъ сахару въ организмъ, а именно: преимущественно мясо, рыбу, яйца, масло, сыръ и сало; воздерживаться же слѣдуетъ отъ употребленія такихъ веществъ, изъ которыхъ въ организмъ образуется сахаръ, значить — отъ всякой мучной пищи, картофеля, риса, саго, пшена, равно какъ отъ сахара, гороха, чечевицы и моркови; вмѣсто всего этого больной можетъ ѣсть зеленые овощи, салатъ, шпинатъ, цвѣтную и красную капусту, съѣдобныя травы, бобы, грибы, спаржу. Что касается хлѣба, то въ очень малыхъ количествахъ діабетики могутъ его кушать, особенно въ поджаренномъ видѣ. Допускаются въ малыхъ количествахъ также сухари, или хлѣбъ неквашенный изъ непросѣянной муки (вродѣ такъ называемаго грагам-хлѣба). Свѣжій хлѣбъ безусловно вреденъ такимъ больнымъ. Разрѣшаются также разнаго рода ягоды и фрукты, равно какъ миндаль, орѣхи и т. п.; вмѣсто сахара — медъ (сотовый). Картофель — въ маломъ количествѣ и лишь сильно поджаренный. Для утоленія жажды: вода, также газовая вода съ лимоннымъ сокомъ. Слѣдуетъ также воздерживаться отъ чрезмернаго питья, что не представляется особенно труднымъ, если избѣгать соленой пищи. Разрѣшается также въ небольшихъ количествахъ несладкое вино съ водой, или также стаканъ пива въ день. — Куреніе табаку вредно.

Вспом. мѣры.

Полезно брать ежедневно полуванну (25° Р., 10 минутъ продолжительности), съ массажемъ всего тѣла; 3 раза въ недѣлю полную (камерную) паровую ванну, въ продолженіи 10 минутъ, или постельную паровую ванну, въ продолженіи 1½ часовъ; цѣльное обертываніе (22° Р., 1 часъ продолжительности) или солнечную ванну. Послѣ каждого изъ такихъ примѣненій должно слѣдовать

цѣльное обмываніе или обливаніе (22° Р.), Постоянное пребываніе въ чистомъ воздухѣ.

Отъ сахарнаго діабета надо отличать діабетъ не сахар-Мочеизнуреніе
ный (простое мочеизнуреніе), который выражается очень обиль- не сахарное.
нымъ истеченіемъ свѣтлой водянистой мочи при одновременно уси-
ленной жаждѣ. Болѣзнь эта предшествуетъ иногда сахарному мо-
чеизнуренію, но она можетъ также продолжаться много лѣтъ, не
имѣя другихъ послѣдствій, кромѣ слабосилія и худобы. Встрѣ-
чается преимущественно у истеричныхъ женщинъ и проходитъ при
урегулированіи діеты (ограниченное введеніе въ организмъ жидко-
стей и употребленіе лишь очень малыхъ количествъ соли) и одно-
временномъ назначеніи *Уран. нитр.* × 3, или *Нитрумъ* × 2, или
Натр. сульфурikumъ × 2.

8. Англійская болѣзнь. Рахитъ.

Англійская болѣзнь представляетъ собою такое измѣненіе **Опредѣленіе**
питанія организма, при которомъ въ костяхъ отлагаются въ не- болѣзни.
достаточномъ количествѣ необходимыя для нихъ известковыя соли,
вслѣдствіе чего кости становятся или остаются мягкими и гибкими.
Суставные концы костей обыкновенно утолщены, какъ бы вздуты, **Симптомы.**
особенно щиколотки ногъ и косточки у кистей рукъ, равно какъ
въ мѣстахъ прикрѣпленій реберъ къ грудной кости. Ребра съ бо-
ковъ часто вдавливаются, выпирая грудную кость (такъ называе-
мая птичья грудь). Ноги болѣе или менѣе искривлены, а животъ
вздутъ. Черепъ головы увеличенъ въ объемъ, фонтанели (роднич-
ки) медленно срастаются, иногда лишь къ 3—4 году жизни, тогда
какъ обыкновенно это бываетъ уже въ 1—2 году. Рахитъ сопро-
вождается часто разстройствами пищеваренія, поносами съ одно-
временнымъ исхуданіемъ. Способствующими развитію болѣзни об-
стоятельствами являются тѣ же, какія упомянуты при золотухѣ.

Въ аллопатіи примѣняется противъ рахита рыбій жиръ съ фосфоромъ— **Лѣченіе.**
въ однихъ случаяхъ съ успѣшнымъ результатомъ, въ другихъ же, многочис-
ленныхъ случаяхъ—безъ всякаго успѣха. Это потому, что случай случаю не
равенъ. При рахитѣ, какъ и при другихъ хроническихъ болѣзняхъ, можно
удачно лѣчить, только строго индивидуализируя, т. е. обособляя каждый от-
дѣльный случай; это же возможно только на основаніи гомеопатическаго лѣ-
карствовѣдѣнія. Въ однихъ случаяхъ фосфоръ подходитъ, въ другихъ нѣтъ.

Главные гомеопатическія лѣкарства противъ рахита суть слѣ-
дующія: *Калькареа*-препараты, *Сульфуръ*, *Силиція*, *Хамомилла*,
Фосфоръ, *Графитъ*, *Гепаръ сульф.*, *Рута*, *Стафизагрія* и др.—

Кромѣ того назначаются еще лѣкарства по состоянію отдѣльныхъ больныхъ органовъ у рахитичныхъ.

Характеристику приведенныхъ лѣкарствъ см. выше при золотухѣ и малокровіи, также въ „Лѣкарствовѣдніи“.

Вспом. мѣры
и діѣта при
рахитѣ.

Вспомогательныя мѣры и діѣта при рахитѣ не менѣе и даже болѣе важны, чѣмъ лѣкарственное лѣченіе. Чистый воздухъ, свѣтъ, солнце, здоровая, цѣлесообразная пища, чистое содержаніе тѣла— суть главныя условія для предупрежденія развитія рахита у дѣтей, къ этой болѣзни предрасположенныхъ. Особенно благотворно въ этомъ отношеніи пребываніе въ гористой мѣстности. О надлежащемъ вскармливаніи грудныхъ дѣтей сказано на стр. 446. Для дѣтей постарше діѣта какъ при золотухѣ (стр. 495). Весьма важно не запускать разстройствъ пищеваренія у такихъ больныхъ. Маленькимъ рахитичнымъ дѣтямъ не слѣдуетъ давать подолгу сидѣть, ихъ не слѣдуетъ и на рукахъ носить; такія дѣти должны все больше лежать на ровной, не слишкомъ мягкой постели; ихъ не слѣдуетъ раньше времени ставить на ножки, а тѣмъ болѣе поощрять къ этому, и такъ до тѣхъ поръ, пока кости не окрѣпнутъ.— Прибавленіе известковой воды къ молоку неправильно: извести достаточно и въ молокѣ, избытокъ же ея можетъ лишь разстроить пищевареніе и вести, наоборотъ, къ размягченію костей. Гомеопатическіе (калькареа) препараты дѣйствуютъ благотворно не своей массой, а динамически, конституціонально, усиливая или улучшая жизнедѣятельность организма, чѣмъ и способствуютъ въ данномъ случаѣ лучшему усваиванію извести изъ молока и другихъ пищевыхъ веществъ.—При искривленіи членовъ существенную помощь оказываютъ механическія приспособленія (педіатрическія), при утолщеніяхъ костей—массажъ.—Полезны соленыя ванны (см. стр. 495).

9. Размягченіе костей. Остеомаляція.

Опредѣленіе
болѣзни.

Подъ этой болѣзнію разумѣютъ не недостаточное отложеніе извести въ костяхъ во время роста въ первые годы жизни, а исчезаніе извести изъ костей, уже вполнѣ развившихся, вслѣдствіе чего кости становятся мягкими, гибкими и теряютъ свою форму. Рахитъ—болѣзнь дѣтей, остеомаляція—болѣзнь взрослыхъ, преимущественно—женщинъ. Эту болѣзнь надо также отличать отъ пористости костей въ старческомъ возрастѣ, зависящей не только отъ недостатка извести въ костяхъ, но и отъ расщипыванія самой костной ткани; при этомъ кости не гибки, а хрупки и ломки.

Остеопорозъ.

Сушность болѣзни до сихъ поръ не выяснена. Изслѣдованіе крови у такихъ больныхъ обнаруживаетъ излишекъ въ ней сѣрной кислоты, недостатокъ натронныхъ солей. Предрасполагающими обстоятельствами являются: нездоровое жилище, плохое питаніе, частая беременность и роды, послѣродовыя болѣзни, слишкомъ продолжительное кормленіе, душевныя волненія, сифились.

Болѣзнь сопровождается костными болями, судорогами мышцъ въ началѣ, а позднѣе—искривленіями костей, также позвоночника. Чаще всего поражается тазъ. Имѣются и общія разстройства организма, преимущественно со стороны пищеваренія.

Силиція есть главное лѣкарство при размягченіи костей. Кромѣ того: *Калькар. карб.*, *Калькар. фосфорика*, *Калькар. флуорика*, *Фосфоръ*, *Сульфургъ*.—При сифилисѣ: *Меркур.* и *Іод*. Наконецъ, еще лѣкарства, показанныя общимъ состояніемъ организма.

Лѣченіе

Пища должна быть, преимущественно, но не исключительно, растительная: овощи, зелень, фрукты, также легкіе сорта мяса, рыба. Умѣстенъ рыбій жиръ при исхудалости. Избѣгать кофе, крѣпкаго чая, спиртныхъ напитковъ, острыхъ кушаній. Полезны разнаго рода примѣненія воды: обмыванія, обертыванія, ванны (между прочимъ сосновыя, соленыя и т. п.).

10. Артритъ. Ломотная болѣзнь. Подагра.

(Мочекислый діатезъ).

Подъ артритомъ разумѣютъ такое измѣненіе обмѣна веществъ, при которомъ въ крови накапливается мочевая кислота; отсюда и названіе мочекислый діатезъ. Это состояніе тѣла ведетъ къ воспаленіямъ въ разныхъ органахъ и тканяхъ и къ отложенію мочекислыхъ солей. Чаще всего, но отнюдь не всегда, поражаются суставы, и между ними раньше всего первый суставъ большого пальца ноги (подагра).—Артритъ передается наслѣдственно, въ большинствѣ случаевъ въ видѣ готовой уже болѣзни или какъ предрасположеніе къ ней.—Развитію болѣзни способствуютъ: чрезмерная мясная пища, при очень ограниченной тѣлесной дѣятельности, неумѣренное употребленіе вина, пива и другихъ спиртныхъ напитковъ, ненормальный образъ жизни вообще. Это скорѣе болѣзнь людей состоятельныхъ, чѣмъ бѣдныхъ; при бѣдности она гораздо рѣже развивается, нежели при богатствѣ, потому вѣроятно, что первая сопряжена съ несравненно большей тѣлесной дѣятельностью. Ожирѣніе и артритъ очень часто развиваются

Опредѣленіе
болѣзни.

Причины.

рядомъ у одного и того же субъекта, или же первое предшествуетъ второму. Особенно склонны къ этому люди грузнаго сложенія и одутловатаго вида, широкоплечіе, мягкотѣлые, словомъ—люди лимфатическаго тѣлосложенія. Имѣется еще особаго рода артритъ, токсическій, вслѣдствіе отравленія, именно—свинцомъ (у рабочихъ, имѣющихъ дѣло съ этимъ металломъ); дѣйствительно, свинецъ, вводимый въ организмъ въ большихъ количествахъ, видоизмѣняетъ обмѣнъ веществъ такъ, что образуется мочекислый діатезъ.

Равнымъ образомъ ведетъ къ послѣднему и длительный катарръ желудка и кишечника, вслѣдствіе образования и всасыванія въ кровь ненормальныхъ продуктовъ обмѣна веществъ (мочевой и молочной кислотъ). Артритиковъ болѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ, имѣется въ Англіи, что неудивительно при почти исключительно мясномъ режимѣ англичанъ: всего меньше артритиковъ въ Италіи, Испаніи и Германіи.

Почти всегда артритъ появляется въ 30 — 40-лѣтнемъ возрастѣ, и лишь очень рѣдко въ болѣе раннемъ; онъ поражаетъ несравненно чаще мужчинъ, нежели женщинъ.

**Проявленія
болѣзни.**

Болѣзнь проявляется обыкновенно острыми припадками. Острый припадокъ является внезапно, обыкновенно ночью; причемъ ему большей частью предшествуютъ предвѣстники: расстройства пищеваренія разнаго рода, уменьшенное выдѣленіе мочи, часто съ кирпично-краснымъ осадкомъ мочекислыхъ солей (лишь въ рѣдкихъ случаяхъ моча обильна и блѣдна); иногда имѣется усиленная половая похоть; далѣе — стѣсненіе и боль въ груди, сердцебіеніе, головокруженіе, шумъ въ ушахъ, приливы къ головѣ, угнетенное или раздражительное настроеніе духа, бессонница, боли въ мышцахъ, ползаніе мурашекъ и проч.

**Разныя формы
артрита.**

Чѣмъ продолжительнѣе эти предвѣстники, тѣмъ ожесточеннѣе является припадокъ артритической ломоты, выражающійся въ видѣ остраго воспаленія сустава. Чаще всего поражается большой палецъ ноги (подагра), именно—въ первомъ его суставѣ. Другіе суставы поражаются лишь впослѣдствіи, послѣ многократныхъ припадковъ подагры. По частотѣ пораженія артритомъ суставы, послѣ большого пальца ноги, слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: большой палецъ руки (хирагра), колѣно (гонагра), бедро (ишіагра), плечо (омогра), локоть (пехиагра), ключица (клеядагра), позвонки (рахисагра), челюсть и ребра (костагра).

Артритъ можетъ поражать и нѣсколько суставовъ одновременно (множественный артритъ) или перескакивать съ сустава на суставъ (блуждающій артритъ).

Хроническій артритъ отличается отсутствіемъ острыхъ жестокихъ припадковъ, имѣя постоянное хроническое теченіе съ подострыми припадками болей. На этой почвѣ развиваются артритическіе узлы, состоящіе изъ отложеній мочекислыхъ солей и болѣе или менѣе обезображивающіе тѣ или другіе суставы, чаще всего суставы рукъ. (Объ обезображивающемъ ревматизмѣ см. въ слѣдующемъ отдѣлѣ). Такія отложенія могутъ образоваться и на внутреннихъ органахъ и тканяхъ, вызывая соотвѣтствующія страданія и разстройства.

Хроническая
ломота.

О продолжительности артрита ничего опредѣленнаго сказать нельзя. Теченіе его зависитъ отъ степени предрасположенія, отъ степени развитія болѣзни и отъ правильного образа жизни и цѣлесообразной діеты.

Аконитъ 1 во время самага припадка, когда жаръ, опухоль и краснота незначительны; въ противномъ случаѣ дается *Беллад.* $\times 3$, одна или попеременно съ *Акон.*, черезъ 10 минутъ по приему.— Когда припадки уже нѣсколько разъ повторялись, то часто лучше дѣйствуетъ *Кольхик.* $\times 1$ — $\times 2$, особенно при очень мутной мочѣ, и когда боли переходятъ и на другіе суставы.— *Бріон. 1* при одновременныхъ желудочныхъ разстройствахъ. Кромѣ того надо имѣть еще въ виду *Ледумъ* $\times 3$, *Анисъ* $\times 3$, *Меркур. солюб.* 3, *Сульфуръ* $\times 3$.— При хронической ломотѣ однимъ изъ лучшихъ лѣкарствъ является *Натр. силицик.* $\times 3$ (не смѣшивать съ салицил. натромъ), также *Аква силиката* Θ или *Силиція* 3.—Если этого оказывается недостаточно, то даютъ *Кали іодат.* (водно-спиртный растворъ—0,1 Кали іод. и по 4,5 воды и виннаго спирта—ежедневно 2 раза по 5 капель, увеличивая съ каждымъ днемъ дозу на 1 каплю и доходя такъ до 30 капель). Затѣмъ можно выбрать еще изъ: *Аммон. фосфор.*, *Литіумъ карбон.*, *Сульф. іодат.*, *Ликопод.*, *Хамэдрисъ 1*, *Гепаръ-сульф.*, *Калькар. карбон.*, *Гваякумъ* и др., смотря по общему состоянію организма.

Лѣченіе
артрита.

Во время обостренія строгая, крайне воздержная діета. Кромѣ того 3 раза въ недѣлю солнечныя ванны, цѣльныя обертыванія или постельныя паровыя ванны, точно также полная (камерныя) паровыя ванны; ежедневный легкій массажъ; вечеромъ обертываніе нижнихъ конечностей съ послѣдующимъ цѣльнымъ обмываніемъ. Хорошіе результаты получаютъ также отъ песочныхъ ваннъ.—

Діета и еспом.
мѣры.

Противъ припадковъ болѣй: паровые компрессы (припарки), теплая ванны (28° R., 10 минутъ продолжительности) съ послѣдующимъ обмываніемъ или обливаніемъ (24° R.). Согревающіе компрессы изъ *белладонноваго масла* (вмѣсто воды).—При хронической ломотѣ весьма важно соблюдать діету, если желательно избѣгнуть повтореній острыхъ припадковъ. Весьма вредны, а потому безусловно должны быть избѣгаемы прежде всего соленые и копченые продукты—мясные и рыбные, равно какъ сыры. Бѣлое мясо, разъ въ день, не вредно, если при этомъ употребляются въ достаточномъ количествѣ зеленые овощи и фрукты; картофель допускается лишь въ малыхъ количествахъ. Пища должна быть вообще возможно болѣе простая, не очень соленая, не пряная, а также необильная. Вредны крѣпкій чай, кофе, тяжелыя и кислыя вина, крѣпкое пиво и спиртные напитки вообще. Въ отдѣльныхъ случаяхъ могутъ быть позволены умѣренные количества винограднаго вина (съ водой) или свѣтлаго пива. Достаточное движеніе на свѣжемъ воздухѣ разумѣется само собою. Закаливающіе способы водою не всегда переносятся артритиками; въ такихъ случаяхъ дѣлаютъ сухія обтиранія фланелью. Что касается одежды, то для предохраненія отъ простуды часто показанъ шерстяной режимъ проф. Іегера, особенно шерстяное бѣлье для нижнихъ конечностей.

ОТДѢЛЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Болѣзни суставовъ, костей и мышцъ.

I. Болѣзни суставовъ.

Содержаніе этого под-отдѣла. 1. Воспаленія суставовъ. — 2. Острый ревматизмъ суставовъ. — 3. Хроническій ревматизмъ суставовъ. — 4. Обезображивающій ревматизмъ суставовъ. — (Англійскую болѣзнь, Артритъ, Подагру, Размягченіе костей см. въ 10-мъ отд.).

1. Воспаленія суставовъ.

Воспаленія суставовъ бываютъ разнаго рода, и въ каждомъ случаѣ необходимо выяснить, какая воспалительная жидкость въ суставѣ, сывороточная (серозная), или гнойная, или кровяная, а также—какая причина воспаленія, какое его происхожденіе. Воспалительный процессъ происходитъ прежде всего во внутренней (синовіальной) оболочкѣ суставной сумки, и въ болѣе легкихъ

случаяхъ ею и ограничивается. Сочленовный хрящъ заболѣваетъ обыкновенно лишь вторично, послѣдовательно. Въ тяжелыхъ случаяхъ суставныхъ воспаленій поражаются воспалительнымъ процессомъ и кости. Но бываетъ часто и обратная послѣдовательность: заболѣваетъ прежде всего кость, и съ нея уже воспаление переходитъ вторично на суставъ, какъ, наприм., при туберкулезномъ пораженіи кости и сустава.

Различаютъ слѣдующія формы воспаленій суставовъ:

Разныя формы
воспаленій
суставовъ.

а. Гиперемическое (приливное) воспаление вторично является въ видѣ первоначальнаго періода развитія болѣе тяжелаго воспаленія, наприм. гнойнаго, первично же оно является лишь при остромъ суставномъ ревматизмѣ. Симптомы этой формы: сильныя боли, являющіяся и сами собою, и особенно при движеніи; кожа сустава напряжена и припухша, часто—синева-краснаго цвѣта. Гиперемическое воспаление либо проходитъ безъ дальнѣйшихъ послѣдствій, подвергаясь обратному развитію, либо же переходитъ въ слипчивыя формы, какъ при остромъ суставномъ ревматизмѣ, или въ серозное и гнойное воспаление.

б. Геморрагическое воспаление сустава сопровождается изліяніемъ крови въ суставъ и встрѣчается при поврежденіяхъ, а также при геморрагическомъ діатезѣ (предрасположеніи къ кровотеченіямъ), при гемофилии, при цынгѣ. Въ послѣднихъ случаяхъ суставъ наполняется кровью безъ всякихъ предвѣстниковъ; является мягкая съ маловыраженнымъ зыбленіемъ опухоль, а, спустя нѣсколько дней, красящее вещество обнаруживается подъ кожей. Теченіе болѣзни тутъ неблагопріятное; объ оперативномъ вмѣшательствѣ не можетъ быть рѣчи; разсасывающіе же компрессы и лѣкарственные средства не предупреждаютъ свертыванія излившейся въ суставъ крови и послѣдовательнаго спаиванія, срастанія суставныхъ поверхностей (анкилоза). Травматическія (отъ поврежденій) кровоизліянія въ суставъ могутъ разсосаться отъ соотвѣствующихъ мѣръ и лѣкарствъ.

в. При серозномъ (сывороточномъ) воспаленіи суставъ сильно опухаетъ отъ накопляющейся въ немъ въ большомъ количествѣ мутной съ хлопьями жидкости, онъ очень болѣзненъ и напряженъ. Это—въ острой формѣ; при хронической же формѣ этого воспаленія внутренняя оболочка сустава мозолиста, утолщена, шероховата, и больной не испытываетъ никакихъ тягостныхъ разстройствъ, развѣ лишь чувство легкой усталости; кожа въ этихъ случаяхъ остается обыкновенно неизмѣненною.

г. Гнойное воспаление сустава сопровождается всегда чрезвычайно рѣзкими воспалительными явлениями; поражаются и разѣдаются и хрящевыя части сустава, образуются хрящевыя язвы; процессъ разрушенія можетъ дойти и до кости, обнажая ее и разѣдая въ большей или меньшей степени. Далѣе, если гнойный процессъ не останавливается, поражаются и суставныя связки и околосуставныя ткани; сумка сустава вздувается шарообразно и лопається; гной проникаетъ въ окружающую ткань и образуетъ околосуставныя нарывы, наконецъ—прорывается наружу. Теченіе болѣзни тяжелое. Она начинается потрясающимъ ознобомъ и сильнымъ повышеніемъ температуры тѣла. Суставъ сильно опухаетъ и становится неподвижнымъ. Кожа горяча на ощупь и красна; на ней видны сильно расширенныя вены. При легкихъ формахъ гнойнаго воспаленія возможно полное выздоровленіе; при тяжелыхъ же могутъ развиваться крайне опасныя общія явленія, особенно же опасаться надо гноекрівія (піеміи); въ лучшемъ случаѣ дѣло оканчивается анкилозомъ (ограниченной или вовсе утерянной подвижностію), иначе говоря—слипчивымъ воспаленіемъ суставныхъ частей.

д. Обезображивающее воспаление суставовъ характеризуется измѣненіемъ формъ суставныхъ концовъ и связочныхъ частей, съ образованіемъ костныхъ наростовъ, значительно разстраивающихъ подвижность суставовъ. Наивысшей степени развитія измѣненіе это достигаетъ въ обезображивающемъ артритѣ (см. стр. 509).

е. Невропаралитическое воспаление суставовъ встрѣчается особенно у табетиковъ и отличается тѣмъ, что во 1) оно является даже при сравнительно незначительныхъ поводахъ, во 2) тѣмъ, что проходитъ очень медленно даже въ такихъ случаяхъ, въ какихъ у людей вообще здоровыхъ оно было бы скоропреходящимъ, легкоизлѣчимымъ. Большею частью поражается, именно, колѣно; оно припухаетъ шарообразно вслѣдствіе кровяно-сывороточнаго выпота, часто въ теченіе уже нѣсколькихъ часовъ; суставъ при этомъ почти вовсе безболѣзненъ, напряженіе небольшое; кожа имѣетъ нормальный видъ или нѣсколько болѣе блѣдный; лишь рѣдко опухоль болѣе плотная или твердая. Въ тяжелыхъ случаяхъ могутъ получиться въ концѣ концовъ стойкія обезображиванія суставовъ.

Причины или способы происхожденія суставныхъ воспаленій. Сюда относятся прежде всего поврежденія: проникающая въ суставъ рана, близсуставныя переломы костей, вы-

вихи; растяженіе связочныхъ частей сустава и т. п. Воспаленіе можетъ быть и бактерійнаго происхожденія, когда, черезъ рану ли или черезъ больныя окружающія ткани (напр. при рожѣ), микроорганизмы попадаютъ въ полость сустава. Но такіе случаи встрѣчаются рѣже, большинство же этихъ воспаленій происходитъ посредствомъ внутренняго переноса (метастазъ, эмболія — см. стр. 384, 388) заразнаго вещества черезъ лимфатическіе и кровеносные пути, какъ при бугорчаткѣ, золотухѣ, тифѣ и проч. Суставныя воспаленія могутъ имѣть и конституціональное происхожденіе, т. е. представляютъ собою частичныя проявленія общихъ разстройствъ въ обмѣнѣ веществъ, какъ при подагрѣ, геморрагическомъ предрасположеніи, кровоточивости и т. д.; сюда же можно причислить и тѣ воспаленія, которыя зависятъ отъ отравленій, наприм. отъ хроническаго отравленія свинцомъ; конституціональный характеръ имѣютъ и тѣ ненормальности суставовъ, которыя происходятъ отъ преждевременной атрофіи (исчезанія) или преждевременнаго стариванія суставныхъ частей; сюда относятся особенно нѣкоторыя обезображивающія, а также хроническія формы ревматизма. Случайной причиной суставнаго воспаленія служитъ нерѣдко и простуда (охлажденіе) при имѣющемся къ нему предрасположеніи, или же простуда ведетъ къ ухудшенію развившагося уже воспаленія.

Общее лѣченіе суставныхъ воспаленій.

Вообще о лѣченіи воспаленій суставовъ можно сказать, что при тѣхъ формахъ ихъ, которыя вызываются (метастатически — см. выше) тѣмъ или инымъ общимъ заболѣваніемъ, на первомъ планѣ стоитъ лѣченіе соотвѣтствующей общей болѣзни, какъ при сифилисѣ, трипперѣ, туберкулезѣ, золотухѣ, подагрѣ, острозаразныхъ болѣзняхъ и проч., и лишь рядомъ съ нимъ — мѣстное лѣченіе, при чемъ послѣднее, мѣстное лѣченіе можетъ въ иныхъ случаяхъ сводиться не только къ примѣненію лѣкарствъ и обычныхъ вспомогательныхъ мѣръ, но и къ хирургическому вмѣшательству. Хирургическое лѣченіе является часто предшествующимъ, главнымъ, при суставныхъ воспаленіяхъ травматическаго происхожденія, равно какъ при гнойномъ воспаленіи.

Внутреннее лѣченіе той или другой общей болѣзни, лежащей въ основѣ воспаленія сустава, см. въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этой книги.

О мѣстномъ же, наружномъ лѣченіи можно вообще сказать слѣдующее.

**Наружное
лѣченіе
воспаленій
суставовъ**

Большая часть случаевъ, особенно же случаи бактерійнаго происхожденія, требуютъ прежде всего покоя; отъ движенія больного сустава процессъ воспаления можетъ значительно ухудшиться. Въ случаяхъ болѣе трудныхъ могутъ понадобится шины, всего лучше изъ толстой папки, укрѣпляемая бинтомъ и умѣстныя особенно тогда, когда цѣлесообразно прикладывать къ суставу согрѣвающие компрессы или лѣкарственные масла или мази—главнымъ образомъ изъ Белладонны (см. „Лѣкарства въ наружныхъ примѣненіяхъ“ на стр. 41-ой, изъ которыхъ и надо выбрать соответствующее). Шина должна быть надлежащимъ образомъ выстлана ватой для мягкости. Простое помѣщеніе больной конечности на подушкѣ, подстилкѣ и т. п. никогда не можетъ замѣнить хорошей удерживающей повязки, такъ какъ больные во время сна могутъ двигать больной конечностью или вынуждены къ движенію ея какой либо надобностью. Удерживающую повязку надо накладывать на больную конечность при такомъ положеніи пораженнаго сустава, при которомъ онъ сохранилъ бы пригодность къ его употребленію на тотъ случай, если бы, по роду болѣзни, суставъ оказался въ концѣ концовъ неподвижнымъ. Такъ, негодными къ употребленію будутъ, наприм., нижняя конечность, согнутая въ колѣнѣ, или верхняя конечность, вполне разогнутая въ локтѣ и т. д. Въ хирургіи примѣняются часто съ пользой, особенно при туберкулезныхъ пораженіяхъ суставовъ, вытягивающія повязки и носильные аппараты.

Во многихъ случаяхъ благотворно дѣйствуетъ массажъ больныхъ суставовъ, но эти случаи надо выбирать съ осторожностью и съ полнымъ знаніемъ дѣла.

Не слѣдуетъ примѣнять массажа при всѣхъ свѣжихъ воспалительныхъ процессахъ бактерійнаго происхожденія, такъ какъ массажемъ можно вогнать тутъ микроорганизмы въ кругъ лимфо-и кровообращенія, а мѣсто—только усилить воспаление. Показанъ массажъ особенно при травматическихъ воспаленияхъ (не гнойныхъ), при затянувшихся воспалительныхъ процессахъ, также при слипчивыхъ и обезображивающихъ формахъ суставныхъ воспаленій. Съ массажемъ можно соединять и кратковременныя пассивныя движенія больныхъ суставовъ.

При скопленіи гноя въ суставѣ, при нарывѣ, не слѣдуетъ медлить съ искусственнымъ его вскрытіемъ, какъ только пришла для этого пора. Въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ можетъ потребо-

ваться резекція (отсѣченіе) суставныхъ концовъ кости или даже ампутація (отнятіе) конечности.

Изъ внутреннихъ лѣкарствъ примѣняются *Аконитъ 1* въ самомъ началѣ, а затѣмъ *Белладонна* $\times 3$, при воспаленіи вслѣдствіе механическихъ поврежденій (травмъ)—*Арника 1* и *Русъ* $\times 3$ — При воспалительной опухоли — *Беллад* попеременно съ *Меркур. солуб.* $\times 3-3$, при признакахъ нагноенія—*Гепаръ сульф* $\times 3-3$; послѣ вскрытія нарыва—*Силиція 3* —Если выздоровленіе затягивается, при хроническихъ, именно, воспаленияхъ, принимать *Сульфуръ* $\times 3$, также *Ацид. флуорик. 3*, *Калькареа фосфорика 3* или, при обильномъ нагноеніи и сильномъ упадкѣ силъ, *Калькар. гипофосфороза 3*.

Внутреннее
лѣчение

Изъ минеральныхъ водъ особенно показаны, именно—въ хроническихъ случаяхъ, теплые источники и воды поваренной соли. Кромѣ того полезны грязи въ видѣ общихъ ваннъ и мѣстныхъ компрессовъ, равно какъ горячія песочныя и сѣрныя ванны

Вспом мѣры

2 Острый суставный ревматизмъ.

Острый суставный ревматизмъ есть очень болѣзненное, лихорадочно-инфекционное, бактерійнаго происхожденія, страданіе, причемъ обыкновенно поражается нѣсколько суставовъ одновременно или вскорѣ одинъ суставъ за другимъ. Болѣзнь эта не прилипчива, но появленіе ея у многихъ лицъ, въ видѣ эпидеміи, наблюдается нерѣдко. Въ большинствѣ случаевъ заболѣванію способствуетъ простуда, именно — внезапное охлажденіе разгоряченнаго отъ работы и вспотѣвшаго тѣла. Способствующими обстоятельствами надо считать также проживаніе въ сырыхъ помѣщеніяхъ, равно какъ нѣкоторыя болѣзни, втеченіи или въ періодѣ выздоровленія которыхъ суставный ревматизмъ развивается поразительно часто; къ такимъ болѣзнямъ относятся скарлатина, кровавый поносъ, послѣродовой періодъ, тифы, также сифилисъ. Самое большое число заболѣваній падаетъ на осенніе и зимніе мѣсяцы. Очень большое влияние на появленіе болѣзни имѣетъ возрастъ. Большая часть первоначальныхъ заболѣваній приходится на юношескій и зрѣлый возрастъ, именно—начиная съ періода наступленія половой зрѣлости до 30 года жизни и затѣмъ до 50 лѣтъ. Въ болѣе старомъ возрастѣ эта болѣзнь почти не встрѣчается. Предвѣстниками ея являются вообще недомоганіе, тянущія боли въ членахъ и т. п., которыя продолжаются дня 2—3. Затѣмъ появляется

Причины

Симптомы
и теченіе.

лихорадка съ повышеніемъ температуры часто до 40° и выше, тяжестью въ головѣ, жаждой и отсутствіемъ аппетита, учащеніемъ пульса и проч.; затѣмъ появляется боль въ томъ или другомъ суставѣ, который вскорѣ опухаетъ, становится горячимъ и краснымъ. Больной избѣгаетъ всякаго движенія пораженнымъ членомъ и не выноситъ даже самаго малѣйшаго прикосновенія. Спустя нѣкоторое время, при продолжающейся лихорадкѣ, поражаются новыя суставы, между тѣмъ какъ ранѣ пораженные возвращаются къ нормѣ (блуждающій, летучій ревматизмъ). Такимъ образомъ, одни за другими могутъ переболѣть всѣ суставы. Если поражены большіе суставы, какъ колѣнный, бедренный и плечевой, или суставы позвоночнаго столба, то больной испытываетъ страшныя муки при малѣйшемъ движеніи. Кожа на ощупь не очень горяча; несмотря на лихорадку, она обыкновенно покрыта потомъ, имѣющимъ кисловатый запахъ. Нерѣдко являются сыпи. Моча выдѣляется въ уменьшенномъ количествѣ и оставляетъ на днѣ сосуда кирпично-красный осадокъ. Языкъ влаженъ, обложенъ бѣлымъ налетомъ. испражненія задержаны, а калъ представляется твердымъ и сухимъ. Сонъ обыкновенно нарушенъ вслѣдствіе сильныхъ болей.

Если болѣзнь протекаетъ безъ особенныхъ осложненій, то она тянется отъ 3 до 6 недѣль, послѣ чего больные представляются крайне исхудалыми и очень медленно поправляются. Бываютъ болѣе легкія формы, при которыхъ поражаются только немногіе суставы и въ умѣренной степени; тогда болѣзнь обыкновенно тянется 8—14 дней. Въ большинствѣ случаевъ поражаются только большіе суставы, маленькіе-же, какъ суставы ручныхъ и и ножныхъ пальцевъ, остаются пощаженными. Наиболѣе часто поражается колѣнный суставъ, равно какъ суставы стопы, ручной кисти, плечевой и локтевой. Изъ осложненій наиболѣе частыми являются воспаленіе сердца, плевры, легкихъ, воспаленіе различныхъ слизистыхъ оболочекъ, какъ бронхитъ, фарингитъ и проч., а также воспаленіе мозга. У пьяницъ суставный ревматизмъ осложняется часто бѣлой горячкой.

Характеристика главнѣйшихъ лѣкарствъ въ отношеніи острого ревматизма суставовъ.

Главнымъ лѣкарствомъ въ началѣ заболѣванія является *Аконитъ 1*, особенно когда имѣется твердый, прыгающій пульсъ, горячая сухая кожа; сильная жажда, безпокойство, тоска, особенно въ области сердца; рвущія, колющія боли, невыносимыя особенно

ночью; красная, съ блескомъ, опухоль пораженныхъ суставовъ, очень болѣзненная при дотрагиваніи.

Вмѣсто Аконита подходитъ *Феррумъ фосфорик.* 3, если пульсъ вялъ и мягокъ. Боли облегчаются отъ медленнаго движенія больной части и отъ приложенія холода. Землистый цвѣтъ лица и легкіе приливы. Больной легко потѣетъ. Моча щелочная.

Бріонія 1. Подобна Акониту въ отношеніи пульса. Лихорадка имѣетъ больше перемежающійся характеръ, временами потъ. Головная боль, тупая, стучащая или колющая. Больной лежитъ неподвижно, избѣгая малѣйшаго движенія, такъ какъ движеніе усиливаетъ всѣ его страданія. Желудочныя разстройства, разстройства и со стороны печени. Сухость во рту, языкъ обложенъ сзади желтовато-бѣлымъ. Больной пьетъ много и часто. Дополнительнымъ къ Бріоніи лѣкарствомъ является *Тартар. эмет.* × 3.

Арника 1. Боль, какъ при вывихѣ или ушибѣ, съ ощущеніемъ онѣмѣнія и свербѣнія; твердая красная, блестящая опухоль. Больной жалуется на какъ бы электрическія подергиванія и ударенія въ больныхъ частяхъ. Чувство какъ бы лежанія на твердомъ.

Хамомила 1. Дополняетъ Аконитъ при сильномъ безпокойствѣ и метаніи въ постели; раздражительное, нервное, капризное настроеніе. Мышцы пораженныхъ частей судорожно напряжены; тянущія, рвущія боли являются больше приступами, при этомъ ощущение онѣмѣнія. Ухудшеніе особенно въ вечерніе часы и ночью. Зябкость спины и членовъ смѣняется жаромъ и краснотою лица, особенно одной щеки. Сильная жажда во время озноба и жара. Горячій потъ всей головы.

Меркур. солуб. × 3 — 2. Колющія, рвущія или жгучія боли не только въ суставахъ, но и въ костяхъ. Хуже отъ теплоты постели и къ утру, также отъ влажнаго и холоднаго воздуха. Обильный, вонючій, какъ бы маслянистый потъ, не приносящій никакого облегченія. Улучшеніе въ теченіе дня и въ покоѣ при теплой погодѣ. Мочевина въ мочѣ уменьшена; мочекислыя соли увеличены, имѣется въ ней и бѣлокъ.

Меркур. корроз. × 3. Тѣ же явленія, но болѣе сильно выраженные. Бѣлокъ и эпителий въ мочѣ. Моча темно-красная или коричнево-красная.

Пульсатилла 1. Боли очень часто мѣняють свое мѣсто, перескакивая съ одного сустава на другой. Облегченіе при раскрываніи больныхъ частей. Блѣдность лица и зябкость, особенно къ вечеру и ночью. Лихорадка не высока. Желудочныя разстрой-

ства, но, въ отличіе отъ Бріоніи, языкъ бѣло обложенъ и жажда не большая. Угнетенное плаксивое настроеніе, часто, однако, и мѣняющееся.

Русь × 3. Помогаетъ скоро въ тѣхъ случаяхъ, когда простуда произошла отъ сырости, отъ промоканія ногъ или вообще тѣла или отъ сильнаго охлажденія при обильной испаринѣ. Больной не находитъ покоя ни въ какомъ положеніи, то и дѣло мѣняя его. Вывихная боль съ ощущеніемъ расслабленности и ползанія мурашекъ въ пораженной части. Красная блестящая опухоль сустава. Облегченіе отъ тепла.

Ацид.-или Натр. салициликумъ × 1. Въ аллопатіи даются въ большихъ дозахъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ ревматизма дѣйствительно быстро унимаютъ боль и уменьшаютъ опухоль ревматически-воспаленныхъ суставовъ, но при этомъ развиваются часто осложненія, особенно со стороны сердца. Въ тѣхъ случаяхъ ревматизма, въ которыхъ салициль помогаетъ, онъ это дѣлаетъ и въ безвредныхъ гомеопатическихъ дозахъ, именно—въ нисшихъ дѣленіяхъ, предпочтительно—1-мъ десятичномъ. Это—тѣ случаи, въ которыхъ моча содержитъ въ обильномъ количествѣ элементы почекъ и мочевыхъ путей, между прочимъ и бѣлокъ, такъ какъ извѣстно, что салициль въ большихъ дозахъ производитъ катарръ упомянутыхъ путей (токсическій нефритъ).

Кромѣ приведенныхъ, могутъ понадобиться при остромъ суставномъ ревматизмѣ еще слѣдующія:

Хина 1. Рѣдко въ началѣ, а больше въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни, особенно при перемежающемся характерѣ ея. Суставы еще опухши, боли подергивающія и давящія. Больной не переноситъ ни малѣйшаго прикосновенія. Общая слабость, рѣзкая блѣдность, обильный потъ.

Арсеникъ × 3. Больныя части крайне чувствительны при давленіи. Большое безпокойство и тоска. Познабливаніе и жаръ попеременно. Больной пьетъ часто, но понемногу. Хуже ночью, лучше въ теплѣ. Обильный, дурнопахнущій потъ.

Ацид. бензоик. × 2. Боли періодичны и часто мѣняютъ свое мѣсто. Упорные ночные поты съ ознобомъ и жаромъ; моча щелочная, горячая и темная, съ противнымъ запахомъ. Частые позывы на мочу, иногда съ мочерѣзомъ. Предупреждаетъ осложненія со стороны сердца. Подходитъ особенно для подагриковъ. Боли идутъ часто сверху книзу и справа влѣво.

Анисъ × 3. Явленія расслабленности преобладаютъ. Отечная,

съ ограниченными краями, опухоль; жгучія и колющія боли. Нервность, беспокойство, чрезмѣрная чувствительность. Ревматизмъ поражаетъ справа влѣво. Цилиндры въ мочѣ, которая сильно насыщена.

Кольхик. Θ — × 1. Общая слабость. Блуждающія боли. Боли въ груди (подобно Бріоніи), съ ощущеніемъ, какъ будто грудь опоясана бинтомъ. Одышка съ стѣсненіемъ въ груди. Моча темная, съ высокимъ удѣльнымъ вѣсомъ и обильнымъ содержаніемъ мочеислаго аммоніака. Подагричность. Ночныя ухудшенія. Часто поносъ съ образованіемъ газовъ. Ревматизмъ осенью и весною при сырой погодѣ.

Дулькамафа × 2. Ревматизмъ особенно отъ промоканія. Боли особенно ночью съ холодомъ и тяжестью, съ ощущеніемъ разслабленности и тугости въ пораженныхъ членахъ. Мутная дурнопахнущая моча, красноватая и съ слизью, съ бѣлымъ и краснымъ осадкомъ. Мочеиспусканіе часто болѣзненно.

При пораженіяхъ сердца примѣняются средства, указанные въ отдѣлѣ 8-мъ, главнымъ образомъ: *Аконитъ, Арсен., Русъ, Спигелія, Кактусъ, Кальмія.*

Наконецъ, надо имѣть въ виду, особенно въ болѣе упорныхъ случаяхъ, еще и конституціональныя средства, какъ *Калькарея карбон., Сульфуръ* и другія, указанные въ 10-мъ отдѣлѣ

О дозахъ и способахъ пріемовъ лѣкарствъ см. ч. 1., гл. 3 и 4 ***дѣленія***—также стр. 35—39.

Страдающаго острымъ суставнымъ ревматизмомъ надо оберегать отъ простуды, не класть у холодной стѣны или вблизи окна или на сквозникъ. Температура комнаты должна быть равномерная, около 15° Р. Не слѣдуетъ примѣнять холодной воды въ видѣ обмываній или обливаній, ни пузыря со льдомъ. Согревающіе компрессы и обертыванія (16—20° Р., 2—3 часа продолжительности) часто хорошо переносятся. Но всего лучше и скорѣе боли и воспаленіе поддаются втираніямъ *белладоннымъ масломъ*, которыя надо производить слегка, не сильно нажимая, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ раза три въ день, каждый разъ затѣмъ заворачивая больныя мѣста въ простую вату и забинтовывая. Когда острые явленія прошли, можно съ пользой примѣнять теплыя ванны съ послѣдующимъ легкимъ массажемъ. Діета должна быть очень легкая и нераздражительная, какъ при лихорадкахъ (стр. 67), преимущественно молочная и растительная.

3. Хроническій ревматизмъ суставовъ.

Признаки и
теченіе.

Хроническій ревматизмъ суставовъ развивается изъ остраго или же является самостоятельно подъ вліяніемъ тѣхъ же причинъ, что и послѣдній. Болѣзнь представляетъ собою медленно протекающее воспаленіе одного или нѣсколькихъ суставовъ, являясь чисто мѣстнымъ страданіемъ. Она наблюдается почти исключительно у пожилыхъ людей. Пораженные суставы почти всегда слегка болѣзненны, но часто въ нихъ появляются и сильныя боли безъ всякой видимой причины, или же при давленіи и движеніяхъ; они почти всегда болѣе или менѣе опухши и очень чувствительны ко всякимъ переменамъ погоды. При ожесточеніи воспаленія отъ движенія или другихъ причинъ больной суставъ кажется на ощупь горячѣе обыкновеннаго, и въ немъ ощущается зыбленіе. При попыткѣ привести въ движеніе больной суставъ, послѣ продолжительнаго его покоя, чувствуется ненормальное сопротивленіе и хрустѣніе, какъ-бы происходящее отъ разрыва сращеній или тренія шероховатыхъ поверхностей. Изъ осложненій встрѣчаются лишь мышечный ревматизмъ и острый суставный (послѣдній въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ онъ уже былъ раньше). Въ давнишнихъ или запущенныхъ случаяхъ являются, вслѣдствіе утолщенія связокъ или суставныхъ оболочекъ, всевозможныя искривленія и набуханія суставовъ, до степени значительнаго обезображенія ихъ. Эта узловатая форма ревматизма по характеру своему очень близко подходитъ къ хронической ломотѣ (артриту — см. стр. 509) и требуетъ такого-же лѣченія.

Лѣченіе

Лѣкарства, показанныя при хроническомъ ревматизмѣ суставовъ, суть слѣдующія: *Сулфуръ*: когда хроническій ревматизмъ произошелъ изъ остраго, и боли облегчаются въ теплѣ и покоѣ. — *Русъ*: блуждающій, переходящій съ сустава на суставъ ревматизмъ; боли усиливаются при переменѣхъ погоды, ночью, отъ теплоты постели и покойнаго положенія, равно какъ въ самомъ началѣ движенія; облегчаются при продолженіи послѣдняго. — *Рододендронъ*: также облегченіе отъ движенія и усиленіе болей ночью; ревматизмъ блуждающій, преимущественно — малыхъ суставовъ, и крайняя чувствительность къ холодному воздуху. — *Каустикъ*. (или *Аммон. каустикумъ 3*): облегченіе въ покоѣ и теплѣ, усиленіе болей отъ продолжительнаго движенія (часто, однако, полезенъ и при отсутствіи этихъ отличительныхъ признаковъ, попеременно съ *Туя*) — *Бріонъ*: припухлость суставовъ съ острыми колющими

болями, отъ прикосновенія и движенія, равно какъ ночью хуже.— *Меркур. солюб.*: при умѣренно опухшихъ суставахъ и усиленіи болей въ постельной теплотѣ.— *Кольхик.*: блуждающія боли, особенно ночью, въ теплую погоду, иногда же и колющія боли въ холодную погоду.— *Қолоцинт.*: особенно послѣ остраго ревматизма, при недостаточной подвижности сустава (также *Ледумъ*).— *Туя*: у больныхъ, страдавшихъ раньше трипперомъ.— *Аммоніумъ фосфорик.* (также *Сульфуръ*): въ запущенныхъ хроническихъ случаяхъ, съ облегченіемъ болей при движеніи и въ покоѣ (принимать продолжительное время 2—3 раза въ день); точно также *Қали іодат.*, или *Іодумъ*, особенно когда боли облегчаются отъ холода, и въ суставахъ ощущается хрустѣніе.—Кромѣ того имѣется еще длинный рядъ лѣкарствъ, которые могутъ пригодиться при хроническомъ ревматизмѣ, а именно: *Арсен. альб.*: при жгучихъ и рвущихъ боляхъ (ночью хуже, а отъ тепла и движенія лучше), *Агарик.*, *Фосфоръ*, *Гепаръ*, *Натр. мур.*, *Қальк. карб.*, *Плумб.*, *Арника*, *Бензое ацид.*, *Берберисъ*, *Коніумъ*, *Дулькамафа*, *Феррумъ*, *Ликопод.*, *Пульсат.*, *Ранункул.*, *Силиція* и др.—Наружно облегчаютъ втиранія лѣкарственными оподельдоками (оподельдоскъ *Русъ*, *Бріон.*, *Ледумъ*, *Арника* и проч.) или настояками и т. д. (см. стр. 41 и проч.). **Дѣленія** см. при „Остромъ ревматизмѣ“.

Грязевыя, соленыя и сѣрныя ванны, а также теплыя купанья **Вспсм. мѣры.** въ Висбаденѣ, Теплицѣ и проч., особенно же Одесскіе лиманы.

Полныя (камерныя) паровыя ванны, втеченіи 20—30 минутъ 3 раза въ недѣлю; солнечныя ванны; постельныя паровыя ванны втеченіи 1½ часовъ), также 3 раза въ недѣлю; или же цѣльныя обертыванія (24° R.) со вложеніемъ влажно-завернутыхъ горячихъ бутылокъ. Послѣ каждаго изъ такихъ примѣненій слѣдуетъ примѣнять полуванну (25° R., 10 мин. продолжительности), съ слѣдующимъ обливаніемъ (22° R.) всего тѣла и суставовъ втеченіи 1 мин. (22°—15° R.).—Очень благотворно дѣйствуютъ также частичныя обливанія (25°—15° R., 2—4 лейки): обливаніе бедеръ. поперечное обливаніе спины, прямое обливаніе спины, обливаніе колѣнъ, обливаніе верхнихъ конечностей и т. д., но не всѣ обливанія въ одинъ день, а дѣлая ихъ въ томъ или другомъ порядкѣ, каждый день по одному или по два.—При узловатомъ ревматизмѣ (утолщеніяхъ суставовъ) хорошіе результаты получались отъ песочныхъ ваннъ (40° R., втеченіи получаса, у очень слабыхъ лицъ не полныя, а частичныя песочныя ванны (ножныя, ручныя). Очень хорошо дѣйствуетъ во всякомъ случаѣ и массажъ съ слѣдующей,

за нимъ шведской гимнастикой. Діета—преимущественно вегетарианская (растительная).

II. Воспаленія костей.

**Предваритель-
ныя замѣтки**

Воспалительные процессы въ костяхъ имѣютъ много общаго съ такими же процессами въ мягкихъ частяхъ тѣла, существенно же отличаются тѣмъ, что въ костяхъ можетъ происходить не только разрушеніе костной ткани, но и восстановленіе ея на мѣсто разрушенной, причемъ новая кость воспроизводится со стороны костнаго мозга, получается какъ бы воспалительная гипертрофія кости. Процессъ образованія кости въ болѣзни происходитъ тѣмъ же путемъ и способомъ, какъ и въ здоровомъ состояніи, когда разсасываніе и новообразованіе костной ткани совершаются одновременно; разница лишь та, что въ болѣзни кости восстанавливающаяся костная ткань образуетъ неправильныя формы (костная мозоль).

Причины воспаленія костей тѣ-же, что и воспаленія другихъ тканей, а именно механическія и химическія воздѣйствія, также внѣдрѣніе заразныхъ началъ (бактерій).

Для аллопатовъ является „замѣчательнымъ своеобразіемъ“, для гомеопатовъ же вполне естественнымъ явленіемъ то, что нѣкоторые химическіе агенты (напримѣръ, фосфоръ) въ малыхъ количествахъ содѣйствуютъ воспроизведенію костной ткани, въ большихъ же, наоборотъ, ведутъ прямо къ омертвѣнію кости (фосфорный некрозъ работниковъ на спичечныхъ фабрикахъ). То же надо сказать о ртути (Меркуріи) и др.

Воспаленіе костей имѣетъ тѣсную связь съ воспаленіемъ суставовъ. Какъ и тамъ, различаются тутъ разныя формы воспаленія, въ зависимости отъ того, какія части кости поражаются, и' отъ какихъ причинъ.

Такъ различаютъ: воспаленіе надкостной плевы или надкостницы (періоститъ), воспаленіе костнаго мозга (остеомиелитъ), воспаленіе самой костной ткани (оститъ), воспаленіе всѣхъ частей кости (паноститъ); послѣднее, т. е. воспаленіе всѣхъ трехъ составныхъ частей кости, встрѣчается чаще всего.

1. Воспаленіе надкостницы. Періоститъ.

**Признаки
и теченіе.**

Гиперемическое (приливное) воспаленіе наблюдается послѣ ушибовъ надкостницы и въ начальномъ періодѣ болѣе тяжкихъ формъ воспаленія ея или другихъ частей кости. Надкостница при

этомъ утолщается и отекаетъ. Воспаленіе это можетъ вести за собою образованіе молодой костной ткани (воспаленіе съ окостенѣніемъ). Новообразовавшіяся, обыкновенно неправильной формы, костныя массы носятъ названіе остеофитовъ, а также экзостозовъ и гиперостозовъ; онѣ имѣютъ видъ остроконечныхъ или неправильной формы сосковидныхъ и узловатыхъ отложеній на поверхности кости, часто до степени обезображиванія нормальнаго ея вида. Или же дѣло не доходитъ до наростанія кости, а образуются лишь въ большемъ количествѣ мозолистые волокнистые наросты.—Гиперемическое воспаленіе можетъ перейти и въ гнойное, при чемъ гной скопляется подъ надкостницей въ видѣ большаго или меньшаго бугра. Тутъ ужъ поражается и ткань самой кости, такъ какъ она лишается питающей ее надкостницы; поверхностный слой кости подвергается омертвѣнію (некрозу).

При гнойномъ воспаленіи надкостницы страдаетъ обыкновенно и весь организмъ, испытывая сильную боль, лихорадочное состояніе и проч. Послѣ прорыва гноя наружу наступаетъ и выздоровленіе, если не дошло до образованія большихъ омертвѣвшихъ костныхъ кусковъ (секвестровъ); на кости либо никакихъ слѣдовъ не остается, либо остается лишь незначительное углубленіе. Въ другихъ случаяхъ бываетъ такъ, что гной не прорывается наружу и, если его не выпустить искусственно, уплотняется и окружается новообразованной костной скорлупой, какъ бы мѣшкомъ (инкапсулируется), оставаясь въ такомъ состояніи до тѣхъ поръ, пока, подъ вліяніемъ какого либо поврежденія, воспаленіе не возгорится вновь. Лѣченіе—ниже.

2. Воспаленіе костнаго мозга. Остеоміэлитъ.

Воспаленіе костнаго мозга бываетъ, какъ и воспаленіе надкостницы, гиперемическое, окостенѣвающее и гнойное. Причины: травматическія вліянія, острые и хроническія общія заразныя болѣзни (туберкулезъ и проч.), воспаленія сосѣднихъ тканей. Теченіе гнойнаго воспаленія костнаго мозга отличается крайне тяжелымъ характеромъ, и, если не принять своевременно соотвѣтствующихъ мѣръ къ выходу гноя наружу, можетъ развиваться гноекроевіе или гнилокроевіе, вслѣдствіе всасыванія гниlostныхъ веществъ въ кровь.

Острый инфекціонный остеоміэлитъ встрѣчается всего чаще въ возрастѣ отъ 10 до 20 лѣтъ, т. е. въ періодъ усиленнаго роста **Острый остеоміэлитъ**

костей. Люди пожилые почти никогда не поражаются этой болѣзнью. Болѣзнь вспыхиваетъ внезапно, среди полного здоровья или же послѣ легкаго поврежденія, ушиба и т. п., при потрясающемъ ознобѣ и лихорадочной температурѣ тѣла. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ воспаленной части быстро развивается жестокая боль. Въ легкихъ случаяхъ сознание не нарушается, въ тяжелыхъ же оно помрачается въ весьма сильной степени, когда и лихорадка очень высока (40° и больше) и имѣетъ тифозный характеръ, такъ что болѣзнь становится очень похожей на брюшной тифъ. Въ отношеніи распознаванія возрастъ больного имѣетъ тутъ важное значеніе. Спустя дней 8 болѣзнь во всякомъ случаѣ выясняется, и имѣются уже явныя указанія на наличность костнаго страданія, сознание же у больного вновь восстанавливается. Въ тяжелыхъ формахъ поражается обыкновенно не только тѣло кости, но и суставные концы, и болѣзнь осложняется воспаленіемъ сустава, выпотнымъ или гнойнымъ (множественный остеомиелитъ). Въ такихъ случаяхъ исходъ болѣзни обыкновенно крайне неблагоприятенъ, такъ какъ развивается общее гноекрое, больные гибнутъ раньше, чѣмъ успѣютъ вполне развиваться всѣ мѣстныя измѣненія.

Когда болѣзнь ограничивается лишь костью, тогда вслѣдъ за появленіемъ боли, выступаетъ въ пораженномъ мѣстѣ тѣстоватая, отечная припухлость съ расширеніемъ подкожныхъ венъ; затѣмъ появляется краснота, а въ концѣ второй или въ началѣ третьей недѣли готовый уже нарывъ становится несомнѣннымъ. Нарывъ можетъ вскрыться и самъ собою, причемъ вытекаетъ большое количество густого сливкообразнаго гноя. Если отверстие большое, то въ глубинѣ можно увидѣть оголенную кость, т. е. лишенную надкостницы. Послѣ вскрытія нарыва температура падаетъ, и больной быстро поправляется. Въ болѣе трудныхъ случаяхъ кость въ большей или меньшей мѣрѣ разѣдается (костоѣда) и раньше или позже выдѣляются небольшіе осколки кости, выталкиваемые наружу путемъ давленія нарастающихъ позади грануляцій, или благодаря движенію конечности. При небольшой распространенности болѣзненнаго процесса достигается такимъ образомъ самостоятельное выздоровленіе. Въ другихъ же случаяхъ, для достиженія скорѣйшаго выздоровленія, необходима оперативная помощь.

Лѣченіе острыхъ воспаленій костей и надкостницы.

Въ самомъ началѣ болѣзни—*Аконитъ* 1: высокая лихорадка, напряженный пульсъ, сильная тоска и безпокойство.—*Белладон-*

на $\times 3$: при сильных мѣстных боляхъ и мозговыхъ симптомахъ.—*Арсеникъ 3*: тифозныя явленія.—*Меркур. солуб. 3* или *Меркур. корроз. 2*: относятся къ главнымъ средствамъ противъ воспаленія костей и даются попеременно съ Белладонной при сильной боли, ухудшающейся особенно ночью.—У дѣтей золотушныхъ, рахитичныхъ, истощенныхъ, умѣстенъ, скорѣ послѣ Меркурія, *Фосфоръ 3* или *Фосфори ацид. $\times 3$* .—Позднѣе—*Силиція 3*.

Наружно—часто смѣняемые компрессы изъ раствора *Симфитумъ Θ* (пополамъ съ водой), особенно при воспаленіи отъ поврежденія; при сильной же воспалительной краснотѣ и жестокихъ боляхъ согрѣвающие компрессы изъ такого же раствора *Рута Θ* (также внутренно *Рута $\times 3$*). Примѣненіе льда не цѣлесообразно, даже въ началѣ болѣзни, равно какъ не переносятся хорошо въ такихъ случаяхъ и слишкомъ теплыя примѣненія, вродѣ припарокъ и горячихъ ваннъ.

3. Хроническое воспаленіе костей. Сюда относятся не-
 выполнѣ излѣченные острые воспаленія; кромѣ того — профессио-
 нальное воспаленіе костей: у работниковъ, которымъ приходится
 имѣть много дѣла съ фосфоромъ, на примѣръ—на спичечныхъ фаб-
 рикахъ (фосфорный некрозъ), или у работающихъ съ перламутромъ отъ вдыханія, во время работы, перламутровой пыли; да-
 лѣе—сифилисъ костей. Въ первыхъ случаяхъ лѣченіе сводится къ
 устраненію причины, а при сифилисѣ — къ лѣченію основной бо-
 лѣзни. — Воспаленіе костей отъ чрезмѣрнаго употребленія ртути
 требуетъ такихъ лѣкарствъ, какъ *Гепаръ сульф.*, *Ацид. нитрик.*
Аурумъ муріатик.

Хроническій
остеомиелитъ.

Чаще всего хроническое воспаленіе костей, какъ и суставовъ, встрѣчается на почвѣ туберкулеза, о которомъ уже была рѣчь въ 10-мъ отдѣлѣ этой книги и будетъ еще сказано ниже.

Надо упомянуть, наконецъ, еще объ одномъ страданіи костей, происхожденіе котораго до сихъ поръ еще не выяснено (развивается иногда послѣ травмы),—а именно—самобытный склерозъ костей (идиопатическій остеосклерозъ). Сущность же его заклю-
 чается въ неупругому утолщенію и уплотненію костей черепа и къ зависящему отъ этого значительному суженію головныхъ полостей (полости черепа, глазницы и пр.) и послѣдовательнымъ разстройствамъ отправленій соотвѣтствующихъ органовъ (эпилепсія, идиотизмъ и пр.) Лѣченіе сводится къ примѣненію лѣкарствъ, влияющихъ на кости (*Силиція*, *Фосфоръ* и проч.) и къ цѣлесообразной діетѣ.

Самобытный
склерозъ
костей.

Туберкулезъ
костей и
суставовъ.

4. Туберкулезъ костей и суставовъ. Туберкулезъ костей не новая болѣзнь; картина этой болѣзни извѣстна была и въ давнія времена, но лишь подъ другими названіями, а именно: артрокаце, артральгія, каріесъ, костоѣда, суставный грибъ (фунгусъ), бѣлая опухоль и проч. И теперь говорятъ еще о золотушномъ или фунгозномъ страданіи суставовъ, которое также есть не что иное, какъ туберкулезное пораженіе. О сущности туберкулеза сказано уже выше (стр. 495); объ отношеніи туберкулеза къ золотухѣ см. стр. 491. Симптомы и теченіе воспаления костей и суставовъ приведены выше.

Здѣсь приводится нѣсколько данныхъ для различительнаго распознаванія болѣзни.

Отъ остеоміалита туберкулезъ костей отличается тѣмъ, что:

	при остеоміалитѣ:	при туберкулѣзѣ:
Больной.	заболѣваетъ въ видимо здоровомъ состояніи.	имѣть золотушное тѣлосложеніе.
Начало болѣзни и теченіе.	внезапное, тяжелое, лихорадочное, съ общими разстройствами; выздоровленіе.	развивается исподволь, медленно, безъ бурныхъ явленій; возрастающій упадокъ силъ.
Преимущественное мѣсто заболѣванія:	средняя часть длинныхъ (трубчатыхъ) костей.	короткія кости и концы (губчатая часть) длинныхъ костей.
Выдѣленіе:	густой, сливообразный гной.	сукровичная жидкость.
Грануляціи (зернистая ткань):	свѣжія, красныя.	блѣдныя, рыхлыя.
Выдѣляющіеся костн. осколки.	острые, сплошно-плотные	закругленные, губчатые

Еще можетъ явиться вопросъ, откуда исходить туберкулезное пораженіе—изъ кости или изъ внутренней оболочки сустава: у дѣтей почти всегда изъ кости, у взрослыхъ же обыкновенно изъ суставной оболочки, когда, именно, въ началѣ имѣется водянка или ворсинчатое воспаление сустава. Въ случаяхъ костнаго происхожденія имѣются всегда болѣзненные точки на костяхъ.—Надо имѣть еще въ виду сифилитическія и гоноррейныя пораженія костей и суставовъ. Кромѣ исторіи болѣзни характерны при сифилисѣ — туго напряженный, какъ дерево, выпотъ и чрезвычайно сильныя боли, особенно по ночамъ, уступающія противосифилитическому лѣченію; при гонорреѣ выпотъ въ суставѣ обыкновенно сыровоточный, отсутствіе другихъ значительныхъ болѣзненныхъ состояній туберкулезнаго или золотушнаго характера; исторія болѣзни.

Въ послѣдніе годы замѣчается даже со стороны аллопатовъ все большее стремленіе къ сохраняющему (консервативному), безкровному лѣченію туберкулезныхъ пораженій костей и суставовъ. Этого бы не было, если бы прежнее огульное и сколь возможно ран-

нее оперирование при каждомъ распознанномъ туберкулезномъ очагѣ давало сколько нибудь благоприятные результаты. Извѣстно, что операція въ такихъ случаяхъ очень часто способствуетъ распространению туберкулезнаго процесса на весь организмъ. И надо лишь радоваться тому, что теперь многие хирурги изыскиваютъ всевозможные способы для самопроизвольнаго исцѣленія туберкулезныхъ суставовъ, которое дѣйствительно такъ часто наблюдается, и допускаютъ оперативное вмѣшательство только въ строго-опредѣленныхъ случаяхъ и въ возможно-ограниченныхъ размѣрахъ. Консервативными, безкровными способами считаются: вытяжение и неподвижная повязка, гипсовые повязки, впрыскивание йодоформной эмульсии въ туберкулезный суставъ, втираніе сѣрой ртутной мази въ туберкулезные суставы и кости и т. п.; въ болѣе легкихъ случаяхъ — ортопедическіе аппараты.

Къ сожалѣнію, аллопатами испытываются всевозможные способы, только не гомеопатическій способъ лѣченія туберкулезныхъ процессовъ въ костяхъ и суставахъ. Между тѣмъ гомеопатическое лѣчение даетъ тутъ очень хорошіе, иногда прямо блестящіе результаты. Само собой разумѣется, что лѣчение въ такихъ случаяхъ болѣзней должно продолжаться выдержанно и настойчиво въ теченіе мѣсяцевъ и даже лѣтъ.

Калькареа-препараты являются главными въ ряду лѣкарствъ влияющихъ на кости. Различаются они между собою меньше характеромъ мѣстныхъ измѣненій, чѣмъ общимъ тѣлосложеніемъ больного. Характеристику этихъ, какъ и другихъ еще лѣкарствъ, см. выше при туберкулезѣ вообще (стр. 497), также при золотухѣ (стр. 493).

Діета и вспомогательныя мѣры вообще тѣ-же, что при золотухѣ и малокровіи.

Искривленія и тому подобныя уклоненія формы человѣческаго тѣла отъ нормы (косоплоскость и неправильность стопы и проч., также горбъ, анкилозы и т. п.) относятся всецѣло къ области хирургіи и ортопедіи, поэтому и не описываются въ этой книгѣ. Лѣкарства даются противъ тѣхъ болѣзненныхъ состояній костей и суставовъ, если они не прирожденны, которыя соотвѣтствуютъ по общимъ правиламъ.

III. Болѣзни мышцъ.

Содержаніе.—1. Мышечный ревматизмъ.—2 Воспаленіе мышцъ—3 Атрофія мышцъ—4. Ожирѣніе мышцъ.—5. Судороги и параличи мышцъ—см стр. 125—145.

1. Мышечный ревматизмъ.

Признаки.

Мышечный ревматизмъ выражается воспаленіемъ въ мышцахъ и въ ихъ оболочкахъ. Болѣзнь выражается болью въ мышцахъ, являющейся самопроизвольно и при движеніи, а также при давленіи. При этой болѣзни, какъ и при суставномъ ревматизмѣ, боли усиливаются при сырой и холодной погодѣ. Наиболѣе часто встрѣчающіяся формы этого заболѣванія суть слѣдующія: Ревматизмъ головы, при которомъ поражаются затылочные, лобныя и височныя мышцы, становясь крайне чувствительными. Ревматизмъ шейныхъ и затылочныхъ мышцъ; при немъ поражена одна или нѣсколько шейныхъ или затылочныхъ мышцъ, и имѣется либо полная неповоротливость и тугость шеи, вызываемая крайней болѣзненностью послѣдней, либо же, при поражении только одной стороны, сведеніе ея въ эту сторону (кривошея). Пораженныя мышцы прощупываются черезъ кожу въ видѣ туго-натянутыхъ шнуровъ. Ревматизмъ грудныхъ и межреберныхъ мышцъ. боли распространяются на всю сторону грудной клѣтки и усиливаются отъ движенія, дыханія, кашля, чиханія, натуживанія во время испражненія и т. п. Ревматизмъ лопаточныхъ мышцъ, при которомъ поражены мышцы лопатки и плеча. Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ характеризуется сильными, постоянными болями въ мышцахъ и связкахъ поясничной области съ одной или съ обѣихъ сторонъ. Изъ всѣхъ встрѣчающихся формъ мышечнаго ревматизма поясничная—самая мучительная, такъ какъ больные страдаютъ при каждомъ положеніи тѣла, и малѣйшее движеніе сопровождается болями. Причина заболѣванія—сырость и холодъ, но бываетъ также слѣдствиемъ растяженія отдѣльныхъ мышечныхъ волоконъ при нагибаніи и выпрямленіи спины, при поднятіи тяжестей и т. д. Невралгію спины (лумбаго пострѣлъ) и проч. см. стр. 120.

Лѣченіе.

При ревматизмѣ вслѣдствие механическихъ поврежденій примѣняется *Арника*, внутренне и наружно (въ видѣ втираній тинктурой или оподельдокомъ Арники).—Затѣмъ, въ другихъ случаяхъ, *Акон.*: послѣ простуды и при поражении главнымъ образомъ верхнихъ конечностей.—*Ругъ* если поражены преимущественно поясница и нижнія конечности, вслѣдствие промоканія; облегченіе при болѣе

продолжительномъ движеніи. — *Брион.*: при ревматизмѣ грудныхъ и брюшныхъ мышцъ; хуже въ покоѣ, лучше въ движеніи. — *Каустик.*: при поясничной боли и одеревенѣлости ногъ; облегченіе болей въ постельной теплотѣ и жестокое усиленіе при движеніи. — *Меркур.-соллюб.*: поясничная боль; облегченіе при движеніи; обильное, но не облегчающее потѣніе. — *Нуксѣ вом.*: поясничная боль съ желудочными страданіями; запоръ. — *Тартар. зметик.*: при поражении мышцъ спины и ногъ, особенно послѣ напряженія, и при крайне жестокихъ боляхъ. — *Пульсат.*: при перескакивающемъ съ мѣста на мѣсто ревматизмѣ, съ усиленіемъ болей въ вечерніе часы. — Затѣмъ еще *Дулькамара*, *Вератр.*, *Сульфуръ* (послѣдній послѣ улучшения, для предупрежденія возвратовъ, принимать еще нѣкоторое время, 2—3 раза въ день).

Примѣненія — тѣ-же, какъ при невралгіи, и они имѣютъ цѣлью **Вспом. мѣры** возстановить правильное кровообращеніе, вслѣдствіе нарушенія котораго является мышечный ревматизмъ, и такимъ образомъ вывести изъ организма накопившіеся въ немъ вредные продукты. Для этого примѣняются: полныя (камерныя) паровыя ванны, продолжительностью 30 минутъ, постельная паровая ванна (въ продолженіе 1½ часовъ), цѣльное обертываніе (22° Р., въ продолженіе 1 часа), затѣмъ полуванна (25° Р. и 10 минутъ продолжительности) съ цѣльнымъ обливаніемъ (2 лейки 22-градусной воды) и послѣдующимъ затѣмъ массажемъ всего тѣла или массажемъ болѣзненныхъ мышцъ (продолжительностью 10—30 минутъ). Противъ болей успѣшно дѣйствуютъ паровыя компрессы, смѣняемые черезъ каждыя 15 минутъ и частичныя обертыванія (рукъ, ногъ, груди и проч.) продолжительностью 2 часа, точно также мѣстныя паровыя ванны. — Также электричество, особенно прерывистый токъ.

2. Воспаленіе мышцъ.

Воспаленіе мышцъ является большей частью вслѣдствіе перехода на нихъ воспалительнаго процесса съ окружающихъ частей и выражается въ видѣ нарыва. Послѣдствіемъ можетъ быть ограниченная дѣятельность пораженной мышцы (тугоподвижность), обусловливаемая образованіемъ рубцовъ. Сравнительно чаще, чѣмъ другія мышцы, поражается такимъ образомъ большая поясничная мышца (м. *псоасъ*), находящаяся въ полости живота на внутренней сторонѣ спины, начинаясь у поясничныхъ позвонковъ и кончающъ у бедреннаго сустава (относится къ мышцамъ, сгибающимъ бедро).

Воспаление этой мышцы, обыкновенно вследствие гнойного воспаления позвонковъ (наприм., при туберкулезѣ послѣднихъ), протекаетъ такъ, какъ больше нарывы вообще, сопровождаясь сильной болью и лихорадкой. Боль въ области поясницы, усиливающаяся отъ выпрямления нижней конечности или поворачиванія ея кнутри и облегчающаяся при согнутомъ въ бедреномъ суставѣ бедрѣ. Исходъ зависитъ отъ того, въ какомъ мѣстѣ гной прорывается, внутрь ли, въ брюшную полость, что очень опасно для жизни, или же по направлению къ бедру наружу (исходъ наиболѣе благоприятный); очень рѣдко нарывъ вскрывается сзади, у позвоночника. Гноетечение продолжается долгое время, истощая силы больного. Предсказаніе сомнительно, когда основная болѣзнь трудноизлѣчима (туберкулезъ).

Крайне рѣдко случается, чтобы воспаление псоасной мышцы не перешло въ нагноеніе; поэтому, въ виду, именно, глубокаго положенія ея въ тѣлѣ и опасности прорыва гноя въ брюшную полость, лѣченіе ея относится больше къ области хирургіи, нежели внутренней медицины.

Внутреннее лѣченіе вообще какъ при нарывахъ: *Белладонна* × 3 и *Меркур. солуб.* × 3, а при признакахъ наступившаго нагноенія— *Гепаръ сульф.* и *Силиція* 3.

3. Атрофія мышцъ.

Атрофія (т. е. оскуднѣніе, исчезаніе) мышечной ткани вызывается чаще всего длительной недѣятельностью или обезкровленіемъ какихъ либо мышцъ конечностей или туловища, что въ свою очередь зависитъ отъ разныхъ обстоятельствъ. Такъ, мышцы могутъ атрофироваться подъ влияніемъ гипсовыхъ повязокъ, накладываемыхъ на продолжительное время при переломахъ костей или при болѣзняхъ суставовъ; до нѣкоторой степени атрофируются мышцы спины у женщинъ, носящихъ постоянно тугостянутый корсетъ, до такой степени, что безъ корсета онѣ не въ состояніи сколько нибудь продолжительно держать туловище въ прямомъ положеніи; равнымъ образомъ дѣйствуютъ вообще тугонакладываемыя на продолжительное время повязки; давленіе, производимое въ такихъ случаяхъ, не настолько сильно и не столь уже долго продолжается, чтобы вызвать омертвѣніе всей конечности, но чувствительное къ обезкровленію мышечное волокно умираетъ.

Своевременное устраненіе вызывающей атрофію причины и

энергический массаж могут въ такихъ случаяхъ привести атрофированныя мышцы въ первоначальное сосгояние.

Мышечная атрофія можетъ быть вслѣдствіе перерѣзки или вообще поврежденія нервовъ, идущихъ къ мышцамъ, или вслѣдствіе давленія на мышцы костныхъ мозолей или опухолей и т. п. Помощь въ такихъ случаяхъ возможна только хирургическая.

Исхуданіе мышцъ при дѣтскомъ параличѣ см. на стр. 118.

Прогрессивная мышечная атрофія. При этой болѣзни исчезаніе мышечныхъ волоконъ можетъ дойти до $\frac{1}{10}$ ихъ объема. Теченіе болѣзни крайне медленное и затягивается на цѣлыя годы и десятки лѣтъ. Болѣзнь начинается съ мышечнаго бугра у большого пальца руки, переходитъ на межкостныя мышцы ладони, на бугоръ у мизинца и т. д. По мѣрѣ атрофирования уменьшается и сила мышцъ. Противодѣйствовать этому процессу можно массажемъ и приемами внутрь *Плѹмбумъ 6, Купрумъ 6, Арсеникъ 6, Сульфуръ 6, Каустикъ 3.*

4. Ожирѣніе или ложная гипертрофія мышцъ.

Ожирѣвшія мышцы производятъ такое впечатлѣніе, какъ будто онѣ просто утолщены, гипертрофированы, какъ у атлетовъ. На самомъ же дѣлѣ мышечная ткань уменьшена, замѣщенная жиромъ, и мышечная сила настолько понижена, что больные съ большимъ трудомъ держатся на ногахъ. Поражаются этой болѣзнію преимущественно дѣти. Лѣченіе, какъ при ожирѣніи вообще (см. стр. 500).

5. Судороги и параличи мышцъ см. стр. 125—145

III. Болѣзни сухожилій, сухожильныхъ влагалищъ и слизистыхъ сумокъ.

Перерѣзки, разрывы и отрывы (отъ мѣста прикрѣпленій) сухожилій, и вывихи ихъ относятся къ области хирургии. Болѣзни сухожильныхъ влагалищъ очень схожи съ болѣзнями суставовъ какъ по происхожденію, такъ и по своему характеру и теченію. Острое сывороточное воспаленіе сухожильныхъ влагалищъ (Тендовагинитъ) встрѣчается особенно при гонорреѣ въ видѣ продолговатой припухлости, соотвѣтствующей ходу сухожилия, въ которой при движеніи чувствуется боль.—Лѣченіе: согрѣвающе компрессы, компрессы изъ *масла Белладонны*, внутрь—*Беллад.*, *Меркуръ солюб.* и проч. (см. остр. воспал. сустава).

Болѣзни сухожилій и сухож. влагалищъ

Хроническій тендовагинитъ представляетъ собою водянку сухожильнаго влагалища и происходитъ изъ острой формы этой болѣзни. Упорныя формы бываютъ чаще всего на сгибателяхъ пальцевъ и часто образуютъ тутъ большія опухоли съ утолщеніями (въ застарѣлыхъ случаяхъ) влагалищной стѣнки, въ видѣ отдѣльныхъ тѣлецъ (такъ наз. рисовыя тѣльца). Лѣченіе: массажъ, а внутрь—*Іод.*, *Калькар. іодат.*, *Калькар. карб.* и т. п., также оперативные способы.

Не вполне еще выяснено, происходятъ ли воспаленія сухожильныхъ влагалищъ отъ чрезмѣрной работы; только одна форма навѣрно происходитъ отъ чрезмѣрныхъ или непривычныхъ напряженій (наприм. отъ гребли и т. п.), это—хрустящій тендовагинитъ. При каждомъ движеніи въ своемъ влагалищѣ сухожиліе издаетъ слышный и для посторонняго трескъ или хрустъ, который легко ощутить при легкомъ сдавливаніи пальцемъ. Массажъ и влажная теплота (съ Арникой) устраняетъ эту ненормальность въ нѣсколько дней.

Или сухожиліе теряетъ свою гладкую поверхность и трубчатую форму, въ однихъ мѣстахъ ущемляется, въ другихъ припухаетъ; также и во влагалищѣ сухожилія развиваются суженія, вслѣдствіе чего являются разстройства въ движеніи („щелкающій“ палецъ). Причины: ушибы и чрезмѣрныя, продолжительныя движенія. Лѣченіе: устраненіе причины, массажъ.

**Болѣзни
слизистыхъ
сумокъ.**

Слизистой сумкой называется щелеобразное образованіе вродѣ лимфатическаго; она прилегаетъ къ суставу. Особенное значеніе имѣютъ слизистыя сумки предколѣнной чашки и локтя, которыя чаще другихъ сумокъ поражаются острымъ воспаленіемъ. Острое воспаленіе слизистой сумки (Бурзитъ) происходитъ путемъ заноса заразнаго начала черезъ лимфатическіе сосуды такъ же, какъ при воспаленіи въ венозной и лимфатической системѣ—(стр. 385—387). Сумка припухаетъ, принимая форму полушара; она болѣзненна и напряжена; при ощупываніи опухоли ощущается зыбленіе заключающейся въ ней жидкости. Въ этой стадіи возможно еще разсосаніе опухоли, если придать больному члену покой, прикладывать согрѣвающие компрессы съ Белладонной и принимать внутрь *Беллад. × 3*, *Меркур. солуб. 3* *Аписъ × 3*. Если же, не смотря на это, боль, опухоль и лихорадка усиливаются, то это означаетъ переходъ въ нагноеніе; тогда принимаютъ *Гепар. сульф. 3*, а послѣ вскрытія нарыва—*Силиція 3*. При очень бурныхъ явленіяхъ лучше не медлить съ искусственнымъ вскрытіемъ нарыва.

Хроническое сывороточное воспаление слизистой сумки называется гигромой. Стѣнка сумки утолщена; на внутренней поверхности ея образуются бородавчатые разращенія, вродѣ полиповъ, которыя могутъ отдѣлиться, и они тогда плаваютъ въ сумочной жидкости въ видѣ огуречныхъ сѣмянъ („рисовыя тѣльца“). Боль въ гигромѣ является только при сильномъ надавливаніи, при ушибѣ; въ колѣнной гигромѣ—при стояніи на колѣняхъ, при мытьѣ половъ, у плотниковъ и т. п. Если опухоль не проходитъ отъ іодистыхъ лѣкарствъ, пульсатиллы, бріоніи и аписа, то надо обратиться къ хирургической помощи, которая заключается въ данномъ случаѣ предпочтительно не въ разрѣзѣ опухоли, а во впрыскиваніи въ нее карболовой кислоты или хлористаго цинка, отъ которыхъ опухоль сморщивается. Въ случаѣ разрѣза остается рубецъ, часто очень тягостный, особенно на колѣнѣ.

Гигрома.

Гангліи есть грыжеподобное выпячиваніе сухожильнаго влагалища или сочленовой сумки. Это та опухоль, которая часто образуется на тылѣ руки, кругловатая, твердая, немного подвижная, величиною съ большой или меньшій орѣхъ, мало или вовсе не болѣзненная, покрытая нормальной или слегка истонченной кожей. Ганглии содержатъ вязкую, густую, желатинообразную жидкость. и въ ней могутъ образоваться упомянутыя выше рисовыя тѣльца. Удаленіе этой опухоли массажемъ болѣзненно и требуетъ много времени. Подкожное раздавливаніе большимъ пальцемъ или ударомъ молотка по плоско наложенной металлической пластинкѣ—грубо и не всегда достигаетъ цѣли. Самое лучшее, это—вылущеніе опухоли, но этотъ хирургическій способъ не предохраняетъ отъ возврата. Какъ наиболѣе вѣрный способъ рекомендуется впрыскиваніе карболовой кислоты или хлористаго цинка, послѣ чего является легкое, малоболѣзненное воспаленіе и затвердѣніе, и ганглии медленно сморщиваются втеченіе 2—4 недѣль. Этимъ способомъ избѣгается образованіе рубца, что можетъ быть важно для молодыхъ женщинъ, у которыхъ, кстати сказать, чаще, чѣмъ у другихъ, образуется эта опухоль, и именно на рукахъ.

Ганглии.

ОТДѢЛЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

Болѣзни кожи.

Кожа играетъ весьма важную роль въ жизни организма. Много болѣзненныхъ состояній не только наружныхъ, но и внутреннихъ, происходитъ вслѣд- Кожа какъ ствіе воздѣйствія на кожу внѣшнихъ вредныхъ вліяній, равно какъ на кожѣ весьма часто отражаются болѣзненные расстройства внутреннихъ органовъ.

Съ другой стороны, кожа по своему назначенію служить предохранительной оболочкой, оберегающей живой организмъ отъ такого воздѣйствія и отъ прониканія въ него извнѣ вредныхъ вліяній, и вмѣстѣ съ тѣмъ она представляетъ собою весьма важный выводной органъ, чрезъ который изъ тѣла удаляются разнаго рода вещества, ставшія для послѣдняго негодными и обладающія даже ядовитыми свойствами. Вещества эти принадлежать къ тѣмъ, такъ сказать, отбросамъ, которые получаютъ въ конечномъ результатѣ перерабатывающей дѣятельности организма. Затѣмъ, чрезъ посредство кожи регулируется содержаніе воды въ тѣлѣ, при чемъ излишекъ послѣдней выдѣляется изъ него въ видѣ испарины, пота, чѣмъ одновременно достигается и регулированіе температуры организма. Далѣе кожа выполняетъ также работу, подобно работѣ легкихъ: она дышетъ, въ томъ именно смыслѣ, что чрезъ нее проникаетъ въ тѣло кислородъ, а изъ тѣла выдѣляется образующаяся въ немъ угольная кислота. Наконецъ кожа представляетъ собою весьма тонкій и нѣжный нервный и нервномышечный аппаратъ, находящійся въ постоянной и самой тѣсной связи съ внутренней нервной системой, и въ этомъ обстоятельствѣ кроется, собственно, важнѣйшее, основное значеніе кожи для организма.

Строеніе кожи.

Соотвѣтственно этому сложному своему назначенію, кожа имѣетъ и очень сложное, въ то-же время весьма нѣжное устройство, которое простымъ, невооруженнымъ глазомъ мало замѣтно, но становится отчетливо видимымъ при помощи микроскопа (на поперечныхъ разрѣзахъ). Она состоитъ изъ трехъ главныхъ другъ надъ другомъ лежащихъ слоевъ: 1) верхней кожицы (эпидермисъ), 2) собственно кожной ткани и 3) подкожной клѣтчатки; подъ самой же кожей имѣется въ большемъ или меньшемъ количествѣ подкожная жировая тканьъ, облегчающая подвижность кожи. Во всей кожѣ развѣтвлены кровеносные сосуды (волосыя трубочки) нервныя волокна, снабженныя чувствительными и осязательными аппаратами, мышечныя волокна, отъ сокращенія которыхъ происходитъ такъ называемая гусиная кожа. Кромѣ того, кожа содержитъ безчисленное множество поръ (точечныхъ отверстій), потовыхъ железъ, затѣмъ—жировыя железки и волосыяныя мѣшечки, изъ которыхъ вырастаютъ волосы и волоски. Всѣ эти составныя части кожи имѣютъ, каждая въ отдѣльности, свое особое сложное строеніе, въ разсмотрѣніе которыхъ однако мы здѣсь входить не будемъ.

Изложенію кожныхъ болѣзней здѣсь предпосылается характеристика ряда лѣкарствъ въ отношеніи этихъ болѣзней. Бросающаяся въ глаза схожесть многихъ лѣкарствъ въ ихъ вліяніи на кожу объясняется тѣмъ, что кожа въ большинствѣ случаевъ реагируетъ почти одинаково на разныя вліянія. Оттѣнки различій все же имѣются, и ими надо главнымъ образомъ руководствоваться при выборѣ подходящихъ лѣкарствъ; кромѣ того надо принимать во вниманіе еще и общее состояніе организма и предположительно брать тѣ лѣкарства (изъ приведенныхъ здѣсь), которыхъ

въ наибольшей мѣрѣ соотвѣтствуютъ этому общему состоянію (о чемъ справляться надо еще въ „Лѣкарствовѣдніи“).

Характеристика ряда лѣкарствъ въ отношеніи болѣзней кожи.

Алюменъ З—6. Общій сильный зудъ, вынуждающій къ расчесамъ, съ высыпаніемъ маленькихъ красныхъ или бѣлыхъ узелковъ и пузырьковъ, особенно на лицѣ, на кожѣ головы, на шеѣ и плечахъ. Наклонность къ образованію прыщей, къ фурункуламъ. Жесткая, трескающаяся, легко кровоточащая верхняя кожа на рукахъ и пальцахъ. Легкая набухлость кожи на лицѣ, съ ощущеніемъ какъ бы засохшаго на ней бѣлка и повышенной напряженности; опуханіе губъ съ образованіемъ пузырьковъ; струповидная сыпь на нижней губѣ; сухія, потрескавшіяся губы съ послѣдующимъ слушиваніемъ верхней кожицы.

Амбра × 3. Наклонность къ пузырчатымъ высыпанъ, ощущеніе всюду сильнаго зуда и жженія, особенно на лицѣ, съ летучимъ жаромъ; желтоватый цвѣтъ лица; болѣзненность кожи головы при дотрагиваніи, выпаденіе волосъ.

Аммон. карбоник. × 3. Высыпаніе просянокъ, узелковъ и пузырьковъ съ сильнымъ и жгучимъ зудомъ, образованіе прыщей; красныя и обширныя пятна, скарлатиноподобныя, съ ощущеніемъ жара, съ послѣдующимъ шелушеніемъ, особенно на туловищѣ, на рукахъ и бедрахъ.

Анакардій × 3. Зудъ и жженіе, мѣстами колотье какъ бы очень тонкими иглами, усиливающееся отъ расчесовъ; пузырьки или гнойнички, особенно на головѣ, на лицѣ, на колѣнахъ и икрахъ. Образованіе бородавокъ на рукахъ, даже на лодоняхъ,

Антимоніумъ крудумъ З—6. Наклонность къ сильному постоянному потѣнію. Накожные сыпи разнаго рода. Отмороженные мѣста краснѣютъ и болятъ даже лѣтомъ; на подошвахъ ногъ образуются рогообразныя утолщенія, ногти пальцевъ рукъ теряютъ свой цвѣтъ и медленно растутъ; мозоли болѣзненны.

Аписъ × 3. Сильный зудъ и жженіе по всему тѣлу, крапивообразныя высыпи, бѣлые пупырышки, съ блѣднорозовой окружностью, большія или меньшія красныя пятна, рожеподобное воспаленіе, ограниченныя, бѣлыя загрубѣнія ткани, синекрасныя или пурпурокрасныя маленькія шишки.

Арника × 3. Чувство ползанія мурашекъ, зудящее покалываніе и жженіе; образованіе зудящихъ просянокъ и пузырьковъ; фурункулезное пораженіе (маленькіе прыщи съ нагноеніемъ); опуханіе подкожной клѣтчатки на лицѣ и на ногахъ съ ощущеніемъ жара въ головѣ и краснотой лица.

Арсеникъ 3. Высыпаніе бѣлыхъ или красныхъ просянокъ и пупырышекъ, или прыщей и пузырьковъ съ сильнымъ, жгучимъ зудомъ; рожеподобная сыпь съ образованіемъ пузырьковъ на лицѣ

и на ухахъ; гнойничковая экзема головы; красныя пятна, маленькіе кровоподтеки; наклонность къ образованію язвъ; желтыя грязноватаго цвѣта пятна съ блѣднымъ оттѣнкомъ и съ рыхлой подкожной клѣтчаткой; ногти теряютъ свой цвѣтъ и теряются, волосы выпадаютъ. При накожныхъ пораженіяхъ на туберкулезной почвѣ предпочтительнѣе *Арсеникъ іодат.*

Аурумъ З (или *Аурумъ муріатик. х З*). Ползаніе мурашекъ на разныхъ мѣстахъ; зудящее жгучее колотье; летучій зудъ кожи; высыпаніе маленькихъ гнойныхъ пузырьковъ на лицѣ, шеѣ и груди. Темныя, коричневокрасныя пятна на носу, чувствительныя къ давленію. Крапивообразныя и зудящіе пупырыши на нижнихъ конечностяхъ; краснота кожи и опуханіе подкожной клѣтчатки на голени,

Ацид. муріатик. З. Жестокій жгучій зудъ въ разныхъ мѣстахъ тѣла; пузырчатая сыпь (экзема) съ сливающимися струпами; маленькіе болѣзненные узелки и прыщики, нагноеніе которыхъ сопровождается жженіемъ и зудомъ; язвы съ дурнопахнущимъ выдѣленіемъ и какъ бы омертвѣлымъ видомъ; ощущеніе въ кожѣ головы, какъ будто волосы ерошатся. Лицо очень краснѣетъ на свѣжѣмъ воздухѣ.

Ацид. нитрик. З. Желтоватый цвѣтъ всей кожи. Черныя поры и угри на лбу, вискахъ и на носу; болѣзненная чувствительность кожи головы при малѣйшемъ прикосновеніи, выпаденіе волосъ; упорныя крапивныя сыпи; образованіе маленькихъ бородавочекъ на вѣкахъ, на шеѣ и груди; веснушки очень замѣтно выступаютъ; зудящіе лишай борода; образованіе большихъ прыщей на разныхъ мѣстахъ тѣла; зудящіе пузырьки на рукахъ и пальцахъ, мозоли на пальцахъ ногъ; болѣзненность отмороженныхъ мѣстъ.

Барита карбоника З—6. Кожа суха, какъ пергаментъ, и горяча, легко трескается и слущивается на тылѣ руки и концахъ пальцевъ; ногтеѣда; зудъ, ползаніе мурашекъ и жженіе въ разныхъ мѣстахъ тѣла; высыпаніе маленькихъ красныхъ прыщиковъ и угрей; трещины въ углахъ рта; набухлыя губы; зудъ усиливается ночью.

Белладонна З. Усиленіе напряженія и теплоты кожи; постоянный или летучій зудъ, появленіе маленькихъ красныхъ прыщиковъ и пузырьковъ или большихъ красныхъ пятенъ и гнойничковъ съ болѣе или менѣе опухшей окружностью.

Бовиста З. Сильнѣйшій зудъ по всему тѣлу, особенно же въ кожѣ головы съ ухудшеніемъ по вечерамъ. Разнаго рода сыпи съ наклонностію къ нагноенію и образованію струпьевъ, особенно въ углахъ рта, у ноздрей, также въ паховой области; нагноеніе сосковъ; воспалительныя боли въ мозоляхъ.

Бріонія х З. Желтоватый цвѣтъ всей кожи; жестокий зудъ съ высыпаніемъ маленькихъ узелковъ и пузырьковъ; легкое слущиваніе верхней кожицы и прѣлость на сгибательныхъ поверхностяхъ конечностей; чечевичеобразныя, красныя пятна, частью исчезающія при надавливаніи.

Вертрумъ альб. × 3. Просовидная сыпь съ жестокимъ зудомъ; послѣ расчеса остаются крапивообразные пупырыши; высыпаніе отдѣльныхъ маленькихъ, болѣзненныхъ гнойничковъ; слущиваніе верхней кожицы. Вялая, холодная кожа.

Гепаръ сульфурисъ 3—6. Жесткая кожа; трещины на губахъ; наклонность къ нагноенію послѣ незначительныхъ поврежденій съ медленнымъ заживленіемъ. Зудящая сыпь особенно въ соприкасающихся кожныхъ поверхностяхъ. Разнаго рода высыпи и другія пораженія кожи; мозоли болѣзненные съ наклонностію къ воспаленію. Выпаденіе волосъ.

Гидрастисъ 1. Частый ночной зудъ на волосистыхъ частяхъ тѣла; летучій жаръ въ лицѣ, на шеѣ и рукахъ съ послѣдующей сыпью, зудящей и жгучей, и съ слущивающейсѣ, послѣ 7 дней, верхней кожицей. Пузырчатая сыпь на лобной границѣ волосъ.

Гіосціамусъ 3. Жестокій зудъ и краснота кожи; коричневая пятна на тѣлѣ то появляются, то вновь исчезаютъ, набрякшее и темнокрасное лицо, гнойные пузырьки на губахъ, прыщеватая сыпь на лицѣ, также въ области бедеръ и колѣнъ.

Графитъ 3—6. Разнаго рода высыпи съ сильнымъ зудомъ, преимущественно нагнаивающіяся и мокнущія. Рожеподобныя пораженія, съ болью и колотьемъ, въ мѣстахъ расширенныхъ венъ; боль ногтя большого пальца ноги; утолщеніе ногтей рукъ; жестокая боли въ мозоляхъ. Блѣдный, желтоватый цвѣтъ лица съ синими кругами у глазъ. Сѣдѣніе отдѣльныхъ волосъ; волосы сухи и склонны къ склочиванію и выпаденію.

Дулькамара × 3. Сильный зудъ всего тѣла съ сухостью, жаромъ и жженіемъ кожи. Накожные высыпи: зудящія красная пятна, прыщики, пузырьки, пупырыши. Бородавки на рукахъ.

Игнація 3. Болѣзненная чувствительность кожи къ дотрагиванію. Потрескавшіяся и кровоточивыя губы, изъязвленія въ углахъ рта и на внутренней поверхности нижней губы; появленіе маленькихъ нарывчиковъ въ области вѣкъ и нижней челюсти, чирьи на голени, крапивная сыпь по всему тѣлу, выпаденіе волосъ.

Инекакуана × 3. Сильный зудъ то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, высыпаніе красныхъ просянокъ и нарывчиковъ или маленькихъ пузырьковъ съ прозрачнымъ содержимымъ на лицѣ, на туловищѣ и на конечностяхъ.

Кали карбоник. 3. Сильный колющій и жгучій зудъ то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ головы, туловища и конечностей; маленькія бѣлыя или красныя просянки; пузырьки, прыщики и пупырышки, образующіе струпья; желтыя, зудящія и шелушащіяся пятна; слущиваніе верхней кожицы съ садненіемъ, особенно въ области промежности. Поверхностныя ноготѣды на пальцахъ рукъ или ногъ. Веснушки. Болѣзненные, застарѣлыя отмороженія и мозоли. Волосы сухіе, выпадающіе.

Калькареа карб. 3—6. Чрезмѣрная чувствительность кожи къ прикосновенію и холоду. Блѣдность лица съ глубокозапавшими глазами и съ темными кругами вокругъ нихъ; летучій жаръ въ

лицѣ. Ощущеніе зуда, свербѣнія и жженія, ощущение какъ бы налетающей паутины; лишаеобразная сыпь на лицѣ; угревые прыщи на лбу и вискахъ; просовидная и пузырчатая сыпь на кожѣ головы съ обильнымъ отдѣленіемъ перхоти и образованіемъ корокъ; выпаденіе волосъ съ зудомъ; крапивная сыпь по всему тѣлу съ облегченіемъ отъ холодного воздуха; пятна разнаго вида и цвѣта; чирьи; бородавки; ногтоѣда; заусеницы; потливость ладоней; ножной потъ.

Камфора × 1. Чрезмѣрная чувствительность кожи при легкомъ прикосновеніи; легкое свербѣніе съ высыпаніемъ маленькихъ пузырьковъ то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ; холодная, блѣдная, вялая кожа; рожеподобная краснота съ опуханіемъ; образованіе прыщика въ наружномъ слуховомъ проходѣ съ быстрымъ нагноеніемъ.

Кантарисъ 3. Рожеподобное воспаленіе съ образованіемъ пузырей; высыпаніе маленькихъ прыщиковъ и пузырьковъ на лицѣ, на рукахъ, на груди, съ зудомъ и жженіемъ. Повышенная чувствительность изъязвленій съ усиленнымъ выдѣленіемъ.

Карбо вегетабилисъ 3—6. Зудящіе пузырьки и пупырышки, особенно на верхнихъ конечностяхъ, общая крапивная сыпь; красные, безболѣзненные желваки и прыщи; угревые прыщи на лбу и вискахъ; зудъ и мокнутіе мошонки, промежности и задняго прохода; садненіе пальцевъ ногъ, зудъ сосковъ. Зудъ кожи головы и сильное выпаденіе волосъ.

Каустикъ × 3. Кожа склонна къ воспаленіямъ, къ отторженію верхней кожицы, къ высыпанію разнаго рода съ зудомъ, жженіемъ и болью. Выпаденіе волосъ. Жгучая боль въ мозоляхъ.

Коккулусъ × 3. Сильный зудъ, свербѣніе и жженіе съ образованіемъ маленькихъ узелковъ и маленькихъ гнойныхъ пузырьковъ. Появленіе разлитыхъ пятенъ безъ тягостныхъ ощущений. Образованіе прыщей.

Коніумъ × 3. Сильный зудъ, особенно на груди, съ жженіемъ послѣ расчеса; общій зудъ кожи съ едва замѣтной узелковой сыпью; высыпаніе маленькихъ прозрачныхъ пузырьковъ; кровавыя пятна, рожеподобныя пораженія, мелкіе прыщики; выпаденіе волосъ; желтыя пятна кожи и желтыя ногти; кровоточивыя язвы, омертвѣніе язвенной ткани съ выдѣленіемъ сукровичной жидкости; ногтоѣда.

Креозотъ 3. Сильный зудъ лица, туловища и конечностей послѣ расчесовъ, съ переходомъ отчасти въ жженіе. Мелкіе прыщики, изъязвляясь, ведутъ къ образованію струпьевъ и обопрьлости кожи.

Кротонъ 3. Скарлатиноподобное воспаленіе кожи съ просовидной сыпью; рожеподобное воспаленіе кожи лица съ опуханіемъ клѣтчатки; пузырчатая сыпь, экземы. Пузырчатый лишай мошонки.

Купрумъ 3. Разлитыя красныя пятна съ сильнымъ жженіемъ ночью; разсѣянные пузырьки и группы пузырьковъ на кончикахъ

пальцевъ, на сгибательныхъ поверхностяхъ конечностей, на волосистой части головы съ водянистымъ содержимымъ, образующіе желтыя чешуи и заживающіе послѣ отпаденія послѣднихъ.

Лахезисъ 6. Зудящія высыпи разнаго рода, зудъ колющій, жгучій. Опуханіе кожи головы и лица; выпаденіе волосъ. Образованіе бородавокъ на рукахъ.

Ликоподій × 3. Блѣдное и изможденное лицо, или сѣровато-желтое; летучій жаръ лица съ желтыми пятнами и мелкими прыщиками. Сильный зудъ и жженіе въ лицѣ, туловищѣ и конечностяхъ; лишаеобразныя высыпи, желтыя или коричневыя пятна на различныхъ частяхъ тѣла, частью съ жгучимъ зудомъ, но и безъ тягостнаго ощущенія; сильно мокнущая сыпь волосистой части головы, желваки, угревые прыщи; кровоточивость изъязвленій. Обопрьлость. Сѣдѣніе и выпаденіе волосъ, необычное выростаніе волосъ на другихъ частяхъ тѣла. Печеночныя пятна и веснушки. Появленіе маленькихъ бородавокъ на рукахъ. Болѣзненные мозоли и ознобленія.

Мезереумъ × 3. Сильный зудъ по всему тѣлу, особенно вечеромъ и ночью; послѣ расчесовъ отпадаютъ большіе лоскуты кожицы. Сильный зудъ и образованіе чешуекъ на волосистой части головы. Накожныя высыпи разнаго рода. Цвѣтъ лица необыкновенно блѣдный съ запавшими чертами.

Меркуръ. солуб. 3—6. Болѣе глубокія и болѣе обширныя пораженія кожи, съ приливомъ крови и воспаленіемъ разнаго рода, чаще съ болью, нежели съ зудомъ. Выпаденіе волосъ головы и обезображивающія измѣненія ногтей.

Натр. карбоник. или *муріатик.* 3. Сухая, ломкая, трескающаяся кожа, особенно на рукахъ, на пальцахъ; частое образованіе заусеницъ съ воспалительнымъ раздраженіемъ ногтевой части; мелкія бородавки на рукахъ, часто кровоточащія; тресканіе и слущиваніе верхней кожицы на губахъ, опуханіе губъ, особенно верхней. Разнаго рода высыпи, сопровождающіяся часто сильнымъ зудомъ. Потливість рукъ и ногъ. Волосы склонны къ слипанію другъ съ другомъ, сильно выпадаютъ и имѣютъ непріятный запахъ. Чрезмѣрная чувствительность всей кожи ко всякому болѣе сильному прикосновенію.

Олеандра × 3. Сильный безпрестанный зудъ, вынуждающій къ расчесамъ, съ образованіемъ мелкихъ узелковъ и пузырьковъ на волосистой части головы; зудящіе бутоны на лицѣ, слущиваніе верхней кожицы съ мокнутіемъ въ мѣстахъ тренія о платье; коегдѣ мелкіе гноящіеся прыщики. Блѣдность лица съ темными кругами у глазъ, обликъ вообще нездоровый.

Петролеумъ 3. Сильный зудъ и колотье всюду по всему тѣлу, раневая боль кожи головы и кончиковъ пальцевъ; сильное потѣніе волосистой части головы и выпаденіе волосъ. Чрезмѣрная чувствительность всей кожной поверхности и склонность къ воспалительнымъ процессамъ, незначительное поврежденіе влечетъ за собою нагноеніе. Ломкая и трескающаяся кожа на ру-

кахъ и губахъ, образованіе желтыхъ пятенъ, жженіе и боль сосковъ, мозоли и ознобленія, мокнутіе ножныхъ пальцевъ, мокнушіе лишаи особенно за ушами, въ области промежности и на мошонкѣ (подобно Креозоту и Графиту).

Пульсатилла × 3. Покалывающій зудъ то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, ухудшающійся отъ согрѣванія тѣла при движеніи или отъ теплоты постели, безъ высыпей. Зудъ и жженіе въ язвѣ или вокругъ нея, если она имѣется; красныя пятна и пупырыши съ жгучимъ зудомъ. Болѣзненные узлы на волосистой части головы; потливость головы. Бываютъ отдѣльные прыщи.

Ранункулусъ × 3. Кусаніе и зудъ въ лицѣ, на губахъ, ушей, на лбу и на волосистой части головы, особенно по вечерамъ и утромъ, съ образованіемъ мелкихъ красныхъ узелковъ или пузырьковъ. Верхняя кожица легко слущивается. Сильно зудящіе узелки на груди и спинѣ, съ жженіемъ послѣ расчесовъ. Жженіе и зудъ во всемъ тѣлѣ, также потливость.

Рододендронъ × 3. Жгучій зудъ на разныхъ частяхъ тѣла, кое-гдѣ высыпь; гнойные прыщики на лбу; сильный зудъ волосистой части головы, проходящій въ нѣсколько дней. Покраснѣніе и опуханіе кожи на отдѣльныхъ суставахъ.

Русъ × 3. Сильный зудъ всюду, особенно на головѣ и половыхъ частяхъ; рожеподобная высыпь съ опуханіемъ кожи и сильнымъ зудомъ; красныя пятна съ образованіемъ пузырьковъ.

Рута × 3. Воспалительная краснота, опуханіе и образование пузырей, сильный общій зудъ кожи, рожеподобныя высыпи.

Сабадилла 3. Жженіе и покалываніе мѣстами на туловищѣ и конечностяхъ, особенно же на волосистой части головы; болѣзненность кожи, сильный по ночамъ зудъ съ ощущеніемъ жженія послѣ расчесовъ; красныя пятна и полосы, особенно ясно выдѣляющіяся при прохладной температурѣ.

Секале × 3. Ощущеніе свербѣнія и ползанія мурашекъ, иной разъ и молніеносная боль. Вялая, блѣдная, холодная кожа, потеря чувствительности къ уколамъ, обезкровленность кожныхъ сосудовъ (мелкія раненія не кровоточатъ), или же образуются кровоподтеки подкожные или въ слизистыхъ оболочкахъ вслѣдствіе разрыва кожныхъ сосудовъ. Омертвѣлая, гниlostныя язвы.

Селен. 3. Кожный зудъ, прыщи и пузырьки на рукахъ и ногахъ. Обильное потѣніе при ходьбѣ.

Сенеціо × 3. Сухая кожа, необыкновенная ломкость ногтей; большая склонность къ потѣнію, утренніе поты.

Сетія 3. Болѣзненная чувствительность кожи, колотье и сильный зудъ, переходящій въ жженіе; зудящіе прыщики на суставахъ, зудящіе пузырьки и пупырыши на лицѣ, рукахъ и ногахъ; вялость кожи и склонность къ опуханію, круглыя пятна на рукахъ и ногахъ съ отпаденіемъ верхней кожицы. Разнаго рода высыпи.

Силиція 3—6. Чрезмѣрная чувствительность всей кожи къ прикосновенію; сильный зудъ, неуступающій расчесамъ; зудъ кожи

головы съ сильнымъ выпаденіемъ волосъ; ощущение свербѣнія и какъ бы ползанія насѣкомыхъ; покалываніе какъ отъ блохъ; гнойные прыщики на лбу, затылкѣ, груди, рукахъ. Мелкія поврежденія кожи очень медленно заживаютъ. Ломкія, желтосѣрыя ногти; ноготѣда и вообще нагноенія.

Стафизагрія × 3. Сильный зудъ и свербѣніе во всемъ тѣлѣ. Болѣзненная чувствительность всей кожи головы; зудъ волосистой части головы съ экземой или безъ таковой; жгучія или колющія ощущенія, особенно въ рукахъ и ногахъ; величиною съ горохъ прыщи съ сильнымъ зудомъ и образованіемъ мокнущихъ мѣстъ послѣ расчесовъ. Появленіе колющаго зуда въ язвахъ, если таковая имѣется.

Сульфуръ 3—6. Всевозможныя пораженія кожи и волосъ болѣе упорнаго характера.

Тартар. эметик. 3. Прыщи развиваются очень медленно и съ сильной болью, изъязвленіе долго не заживаетъ. Мелкія пятна, желтыя и красныя, на кожѣ, которая холодна и покрыта липкимъ потомъ.

Туя 3—6. Болѣзненно-чрезмѣрная чувствительность всей кожи къ прикосновенію; свербѣніе, зудъ и жженіе въ разныхъ мѣстахъ кожи, ощущеніе подъ кожей какъ бы падающихъ капельъ, зудящія колотья на туловищѣ и конечностяхъ; растертыя мѣста кожи ощущаютъ жгучую боль; разнаго рода высыпи, особенно на головѣ, въ нижней части живота надъ лобкомъ, на рукахъ и ногахъ; образованіе бородавокъ на рукахъ и пальцахъ; кондиломы на половыхъ частяхъ и у задняго прохода.

Фосфоръ 3. Жгучій и колющій зудъ какъ отъ насѣкомыхъ; продолжительное жгучее ощущеніе разныхъ мѣстъ кожи съ краснотой; мокнутіе; жесткая, трескающаяся кожа со слущивающеюся верхней кожицей, всевозможныя высыпи; болѣзни ногтей, выпаденіе волосъ. Ощущеніе въ лицѣ какъ бы засохшаго бѣлка или какъ бы налетающей паутины.

Хамомила × 3. Кожа очень чувствительна къ сквозняку и холоду. Мелкіе красные узелки и прыщики съ зудомъ и жженіемъ. Верхняя кожа слущивается и оставляетъ послѣ себя мокнущую поверхность; слущиваніе верхней кожицы губъ и изъязвленія въ углахъ рта, такъ же и на грудныхъ соскахъ. Легкія поврежденія кожи заживаютъ не иначе, какъ съ нагноеніемъ. Лобъ и вообще голова легко потѣютъ. Перемѣнчивыи цвѣтъ лица, краснота иной разъ лишь одной щеки.

Хина × 3. Руки и ноги холодныя, потѣніе до упадка силъ; зудящее покалываніе при общей чрезмѣрной чувствительности; мелкіе прыщики и пузырьки съ водянистымъ содержимымъ; обширныя, рожеподобныя пятна; вялое, блѣдножелтоватое лицо, съ налетающей временами краснотой и съ припуханіемъ. Выпаденіе волосъ послѣ головной боли.

I. Болѣзни верхней кожицы (эпидермиса).

Кератозы.

1. Мозоли и ороговѣлости (Кератозы). Замѣчается несомнѣнное предрасположеніе къ образованію этихъ гипертрофій кожи, которыя бываютъ часто болѣзненны, сопровождаясь воспалительнымъ состояніемъ. Связь ихъ съ общимъ состояніемъ организма явствуетъ еще изъ появленія или усиленія болей въ этихъ образованіяхъ кожи передъ переменами погоды. Стало быть, вполне уместно и въ этихъ болѣзняхъ, кромѣ наружнаго, также и внутреннее употребленіе подходящихъ лѣкарствъ, а именно—*Силиція*, *Туя*, *Сульф.*, *Антимон. круд.*, *Графитъ* и проч.; при болѣзненности ихъ: *Беллад.*, *Русъ*, *Игнація*, *Рододендр.* и проч.—Лучшимъ наружнымъ средствомъ являются теплыя ножныя ванны, въ которыхъ мозоль размягчается и легко можетъ быть удалена (иногда съ „корнемъ“) при помощи ногтя или подходящаго орудія. Рекомендуются также смазываніе слѣдующимъ составомъ: *Таннинъ* 2 чч., *Уксусная кислота* (крѣпкая) 3 чч. и *Спиртъ* (70°) 95 чч. (въ томъ лишь случаѣ, когда кожа ноги вообще здорова и не имѣетъ ни ранъ, ни ссадинъ). При болѣзненныхъ (воспаленныхъ) мозоляхъ: *мазь* изъ *Беллад.*, *Русъ* и т. п., смазываніе растительными кислотами (лимоннымъ, наприм., сокомъ) или тинктурой *Беллисъ переннисъ* или прикладываніе, въ видѣ пластыря, *Туя* или *Арника*. Изъ внутреннихъ лѣкарствъ рекомендуются: *Ферр. фосфорик.*, *Ацид. сульф.*, *Миллефолій*, *Графитъ*, *Калькареа*, *Карбо*.

Бородавки.

2. Бородавки. Наружно смазывать 2—3 раза въ день тинктурой *Туя* и *Вератр.* Прижиганіе ляписомъ, или ѣдкимъ кали, или хлористымъ цинкомъ.—Бородавки не врожденныя, а пріобрѣтенныя, нерѣдко исчезаютъ подъ влияніемъ внутреннихъ пріемовъ *Туя*, *Барита*, *Калькар.*, *Ликопод.*, *Каустик.*, *Силиція* и др., но часто и сами собою, безъ видимой причины. При болящихъ бородавкахъ: *Белл.*, *Арника*, *Русъ*, внутренне и наружно.

Ихтиозъ.

3. Рыбная чешуя (Ихтиозъ). Это болѣзненное измѣненіе кожи всегда врожденное, а когда подобнаго рода лишай пріобрѣтенъ впоследствии, то его надо считать псориазомъ (см. ниже) или чѣмъ либо подобнымъ. Болѣзнь эта не причиняетъ никакихъ беспокойствъ, она непріятна лишь въ эстетическомъ смыслѣ. Полнаго излѣченія трудно достигнуть, значительно же уменьшать ее можно съ помощью частыхъ обмываній теплой во-

дой съ мыломъ, послѣ предшествующаго (за нѣсколько часовъ) втиранія жиромъ. Внутрь умѣстны: *Силиція, Сульф., Калькар. карб., Ликоподій*, также *Арсен., Аурумъ, Петролеумъ* и др.

4. О т р у б е в и д н ы й л и ш а й (Питириазъ) бываетъ обыкновенный (простой) и красный. При обыкновенномъ питириазѣ кожа подъ отпадающими чешуйками и пластинками эпидермиса не измѣнена въ своемъ цвѣтѣ, при красномъ же она, вслѣдствіе прилива крови, красновата. Болѣзнь сопровождается сильнымъ зудомъ и жженіемъ, начинаясь нерѣдко лихорадочнымъ состояніемъ. Простой питириазъ поражаетъ лишь отдѣльные участки тѣла, красный же распространяется по всему тѣлу. Въ послѣднемъ случаѣ болѣзнь принимаетъ обыкновенно довольно затяжной характеръ. — Главнѣйшія лѣкарства суть: *Арсен. и Графитъ*, также *Сенія, Силиція, Сульф., Калькар. карб., Бріонія, Креозотъ, Фосфоръ*.

Питириазъ
простой и
красный.

5. П е ч е н о ч н ы я п я т н а (Питириазисъ верзиколоръ). Эта сыпь встрѣчается преимущественно на передней и задней поверхности груди, на лицѣ же—никогда, и до недавняго еще времени считалась симптомомъ болѣзни печени. Мнѣніе это теперь большинствомъ врачей не признается, такъ какъ дознано, что большія или меньшія желтоватыя пятна, изъ которыхъ сыпь эта состоитъ и которыя легко поддаются sluшиванію ногтемъ, происходятъ отъ особаго плѣсневаго грибка, называемаго „микроспоронъ фульфуръ“. Замѣчательно однако, что пятна эти особенно часто наблюдаются у чахоточныхъ. Лѣчение — мѣстное: частыя купанія и обмыванія (зеленымъ мыломъ); также цѣлесообразны обмыванія водкой, одеколономъ, слабымъ уксусомъ и т. п. Въ упорныхъ случаяхъ—обмыванія разведенной въ водѣ соляной или азотной кислотой.

Питириазъ
верзиколоръ.

6. Ч е ш у й ч а т ы й л и ш а й (Псоріазъ). Начинается красноватыми слегка возвышенными мелкими пятнами, которыя мало по малу покрываются бѣлыми чешуйками серебристаго цвѣта. Чаще всего поражается разгибательная поверхность локтей и колѣнъ; лишай этотъ никогда не бываетъ на ладоняхъ и подошвахъ ногъ (въ противоположность сифилитическимъ лишаямъ). Отъ накопленія чешуекъ другъ надъ другомъ образуются болѣе или менѣ толстыя струппы, по удаленіи которыхъ обнаруживается красная, иногда слегка мокнущая кожа. Сопровождается иногда зудомъ, повышеніями температуры тѣла, болями въ суставахъ и невралгіями. Лишайные больные обыкновенно мало потѣютъ.

Псоріазъ.

Псоріазъ самъ по себѣ не обусловливаетъ замѣтныхъ общихъ разстройствъ организма, самъ же, при появленіи общей болѣзни, исчезаетъ, а по минованіи таковой, обыкновенно появляется, вновь. Когда болѣзнь идетъ къ излѣченію то, по отпаденіи чешуй, остаются темноокрашенные пятна, которыя мало по малу исчезаютъ.

Отъ сухой шелушащейся экземы отличается тѣмъ, что послѣдняя сильно зудитъ и образованію чешуекъ и струпьевъ предшествуетъ высыпаніе красныхъ, пузырьчатыхъ бугорковъ, а отъ сухой экземы головы еще тѣмъ, что при псоріазѣ головы имѣется рѣзкоочерченная красная полоска, идущая вдоль лба на границѣ волосъ. Шелушащаяся сифилитическая сыпь начинается не красными, а буроватыми пятнистыми узелками, шелушеніе которыхъ лишь незначительно; при этомъ имѣются обыкновенно и другія сифилитическія явленія. На локтяхъ и колѣняхъ сыпь сифилитическая не бываетъ, напротивъ же часто на ладоняхъ и подошвахъ ногъ, чего не бываетъ при псоріазѣ. Рупія (толстые струпья) сифилитическая, по удаленіи ея, оставляетъ послѣ себя глубокую язву.

Болѣзнь эта поражаетъ преимущественно лицъ мужского пола, отъ 7—до 50-лѣтняго возраста. О причинахъ ничего опредѣленнаго сказать нельзя, допуская развѣ лишь лишайное предрасположеніе, обусловливаемое наслѣдственностію или происхожденіемъ отъ хроническихъ разстройствъ крови и лимфы (золотуха, сифилисъ).

**Лѣченіе
псоріаза.**

Излѣченія получались отъ такихъ лѣкарствъ, какъ *Сульф.*, *Фосфоръ*, *Сенія*, *Петролеумъ*, *Калькар. карб.*, *Ацид. нитрик. и-фосфорик.*, *Арсен.*, *Теллур.*—Изъ наружныхъ средствъ наиболѣе полезными являются паровыя ванны, съ обмываніями обыкновеннымъ мыломъ, въ болѣе упорныхъ случаяхъ—съ зеленымъ мыломъ. Полезны примѣненія и холодной воды, въ видѣ обмываній, обтираній, обертываній.

Интертриго.

7. **Обопрѣлость, ободранность** (Интертриго) получается отъ обнаженія кожи отъ ея верхней кожицы, вслѣдствіе чего она приобретаетъ темноватую окраску и выделяетъ клейкую маркую жидкость. Образуется часто у жирныхъ дѣтей въ частяхъ тѣла, гдѣ кожныя поверхности соприкасаются, какъ въ складкахъ шеи или въ паховыхъ сгибахъ, также у взрослыхъ, напримѣръ, при продолжительной ходьбѣ и т. п., между ягодицами. Къ тому же могутъ вести механическія и химическія

раздражения, также раздражающія язвенныя выдѣленія. Наружно примѣняются обмыванія 'слабымъ растворомъ *Календула* Θ (20—30 капель на стаканъ воды) и, послѣ обсушки, присыпаніе картофельной мукой или рисовой пудрой. Внутрь: *Арника*, *Калькарея карб.*, *Каустик.*, *Графитъ*, *Сульф.*, *Сенія*, *Меркур.*, *Рута*. Обопрьлость у новорожденныхъ см. на стр. 455.

8. Надрывы, ссадины, трещины. *Арника* — внутрь и наружно (арника-пластырь). О трещинахъ губъ см. стр. 171, о трещинахъ грудныхъ сосковъ—стр. 445

9. Пигментныя пятна происходятъ отъ чрезмѣрнаго образованія пигмента (красящаго вещества) кожи и имѣютъ свѣтло-желтый, коричневожелтый, коричневый или черный цвѣтъ. Если измѣненіе такое прирожденное, то называется родимымъ пятномъ (*Нэвусъ*), если оно приобрѣтено—**хлоазма**. Хлоазма можетъ быть самостоятельнымъ измѣненіемъ или симптоматическимъ (зависящимъ отъ внутренняго разстройства организма).

Хлоазма.

Къ самостоятельнымъ хлоазмамъ относятся:

а. *Веснушки*. Онѣ могутъ быть не только на лицѣ, но и на другихъ частяхъ тѣла, покрытыхъ платьемъ; стало быть не солнечные лучи являются единственной причиной, а имѣются, надо полагать, и внутреннія причины. Веснушки очень рѣдко наблюдаются ранѣе 6 и позднѣе 40-лѣтняго возраста. Примѣняются противъ веснушекъ съ большей или меньшей пользой смачиваніе 1—2 раза въ день *Беллисъ переннисъ* Θ или спиртнымъ растворомъ *Меркур. корроз.* (1:100) или йодной настойкой (раза два въ недѣлю); мыльные втиранія. Цѣль этихъ наружныхъ примѣненій—слущиваніе верхней кожицы; когда эта цѣль достигнута, то присыпаютъ картофельной или рисовой пудрой. Внутрь *Кали карб.*, *Ликоподій*, *Фосфоръ*, *Сенія*, *Калькар. карб.*, *Сульфуръ* и др.

б. Хлоазма отъ механическаго раздраженія или продолжительнаго давленія, наприм., отъ повязокъ, бандажей, поясовъ, колець и т. п., также при хроническихъ зудящихъ измѣненіяхъ кожи, какъ наприм., при пруриго, экземѣ, чесоткѣ и т. п.; далѣе—хлоазма отъ солнечнаго пригрѣва или отъ продолжительнаго вліянія холода, а также токсическая хлоазма отъ химическихъ раздраженій, какъ, наприм., отъ горчичника, шпанской мухи и т. п.; людямъ, обладающимъ нѣжной кожей, надо поэтому остерегаться примѣненія такихъ средствъ на мѣстахъ, не покрытыхъ одеждой, такъ какъ полученная ими хлоазма можетъ остаться на долгое

время или навсегда. — Также — хлоазма отъ продолжительнаго, чрезмернаго, въ большихъ дозахъ, употребленія ляписа (Аргирія).

Къ хлоазмамъ симптоматическимъ относятся:

а) Хлоазма маточная, выражающаяся въ коричнево-желтыхъ пятнахъ, лоснящихся и не шелушащихся (въ отличіе отъ подобныхъ же печеночныхъ пятенъ — см. выше).

Встрѣчается у женщинъ, страдающихъ неправильностями менструаций или болѣзнями матки или яичниковъ, также у беременныхъ. Проходитъ обыкновенно ко времени климактерія.

б. Хлоазма кахектическая у лицъ, истощенныхъ тяжелой болѣзнію, какъ малярія, сифилисъ, ракъ, чахотка, также у страдающихъ адиссоновой болѣзнію (см. стр. 404).

II. Болѣзни ногтей.

Ненормальности ногтей.

Уроdlивость, утолщенность, ломкость ногтей. Подобныя измѣненія могутъ быть вслѣдствіе болѣзненныхъ процессовъ въ ногтевомъ ложѣ или близъ него, или же отъ неправильнаго питанія ногтей вслѣдствіе внутреннихъ разстройствъ организма; эти измѣненія служатъ не такъ предметомъ лѣченія, какъ указываютъ на соотвѣтствующія организму лѣкарства, которыя послѣдовательно могутъ имѣть вліяніе и на самыя ногти, а именно на *Алюменъ, Графитъ, Силицію, Сульфуръ, Гидроокисъ, Меркуръ, Сабадилла*.

Необычайная мягкость ногтей: *Туя*. — Измѣненный цвѣтъ ногтей: *Антим. круд., Графитъ, Ацид. нитр., Ацид. муріат., Силицію, Сульфуръ*.

Ноготѣда.

Ноготѣда (панарицій) есть нарывъ близъ ногтя или въ ногтевомъ ложѣ. Главными лѣкарствами являются: *Белладонна, Гепаръ сульф. и Силицію*. Наружно: согрѣвающие компрессы, теплыя мыльныя ручныя ванны. При склонности къ частымъ возвратамъ — *Сульфуръ*. Надо остерегаться слишкомъ ранняго искусственнаго вскрытія нарыва. Надо лишь утончить кожу, срѣзавъ верхнюю кожицу (какъ мозоль), если она слишкомъ толста или мозолиста (какъ у рабочихъ), дальнѣйшее же теченіе предоставить природѣ. Послѣ вскрытія нарыва прикладывать марлю, смоченную растворомъ *Календула* (чайн. ложка на стаканъ воды), поверхъ нея — слой гигроскопической ваты, и бинтовать; такъ поступать 2 раза въ день.

III. Болѣзни волосъ.

Выпаденіе волосъ происходитъ вслѣдствіе недостаточнаго питанія или высыханія (атрофіи) волосныхъ сумокъ. Чаше всего оно бываетъ въ старческомъ возрастѣ, но встрѣчается также довольно часто и у молодыхъ особъ, у которыхъ несомнѣнную роль играетъ наслѣдственное предрасположеніе. У наслѣдственно предрасположенныхъ къ выпаденію волосъ способствующими поводами являются: чрезмѣрные умственные занятія, угнетающія заботы, печаль, горе, излишества въ образѣ жизни.

**Выпаденіе
волосъ.**

При полной атрофіи волосныхъ сумокъ никакія средства не могутъ ихъ оживить и вызвать роженіе волосъ. Въ другихъ случаяхъ цѣлесообразно утромъ и вечеромъ втирать въ кожу головы одеколонъ или спиртъ, къ которому (на 100 чч.) можно прибавить тинктуру арники (5 чч.) и аписнаго спирта (10 чч.); рекомендуется для этого и водный растворъ нашатырнаго спирта (5 на 100). Отъ этихъ втираній сумки укрѣпляются и волосы лучше и прочнѣе растутъ. Противъ выпаденія волосъ послѣ тяжелыхъ болѣзней (какъ тифъ, воспаленіе легкихъ и т. п.) употребляются средства, дѣйствующія на общее укрѣпленіе организма: съ восстановленіемъ его силъ возобновляется и ростъ волосъ. То же надо сказать о выпаденіи волосъ вслѣдствіе сифилиса. Встрѣчается еще ограниченное облысѣніе (плѣшивость), причину котораго одни видятъ въ кожномъ паразитѣ, а другіе считаютъ неизвѣстной; черезъ нѣкоторое время волосы обыкновенно вновь появляются. Точно такъ же преходяще выпаденіе волосъ при рождѣ головы, себорреѣ или экземѣ и т. д., если эти состоянія лѣчатся надлежащимъ образомъ.

Преждевременное сѣдѣніе волосъ является на почвѣ наслѣдственного предрасположенія или вслѣдствіе сильныхъ или внезапныхъ душевныхъ потрясеній, испуга и т. п.

Изъ внутреннихъ лѣкарствъ, способствующихъ лучшему росту волосъ, главными являются слѣдующія: *Калькар. карб.*, *Графитъ*, *Ликоподій*, *Меркур.*, *Сенія*, *Силиція*.—Противъ преждевременнаго сѣдѣнія: *Ликопод.*, *Фосфоръ*, *Сульфуръ*.—Противъ сухости волосъ: *Алюменъ*, *Кали карбоник.*

Колтунъ (Плика полоника). Болѣзнь эта встрѣчается особенно часто на берегахъ Вислы (отсюда нѣмецкое названіе *Weichselzopf*) и состоитъ въ томъ, что волосы всклочиваются до такой степени, что никоимъ образомъ не поддаются расчесыванію,

Колтунъ.

вслѣдствіе чего голова дѣлается мѣстомъ скопленія разнаго рода грибовъ и паразитовъ. Колтунъ сопровождается себорреей (сальностью головы) съ зловоннымъ запахомъ. Какъ только послѣдняя проходитъ, отрастаютъ изъ корней новые волосы, и тогда только, по народному наблюденію, больные волосы могутъ быть отрѣзаны. Большинство врачей считаетъ заблужденіемъ мнѣніе народа объ опасности, грозящей общему здоровью организма отъ отрѣзыванія колтуна. Однако извѣстны случаи, гдѣ больные, страдавшіе колтуномъ, вскорѣ послѣ того, какъ имъ его остригали, заболѣвали воспаленіемъ мозга. Поэтому надо съ осторожностью рѣшать вопросъ о томъ, слѣдуетъ или не слѣдуетъ сразу удалить колтунъ. Во всякомъ случаѣ полезно будетъ сначала основательно полѣчить больного исправляющими худосочіе средствами, какъ вспомогательными, такъ и гомеопатическими: *Арсен. альб.*, *Арсен. іодат.*, а также, принимая во вниманіе имѣющіяся побочныя разстройства: *Графитъ*, *Туя*, *Сульфуръ*, *Ликопод.*, *Бораксъ*, *Хелидоній*, *Натр. муриат.* *Винка миноръ*.

IV. Болѣзни болѣе глубокихъ слоевъ кожи.

Признаки и
теченіе рожи.

1. Рожистое воспаленіе кожи, **Рожа**. Рожа поражаетъ чаще всего лицо, также голени и половыя части, при чемъ она проявляется либо самостоятельно, отъ причинъ неизвѣстныхъ, либо послѣдовательно при поврежденіяхъ кожи или слизистыхъ оболочекъ, между прочимъ, въ лицѣ именно, при трещинахъ слизистой оболочки носа или при испорченныхъ зубахъ. Рожа выражаетъ собою своеобразное воспаленіе кожи съ краснотой, а иногда и съ образованіемъ (на воспаленной части) бѣлыхъ или меньшихъ пузырей, рѣже — гнойничковъ. Еще рѣже она влечетъ за собою гангрену. Теченіе этой болѣзни болѣе или менѣе бурно и сопровождается ознобомъ, жаромъ, разстройствами пищеваренія, мозговыми явленіями (особенно при пораженіи лица и головы). Обыкновенная продолжительность ея 8—9 дней, въ трудныхъ же случаяхъ—и до 6 недѣль. Злокачественная рожа, особенно лица и головы, можетъ окончиться гнойнымъ разложеніемъ крови или опаснымъ для жизни воспаленіемъ почекъ или мозговыхъ оболочекъ.—Въ помѣщеніи, гдѣ находится рожистый больной, не должны находиться имѣющіе на тѣлѣ раны, а ухаживающіе за нимъ должны заботиться о томъ, чтобы на рукахъ у нихъ или на лицѣ не было ни малѣйшей царапины (во избѣжаніе зараженія рожистымъ

ядомъ) и, если таковыя окажутся, смазать ихъ коллодіумомъ или заклеить пластыремъ. Особенно легко рожистая зараза переходитъ на родильницъ, и въ то же время крайне для нихъ опасна.

Беллад.: въ болѣе легкихъ случаяхъ.—*Анисъ* (или *Анисин.*): **Лѣченіе рожи** при напряженной, красной опухоли, мозговыхъ явленіяхъ, сухости во рту и глоткѣ, особенно при отекахъ сосѣднихъ частей (наприм.—вѣкъ при рожѣ лица).—*Русъ*: при пузыристой рожѣ.—*Камфора*: мелкопузырчатая рожа съ опуханіемъ и крайней чувствительностью заболѣвшихъ частей. Въ тяжелыхъ случаяхъ рожи Камфора въ вещественныхъ дозахъ (Камфора Рубини) является главнымъ средствомъ.—*Арсен.*: при жгучихъ боляхъ и сухой кожѣ. — Затѣмъ: *Бріон.*—особенно при рожѣ суставовъ, *Пульсат.*—при такъ называемой ползучей (блуждающей) рожѣ. — При подверженности возвратамъ рожи: *Сульф.*, *Графит.*, *Барита* и *Аурумъ*.

Наружно цѣлесообразнѣе всего смазываютъ больныя мѣста **Вспом. мѣры.** камфорнымъ масломъ съ послѣдующимъ присыпаніемъ картофельной мукой. Теплыя укутыванія, въ видѣ обкладыванія ватой и т. п., вредны тѣмъ, что усиливаютъ приливъ крови и воспаленіе. Обведеніе рожистаго мѣста іодистой или ляписной чертой или полоскою липкаго пластыря для предохраненія отъ дальнѣйшаго расползанія рожистаго процесса,—до сихъ, молъ, поръ и не дальше!—надо считать такимъ же суевѣріемъ, какъ „заговоръ“, употребляемый простымъ народомъ для той же цѣли. — Діета, какъ при лихорадочныхъ болѣзняхъ.

2. Нарывное воспаленіе кожи. Это воспаленіе проникаетъ всю **Разныя формы** толщу кожи и глубже, поражая и подкожныя ткани. Оно можетъ **нарывовъ.** быть ограниченнымъ, образуя обыкновенный чирей (вередъ)—фурункулъ, или чирей болѣе тяжелой формы—карбункулъ, или, наконецъ, нарывъ въ видѣ воспалительно-гнойной опухоли—флегмона (ложная рожа).

Причины могутъ быть либо наружныя, въ видѣ извнѣ дѣйствующихъ раздраженій кожи, либо же внутреннія, исходящія изъ разстройствъ питанія организма.

Обыкновенный вередъ (фурункулъ) начинается **Фурункулъ.** ограниченнымъ болѣзненнымъ затвердѣніемъ, которое мало по малу увеличивается и краснѣетъ. Затѣмъ оно становится мягче, на верхушкѣ его образуется отверстіе, въ которомъ виднѣется бѣлая или бѣловато-желтая твердоватая ткань. Послѣдняя въ дальнѣйшемъ теченіи дѣлается мягче и выдѣляется вмѣстѣ съ гноемъ (матеріей), часто въ видѣ червячка. Весь этотъ процессъ продолжается нѣ-

сколько дней и сопровождается сильной болью, часто даже ознобами и жаромъ и общимъ недомоганіемъ. Наконецъ, вередъ мало по малу очищается и заживаетъ, оставляя послѣ себя большій или меньшій рубецъ. Если причина—въ разстройствѣ крови, то вередъ повторяется часто на разныхъ мѣстахъ тѣла (фурункулѣзъ). Вередъ, однако, не всегда нагнаивается, а иногда и рассасывается.

Карбункулъ.

Карбункулъ имѣетъ гораздо болѣе бурное теченіе и встрѣчается обыкновенно на спинѣ, особенно у старыхъ людей. Онъ начинается не однимъ, а нѣсколькими тѣсно другъ около друга лежащими затвердѣніями, которыя, сливаясь, образуютъ гораздо большую, чѣмъ при фурункулѣ, твердую, крайне болѣзненную опухоль. Здоровье больного нарушается гораздо больше, чѣмъ при вередѣ, причемъ очень часто является даже лихорадочный бредъ и другія явленія мозгового возбужденія, а также, въ худшихъ случаяхъ,—угнетенія. Черезъ нѣсколько дней образуется надъ затвердѣніемъ синеvато-черный пузырь, при вскрытіи котораго въ глубинѣ обнаруживается гнилостно-распавшая подкожная ткань. Затѣмъ кожа прорывается въ нѣсколькихъ мѣстахъ, и вся опухоль мало по малу распадается въ омертвѣвшую, коричнево-черную массу, часто противнаго гнилостнаго запаха. Послѣдняя мало по малу отпадаетъ и, наконецъ, образовавшаяся глубокая язва, въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, постепенно заживаетъ, оставляя послѣ себя глубокой рубецъ. Въ очень тяжелыхъ случаяхъ можетъ произойти гнилостное зараженіе всего организма (піэмія) съ послѣдующей отъ этого смертію. Особенно опасны въ этомъ отношеніи карбункулы лица или головы.

Флегмона.

При флегмонѣ поражается обыкновенно большій, чѣмъ въ прежнихъ случаяхъ, участокъ кожи, который опухаетъ, краснѣетъ, становится очень твердымъ и болѣзненнымъ, съ отечностію сосѣднихъ здоровыхъ частей тѣла. Страданія больного очень сильны и прекращаются лишь тогда, когда размягчившійся, „созрѣвшій“ нарывъ вскрывается самъ собою или при помощи оперативнаго ножа. Флегмона можетъ развиваться отъ всевозможныхъ ранъ, отъ самыхъ ничтожныхъ до обширныхъ послѣ большихъ операций, путемъ заноса заразныхъ началъ (бактерій).

Лѣченіе нарывовъ.

Въ началѣ воспаленія *Арника* × 2—3 внутрь, чрезъ часть по 5 капель. Если воспаленіе все таки подвигается впередъ и являются сильныя боли, то надо брать *Беллад.*, чрезъ часть по 5 капель, попеременно съ Арникой. Какъ только наступятъ признаки начинающагося нагноенія, а именно — острые колющіе боли и, какъ

часто бываетъ, ознобъ, умѣстенъ *Гепаръ сульф.*, отъ котораго процессъ нагноенія можетъ приостановиться, а опухоль разсосаться. Когда этого не произошло, то, для скорѣйшаго размягченія и вскрытія нарыва, прибавляютъ *Силицію*, которую продолжаютъ принимать до полного заживленія нарывной раны. Если бы лѣкарство это недостаточно скоро дѣйствовало, то нѣсколько дозъ *Сульфуръ* усиливаютъ реакцію организма, и тогда Силиція оканчивается лѣченіе. — Случается, что гной разлагается, становится темнымъ, жидкимъ и вонючимъ; тогда всѣмъ прочимъ лѣкарствамъ слѣдуетъ предпочесть *Лахезисъ*, чрезъ 2 часа по приему. Когда образовалась, какъ это бываетъ особенно при карбункулѣ, нечистая, гниlostная язва злокачественнаго характера, то, вмѣсто Лахезиса, болѣе подходитъ *Карбо вегетаб.*, чрезъ часъ по приему. При сильномъ упадкѣ силъ и общемъ душевномъ безпокойствѣ — *Арсе-ник. альб.*

Для предотвращенія возвратовъ этой болѣзни слѣдуетъ прежде всего давать *Силицію*, втеченіи недѣли по 2—3 приѣма въ день, затѣмъ *Графитъ* такимъ же образомъ. Въ случаѣ надобности можно этотъ попеременный курсъ лѣченія повторить. Для той же цѣли можетъ оказаться полезнымъ *Туя* и т. п.

Наружно прикладывается раза 2—3 въ день: при фурункулѣ *Воспом. мѣрь* или карбункулѣ — *Арника* Θ , не разведенная, или въ видѣ мази или масла, въ началѣ, а при продолжающемся воспаленіи — *Белладонна* Θ въ видѣ согрѣвающихъ компрессовъ, или въ видѣ мази или масла. При флегмонѣ цѣлесообразны въ началѣ компрессы изъ раствора *Меркур. корроз.* (1:5000 до 1:3000), а при продолжающемся воспаленіи — *Белладонна*, какъ указано выше. Обыкновенно нарывъ вскрывается самъ собою, но, когда онъ совсѣмъ созрѣлъ, теченіе болѣзни значительно сокращается, если его искусственно вскрыть, особенно при глубокомъ пораженіи кожи; искусственное вскрытіе нарыва можетъ стать необходимымъ и прямо спасительнымъ, когда онъ находится близъ какого либо важнаго органа.

3. Комедоны (Сальные пробки, Бѣлые угри, Слизнякъ) *Сальные про*
являются вслѣдствіе закупорки выводныхъ протоковъ сальныхъ ^{и Бѣлые угр}
железъ или же волосныхъ мѣшечковъ, что въ свою очередь явля- *Слизнякъ.*
ется отъ засоренія извнѣ или отъ внутреннихъ разстройствъ, веду-
щихъ къ выдѣленію железами слишкомъ твердаго сала и къ ско-
пленію слизи въ волосныхъ мѣшечкахъ. Сальные пробки и бѣ-
лые угри встрѣчаются большею частію у молодыхъ особъ отъ 16 до
24 лѣтъ, въ періодъ полового развитія, всего чаще на лбу, на

носу, на губахъ, на груди и на спинѣ, на тѣхъ именно мѣстахъ, гдѣ всего больше бываетъ жировыхъ железъ; слизнякъ же встрѣчается чаще на затылкѣ, мошонкѣ, наружныхъ женскихъ половыхъ частяхъ и проч.

Сальные пробки и бѣлые угри представляютъ собою точечные бугорки, затвердѣнія, величиною съ просяное или конопляное зерно, но отличаются одно отъ другого тѣмъ, что верхушка сальной пробки черного или синеваго цвѣта, верхушка же бѣлаго угря—бѣлаго или сѣровато-бѣлаго цвѣта. Слизнякъ представляетъ собою значительно большее затверденіе вродѣ маленькой опухоли, достигающей величины горошины; содержимое его—полужидкое или сырообразное вещество непріятнаго запаха; встрѣчается только у взрослыхъ.—Сальные пробки часто ведутъ къ воспаленію сосѣдней съ железкой ткани, образуя довольно чувствительные, а иногда и весьма болящіе прыщики (см. ниже „Акнэ“).

Лѣченіе должно быть прежде всего наружное, мѣстное, начиная съ надлежащаго ухода за кожей, чистаго содержанія ея, и кончая механическимъ выдавливаніемъ сальныхъ пробокъ и угрей, а также оперативнымъ удаленіемъ слизняковъ. Выдавливаніе лучше производить помощью ключика отъ часовъ, при чемъ послѣдній углубленіемъ своимъ ставится надъ бугоркомъ и придавливается, вслѣдствіе чего въ углубленіе ключика выскакиваетъ содержимое закупореннаго канальца въ видѣ червячка. Если это не удастся сразу, тогда предварительно обводятъ верхушку бугорка остріемъ иглы, а затѣмъ выдавливаютъ. Раздражающихъ мазей слѣдуетъ избѣгать. Что касается внутренняго лѣченія, то оно должно быть соотвѣтственнымъ основному страданію (излишняя раздражительность крови, или малокровіе, блѣдная немочь и проч.). Всего чаще приходится примѣнять *Натр. muriat.*, *Сульфуръ*, *Меркуръ*, *Графитъ*, *Калькарса* и проч. При расстройствахъ въ половой сферѣ—*Платина*, *Селен*. и т. д.

Красные угри,
Прыщи

4. Акнэ. (Красные угри, Прыщи). Излюбленнымъ мѣстомъ акнэ служитъ лицо и верхняя часть спины. Вначалѣ являются обыкновенные угри, которые затѣмъ воспаляются и часто нагнаиваются; такимъ образомъ являются прыщи краснаго цвѣта и гнойные нарывчики; при этомъ часто бываетъ сальность кожи. Зуда нѣтъ, а нагноившіеся прыщи не всегда болятъ. Теченіе болѣзни—хроническое, съ ослабленіями и обостреніями, что зависитъ какъ отъ внѣшнихъ вліяній, такъ и отъ переменъ внутри организма; въ по-

слѣднемъ отношеніи всего больше вліяетъ раздражительная половая сфера, а также расстройства пищеварительныхъ органовъ.

Возрастъ имѣетъ несомнѣнное вліяніе, при чемъ почти всегда болѣзнь начинается ко времени полового созрѣванія и очень рѣдко бываетъ послѣ 25—30 лѣтняго возраста; дѣти же никогда ею не поражаются. У женщинъ замѣчается связь между акнѣ и неправильностями мѣсячныхъ. Далѣе, акнѣ сопровождается часто болѣзнями, такъ или иначе ослабляющія организмъ, наприм. чахотку, золотуху и проч. Иной разъ она вызывается и искусственно, а именно подѣ вліяніемъ нѣкоторыхъ лѣкарственныхъ веществъ. Такъ, дехтярная вода можетъ вызвать акнѣ не только при наружномъ, но и при внутреннемъ употребленіи (напр. вдыханіе дехтярныхъ паровъ); точно такъ же можетъ дѣйствовать креозотъ, бензинъ, петролеумъ. Вполнѣ установленъ также фактъ появленія акнѣ отъ излишняго употребленія бромистыхъ и іодистыхъ лѣкарствъ.

Предоставленная собственному теченію, болѣзнь эта можетъ оставить послѣ себя неизгладимые рубцовые слѣды и жесткость, шершавость кожи. Различающій діагнозъ вообще легокъ. Отъ экземы болѣзнь эта отличается прежде всего отсутствіемъ зуда, а отъ сифилитической прыщеватости отсутствіемъ другихъ сифилитическихъ явленій.

Указанное выше при комедонахъ выдавливаніе угрей съ помощью часового ключа является тутъ обыкновенно затруднительнымъ вслѣдствіе воспаленнаго состоянія и болѣе или менѣе сильной болѣзненности угрей. Въ тѣхъ случаяхъ, когда акнѣ является слѣдствіемъ ядовитаго дѣйствія упомянутыхъ выше лѣкарствъ, то прежде всего слѣдуетъ, конечно, прекратить ихъ употребленіе, послѣ чего скоро проходитъ и акнѣ. Замѣчено, что „дегтярная“ прыщеватость держится долѣе, чѣмъ бромистая и іодистая, и сопровождается даже зудомъ и жженіемъ. Акнѣ на лбу развивается иногда отъ кожаной подкладки въ шляпѣ, что зависитъ, вѣроятно, отъ какого нибудь ядовитаго вещества (мышьяка?), заключающагося въ лакѣ той подкладки; въ этомъ случаѣ надо замѣнить кожаную подкладку мягкой полотняной или шелковой. Slѣдуетъ устранить и всякія другія внѣшнія раздраженія, вызывающія акнѣ, наприм., ѣдкое мыло, сильный холодъ или жаръ и т. п.

Въ случаяхъ, зависящихъ отъ внутреннихъ расстройствъ организма, надо главное вниманіе обращать на послѣднія. При выборѣ лѣкарствъ надо руководствоваться имѣющимися неправильностями со стороны внутреннихъ органовъ, а также наружнымъ видомъ

лѣченіе.

прыщей. Такъ, когда сыпь представляется въ формѣ угрей, не склонныхъ къ нагноенію, остающихся на стѣпени простого воспаления, даютъ *Меркур. солюб.* 3—6 по 2—3 приема въ день, втеченіи 8 дней, послѣ чего, сдѣлавъ настолько же дней перерывъ, лѣчение это можно повторить.—Если Меркурій не приводитъ къ цѣли втеченіи 3—4 недѣль, то даютъ *Гепаръ сульф.* 3—6, особенно когда угри увеличиваются, затвердѣвають и выказываютъ наклонность къ нагноенію. Въмѣсто Гепаръ сульф. бываетъ полезно давать *Іод.* или *Кали іодат.* 1—2, когда имѣется дѣло съ несомнѣнно золотушнымъ больнымъ, страдающимъ припухlostью железъ. При одровременно существующей себорреѣ (сальности кожи—см. ниже) полезно *Натр. муриат.* внутрь, а также наружно. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказывался полезнымъ *Кали бромат.* 1—3 при акнѣ лица и спины, когда прыщики не нагнаиваются. Лѣкарство это не подходитъ для тѣхъ случаевъ, гдѣ акнѣ произошло отъ этого самаго лѣкарства: туку *Арсеник. альб.* 3 рекомендуется какъ противоядіе. Кромѣ упомянутыхъ лѣкарствъ употребляются еще *Коніумъ*, *Клематисъ*, *Силиція*, *Графитъ*, также *Юглансъ*, *Петролеумъ*, *Пиксъ ликвида* (жидкая смола) въ гомеопатическихъ дѣленіяхъ.

Синозь
бороды.

5. Прыщеватость бороды (Сикозъ) *) развивается только у мужчинъ, притомъ бородатыхъ, и всегда лишь въ области бороды и усовъ; на другихъ, обросшихъ волосами, частяхъ тѣла встрѣчается крайне рѣдко. Микроскопическое изслѣдованіе содержимаго этихъ прыщей обнаруживаетъ паразитическія образованія, грибки, которыя составляютъ либо послѣдствіе, либо причину болѣзни, во всякомъ же случаѣ поддерживаютъ воспалительный процессъ.—Не паразитическая прыщеватость бороды называется Акнементатра.

Высыпанію прыщей часто предшествуетъ чувство жжения, напряженія или боли въ области бороды. Затѣмъ у корней волосъ образуются красные бугорки, которые могутъ достигнуть величины горошины и болѣе, при чемъ въ серединѣ каждого бугорка торчитъ волосъ. Нѣсколько такихъ узловъ могутъ соединиться вмѣстѣ и образовать бугристую возвышенность. Часто дѣло доходитъ и до образованія большихъ воспалительныхъ за-

*) Въ настоящее время подъ сикозомъ понимаютъ лишь узловатую прыщеватость бороды, Ганеманъ же обозначалъ этимъ словомъ одинъ изъ трехъ общихъ видовъ испорченности крови (сикозъ, сифилисъ и псор), обнаруживающійся появленіемъ смоквовидныхъ разраженій на кожѣ и слизистыхъ оболочкахъ и имѣющій связь съ трипперной болѣзнію.

твердѣній. На бугоркахъ появляются гнойнички, которые лопаются и выдѣляютъ желтоватую жидкость, засыхающую затѣмъ въ желтоватыя корки. Волосы, торчащія въ гнойничкахъ, очень легко и безъ боли поддаются выдергиванію пинцетомъ, при чемъ корень волоса выглядит набухшимъ, пропитаннымъ гнойной жидкостью. При значительной продолжительности болѣзни волосныя мѣшечки могутъ въ концѣ концовъ совершенно зарубцеваться, и дальнѣйшее произрастаніе волосъ изъ нихъ становится невозможнымъ. Часто при этой болѣзни припухаютъ подчелюстныя железы.

Отъ экземы сикозъ отличается тѣмъ, что при немъ не имѣется зуда, кожа подъ корками не мокнетъ и сыпь не переходитъ за границы волосъ. Послѣдній признакъ отличаетъ сикозъ и отъ сифилиса; при сифилисѣ впрочемъ имѣются и другія сифилитическія явленія на тѣлѣ.

Задача лѣченія во 1) та, чтобы не допускать до нагноенія первоначальныхъ узелковъ, во 2) уже развившееся въ нихъ воспаление возможно раньше прервать, въ 3) образовавшіяся уже корки удалять и больную кожу приводить къ нормальному состоянію. Для выполненія этой задачи приходится прежде всего пользоваться мѣстными наружными средствами. Первые двѣ цѣли достигаются постепеннымъ выдергиваніемъ волосъ съ ихъ корнями помощью специально къ тому приспособленнаго пинцета. Хотя этимъ и не удастся сразу вырвать съ корнемъ и самую болѣзнь, но при настойчивомъ примѣненіи этого способа и соблюденіи надлежащей чистоты въ уходѣ за больной кожей, можно въ началѣ болѣзни довольно скоро достигнуть полного ея исчезновенія. Раньше выдергиванія волосъ, ихъ необходимо предварительно коротко остричь, благодаря чему эта маленькая операція почти не причиняетъ боли, если только производить ее достаточно ловко и нѣжно. Первое условіе при этомъ — вырвать волоски въ томъ направленіи, въ какомъ они растутъ въ кожѣ. Кромѣ того полезно смачивать больныя мѣста на ночь примочкой изъ сѣрнаго цвѣта (1 часть на 8 частей воды), которую предъ употребленіемъ взбалтывать. Смочивъ такимъ образомъ кожу, даютъ ей просохнуть, а оставшуюся на ней сѣру утромъ смываютъ теплой мыльной водой. Просушивъ опять кожу, наносятъ на нее тонкій слой нѣжной мази, всего лучше — *Ирисъ-мази*; цѣлесообразна также *мазь изъ сѣрнаго цвѣта* (1 ч. на 8 частей жира) или изъ *Сдобидилла* Θ (2—5 чч. на 30 чч. жира).

Лѣченіе.

Изъ внутреннихъ лѣкарствъ главныя суть: *Антимон. круд., Меркур. солюб., Ацид. нитрик., Сульфуръ, Графитъ, Кали бихромик., Туя.*

**Мѣднокрасный
носъ.**

6. Мѣднокрасная угреватость (Акнэ розацеа) поражаетъ всегда

лишь необросшую волосами часть лица. Болѣзнь начинается краснотою носа и переходитъ часто на щеки, подбородокъ, лобъ. Въ легкихъ случаяхъ болѣзнь этимъ и ограничивается, что бываетъ обыкновенно у лицъ женскаго пола. Кромѣ красноты замѣчается часто расширение и извилистость подкожныхъ венъ, что зависитъ отъ застоя крови. При этомъ имѣется еще сальность кожи и кой-гдѣ узелки и гнойнички обыкновенной акнэ. — Въ дальнѣйшемъ теченіи на покраснѣвшей кожѣ выступаютъ ярко-красные узлы, которые, впрочемъ, лишь рѣдко нагнаиваются. — При еще большемъ развитіи болѣзни образуются большія бородавчатыя разраженія, отвислыя массы, отдѣленные другъ отъ друга глубокими бороздами и болтающіяся надъ верхней губой.

Болѣзнь эта встрѣчается лишь въ среднемъ и болѣе пожиломъ возрастѣ, но далеко не всегда является слѣдствиемъ злоупотребленія виномъ. У лицъ, предрасположенныхъ къ ней, способствующими обстоятельствами являются расстройства обмѣна веществъ съ вялостью кровообращенія и застоями крови въ болѣе отдаленныхъ органахъ. У женщинъ имѣются при этомъ почти всегда расстройства органовъ половой сферы, въ видѣ неправильныхъ регулъ, болѣзней матки; въ нѣкоторыхъ случаяхъ поводомъ служатъ беременность, роды. Всего чаще, однако, эта болѣзнь встрѣчается въ періодъ полового созрѣванія и въ переходномъ состояніи у женщинъ.

Нѣкоторыя другія болѣзни могутъ имѣть сходство съ акнэ розацеа въ началѣ своего развитія. Отличительными признаками служатъ слѣдующіе. Краснота носа вслѣдствіе отмороженія не ярко-красная, какъ при акнэ, а сине-красная, притомъ безъ расширенныхъ венъ — Отъ воспалительно-красной волчанки акнэ носа отличается тѣмъ, что при первой образуются чешуи и рубцы. При обыкновенной волчанкѣ имѣются коричневокрасные узелки, легко распадающіеся и образующіе рубцы. — Ракъ носа обыкновенно скоро переходитъ въ язву, а сифилисъ носа сопровождается еще другими сифилитическими явлениями на кожѣ и слизистыхъ оболочкахъ.

Лѣченіе.

Прежде всего необходимо устранить возможные причинные моменты, а именно употребленіе спиртныхъ напитковъ, вредныя внѣшнія вліянія и внутреннія расстройства организма, что дости-

гается какъ регулированиѣмъ образа жизни, такъ и лѣкарственными средствами, для выбора которыхъ приведемъ здѣсь лишь нѣсколько общихъ указаній. Такъ, привычнымъ къ спиртнымъ напиткамъ даютъ *Карб. анимал.*, *Арсен. альб.*; при разстройствахъ менструаціи: *Пульсат.*, *Калькар карбон*; въ переходномъ состояніи у женщинъ: *Графитъ*, *Селія*; при разстройствахъ пищеваренія: *Сульфуръ*, *Нуксъ вом.*, *Брион.*, *Ликопод.*—Принимая во вниманіе мѣстныя измѣненія, назначаютъ *Петролеумъ*, когда болѣзнь только еще въ началѣ и выражается лишь краснотою носа и щекъ. Снаружи цѣлесообразно въ этомъ періодѣ смазывать носъ мягкимъ колодіемъ: образовавшійся струпикъ долженъ отвалиться самъ, — насильно снимать его не слѣдуетъ. Когда образовались уже гнойнички, то даютъ *Гепаръ сульф.*, 2—3 приема въ день, а въ дальнѣйшемъ теченіи — *Фосфоръ*, *Туя*. Наружно полезно смачивать на ночь больныя мѣста смѣшаннымъ въ водѣ *сѣрнымъ цвѣтомъ* (въ пропорціи 1:8), при чемъ смѣсь эту предъ каждымъ употребленіемъ хорошенъко взбалтываютъ. Смоченнымъ такимъ образомъ мѣстамъ даютъ просохнуть, а утромъ смываютъ мыльной водой. Ту же сѣру употребляютъ въ видѣ мази, всего лучше со смѣсью ланолина и вазелина — пополамъ: на 8 частей смѣси одну часть сѣрнаго цвѣта. Кромѣ того примѣняютъ еще съ пользою *Гаммелисъ-мазь*, отдѣльно или вмѣстѣ (пополамъ) съ *Графитъ-мазью*. Точно такъ-же употребляютъ снаружи и *Туя*, особенно при разрашеніяхъ кожи, когда они еще не велики. Болѣе крупныя же, бородавчатые разрашенія могутъ быть удалены лишь хирургическимъ путемъ, точно такъ же болѣе крупныя пустулы (гнойники) должны быть искусственно вскрываемы.

Волчанку, проказу и ракъ кожи—см. въ отд. 10-мъ.

7. Почесуха (Пруриго). Болѣзнь эта встрѣчается рѣдко и начинается по большей части въ дѣтскіе годы, не раньше 3-го года жизни и лишь очень медленно исчезаетъ къ старости. Она состоитъ изъ разсѣянныхъ по туловищу и разгибательнымъ поверхностямъ членовъ бугорковъ, величиною съ конопляное или горчичное зерно, не красныхъ и не столько видимыхъ глазомъ, сколько осязаемыхъ руками. При накалываніи такого бугорка просачивается изъ него свѣтлая жидкость. Бугорки эти очень зудятъ и вынуждаютъ къ расчесамъ, вслѣдствіе которыхъ образуются струпики, часто кровавые. Въ болѣе легкихъ случаяхъ зудъ имѣетъ характеръ ползанія мурашекъ по тѣлу. Частые расчесы кожи ведутъ также къ образованію гнойничковъ и къ экзематознымъ воспаленіямъ кожи.

Пруриго.

Въ дальнѣйшемъ теченіи кожа становится грубой, жесткой, сухой и весьма мало склонной къ потѣнію. Очень часто опухаютъ паховыя железы. Почесуха никогда не поражаетъ половыхъ органовъ; на волосистой же части головы она является лишь въ видѣ отрубевиднаго шелушенія кожи съ высыханиемъ и выпаденіемъ волосъ. Наиболѣе мучительный симптомъ этой болѣзни, какъ сказано, зудъ, который обыкновенно ухудшается отъ острой пищи, спиртныхъ напитковъ, тѣлесныхъ напряженій, зимой (лѣтомъ, при потѣніи, зудъ меньше); особенно беспокоить онъ ночью, въ теплой постели, при чемъ необходимость чесаться лишаетъ больныхъ сна, вслѣдствіе чего они худѣютъ, теряютъ аппетитъ, становятся крайне унылыми и помышляютъ даже о самоубійствѣ. Вслѣдствіе сильнаго упадка питанія и малокровія развиваются водяночныя явленія, въ видѣ отековъ разныхъ органовъ тѣла, при чемъ отекъ гортани можетъ вызвать быструю смерть.

Отъ нервнаго зуда кожи (см. ниже „Прурить“) и другихъ зудящихъ накожныхъ болѣзней, равно какъ отъ зуда, производимаго кожными паразитами, почесуха отличается характернымъ своимъ мѣстоположеніемъ на тѣлѣ и упорнымъ теченіемъ.

Пруриго поддается лѣченію, хотя и очень туго, и это неудивительно, такъ какъ во 1) основа этой болѣзни—испорченность лимфы, во 2) она встрѣчается почти только въ нисшихъ бѣдныхъ слояхъ населенія, въ которыхъ условія жизни неблагоприятны для излѣченія столь упornaго страданія. Главными лѣкарствами являются тутъ *Сульфуръ, Сетія, Арсеникъ, Графитъ, Калькареа карбон.*, также *Русъ, Аписъ, Пульсатилла*. Наружно: ванны, обыкновенныя и паровыя, съ зеленымъ мыломъ, втиранія *Сульфуръ-мази*; зудъ облегчается втираніемъ *Русъ-масломъ*.

Лихенъ.

8. Бугоровый лишай. (Лихенъ) встрѣчается въ разной степени и съ разнымъ теченіемъ У дѣтей во время прорѣзыванія первыхъ зубовъ, вслѣдствіе ли прямыхъ раздраженій кожи или вслѣдствіе неправильнаго питанія и разстраивающагося пищеваренія, появляются внезапно, на лицѣ ли только или по всему тѣлу, бугорки, величиною въ булавочную головку, блѣднаго, краснаго или темно-краснаго цвѣта. Отдѣльные бугорки исчезаютъ черезъ 3—4 дня, замѣняясь новыми на тѣхъ же или на другихъ мѣстахъ, и такъ болѣзнь можетъ тянуться недѣлями. Бугорки эти лишь у дѣтей, которыя ужъ постарше, сопровождаются зудомъ, особенно въ постельной теплотѣ.—Лихенъ у взрослыхъ наблюдается чаще всего подъ влияніемъ жара и сопровождается всегда сильнымъ зудомъ,

вынуждающимъ къ расчесамъ, которые въ свою очередь ведутъ къ образованію корокъ. Отдѣльные бугорки держатся 10—12 дней, возобновляясь все новыми, и такъ болѣзнь можетъ тянуться мѣсяцами, а въ тяжелыхъ случаяхъ и при непрекращающихся вредныхъ вліяніяхъ она можетъ стать очень упорной и мучительной, ведя къ образованію настоящей экземы.

Лѣченіе сводится къ устраненію вредныхъ вліяній и къ примѣненію *Меркур. солюб.*, *Стафизагрія*, *Русъ*, также *Графитъ*, *Олеандръ*, *Сенія* и др. Наружно: смазывать 2—3 раза въ день *масломъ* или *мазью Русъ* и присыпать картофельной или рисовой мукой. Каждый день обмывать тепловатой водой и мыломъ, полезны и ванны.

9. Нервный зудъ кожи (Пруритъ). Болѣзнь эта сама по себѣ не обуславливается какими либо видимыми измѣненіями кожи, а таковыя (воспаленныя и мокнущія мѣста) могутъ явиться лишь слѣдствиемъ расчесовъ, къ какимъ вынуждаетъ страдающихъ пруритомъ сильный зудъ кожи. Чаше всего пруритъ поражаетъ область половыхъ органовъ и задняго прохода, затѣмъ переднія поверхности нижнихъ конечностей, у стариковъ же онъ распространяется и по всему тѣлу (старческій зудъ). Всего сильнѣе зудъ въ постельной теплотѣ, равно какъ въ слишкомъ теплой или прохладной комнатѣ.—Причины нервного зуда кожи не вполне еще выяснены. Полагаютъ, что ближайшей причиной являются замедленія (застои) крови въ капиллярахъ (волосныхъ сосудахъ) кожи. У лицъ, предрасположенныхъ къ пруриту послѣдній во всякомъ случаѣ часто вызывается употребленіемъ острыхъ и соленыхъ кушаній, горячительныхъ или спиртныхъ напитковъ, а также устрицъ, раковъ, морскихъ рыбъ, земляники; онъ является также вслѣдствіе душевныхъ волненій, неправильностей регулы и т. п. Нервнымъ зудомъ страдаютъ преимущественно истеричныя особы, ипохондрики и вообще нервные люди. Мужчины заболѣваютъ имъ, однако, чаще чѣмъ женщины, и люди ведущіе очень роскошный образъ жизни—чаще, чѣмъ бѣдные люди; если послѣдніе страдаютъ зудомъ кожи, то причина его обыкновенно—чесоточная болѣзнь или вшивость.—Нервный зудъ сопровождается часто хроническій катарръ мочевого пузыря у стариковъ и наблюдается также при желтухѣ, затѣмъ послѣ большихъ дозъ опія или морфія и въ періодъ выздоравливанія послѣ тяжелыхъ болѣзней. Изъ всѣхъ формъ нервного зуда кожи, старческая—самая упорная; довольно упоренъ также зудъ задняго прохода и

Пруритъ.

половыхъ частей; однако, при нѣкоторомъ терпѣніи и выдержкѣ, можно съ помощью гомеопатическаго лѣченія и соотвѣтствующихъ вспомогательныхъ мѣръ добиться излѣченія.

При выборѣ лѣкарствъ надо принимать во вниманіе, кромѣ характера и мѣста проявленія зуда, еще и общее состояніе организма, всѣхъ органовъ и тканей. Относительно общихъ неправильностей надо справляться въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этой книги, относительно же первыхъ двухъ показаній можно руководствоваться слѣдующими сопоставленіями:

Характеръ зуда:

колющій: *Меркур солюб.*, *Русь*, *Графитъ*; жгучій: *Арсен. альб.*, *Каустик.*, *Фосфоръ*, *Сульфуръ*; какъ будто мурашки по кожѣ бѣгаютъ: *Пульсат.*, *Русь*, *Сенія*, *Сульфуръ*; хуже въ теплѣ: *Пульсат.*, *Меркур. солюб.*, *Сульфуръ*, *Сенія*; хуже въ прохладѣ: *Арсен. альб.*, *Гепаръ сульфур.*, *Каустик.*; хуже отъ чесанія: *Сульфуръ*, *Русь*, *Пульсат.*; лучше отъ чесанія: *Фосфоръ*, *Кальк. карбон.*, *Туя*.

Мѣсту проявленія зуда:

у задняго прохода: *Сульфуръ*, *Натр. muriat.*, *Нуксѣ вом.*, *Сенія*, *Нитри. ацид.*, *Калькар. карбон.*, *Силиція*; на ядерной мошонкѣ: *Туя*, *Сульфуръ*; на дѣтородномъ членѣ: *Меркур. солюб.*, *Сульфуръ*, *Сенія*; на головкѣ дѣтородн. члена: *Кали. карбон.*, *Натр. muriat.*, *Аурумъ muriat.*, *Нитри. ацид.*; на половомъ лобкѣ: *Меркур. солюб.*, *Сульфуръ*, *Туя*; на наружныхъ половыхъ частяхъ у женщинъ: *Бораксъ*×2, *Русь*, *Аписъ*, *Имація*, *Беллад.*, *Калькар. карбон.*, *Каннабисъ*, *Цинк.*, *Кали бромат.*

При старческомъ зудѣ: *Мерсерумъ*.

Изъ вспомогательныхъ мѣръ полезны ванны (25° Р., 10 мин. продолжительности), обмыванія всего тѣла (22° Р.), набрюшные согрѣвающие компрессы (22° Р., на 2 часа), паровая ванна. Нераздражающая пища; особенно слѣдуетъ избѣгать употребленія въ пищу тѣхъ веществъ, которыя, какъ наблюденіе показываетъ, способствуютъ появленію и развитію зуда (см. выше). Вообще требуется простой, здоровый образъ жизни. Зудъ облегчается отъ втиранія *масломъ Русь*, при чемъ масло слѣдуетъ брать предпочтительно кокосовое.

Уртикарія.

10. Крапивница Уртикарія. Причины могутъ быть наружныя и внутреннія. Къ первымъ принадлежатъ: прикосновеніе крапивы, сумаха (*Русь*), укусы насѣкомыхъ; затѣмъ карболовыя и другія перевязки, припарки, вліяніе рѣзкаго вѣтра и проч. Къ внутреннимъ причинамъ, производящимъ часто у чувствительныхъ къ тому особъ крапивную сыпь, принадлежатъ нѣкоторыя пищевыя вещества и лѣкарства, при чемъ иной разъ достаточно даже одного прикосновенія ихъ къ слизистой оболочкѣ рта, а именно:

земляника, смородина, жирныя кушанья, устрицы, сельди, раки, укусъ и др.; хина, опій, морфій, хлоралгидратъ, арника, кубеба и др. — Затѣмъ, крапивница часто сопровождается желудочныя болѣзни, маточныя страданія и другія болѣзненные состоянія. Прямые нервныя или душевныя вліянія могутъ также вызывать крапивную сыпь, а именно: вліяніе гнѣва, испуга, радости, горя и пр. Часто болѣзнь эта имѣетъ эпидемическій характеръ, подъ вліяніемъ, вѣроятно, атмосферическихъ перемѣнъ. Крапивная сыпь не заразительна.

Блѣдныя или красныя различной формы возвышенія кожи, которыя сильно зудятъ, часто скоро проходятъ, не оставляя послѣ себя никакихъ слѣдовъ. Появленіе сыпи сопровождается часто жаромъ тѣла съ предшествующимъ ознобомъ и другими лихорадочными явленіями (крапивная лихорадка). Крапивная сыпь принимаетъ нерѣдко и хроническое, затяжное теченіе; въ этомъ случаѣ упомянутыя возвышенія кожи превращаются въ воспалительныя бугорки, которые могутъ переходить даже въ нарывы, чирьи (крапивница бугорковая).

Симптомы
крапивницы.

Если причина извѣстна, то она прежде всего должна быть устранена. При жарѣ тѣла *Аконитъ* (попеременно съ *Русъ*, если при этомъ имѣется сильный зудъ). При меньшемъ жарѣ, но сильныхъ ревматическихъ боляхъ, хорошо дѣйствуетъ *Бріонія*; при поносѣ: *Дулькамара*. — Когда больной весьма чувствителенъ къ боли и, кромѣ зуда, ощущаетъ еще и невыносимое жженіе и колотье въ пораженныхъ частяхъ тѣла, тогда слѣдуетъ давать *Анисъ*, особенно, если сыпь является при перемежающейся лихорадкѣ. — Случаи, объясняемые нервными потрясеніями, или вообще нервныя субъекты, требуютъ назначенія: *Игнація*, *Хомолла* или *Валеріана*, а также *Кали бромат*. — При желудочныхъ разстройствахъ: *Нуксъ вом.*, *Антим. круд*; при подозрѣніи на глисты: *Цина*.

Лѣченіе.

Вообще, при лѣченіи крапивной сыпи, какъ и другихъ на-кожныхъ болѣзней, надо руководствоваться не только сыпью, какъ таковой, и не только причинами, вызвавшими сыпь, но и всѣми болѣзненными состояніями, которыми сыпь сопровождается.

Какъ въ острыхъ, такъ и въ хроническихъ случаяхъ крапивницы, можно съ пользой употреблять, какъ промежуточное средство, противъ сильнаго зуда и жженія: *Анакард.*, особенно если зудъ является вскорѣ послѣ каждой ѣды, а также *Ледумъ*, если сыпь похожа на укусы комаровъ. Наружно: обмыванія, нѣ-

сколько разъ въ день, или примочки изъ *Уртика* Θ , 20 капель на бутылку воды, также *Русь-масло*.

Въ хроническихъ случаяхъ крапивницы еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ острыхъ, нужно руководствоваться общимъ состояніемъ больного и сопровождающими крапивницу болѣзнями. Всего чаще имѣютъ дѣло съ золотушнымъ сложеніемъ, и въ такомъ случаѣ главное лекарство: *Калькар. карбон.*; послѣ этого: *Сульфуръ* или *Гепаръ сульф.*—При малокровіи: *Феррумъ*, *Арсеникъ*; то и другое въ перемежку съ *Пульсатилла* (также *Сенія*), если имѣются и маточныя страданія.—При хронической маляріи съ упадкомъ общаго питанія организма: *Намф. муриат.* — *Румексъ*: зудъ усиливается отъ холода и облегчается въ теплѣ (особенно у женщинъ).

О дозахъ, дѣленіяхъ и способѣ пріемовъ см. ч. I гл. 3 и 4: о дѣленіяхъ также стр. 35—39 и стр. 535—541.

Потница.

11 Милиарія. (Потница): Эта форма выпота кожи приводится тутъ лишь для того, чтобы читатель зналъ, съ чѣмъ имѣетъ дѣло, когда встрѣтится съ подобной сыпью, ибо сама по себѣ послѣдняя, кромѣ содержанія тѣла въ чистотѣ, не требуетъ вообще лѣченія. На тѣлѣ высыпаетъ безчисленное множество пузырьковъ, безъ всякихъ особыхъ кожныхъ ощущеній, величиною съ просяное зерно или булавочную головку, весьма рѣдко бывая больше. Тѣло кажется какъ бы покрытымъ росой. Сыпь эта является часто лѣтомъ у людей вообще здоровыхъ, особенно у полныхъ, вслѣдствіе жары и потѣнія, а также часто послѣ кризиса въ лихорадочныхъ болѣзняхъ и вообще втеченіи инфекціонныхъ лихорадочныхъ болѣзней. Различаютъ кристалличную просянку, когда содержимое пузырьковъ прозрачно, бѣлую—когда она мутно, и красную, когда пузырьки окружены красными каймочками кожи.

Герпесъ.

13. Пузырчатый лишай (Герпесъ.) Различаютъ 4 разновидности этой болѣзни:

а) Лихорадочный или лицевой (губной) лишай (см. стр. 170).

Половой
лишай.

б) Половой лишай. Причинами являются въ нѣкоторыхъ случаяхъ предшествовавшія венерическія болѣзни, въ другихъ—наружныя раздраженія всякаго рода; во многихъ же случаяхъ ближайшую причину опредѣлить невозможно, и ее приходится приписывать какому либо чисто нервному вліянію.

Поражаются наружныя половыя части, какъ у мужчинъ такъ

и у женщинъ; появляющаяся сыпь состоитъ изъ прозрачныхъ мелкихъ пузырьковъ, ссыхающихся и образующихъ плоскія корки, по отпаденіи которыхъ не остается никакихъ замѣтныхъ слѣдовъ. Высыпаніе это не сопровождается ни ознобомъ, ни жаромъ тѣла, какъ это бываетъ при губномъ лишаѣ. Болѣзнь склонна къ возвратамъ.

Причинныя болѣзни должны лѣчиться соотвѣтственнымъ образомъ, точно такъ же одновременныя бѣли у женщинъ. Изъ внутреннихъ средствъ: *Аурумъ муріат.*, *Гепаръ сульфурисъ*, *Меркур. солуб.*, *Туя* и другія.

Наружно обмывать раза два въ день растворомъ изъ 20—30 капель *Меркур. корроз.* $\times$ 2 въ стаканъ воды и присыпать картофельной или рисовой мукой; при образованіи корокъ и при зудѣ смазывать *мазью-Русъ* или *Аписъ*.

в) Кольцевидный лишай. Эта форма пузырчатой **Кольцевидный лишай.** сыпи поражаетъ многихъ весною и осенью какъ бы эпидемически, чаще всего малокровныхъ и золотушныхъ субъектовъ. Сыпь эта у одного и того же лица можетъ повторяться каждый годъ. Она является всего чаще на тыльной поверхности рукъ и ногъ въ видѣ отдѣльныхъ или нѣсколькихъ колецъ, заключающихъ одно въ другомъ, вызывая красноту кожи, такъ что послѣдняя кажется усыянной круглыми пятнами; по мѣрѣ заживленія, пятна принимаютъ и иную форму и различные цвѣта, какъ бы радужные.—Дальнѣйшія измѣненія самой сыпи такія же, какъ и при лицевомъ лишаѣ. Ощущенія, вызываемыя сыпью, не сильныя: легкій зудъ, незначительное расстройство пищеваренія, иногда легкій жаръ. Обыкновенно въ 1—2 недѣли проходитъ, но можетъ продолжаться 3—4 недѣли.

Мѣстно надо стараться содержать пораженныя мѣста кожи подъ защитительнымъ покровомъ (жирное смазываніе или присыпка и вата). Въ прочемъ—лѣченіе какъ при половомъ лишаѣ. Малокровіе, золотуха и другія расстройства организма должны быть лѣчимы соотвѣтственнымъ образомъ. Для предохраненія отъ возвратовъ пригодны *Сульфуръ*, *Ктлькар. карбон.*, *Графитъ* и проч.

г) Опоясывающій лишай, (Герпесъ-Цостеръ) является главной формой пузырчатого лишая и зависитъ отъ измѣненій, происшедшихъ внутри организма, въ нервной и сосудистой системѣ. Ближайшимъ поводомъ могутъ служить наружныя поврежденія, сильныя душевныя потрясенія, вліяніе сырости, холода, простуженный и скрывшійся ножной потъ. **Опоясывающій лишай.**

Часто высыпанію пузырьковъ предшествуетъ тяжесть головы, жаръ тѣла, стѣсненіе въ груди, тошнота, рвота, и, кромѣ того, на мѣстѣ сыпи почти всегда чувствуется боль, которая тѣмъ сильнѣе, чѣмъ старше больной; боль—жгучая или тупая, сверлящая, или же колющая точно иглами. Спустя 2—3 дня появляются группами пузырьки, сидящіе на красной, воспаленной кожѣ. Содержимое пузырьковъ вначалѣ прозрачное, скоро мутнѣетъ и принимаетъ видъ гноя. Какъ только сыпь появилась, боль утихаетъ. Въ тяжелыхъ случаяхъ пузырьки становятся, отъ кровоизліяній въ нихъ, темными и даже черными (кровянистый лишай). Затѣмъ сыпь подсыхаетъ и образуетъ струпикі, которые въ течение 1—2 недѣль отпадаютъ, иногда же образуются язвочки, заживающія съ образованіемъ рубцовъ. Въ этомъ случаѣ боли обыкновенно возобновляются, становясь иной разъ крайне тягостными и продолжаясь долгое время. — Лишай этотъ можетъ появляться въ любой части тѣла, всего чаще однако поражается боковая часть туловища (область груди), откуда болѣзнь и получила свое названіе. Онъ бываетъ всегда, за рѣдкими исключеніями, лишь на одной половинѣ тѣла и не имѣетъ склонности къ возвратамъ.

Лѣченіе

При лѣченіи этой болѣзни надо принимать во вниманіе самыя мельчайшія подробности, въ отношеніи какъ ея самой, такъ и общаго состоянія организма, на основаніи которыхъ и выбирать подходящія лѣкарства.

Мезереумъ: больной чувствуетъ себя хуже въ теплѣ, а также вечеромъ; прикосновеніе, равно и движеніе усиливаютъ боль. По-переменно съ этимъ лѣкарствомъ—*Белладонна*: при возбужденномъ состояніи съ жаромъ, или *Бріонія*: при желудочныхъ расстройствахъ, густо и желтообложенномъ языкѣ, запорѣ, боляхъ въ членахъ.—*Дулькамара*: при простудѣ отъ сырости, у лицъ, вообще очень чувствительныхъ къ холоду и сырости, попеременно съ *Сульфурѣ*, особенно если имѣется еще рвота и поносъ съ коликой въ животѣ (облегченіе при движеніи и въ тепломъ воздухѣ). Если вмѣстѣ съ болѣзнію произошло прекращеніе ножного пота, и больной ревматическаго состоянія, то подходит *Русъ*, попеременно съ *Силиція*. (При Русъ усиленіе боли ночью, въ покоѣ, отъ слишкомъ долгой ходьбы; облегченіе—въ началѣ движенія, отъ наружной теплоты, отъ потѣнія). *Ранункулусъ*: пузырьки темнаго или чернаго цвѣта, колющій зудъ, жженіе (усиленіе боли при переходѣ изъ тепла въ холодъ или обратно, особенно утромъ и послѣ ѣды). Если припадки боли періодичны;

являясь въ опредѣленные промежутки времени, слѣдуетъ давать *Арсеник. альб.* (это лѣкарство подходитъ болѣе для хроническихъ случаевъ), приемы нечастые—2—3 раза въ день. Кромѣ того *Меркур. солюб.*, *Цистусъ канадензисъ*, *Цинк.* и др. Въ запущенныхъ случаяхъ: *Графитъ*, *Фосфоръ* и др.

Наружно: смазываніе *масломъ Белладонны*, приготовленнымъ предпочтительно на кокосовомъ маслѣ; часто, однако, даже наркотическія мази (съ хлороформомъ или морфіемъ) не облегчаютъ боли при этой болѣзни; на время облегченіе получается лишь отъ внутреннихъ приемовъ (подкожнаго впрыскиванія) морфія.

Во всякомъ случаѣ необходимо защитить сыпь отъ всякихъ наружныхъ вліяній и поврежденій, для чего покрываютъ болящее мѣсто тонкимъ слоемъ ваты, карболовой или салициловой. Передъ тѣмъ можно смазать ее слоемъ нѣжнаго жира (ланолинъ—3 ч. и миндальное масло 1 часть) или кокосоваго масла и присыпать рисовой пудрой. Въ упорныхъ случаяхъ приноситъ иногда пользу электризація.

14. Мокнущій лишай (Экзема). Происходитъ лишь отъ внѣшнихъ раздраженій, либо вслѣдствіе внутреннихъ расстройствъ организма. Къ внѣшнимъ раздраженіямъ принадлежатъ: сильныя расчесы, трение жесткими предметами, раздражающія химическія вещества (ртутные, сѣрные, іодистые препараты, скипидаръ, кротонное масло и др.), жгучіе лучи солнца и сухой жаръ отъ огня и т. д.; къ химическимъ раздраженіямъ принадлежитъ также обильный разѣдающій потъ (напр. въ подмышкахъ, въ пахахъ, подъ отвислыми грудями), а также ѣдкія истеченія, наприм., изъ носа (при насморкѣ), изъ глазъ и ушей (при катаррѣ этихъ органовъ); далѣе—ѣдкія бѣли у женщинъ, а у дѣтей разѣдающія заднюю часть кишечныя выдѣленія при поносѣ.—Изъ внутреннихъ причинъ надо упомянуть прежде всего золотуху; затѣмъ экзема часто наблюдается у лицъ, страдающихъ подагрой и другими расстройствами крови и питанія, какъ малокровіе, полнокровіе, ожирѣніе, сахарное мочеизнуреніе, а также желудочно-кишечными расстройствами, маточными и почечными болѣзнями и проч. Въ подобныхъ случаяхъ экзема можетъ быть вызвана даже чисто нервными вліяніями, какъ напр., тоской, печалью, испугомъ, а у женщинъ—неправильностію регуль, беременностію, кормленіемъ. Наблюдается, наконецъ, и несомнѣнное наслѣдственное предрасположеніе къ заболѣванію экземой.—Болѣзнь эта—неприлипчивая, хотя продолжительное или частое и тѣсное

Причины
экземы.

соприкосновение здоровой кожи съ экзематозной можетъ вызвать и на первой воспаленіе; она встрѣчается чаще въ хронической формѣ, нежели въ острой.

**Разныя формы
экземы**

Различаютъ нѣсколько разновидностей экземы, смотря по характеру преобладающихъ въ каждомъ случаѣ измѣненій кожи. Такъ, говорятъ объ узелковой (бугорковой) формѣ экземы, пузырьчатой, гнойничной, красной, которая обыкновенно бываетъ и мокнущей, струпьевой и чешуйчатой. — Узелковая и пузырьчатая формы являются первоначальными формами экземы, изъ которыхъ, путемъ дальнѣйшаго развитія и измѣненій, могутъ развиться всѣ прочія. Въ простѣйшихъ случаяхъ на вообще нормальной кожѣ образуются группы пузырьковъ, которые лопаются, засыхаютъ въ струпики и опадаютъ. Зудъ при этомъ незначительный. Узелковая форма сопровождается обыкновенно покраснѣніемъ кожи, при чемъ, кромѣ узелковъ, бываютъ и пузырьки. Тутъ зудъ ужъ очень сильный и вынуждаетъ къ расчесамъ, которые, сдирая пузырьки или верхушки узелковъ, въ свою очередь израниваютъ кожу и тѣмъ еще болѣе ухудшаютъ и обостряютъ болѣзненный процессъ, кожа поражается глубже, и, кромѣ воспалительной красноты, появляется еще и отежная припухлость съ выпотѣніемъ жидкости. При этомъ легко образуются гнойныя пустулки, и экзема принимаетъ форму гнойничной. Въ такихъ случаяхъ ощущается сильное мѣстное жженіе, часто при общемъ жарѣ тѣла съ знобленіемъ. Наконецъ, процессъ заживленія идетъ путемъ присыханія мокнущей сыпи и образования струпьевъ и корокъ, по отпаденіи которыхъ остаются на кожѣ временныя красныя и блѣднокрасныя пятна, на которыхъ иногда появляются еще бѣлыя чешуйки. — Весь процессъ только что описанной острой экземы продолжается, при надлежащемъ лѣченіи, отъ 2 до 6 недѣль, смотря по степени болѣзни. Въ совсѣмъ легкихъ случаяхъ излѣченіе можетъ послѣдовать и въ нѣсколько дней.

Хроническая экзема отличается прежде всего болѣею продолжительностью, частыми обостреніями и возвратами. Зудъ гораздо сильнѣе и мучительнѣе; выдѣленіе становится очень обильнымъ, а кожа все болѣе утолщается и уплотняется; она покрывается толстыми струпьями и корками, подъ которыми воспаленіе продолжается, осложняясь язвами, мелкими чирьями и нарывами и сопровождаясь опуханіемъ лимфатическихъ железъ (въ подмышкахъ, въ пахахъ, на шеѣ); часто, особенно на лицѣ, она даетъ поводъ и къ рожеистому воспаленію. Течение хронической экземы

по большей части очень продолжительно, при чемъ періоды улучшения, съ ослабленіемъ всѣхъ болѣзненныхъ явленій, чередуются съ періодами ухудшения, обострѣнія болѣзненного процесса.

Чаще всего экзема наблюдается на волосистой части головы, на лицѣ (у маленькихъ дѣтей) и на голеньяхъ.

Экзема волосистой части головы Обильное выдѣленіе изъ разсыянныхъ по головѣ узелковъ, пузырьковъ или гнойничковъ, высыхая, образуетъ струпу и корки желтаго, иногда бѣлаго цвѣта, которые склеиваютъ волосы, сильно зудятъ и обыкновенно служатъ мѣстомъ скопленія головныхъ паразитовъ. По удаленіи такихъ корокъ обнаруживается красная и часто сильно мокнущая поверхность кожи. Съ головы экзема часто опускается на шею, лобъ, уши, вѣки, что бываетъ наичаще у маленькихъ дѣтей (молочная короста), въ связи съ сальностію головы, и сопровождается катарромъ глазъ и ушей, а также припуханіемъ шейныхъ железъ. Послѣдствіемъ головной экземы является часто выпаденіе волосъ или слабый ихъ ростъ.

**Экзема
головы.**

Отъ себорреи (сальности) экзема головы отличается тѣмъ, что при первой подъ корками всегда имѣется нормальный цвѣтъ кожи; кромѣ того себоррейныя корки никогда не выходятъ за предѣлы волосъ. При паршахъ, которыя можно было бы смѣшать съ экземой, корки имѣютъ сѣрожелтый цвѣтъ и углубленіе посредицѣ; кромѣ того, помощью микроскопа обнаруживаются характерныя паршевыя грибки. Псоріазъ (стр. 554) головы отличается тѣмъ отъ экземы, что при немъ всегда имѣются характерныя псоріазныя пятна съ блестящими чешуйками и на прочихъ частяхъ тѣла.

Экзема лица встрѣчается всего чаще у грудныхъ дѣтей (молочная короста) и начинается обыкновенно на щекѣ или на лбу. Выдѣленіе экзематозной сыпи тягучее, желтоватое, засыхаетъ въ корки желтоватаго цвѣта, похожая на засохшій медъ. Все лицо можетъ покрыться этими корками точно маской. Эта экзема причиняетъ сильнѣйшій зудъ, вслѣдствіе котораго больныя расчесываютъ себѣ лицо до крови. Подъ корками кожа красная и мокнущая. При поражении экземой слизистой оболочки носа, полость послѣдняго выполняется корками и затрудняетъ дыханіе. Это особенно важно у грудныхъ дѣтей, у которыхъ затрудненіе дыханія можетъ имѣть опасныя для жизни послѣдствія. Экзема носа важна еще тѣмъ, что наичаще подаетъ поводъ къ рожиному воспаленію лица. У взрослыхъ экзема лица поражаетъ мѣста, покрытыя волосами—экзема бороды. Въ этихъ случаяхъ сыпь большею частью гнойничная и очень похожа на сикозъ бороды (стр. 554), который отличается тѣмъ, что держится исключительно волосныхъ мѣшечковъ и никогда не выходитъ изъ границъ бороды, что при экземѣ, напротивъ, почти всегда бываетъ.

**Экзема лица.
Молочная
короста.**

Экзема голени бываетъ почти безъ исключенія при расширеніи венъ, особенно малыхъ, очень упорна, сильно зудитъ и обостряется большей частью весной и осенью. Имѣетъ обыкновенно характеръ экземы красной мокнущей съ рѣдкимъ образованіемъ гнойничковъ, но часто съ значительнымъ пропитываніемъ и утолщеніемъ кожи. Характерно для этой экземы то, что она часто поражаетъ обѣ голени въ симметричныхъ мѣстахъ.

**Экзема
голеней.**

Экзема мошонки также преимущественно бываетъ красной, сопровождается сильнѣйшимъ зудомъ и утолщеніемъ кожи. Чрезвычайно упорна.

Садненіе, обопрѣлость имѣетъ также характеръ экземы (см. стр. 554)

**Задачи
лѣченія
при экземѣ.**

Лѣченіе экземы различно, смотря по тому, имѣемъ ли дѣло съ острой или хронической экземой, съ больными, организмъ которыхъ вообще здоровъ, или съ страдающими какими либо хроническими внутренними разстройствами; затѣмъ принимаются во вниманіе мѣстоположеніе, форма и вообще всѣ явленія даннаго случая экземы и всего организма. Въ острыхъ случаяхъ, особенно у лицъ вообще здоровыхъ, когда экзема явилась слѣдствіемъ какого либо наружнаго раздраженія кожи, на первый планъ выступаетъ мѣстное лѣченіе, основная задача котораго состоитъ, во 1), въ томъ, чтобы устранить вызвавшую или поддерживающую экзему причину, во 2), чтобы защитить больную часть отъ всякихъ наружныхъ вліяній, даже отъ воздуха. При этомъ прежде всего необходимо заботиться о возможно чистомъ содержаніи кожи.

**Вспом. мѣры
при экземѣ.**

Въ раннемъ періодѣ экземы, когда она еще не мокнетъ или отдѣленіе еще очень незначительно, полезно присыпать пораженныя мѣста рисовой или картофельной мукой или порошкомъ очищеннаго мѣла.

Чистоты ради и для предупрежденія образованія корокъ и струпьевъ, при которыхъ зудъ особенно силенъ, надо больныя мѣста раза два въ день обмывать прохладной или чуть теплой водой, при чемъ вода должна быть мягкой, а не жесткой. Жесткость воды можно уменьшить кипяченіемъ и прибавленіемъ соды (щепотку на стаканъ воды). Особенно смягчительныя свойства можно придать водѣ, если кипятить ее съ овсяной мукой или отрубями и затѣмъ процѣдить. То-же достигается жидкимъ отваромъ риса на молокѣ съ водою и отцѣженнымъ отъ зеренъ. Очень благотворно дѣйствуетъ на кожу при экземѣ теплый жидкій крахмальный клейстеръ. Мыла лучше не употреблять, а вмѣсто него яичный желтокъ, который затѣмъ обмывается мягкой водой (съ содой) или однимъ изъ упомянутыхъ отваровъ.

При экземѣ на конечностяхъ и туловищѣ можно употреблять мѣстныя или общія тепловатыя ванны изъ чистой мягкой воды или изъ отвара овса или ячменныхъ отрубей. Каждый разъ послѣ ванны (или обмываній) надо старательно осушить больныя мѣста и присыпать вышеупомянутыми порошками.

Если сыпь сопровождается краснотой или отечностью кожи, весьма полезны примочки изъ отвара крахмала: крахмалъ и вода берутся въ равныхъ количествахъ, смѣшиваются, завариваются кипяткомъ и затѣмъ остужаются. Такія примочки умѣряютъ мѣстный жаръ и успокаиваютъ зудъ. Того же можно въ нѣкоторыхъ

случаяхъ достигнуть слабымъ растворомъ соды ($\frac{1}{4}$ ложки на стаканъ воды). Когда воспаленіе прошло, можно перейти къ присыпкамъ.—Въ иныхъ случаяхъ полезно смазывать пораженныя мѣста два въ день, какимъ либо растительнымъ масломъ (непремѣнно свѣжимъ) или свѣжимъ коровьимъ (не просоленнымъ) масломъ или топленнымъ свинымъ саломъ.

Когда къ началу лѣченія имѣются уже корки, струпы и чешуйки, то прежде всего надо ихъ удалить съ помощью какого либо изъ указанныхъ жировъ. Полезны для этой цѣли и упомянутый крахмальный отваръ. При экземѣ головы необходимо остричь волосы, если они длинны и мѣшаютъ примѣненію наружныхъ средствъ.

Въ острыхъ случаяхъ назначаются слѣдующія лѣкарства внутрь:

Меркур. солюблисъ: при красной, пузырьчатой, мокнущей экземѣ съ жаромъ и жженіемъ въ пораженныхъ мѣстахъ и съ вечерними ухудшеніями. Если при этомъ имѣется общій жаръ тѣла, то добавляется *Аконитъ*.—Если въ теченіе нѣсколькихъ дней не наступило улучшенія, при чемъ экзема мокнетъ и жженіе продолжается, даютъ *Кротонъ*; если же при этомъ имѣется воспалительная краснота съ отечностью — *Русъ*; при преобладаніи гнойничковъ и корокъ — *Антимон. круд.*, *Графитъ* или же *Калькар. карбон.*

Лѣкарства
противъ
экземы.

При хронической экземѣ необходимо возможно полнѣе опредѣлить основной характеръ болѣзни, ибо только при этомъ условіи имѣется наиболѣе шансовъ для вѣрнаго выбора соотвѣтственныхъ лѣкарствъ. Далеко не всегда однако удается раздобыть въ этомъ направленіи достаточно опредѣленные данныя; въ такихъ случаяхъ всего лучше начать лѣченіе съ *Сульфуръ* или же, особенно у женщинъ, съ имѣющаго наиболѣе сходства съ сѣрой *Графитъ*, при томъ съ вышшихъ ихъ дѣлений и въ не слишкомъ частыхъ дозахъ, и лишь въ случаѣ надобности спускаясь къ низшимъ дѣленіямъ и болѣе частымъ приемамъ.—Послѣ Сульфуръ или Графитъ, выбираютъ лѣкарства, смотря по характеру болѣзни и по болѣе специальнымъ показаніямъ.—При хронической экземѣ головы дается *Меркур. солюб.*, если выдѣленіе клейкое и производитъ жженіе, 2—3 раза въ день по 1 приему. Если при этомъ кожа воспаленная (красная) и отечная: *Русъ*, такимъ же образомъ, или болѣе частые приемы. Если чрезъ нѣсколько дней незамѣтно улучшенія: *Ликопод.*—попеременно съ *Арсеник. альб.* или *Арсеник. іодат.* Въмѣсто Арсеника рекомендуется *Калькар.*

карбон., если экзема спускается на лицо и образуются толстые, часто бѣлыя корки; сложеніе больного золотушное, и имѣются еще и другія золотушные явленія, какъ болѣзнь ушей, железъ и проч. Калькареа дается, какъ сказано при Сульфурѣ. *Силиція* слѣдуетъ предпочесть Калькареѣ, если голова больного сравнительно велика, а на ногахъ имѣется ѣдкій, разъѣдающій кожу потъ; особенно при одновременной болѣзни костей.

Что касается другихъ мѣстонахожденій экземы, то упомянемъ лишь, главнѣйшія съ перечисленіемъ специально рекомендуемыхъ средствъ.

Экзема за ушами: *Меркур. солуб.*, *Гепар. сульф.* *Олеандръ*, *Русь*, *Арсеник. альб.*, *Карбо вегетаб.*—Молочная короста: *Сульфур.*, *Русь*, *Меркур.*, *Віола триколоръ*, *Бораксъ*, *Клематисъ*, *Кротонъ*.—Экзема грудныхъ сосковъ (во время кормленія): *Арника* внутрь, а также *Арника* въ растворѣ наружно для примочекъ (10—15 капель на стаканъ воды); затѣмъ *Графитъ*, *Гидрастисъ*.—Экзема мошонки: *Русь*, *Кротонъ*, *Лазезисъ*, *Сенія*, *Арсеник. альб.*—Экзема женскихъ дѣтородныхъ частей: *Калькар.*, *Гепаръ*, *Сенія*, *Графитъ*.—Экзема задняго прохода: *Сульфуръ*, *Арсеник. альб.*, *Нитри ацид.*, *Карбо анималисъ*.—Экзема нижнихъ конечностей: *Русь*, *Сенія*, *Графитъ* суть главныя средства; въ очень упорныхъ случаяхъ приноситъ пользу *Іодъ* $\times 3$, 2 раза въ день по 1 приему, съ наружнымъ примѣненіемъ іодной настойки (2 капли на 2 ложки воды); 2 раза въ день смазывать больныя мѣста. Экзема ладоней: *Графитъ*, *Гепаръ*.—Экзема тыльной поверхности рукъ: *Бовиста*.

V. Паразитныя пораженія кожи.

Чесотка.

1. Чесотка (Скабіесъ) происходитъ отъ появленія и распложенія въ кожѣ такъ называемаго чесоточнаго клеща, животнаго паразита. Ведутъ къ этому разные пути: совмѣстное спанье и вообще тѣсное общеніе съ чесоточными больными, ношеніе платья съ такихъ больныхъ и т. д. Чаше всего поражаются руки, голова же и лицо остаются всегда пощаженными—впрочемъ только у взрослыхъ, но не у грудныхъ дѣтей. Клещъ внѣдряется въ кожу и начинаетъ въ ней странствовать, пробуравливая себѣ ходы, отъ чего и происходитъ невыносимый зудъ кожи. вынуждающій къ сильному расчесамъ, отъ которыхъ въ свою очередь кожа изранивается, воспаляется и принимаетъ характеръ экзематозный.

Лѣченіе должно быть прежде всего мѣстнымъ, направленнымъ къ умерщвленію паразитовъ и ихъ разводковъ. Это всего проще и вѣрнѣе достигается слѣдующимъ образомъ. Въ теплой ваннѣ (28° Р.) втираютъ въ тѣло зеленое мыло и смываютъ. Затѣмъ, послѣ основательнаго осушенія тѣла, втираютъ въ него жидкій *Стираксъ-бальзамъ* или *Перувианскій бальзамъ* (смѣшан-

ный съ равными частями бензина и спирта) и надѣваютъ обычное платье. Втиранія эти повторяютъ 3 раза въ теченіе трехъ дней (по 1 разу въ день), а на четвертый опять принимаютъ теплую ванну съ мыльнымъ натираніемъ тѣла и, обсушившись, надѣваютъ свѣжее, чистое бѣлье и чистое платье. (Надо помнить, что втиранія перувианскаго бальзама, смѣшаннаго съ бензиномъ и спиртомъ, нельзя дѣлать близъ огня, въ виду возможности воспламенѣнія бензина).—Еще энергичнѣе дѣйствуетъ примѣненіе сѣрнаго цвѣта, въ смѣси съ перувианскимъ бальзамомъ: по 10 граммъ на 100 граммъ жира. Эту мазь слѣдуетъ употребить у лицъ съ жесткой кожей или въ запущенныхъ случаяхъ чесотки. Способъ примѣненія такой же, какой изложенъ выше.—Бѣлье съ чесоточныхъ должно быть выварено, а платье всего лучше сжечь.—Вмѣсто упомянутыхъ выше ваннъ, можно примѣнить также, и даже еще съ большей пользой, полныя паровыя ванны (20 мин. продолжительности) съ послѣдующей полуванной (25° Р.) и растираніемъ въ ней кожи зеленымъ мыломъ.—Въ болѣе свѣжихъ и легкихъ слѹчаяхъ можно ограничиться втираніемъ мази изъ сѣрнаго цвѣта и теплыми мыльными обмываніями.

Внутрь противъ предрасположенія къ чесоткѣ даютъ *Сульфуръ 6* втеченіи одной недѣли, а затѣмъ—*Сенія, Калькар. карб., Графитъ, Ликоподій.*—Въ упорныхъ случаяхъ. *Туя, Меркур., Аписъ, Арсеникъ, Силиція.*

2. Вшивость (Фтириазъ). Главное средство противъ вшивости—опрятность и чистота. При вшивости головы, кромѣ частыхъ обмываній теплой водой съ мыломъ, помогаетъ смачиваніе растворомъ *Сабадилла Ө* (пополамъ съ водой), 1—2 раза въ день, также смазываніе анисовымъ масломъ.—Платяныя вши, излюбленными мѣстами которыхъ служатъ складки бѣлья, уничтожаются всего вѣрнѣе горячимъ утюгомъ.—Площицы распложатся преимущественно на покрытыхъ волосами частяхъ тѣла, даже въ бровяхъ. Лучшее противъ нихъ средство—сѣрая ртутная мазь; дѣйствительна также мазь изъ 1 части персидскаго порошка (употребляемаго противъ насѣкомыхъ) съ 5 частями вазелина. При предрасположеніи ко вшивости показаны тѣ же средства внутреннія, какія приведены при чесоткѣ.

Вшивость

3. Парша (Фавусъ). Парша встрѣчается чаще всего на волосистой части головы и состоитъ изъ желтоватыхъ, мягкихъ корокъ, съ вдавленіемъ и волосомъ посрединѣ, распространяющихъ своеобразный крайне непріятный запахъ (напоминающій

Парша.

кошачью мочу). По снятии такой корки, подъ ней оказывается гноящееся чашечкообразное углубление въ кожѣ. Болѣзнь вызывается особымъ грибомъ (ахоріумъ или оидіумъ Шенлейна) и крайне заразительна. Течение—хроническое и очень продолжительное. При нечистомъ содержаніи болѣзнь осложняется скопленіемъ и размноженіемъ паразитовъ съ соотвѣстными послѣдствіями (сильнымъ зудомъ и проч.); при обратномъ условіи фавусъ можетъ продолжаться долгое время, не причиняя никакихъ болѣзненныхъ ощущений. — Лѣчение представляетъ не мало трудностей, и оно можетъ считаться вполне успешнымъ лишь въ томъ случаѣ, если грибки, всѣ до одного, уничтожены. Радикальнымъ можетъ быть лишь мѣстное лѣчение. Внутреннія же, дѣйствующія на исправленіе соковъ, средства (какъ *Сульфуръ*, *Туя* и проч.) имѣютъ лишь вспомогательное значеніе. И такъ, волосы надо остричь возможно короче и затѣмъ корки повторно смазывать прованскимъ масломъ для ихъ размягченія. Послѣ удаленія корокъ надо каждое утро обмывать голову теплой водой съ мыломъ, а вечеромъ втирать въ нее водный растворъ сулемы (1:1000), покрыть затѣмъ тонкимъ слоемъ ваты и обвязать. Внутрь даются *Сульфуръ* 6 попеременно съ *Меркур.* солюб. 6 въ теченіе 2 недѣль, а послѣ того—*Арсеник.*, *Графитъ*, *Мезереумъ*, *Туя*, *Нуксъ юглансъ*, и т. п. въ не слишкомъ низкихъ дѣленіяхъ. Въ упорныхъ случаяхъ парши выдергиваютъ специальнымъ пинцетомъ—эпиляторомъ (съ широкими захватами) всѣ подозрительные, блѣдные, лишенные блеска, волосы, повторяя это настойчиво, пока не уничтожится болѣзнь.

**Стригушій
лишай**

4. Стригушій лишай, Кольцевъ (Герпесъ тонзурансъ). Болѣзнь эта, какъ и парша, происходитъ отъ пораженія кожи грибомъ, называемымъ „трихофитонъ тонзурансъ“ и состоитъ изъ кольцеобразно расположенныхъ группъ зудящихъ пузырьковъ. Она встрѣчается какъ на волосистой части головы, такъ и на прочей поверхности тѣла, между прочимъ и подъ краемъ ногтей. На головѣ сыпь имѣетъ видъ круглыхъ, величиною отъ чечевицы до грошевой монеты, ограниченныхъ красныхъ пятенъ и ведетъ къ измѣненію цвѣта волосъ, равно какъ къ ихъ ломкости и выпаденію.

Наружно примѣняются втиранія дезинфицирующими веществами, 2-хъ-процентнымъ карболовымъ растворомъ, растворомъ сулемы (1:1000), ихтиоловыми препаратами, 5-ти-процентной нафтоловой мазью и т. п. Полезна также мазь Вилькинсона:

березовое масло (*Oleum Rusci*) и сѣрный цвѣтъ (по 1 драхмѣ) смѣшиваются (растираются) съ зеленымъ мыломъ и ланолиномъ (по 2 драхмы).

Внутрь примѣняются, кромѣ *Калькареа*-препаратовъ, *Сульфур*, *Туя*, *Арсен.*, также *Антим. круд.*, *Бовиста*, *Мезереумъ*, *Нитри ацид.*, *Петролеумъ* и др. Рекомендуются также *Псоринъ* и *Туберкулинъ* въ высшихъ дѣленіяхъ.

VI. Кожныя язвы.

Самыя частыя и самая упорныя язвы встрѣчаются на голенихъ, особенно у женщинъ, страдающихъ, вслѣдствіе многократныхъ родовъ, расширеніемъ венъ нижнихъ конечностей (варикозомъ), происходящимъ отъ замедленнаго въ нихъ кровообращенія. Язвы могутъ образоваться и отъ другихъ причинъ, такъ или иначе повреждающихъ кожу и производящихъ въ ней воспаленіе съ послѣдующимъ разрушеніемъ, или отъ запущенныхъ ранъ, ожоговъ и отмороженій; наконецъ, язвы развиваются на почвѣ разнаго рода худосочій: туберкулезнаго, золотушнаго, силитическаго и раковаго.

При лѣченіи кожныхъ язвъ имѣютъ одинаково важное значеніе какъ наружныя, такъ и внутреннія средства, но относительно тѣхъ и другихъ не слѣдуетъ придерживаться шаблона, а надо выбирать первыя согласно характеру самой язвы, а вторыя—согласно общему состоянію организма. Есть, напримеръ, язвы, которыя хорошо переносятъ жирныя мази, другія, наоборотъ ухудшаются отъ нихъ и лучше заживаютъ подъ сухой повязкой или подъ влажными компрессами, для однихъ язвъ достаточно смазыванія какимъ либо индифферентнымъ жиромъ, другія требуютъ болѣе раздражающаго мѣстнаго лѣченія или, наоборотъ, прямо успокаивающаго и т. д. Внутреннее лѣченіе и подавно не можетъ быть вполне одинаковымъ во всѣхъ случаяхъ.

При простыхъ, недавнихъ язвахъ, не воспалительныхъ и происшедшихъ отъ ранъ, нарывовъ и т. п., у лицъ во всемъ прочемъ совершенно здоровыхъ, можно ограничиться однимъ наружнымъ лѣченіемъ. Два раза въ день прикладываютъ либо обыкновенный „спускъ“ (или другой какой либо чистый жиръ), либо *Календула-мазь*, и накладываютъ легкую, не разгорячающую повязку.—При воспаленной язве дѣлаются влажные согревающие компрессы (20—25° Р.), смѣняемые черезъ 1—2 часа, внутрь же даютъ *Беллад.*, черезъ часъ по приему. При сильной боли, кромѣ того, *Меркур. солуб.* или *Русъ*, особенно если выдѣленіе язвы острое и разѣдающее.—Язвы, происшедшія отъ наружныхъ поврежденій, требуютъ наружнаго и внутренняго примѣ-

ненія *Арника* и *Коніумъ*.—При ухудшеніи язвы, явившемся вслѣдствіе простуды: *Акон.*, *Беллад.* и *Бріон.*, также: *Меркур.-сол.*, *Гепаръ* или *Русъ*.—При крайне сильныхъ боляхъ въ язвѣ, подходятъ слѣдующія лѣкарства: *Беллад.* или *Атропинъ*, *Гепаръ*, *Меркур.*, *Арсен.*, *Карбо вегет.*, *Нуксъ вом.*, *Лазезисъ*, *Пульсат.*, *Графитъ*.—У истеричныхъ: *Нуксъ мосхата*, *Хамомила* или *Асафетида*.—При вялыхъ язвахъ, съ блѣднымъ рыхлымъ дномъ, и безболѣзненныхъ, надо прежде всего позаботиться объ общемъ укрѣпленіи организма, всегда въ такихъ случаяхъ слабого, а язвы смазывать 2—3 раза въ день камфорнымъ масломъ и, прикладывать *Эвфорбіумъ-мазь*; вмѣсто камфорнаго можно также съ пользой употребить *Хамомила-масло* (1 ч. тинктуры на 8 ч миндальнаго масла). Внутрь даютъ: *Хина 1*, или *Хинин.-сульф. 1*. или *Арсен.*, *Фосфоръ*, *Фосф. ацид.*, *Нитри ацид.*—При чрезмѣрномъ разращеніи дна язвы (такъ назыв. дикомъ мясѣ): смазываніе, посредствомъ кисточки, растворомъ квасцовъ или ляписа (по прописи врача), а внутрь: *Силиція*, *Карбо вегет.*, *Сенія* и *Туя*.—Если края вялой язвы тверды, то для возбужденія въ ней реакціи рекомендуется *терпентинный пластырь* (скипидаръ бѣлый воскъ, сало, деревянное масло по равной части), 2 раза въ день прикладывать. Внутреннія въ этихъ случаяхъ лѣкарства: *Арсен.*, *Карбо вегет.*, *Силиція*, *Сульф.*, *Туя*.—При гангренозныхъ язвахъ (антоновъ огонь): устраненіе вызвавшей гангрену причины (загрязненіе язвы, скверныя условія жизни и питанія, заразные моменты, состоянія слабости, испорченность крови), дезинфицированіе Сулемовой водой (1 на 1000) или терпентиннымъ масломъ (1 часть съ 8 частями миндальнаго масла) или хлорной водой; внутрь же: *Арсен.*, *Лазезисъ*, *Фосфоръ*, *Нитри ацид.*, *Креозот. 3*, при этомъ укрѣпляющая діета съ виномъ.—При фистулезныхъ язвахъ: въ подходящихъ случаяхъ хирургическое лѣченіе; внутрь: *Калькар-карбон.*, *Силиція*, *Сульф.*, *Туя*.—Варикозныя язвы лѣчатся вообще, какъ и предыдущія. (См. „Расширеніе венъ“, стр. 386).

Ожоги и отмороженія.

Ожоги.

Ожоги. Различаютъ три степени ожоговъ. При первой имѣется лишь покраснѣніе кожи, при второй—образованіе пузырей, при третьей—изъязвленіе и омертвѣніе кожи и тканей, захватывающее болѣй или меньшій участокъ тѣла. Заживленіе при

большихъ ожогахъ происходитъ обыкновенно очень медленно. При томъ, въ особенности у слабыхъ и золотушныхъ дѣтей, рубцы снова разрываются и вызываютъ нерѣдко продолжительное нагноеніе, могущее повести къ опасному истощенію.—Опасность, которою угрожаетъ вообще ожогъ, зависитъ не столько отъ глубины послѣдняго, сколько отъ его протяженія. Ожоги даже первой степени, простирающіеся на всей или $\frac{2}{3}$ поверхности тѣла, безусловно смертельны, вслѣдствіе ослабленія и паралича сердца или вслѣдствіе воспаленія внутреннихъ органовъ.

Наружное примѣненіе гомеопатическихъ лѣкарствъ см. стр. 43—44. За неимѣніемъ подъ руками таковыхъ и если имѣется болѣе легкій ожогъ (первой и второй степени), и пузыри на кожѣ еще цѣлы, то опорожняютъ послѣдніе отъ ихъ содержимаго помощью прокола у самаго основанія тонкой иглой и присыпаютъ мукой, отрубями, мѣломъ, плауновымъ сѣменемъ; полезно предварительно смазать масломъ или смѣсью равныхъ частей льняного масла и известковой воды, или топленнымъ саломъ; часто хорошо и успокаивающе дѣйствуетъ яичный бѣлокъ, въ сыромъ видѣ приложенный къ обожженному мѣсту; если пузыри сошли, то положенная на рану свѣжая кожица яичнаго бѣлка значительно способствуетъ заживленію.—Лѣченіе ожоговъ третьей степени такое же, какъ лѣченіе кожныхъ язвъ вообще (см. выше).—Если ожогъ занимаетъ очень значительную поверхность тѣла, то больного лучше всего посадить въ тепловатую ванну, въ которой его оставляютъ возможно дольше. Внутрь даютъ *Арсен.-альб.* попеременно съ *Каустик.*, также *Арника*, *Беллад.*, *Ацид.-нитр.*, *Петролеумъ* и др.

Отмороженія. И тутъ, какъ при ожогахъ, различаютъ Отмороженія. нѣсколько степеней. Самая легкая изъ нихъ характеризуется умѣреннымъ припуханіемъ и синеватой краснотой кожи отмороженной части, въ которой больной чувствуетъ часто зудъ и жженіе. Эти явленія могутъ продолжаться часы, дни и даже недѣли, но обыкновенно прекращаются съ наступленіемъ лѣта. Только въ рѣдкихъ случаяхъ отмороженная часть (чаще всего руки, ноги, кончикъ носа или уши) сохраняетъ продолжительное время синева-то-красный цвѣтъ.—При второй степени отмороженія образуются пузыри, тѣмъ скорѣе, чѣмъ раньше отмороженную часть подвергаютъ болѣе высокой температурѣ. Боли очень сильны, припуханіе значительно. Пузыри содержатъ обыкновенно кровь, и кожа подъ ними, по обнаженіи, представляется сильно и глу-

боко изъязвленной.—Третья степень отмороженія характеризуется полнымъ ооченѣніемъ и послѣдующимъ омертвѣніемъ пораженныхъ частей тѣла.—Общія явленія при болѣе или менѣе обширныхъ отмороженіяхъ тѣ же, что и при ожогахъ: учащенный и часто неправильный пульсъ, повторные приступы озноба, симптомы возбужденія мозга, приливы къ внутреннимъ органамъ и проч.

Ооченѣвшаго отъ холода человѣка переносятъ сперва въ не топлennую комнату и въ теченіе нѣкотораго времени осторожно оттираютъ мокрыми полотенцами или льдомъ и снѣгомъ. Затѣмъ его помѣщаютъ въ прохладную ванну и продолжаютъ въ ней растираніе. Также клистиры изъ прохладной воды; для возбужденія даютъ нюхать нашатырный спиртъ; какъ только больной начнетъ глотать, его можно перенести въ болѣе теплое помѣщеніе и дать немного теплаго чаю.—При частичныхъ отмороженіяхъ производятъ также лишь медленное и постепенное согрѣваніе отмороженныхъ частей. Сперва ихъ растираютъ снѣгомъ и льдомъ, затѣмъ дѣлаютъ влажныя обертыванія, сначала болѣе прохладною, затѣмъ тепловатою водою.—При изъязвленіяхъ примѣняются тѣ же средства, какъ при таковыхъ отъ ожоговъ. При гангренѣ необходимо бываетъ, для предупрежденія общаго зараженія крови, прибѣгнуть къ оперативному удаленію гангренозныхъ частей.—Внутрь даютъ: *Нитри ацид.*, *Арсен. альб.*, *Туя*, *Гидрастисъ* и проч.

VIII. Ненормальности со стороны жировыхъ и потовыхъ железокъ кожи.

**Сальность
кожи.**

1. Сальность кожи. Себоррея (усиленное выдѣленіе изъ жировыхъ железокъ кожи). Является слѣдствіемъ какой-либо внутренней неправильности въ организмѣ, встрѣчаясь чаще всего у золотушныхъ субъектовъ.

Нерѣдко себоррея появляется у женщинъ послѣ родовъ, а также при разстройствахъ регулъ. Женщины вообще болѣе склонны къ этой болѣзни, равно какъ и дѣти; у послѣднихъ всего чаще поражается лицо, которое начинаетъ очищаться обыкновенно лишь по достиженіи ими половой зрѣлости. Брюнеты гораздо болѣе склонны къ себорреѣ, чѣмъ блондины.

Кожа выглядит какъ бы вымазанная саломъ, причемъ отъ вліянія воздуха она принимаетъ лоснящійся видъ. Сальность кожи встрѣчается преимущественно на головѣ, лицѣ, половыхъ органахъ, т. е., въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ всего больше имѣются и раз-

виты жировыя железки. Высыхая, накопляющійся на кожѣ жиръ образуетъ отрубевидныя чешуйки (сухая себоррея), которыми тѣло иногда какъ бы обсыпано; на головѣ этотъ процессъ ведетъ къ образованію перхоти, которая обыкновенно бываетъ лишь у взрослыхъ и часто ведетъ къ разрыхленію и выпаденію волосъ, даже до степени полного облысненія. У грудныхъ дѣтей образованіе и накопленіе такихъ чешуекъ на головѣ производитъ такъ называемый гнейсъ, чешуйчатая корка, пристающія крѣпко къ головѣ и становящіяся отъ пыли темными и грязными. Корки эти часто зудятъ, что подаетъ поводъ къ расчесамъ, которые въ свою очередь ведутъ къ воспаленію кожи съ жидкимъ отдѣленіемъ. Последнее, соединяясь съ корками и высыхая, образуетъ уже настоящіе струпья, подъ которыми воспаленіе продолжается. Словомъ, развивается экзема, могущая, какъ таковая, перейти на лицо и другія сосѣднія части (молочная короста) и очень вредно вліяющая на развитіе ребенка. — Весьма важное значеніе, опять таки у дѣтей, имѣетъ и себоррея половыхъ органовъ, ибо накопленіе сала подъ крайней плотью (или въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ у дѣвочекъ), въ случаѣ его разложенія и происходящаго отсюда мѣстнаго раздраженія, можетъ повести къ рукоблудію. У лицъ мужского пола этого рода себоррея зависитъ большей частію отъ несоразмѣрной ѳзкости крайней плоти. — Связь съ себорреей имѣетъ также то состояніе у новорожденныхъ, когда сыровидная смазка не сходитъ, но продолжаетъ оставаться, образуя тонкую блестящую кору. Если не принять своевременно энергичныхъ мѣръ (болѣе частыя, 3—4 раза въ день, купанія съ послѣдующимъ смазываніемъ тѣла жиромъ), состояніе это можетъ имѣть для ребенка самыя роковыя послѣдствія: онъ отказывается отъ груди, питаніе его, а вмѣстѣ съ тѣмъ и температура тѣла быстро падаютъ и ребенокъ въ концѣ концовъ погибаетъ.

При себорреѣ, какъ и при большинствѣ накожныхъ болѣзней, наружное лѣченіе неразрывно связано съ внутреннимъ.

При себоррейной корѣ (гнейсѣ) слѣдуетъ каждый вечеръ смазывать кожу головы жиромъ, всего лучше рыбьимъ, или миндальнымъ, или свѣжимъ коровьимъ масломъ, на слѣдующее же утро смывать теплой мыльной водой. — При перхоти взрослыхъ втираютъ вечеромъ въ кожу головы разведенный (пополамъ съ водой) арниковый спиртъ, а утромъ смазываютъ голову арниковымъ масломъ или же мазью изъ 1 части арниковой тинктуры и

**Наружное
лѣченіе.**

15 частей жира. Если арника не переносится (см. стр. 41), то примѣняется *Гиперик*. Волосы слѣдуютъ при этой болѣзни коротко стричь.—Себоррея половыхъ органовъ требуетъ крайне чистаго содержанія пораженныхъ частей, при чемъ, въ виду нѣжности послѣднихъ, мыла употреблять не часто, замѣняя его яичнымъ желткомъ; смазывать же *Календула-мазью*. При общей сухой себорреѣ, которая почти всегда зависитъ отъ какого-либо внутренняго истощающаго разстройства, кромѣ лѣченія основной болѣзни и общаго укрѣпленія организма, весьма полезны тепловатыя ванны съ послѣдующими масляными втираніями.

**Внутреннее
лѣченіе
себорреи.**

Внутреннее лѣченіе цѣлесообразно начать съ *Сульфуръ*, по 2—3 приема въ день, въ теченіе 10—12 дней. Наиболѣе подходящимъ послѣ Сульфуръ лѣкарствомъ является *Меркур. солуб.*, особенно если потѣние и постельная теплота ухудшаютъ состояніе больного, если у него усиливается при этихъ условіяхъ зудъ въ пораженныхъ частяхъ, также жженіе и головная боль. Дѣти въ такомъ состояніи особенно безпокойны ночью. — При ощущеніи зуда въ волосахъ, и если при этомъ имѣется еще головная боль, но при отсутствіи прочихъ симптомовъ ртути, особенно у дѣтей, у которыхъ во время сна головка сильно потѣетъ, даютъ *Калькар. карбон.*, отъ 3 до 6 приемовъ въ день, въ теченіе 10—14 дней, послѣ чего, нѣкоторое время погода, можно повторить опять Сульфуръ, давая его какъ раньше. — *Напр. муріат.*: при отсутствіи приливовъ къ головѣ—зудъ очень сильный, а волосы выпадаютъ. Давать, какъ предыдущія лѣкарства. Это же средство можно примѣнять и наружно, для обмываній, въ видѣ раствора (1 чайная ложечка соли въ стаканъ воды), при маслянистой себорреѣ вообще и при себорреѣ лица въ особенности. — *Графитъ*: при сильномъ развитіи болѣзни, при склочиваніи волосъ, сильнымъ зудѣ и жарѣ кожнаго покрова головы, по 3 приема въ день до тѣхъ поръ, пока зудъ и жаръ пройдутъ, а затѣмъ давать одно изъ вышеупомянутыхъ средствъ. Послѣ ртути часто хорошо дѣйствуетъ *Гепаръ сумф.* Это средство также весьма пригодно для дѣтей. — Далѣе могутъ быть показаны: *Фосфоръ* (при зудѣ на кожѣ головы и при сѣченіи волосъ), *Русъ*, *Віола триколоръ*, *Сарсапарилла*, *Мезереумъ*. Въ случаѣ надобности, эти послѣднія лѣкарства полезно употреблять въ порядкѣ, въ какомъ они здѣсь приведены. — См. еще характеристику лѣкарствъ и дѣленія на стр. 535—541.

**Жесткая
ножа.**

2. Чрезмѣрная жесткость кожи (уменьшенное выдѣленіе изъ жировыхъ железокъ). Кожа очень суха и жестка, легко трескается, при

чемъ трещины часто болятъ и кровоточатъ. Въ практическомъ отношеніи имѣть значеніе чрезмѣрная жесткость рукъ, всего чаще у тѣхъ, которые имѣютъ дѣло съ ѣдкими химическими веществами, какъ минеральныя кислоты, острые щелочи плохія мыла и проч. Въ подобныхъ случаяхъ удаленіе причины и надлежащій уходъ за кожей рукъ опять восстанавливаютъ ихъ нормальное состояніе. — Общее навсѣмъ тѣлѣ уменьшеніе выдѣленія кожей жира зависитъ отъ чрезмѣрнаго упадка питанія организма, или же оно является однимъ изъ симптомовъ другихъ кожныхъ болѣзней (сухіе лишаи и проч.). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ причину найти невозможно, и тогда такое состояніе кожи приходится считать врожденнымъ. — При лѣченіи надо прежде всего избѣгать употребленія мыла, такъ какъ отъ него страданіе только поддерживается и даже усиливается. Вредно также смазываніе глицериномъ, который еще болѣе сушитъ кожу и, попадая въ трещины ея, вызываетъ сильную боль. Вообще слѣдуетъ при этой болѣзни возможно рѣже мыть руки, притомъ только теплой водой, а не холодной, въ холодную же вѣтреную погоду не выходить безъ перчатокъ. вмѣсто мыла употреблять яичный желтокъ (со щепоткой соды) или растворъ изъ миндальныхъ отрубей. Послѣ мытья рукъ, хорошенько ихъ обсушивъ, втираютъ въ нихъ немного миндальнаго масла или смѣси изъ 3 частей ланолина и 1 части миндальнаго масла. вмѣсто этого весьма хорошо дѣйствуетъ также мазь Гидрастисъ-арниковая (1 ч. *Арника* Θ и 5 частей *Гидрастисъ* Θ на 30 частей жира). — При общей сухости тѣла на первый планъ выступаетъ лѣченіе основной болѣзни и поднятіе общаго питанія организма. Главное лѣкарство: *Туя* (въ высухихъ дѣленіяхъ). Общія тепловатыя (25—27° Р., 15—20 минутъ) ванны съ послѣдующимъ втираніемъ въ тѣло какого либо нѣжнаго жира.

3. Потливость (чрезмѣрное выдѣленіе изъ потовыхъ железокъ). Подъ потливостью (гипергидрозисъ) разумѣютъ не потѣніе при простудныхъ болѣзняхъ или при болѣзняхъ изнурительныхъ, какъ чахотка и т. п., а ненормальность, исходящую изъ нервной системы и выражающуюся въ усиленной дѣятельности потовыхъ железокъ, т. е. чисто функціональное разстройство. Въ такихъ случаяхъ внезапное, искусственное прекращеніе пота, особенно ножного, можетъ повлечь за собою опасныя заболѣванія со стороны внутреннихъ органовъ. Съ другой стороны потливость наблюдалась въ связи съ падучей, астмой и другими нервными болѣзнями, причемъ припадки той или другой болѣзни замѣщались припадками обильнаго потѣнія или послѣднее предшествовало припадкамъ. — Потливость бываетъ общая и мѣстная. При общей потливости выступаетъ на всемъ почти тѣлѣ обильный потъ послѣ малѣйшаго физическаго напряженія или нервнаго волненія, а то и безъ всякаго видимаго повода. Явленіе это наблюдается не только у слабыхъ или ослабленныхъ субъектовъ, но и у людей, по виду совершенно здоровыхъ и даже хорошо упитанныхъ. По характеру своему такой потъ не совсѣмъ нормаленъ; онъ отличается особой ѣдкостью, вслѣдствіе чего на кожѣ появляются еще и дру-

Потливость.

гого рода измѣненія: зудъ, пузырчатая сыпь, даже воспаление садненіе, обопрѣлость); послѣднее бываетъ особенно въ складкахъ и углубленіяхъ тѣла (напр. между ягодицами, между мошонкой и бедрами, въ подмышковыхъ впадинахъ и проч.). Мѣстная потливость ограничивается отдѣльными участками тѣла, притомъ не въ томъ только смыслѣ, что поражаются лишь подмышки, руки (ладони) или ноги (ступни); бываетъ именно еще такъ, что одна половина тѣла потливая, другая—нѣтъ, какъ при нѣкоторыхъ нервныхъ и душевныхъ болѣзняхъ, или лицо потѣетъ на одной сторонѣ, а спина и конечность—на противоположной, или даже лишь одна половина ладони или кончикъ носа и т. д. Особенно важное въ практическомъ отношеніи значеніе имѣетъ потливость ногъ („ножной потъ“). Ножной потъ имѣетъ почти всегда ѣдкія свойства и весьма неприятный запахъ, ведетъ къ воспаленію и слущиванію кожи, причиняя даже боли, часто очень сильныя. Неприятный запахъ ножного пота часто не проходитъ и при самомъ чистомъ содержаніи ногъ, если при этомъ не предпринять надлежащаго внутренняго лѣченія.

Лѣченіе потливости.

При выборѣ гомеопатическихъ лѣкарствъ руководствуются не только мѣстными симптомами, но въ несравненно большей мѣрѣ нервнымъ и душевнымъ складомъ больного. Во главѣ ихъ стоитъ *Силиція*, и съ нея слѣдуетъ начать лѣченіе особенно тогда, когда при потливости имѣется общая нервная слабость, быстрая утомляемость, чрезмѣрная чувствительность ко всякимъ раздраженіямъ (сильные звуки, шумъ, пѣніе), дѣйствующимъ на нервы. Рядомъ съ Силиціей—*Калькар карбон.*, когда, при общей исхудалости, животъ и голова сравнительно велики, какъ это часто наблюдается у дѣтей. Силиція можетъ спасительно подѣйствовать въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ внутренняя болѣзнь есть очевидное, несомнѣнное слѣдствіе скрывшагося или подавленного ножного пота. Въ такихъ случаяхъ надо давать лѣкарство въ болѣе частыхъ приемахъ, смотря по степени внутренняго заболѣванія.

Болѣе или менѣе подобными Силиціи являются при этой болѣзни слѣдующія лѣкарства:

Туя больной не переноситъ ни малѣйшей сырости, а также купанія и даже обмыванія тѣла (высокія дѣленія въ болѣе рѣдкихъ приемахъ).—*Нитри. ацид.*: при воспалительной краснотѣ потѣющихъ мѣстъ, что происходитъ отъ ѣдкости пота. На тѣлѣ кое-гдѣ язвы. *Кали карбоник.*.. чрезвычайно легкая простужаемость, при чемъ почти всегда прежде всего является катарръ носа и

гортани. Чрезмѣрная пугливость при малѣйшемъ внезапномъ шумѣ, сопровождающаяся нервной дрожью, или же душевная апатія, равнодушие ко всему окружающему; наиболѣе показывается для женщинъ.—*Графитъ*: также особенно для женщинъ полныхъ и страдающихъ запоромъ; душевная подавленность, постоянная озабоченность, боязнь воображаемыхъ неудачъ; при волнении съ трудомъ успокаиваются.—*Фосфоръ*: утомление и тяжесть въ головѣ при малѣйшемъ умственномъ напряженіи, чувство жжения вдоль спины и сильная слабость въ ногахъ; общая слабость тѣла и духа.

Кромѣ того, могутъ понадобиться и нѣкоторыя другія лѣкарства. Прежде всего *Барита. карбон.*: при сильной склонности къ простудѣ горла (воспаленіе миндалинъ), а также у стариковъ, страдающихъ астмой.—*Кальк. фосфорик.*: при блѣдной, дряблой кожѣ и общемъ слабомъ развитіи тѣла, особенно для дѣтей и вообще малокровныхъ субъектовъ.—*Петролеумъ*: обильный противнаго запаха потъ подмышекъ и подошвъ.—*Ацид. лактик.*: потливость ногъ безъ запаха.—*Брионія*: при жирномъ потѣни головы съ кислымъ запахомъ, при осложненіи разстройствомъ пищеваренія.

Вспомогательныя мѣры должны быть направлены на укрѣпление нервной системы (см. „Неврастенія“, стр. 147).

4. Чрезмѣрная сухость кожи, вслѣдствіе недостаточной дѣятельности потовыхъ железокъ, особаго практическаго значенія не имѣетъ, если только не сопровождается внутренними разстройствами. Происхождение этой ненормальности несомнѣнно нервное. Въ другихъ же случаяхъ она представляетъ собою одинъ изъ симптомовъ какой либо внутренней болѣзни (сахарное мочеизнуреніе, хронич. воспаленіе почекъ, раковое худосочіе) или наложной (экзема, лишаи и проч.). Въ послѣднихъ случаяхъ лѣченіе сводится къ устраненію основнаго страданія, а въ тѣхъ, когда это состояніе кожи является болѣе самостоятельнымъ, или, вѣрнѣе сказать, нервнымъ, надо при назначеніи лѣкарствъ руководствоваться общимъ, преимущественно душевно-нервнымъ состояніемъ больного. Изъ лѣкарствъ чаще всего подходятъ: *Алюменъ, Калькар. фосфорика, Арсен., Графитъ, Ликопод, Сульфур* и др.

Сухая кожа.

VI. Кровотеченія изъ наружныхъ ранъ.

Раны бываютъ порѣзные, колотыя, рванныя, ущемленныя, огнестрѣльныя; кромѣ того различаютъ еще заразные раны отъ укусовъ ядовитыхъ животныхъ (змѣй и проч.). Тутъ имѣются въ виду, главнымъ образомъ, наружныя раны, сопровождающіяся кровотеченіемъ.

При незначительныхъ пораненіяхъ кожи достаточно бываетъ обмыть пораженное мѣсто воднымъ растворомъ

Арника (см. стр. 41) и приложить арниковый пластырь или повязку изъ марли, смоченной въ растворѣ арники, и гигроскопической ваты. При кровотеченіи изъ болѣе крупнаго сосуда (артеріи), изъ котораго кровь бьетъ какъ изъ фонтана, необходимо, для остановки кровотеченія, перевязать артерію, что можетъ сдѣлать только врачъ; до его прибытія надо пальцемъ придавливать ее повыше мѣста раненія или въ самой ранѣ.—Само собою разумѣется, что надо заботиться о крайне чистомъ содержаніи раны и перевязывать ее такъ, чтобы извнѣ не попадалъ въ нее воздухъ (пыль и прочія вредныя вещества).—При ущемленіяхъ и желвакахъ (шишкахъ) отъ ушибовъ, при кровоподтекахъ прикладываніе холодныхъ компрессовъ нецѣлесообразно, а гораздо лучше и скорѣе дѣйствуютъ согрѣвающие компрессы изъ арниковаго раствора. — При разорванныхъ ранахъ: *Календула* — растворъ (см. стр. 42). Края ранъ стягиваются липкимъ пластыремъ (календуловымъ же), именно полоскою его, средняя часть которой у же, чѣмъ концевая, и приходится на самую рану.

При болѣе значительныхъ раненіяхъ бываетъ раневое повышение температуры, раневая лихорадка; въ такихъ случаяхъ дается внутрь *Акон.* попеременно съ *Арника* (последняя — уже съ самаго начала всякаго раненія).

Арника при наружномъ примѣненіи часто раздражаетъ кожу, вызывая воспалительную красноту ея (см. стр. 41); въ такихъ случаяхъ ее надо замѣнить *Гиперикумъ*, также *Гамamelисъ* или *Календула*. *Гиперикумъ* рекомендуется особенно при колотыхъ ранахъ (также *Стафизагія*), *Арника*—при ущемленіяхъ и ушибахъ безъ поврежденія кожи, *Гамамел.* и *Календула* — при не очень свѣжихъ ранахъ, когда успѣло уже образоваться воспалительное состояніе пораженной ткани.

ОТДѢЛЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

Болѣзни глазъ и ушей.

Предварительныя замѣтки. Тутъ приводятся лишь такія болѣзни глазъ и ушей, которыя до нѣкоторой степени могутъ быть узнаны и не специалистами и быть лѣчимы внутренними лѣкарствами. Во многихъ случаяхъ, однако, специальное наружное лѣченіе болѣзней глазъ и ушей бываетъ важнѣе, чѣмъ внутреннее, какъ, на примѣръ, смазываніе ляписнымъ растворомъ при бленорреѣ глазъ, тушированіе квасцами или мѣднымъ купоросомъ (синимъ камнемъ) при трахомѣ, впусканіе въ глазъ атропиновыхъ капель при воспаленіяхъ роговой или радужной

оболочки, или другого рода капель—при воспалительных состояниях соединительной оболочки и т. д. Но надо помнить, что не-врачу никогда не должно доверять применения подобных средств, за исключением лишь таких, как глазные ванны или обмывания, или примочки, для ушей—промывания, съ прибавлением для глаз *Эфразия* Θ (5 капель на столовую ложку воды) или для ушей *Календула* Θ (чайн. лож. на $\frac{1}{2}$ —1 стаканъ воды) и т. п. Вообще, однако, и въ виду того, что иногда единственно цѣлесообразнымъ является оперативное вмѣшательство, слѣдуетъ при всякомъ болѣе или менѣе серьезномъ разстройствѣ зрѣнія или слуха обратиться къ врачу, по возможности—къ специалисту, во 1) для точнаго распознаванія болѣзни, во 2) для надлежащаго наружнаго лѣченія. Съ другой стороны, никогда не слѣдуетъ при болѣзняхъ этихъ органовъ пренебрегать и внутреннимъ лѣченіемъ гомеопатическими лѣкарствами, такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, что лѣкарства эти въ весьма значительной степени способствуютъ скорѣйшему исцѣленію также глазныхъ и ушныхъ болѣзней; часто же только они и исцѣляютъ, какъ, напримѣръ, въ случаяхъ золотушныхъ заболѣваній этихъ органовъ.

1. Болѣзни глазъ.

1. Болѣзни вѣкъ.

Отдѣльныя части вѣкъ суть слѣдующія: кожа съ подкожной клѣтчат-**Строеніе вѣкъ.** кой, мышечныя волокна, хрящъ и слизистая (соединительная) оболочка, выстилающая внутреннюю поверхность вѣкъ и загибающаяся на переднюю часть глазного яблока, кончаясь на краю роговицы. На передней губѣ свободного края вѣка находятся рѣсницы, сумки которыхъ снабжены слезными железами. Въ хрящѣ вѣка помѣщаются Мейбоміевы железы гроздевидной формы; протоки ихъ открываются на задней губѣ свободного края вѣка. Кромѣ того, въ каждомъ вѣкѣ имѣются кровеносные сосуды и нервы, также слезные каналцы (точечное отверстіе слезнаго каналца видно во внутреннемъ углу глаза на нижнемъ и верхнемъ вѣкѣ).

Вѣки служатъ для защиты глазъ отъ вредныхъ внѣшнихъ вліяній; отчасти для этого служатъ и брови, не давая, напримѣръ, поту со лба попадать въ глаза, также рѣсницы, задерживающія попаданія въ глаза легкихъ инородныхъ тѣлъ.

Кромѣ того, постояннымъ своимъ движеніемъ (морганіемъ) по передней поверхности глаза вѣки способствуютъ равномерному увлажненію роговой оболочки и удаленію отпадающихъ эпителиальныхъ клѣтокъ, попадающей въ глаза пыли и т. п. Наконецъ, вѣки, закрываясь, отводятъ собирающія слезы къ внутреннему углу глаза и загѣмъ въ полость носа черезъ слезопроводящіе пути.

1. Воспаленіе кожи вѣкъ можетъ быть разлитое и ограниченное. Къ разлитому воспаленію относятся: рожа, флегмона и сыпи (экзема и проч.) и лѣченіе въ такихъ случаяхъ такое же, какъ при такого рода болѣзняхъ кожи вообще (см. отдѣлъ 12-ый).

Къ воспаленіямъ ограниченнымъ относятся:

Блефаритъ.

а. Воспаление свободного края вѣкъ (Блефаритъ). Самая легкая форма характеризуется краснотой и небольшимъ припуханиемъ рѣсничнаго края; при этомъ имѣется раздраженіе слизистой оболочки, также ощущение жженія, зуда, боли. Болѣзнь эта бываетъ изрѣдка упорна и сопровождается образованиемъ небольшихъ корокъ, по удалении которыхъ обнаруживаются язвинки, покрытыя тонкимъ слоемъ гноя. Въ болѣе трудныхъ случаяхъ имѣется уже разрушеніе рѣсничныхъ сумокъ вслѣдствіе нагноенія, отъ чего рѣсницы выпадаютъ, замѣняясь другими болѣе тонкими или блѣдными, или же онѣ совсѣмъ теряются, вслѣдствіе зарубцеванія сумокъ; рубцеваніе вѣка можетъ имѣть послѣдствіемъ выворотъ или заворотъ послѣдняго съ зависящими отъ этого тягостными страданіями глазъ.—Блефаритъ въ большинствѣ случаевъ развивается на почвѣ золотухи, онъ бываетъ также у людей, страдающихъ себорреей, и послѣдовательно при хроническихъ воспаленіяхъ слизистой оболочки и слезопроводящихъ путей, также при аномаліяхъ рефракціи (дальнозоркость, астигматизмъ) вслѣдствіе прилива крови къ глазамъ отъ постоянного ихъ напряженія при работѣ.

Лѣченіе должно быть какъ мѣстное, такъ и общее. Ежедневно, утромъ и вечеромъ, обмываніе вѣкъ теплой водой, чистой или съ прибавленіемъ *Календула* Θ (5 капель на 1—2 столовыя ложки воды). Для удаленія засохшихъ корокъ смазываютъ на ночь края вѣкъ козьимъ жиромъ или мазью изъ *Меркур. преципит. руберъ* (1 гранъ на 2 драхмы жира). При одновременномъ катаррѣ слизистой оболочки полезно впускать въ глаза утромъ и вечеромъ по 2—3 капли слабаго раствора *Цинкумъ сульфурікумъ* ($\frac{1}{8}$ грана на $\frac{1}{2}$ унціи воды).

Мазь втирается пальцемъ или кисточкой между рѣсницами; это надо дѣлать такъ, чтобы мазь не попадала вглубь на слизистую оболочку, поэтому у дѣтей, которыя часто трутъ свои вѣки (тренія этого слѣдуетъ избѣгать при блефаритѣ), лучше втирать мазь днемъ, оставляя послѣднюю на вѣкѣ не болѣе $\frac{1}{2}$ —1 часа. Если мазь производитъ раздраженіе, то надо или рѣже ее втирать (напримѣръ, черезъ день) или брать болѣе слабую, если она лѣкарственная. Жиръ для мази слѣдуетъ брать свѣжій, всего лучше—масло какао съ миндальнымъ масломъ по равной части.

При ссадинахъ и изъязвленіяхъ на свободномъ краѣ вѣка мази обыкновенно не переносятся; въ такихъ случаяхъ надо ограничиваться обмываніями, или еще смазывать растворомъ ляписа (по рецепту врача) 1—20/0. Когда изъязвленія прошли, можно опять перейти къ мазямъ.

При всякомъ блефаритѣ надо оберегать глаза отъ свѣта (очки-консервы), отъ пыли, жара, вѣтра и прочихъ вредныхъ влияній.

Изъ внутреннихъ лѣкарствъ примѣняются: въ началѣ—*Меркур. солѣб.*, *Беллад.*; затѣмъ—*Гепар сульф.*, *Пульсат.* Въ болѣе упорныхъ случаяхъ. *Графитъ*, *Арсен. йодат.*, *Силиція*, *Стафизагрія*, *Сульф.* Вообще же лѣчение, какъ при золотухѣ.

6. Ячмень или Песъякъ есть ограниченное воспаление, обыкновенно гнойное, на свободномъ краѣ вѣка. Симптомы и течение такие же, какъ при обыкновенномъ чирьѣ. Причиной можетъ быть механическое влияние (наприм., частое трение вѣкъ, продолжительное ношеніе давящей повязки и т. п.) или хроническая гиперемія (наприм. при дальнорзости, астигматизмѣ), при хроническомъ катаррѣ слезистой оболочки, при неправильномъ возстановленіи рѣсницъ.

Ячмень.
Песъякъ.

Каждая рѣсница выпадаетъ черезъ каждые 3—4 мѣсяца и замѣняется новою, которая какъ бы выталкиваетъ старую изъ сумки если это выпаденіе почему либо не происходитъ во время, то, оставаясь въ сумкѣ какъ инородное тѣло, рѣсница можетъ вызвать воспаленіе

Теплыя примочки ускоряютъ нагноеніе и успокаиваютъ боли. Внутри даются тѣ же средства, что при воспаленіи вѣкъ. Для предупрежденія возвратовъ необходимо устранить причину и утромъ и вечеромъ обмывать глаза чистой теплой водою или слабымъ растворомъ *Календула* Θ .

2. **Опухоли вѣкъ.** а) **Халаціонъ** — кругловатая, плотная **Опухоли вѣкъ.** опухоль, величиною съ горошину и болѣе, ограниченная, гладкая; развивается въ Мейбоміевой железнѣ (въ хрящѣ вѣка), чаще всего — у людей, страдающихъ хроническимъ воспаленіемъ слезистой оболочки глазъ, а также у страдающихъ себорреей (стр. 673). Опухоль эта держится долго, иногда уменьшается или даже вовсе исчезаетъ, что бываетъ, однако, очень рѣдко; иногда она воспаляется и нагнаивается и такимъ путемъ исчезаетъ. Опухоль эта, помимо того, что обезображиваетъ, вызываетъ механически раздраженіе слезистой оболочки и зависящія отъ этого неприятыя ощущенія въ глазу Поэтому, если она не проходитъ скоро отъ *Меркур. сол.*, *Гепаръ сульфур.*, *Барита карбон.* и т. п., всего лучше удалить ее оперативнымъ путемъ (вылущеніемъ).—б) Опухоли, зависящія отъ частичнаго раздраженія кожи вѣка — бородавки (папилломы); они удаляются оперативнымъ путемъ такъ же какъ и другія опухоли: фибромы, липомы, саркомы, эпителиомы. При эпителиомѣ (ракѣ) вѣка, если оперативное удаленіе

невозможно, примѣняются средства противъ рака, указанные на стр. 287.

4. Паразиты на вѣкахъ устраняются втираніемъ сѣрой ртутной мазью.

5. Нервные расстройства вѣкъ:

Судорога
вѣкъ.

а) Судорога (спазмъ) вѣкъ (Блефароспазмъ), чаще всего—въ видѣ судорожнаго морганія (прерывистый спазмъ) и въ видѣ судорожнаго смыканія вѣкъ (безпрерывный спазмъ). Причинами могутъ быть: катарры слизистой оболочки, попаданіе подъ вѣки инороднаго тѣла, изъязвленіе роговой оболочки, неправильности зрѣнія, общее нервное состояніе или раздраженіе нервныхъ участковъ тѣла, подчасъ и отдаленныхъ (напримѣръ—нервовъ кишечника, половыхъ органовъ).

Лѣченіе — сообразно основной причинѣ. При чисто нервной формѣ: *Беллад.*, *Игнація*, *Страмоній*, *Купрум*, *Цинк*. и проч. (см. „Судороги“, стр. 125).

Параличъ
вѣкъ.

б) Параличъ вѣкъ. Параличъ выражается либо опущеніемъ верхняго вѣка²⁾ (птозисъ), когда парализована мышца, поднимающая вѣко, либо расширеніемъ глазной щели, когда парализована круговая мышца вѣка. Въ послѣднемъ случаѣ, если параличъ не проходитъ, можетъ развиваться стойкій выворотъ нижняго вѣка вслѣдствіе стягиванія кожи, зависящаго отъ разѣденія ея (экземы) постоянно стекающими слезами, а также высыханіе и изъязвленіе роговой оболочки, вслѣдствіе постоянно открытаго глаза. Изъ внутреннихъ лѣкарствъ показаны: *Гельземинъ*, *Каустик.*, *Графитъ*, *Спиелія*, *Страмоній* и др.

Для предотвращенія послѣдствій постояннаго слезотеченія въ такихъ случаяхъ дѣлается расщепленіе нижняго слезнаго канала. Образовавшаяся на вѣкѣ экзема лѣчится соотвѣтствующими средствами, а для защиты роговой оболочки отъ высыханія и изъязвленія удерживаютъ вѣки въ надлежащемъ положеніи постояннымъ ношеніемъ соотвѣтствующей (давящей) повязки. Примѣняется часто съ пользой и электризація (постоянный токъ).

Заворотъ
вѣкъ.

6. Заворотъ вѣкъ (Энтропионъ). Степень заворота бываетъ различная: или лишь рѣсницы заворочены къ глазу, или свободный край вѣка заворачивается или, наконецъ, кожная поверхность вѣка прилежитъ къ главному яблоку. Состояніе, обусловливаемое лишь заворотомъ рѣсницъ, носитъ названіе „трихиазисъ“. Всякій заворотъ вѣка, въ какой бы степени ни былъ, есть страданіе весьма серьезное для глаза,* такъ какъ отъ тренія завернутаго вѣка о

глазное яблоко получается сильное раздраженіе слизистой оболочки и роговицы; отсюда краснота глаза, слезотеченіе, боли, помутнѣніе и изъязвленіе роговицы.—Чаще всего заворотъ вѣка является слѣдствіемъ рубцового стягиванія слизистой оболочки его при продолжительномъ трахоматозномъ процессѣ, также при хроническомъ блефаритѣ. Лѣченіе тутъ прежде всего оперативное. Наиболѣе простой, лишь временно устраняющій завороченныя рѣсницы, способъ состоитъ въ вырываніи ихъ съ помощью спеціального рѣсничнаго пинцета, концы котораго широки, гладки и плотно прилегаютъ другъ къ другу; рѣсница захватывается пинцетомъ у самаго края вѣкъ и выдергивается въ направленіи книзу на верхнемъ вѣкѣ или кверху на нижнемъ вѣкѣ. Облегченіе получается такимъ образомъ мѣсяца на три, пока вырастетъ новая рѣсница. Этотъ способъ практически годенъ лишь при частичномъ трихиазѣ, но и въ этомъ случаѣ, а тѣмъ болѣе, когда многія рѣсницы заворочены внутрь, лучше всего сдѣлать радикальную операцію, т. е. удаленіе всего соотвѣтствующаго края вѣка.

7. Выворотъ вѣкъ (Эктропіонъ) есть состояніе, противоположное завороту вѣка и бываетъ также въ различной степени. Различны и причины: расслабленіе круговой мышцы (отъ паралича или отъ старческихъ измѣненій); въ этомъ случаѣ поражается нижнее вѣко; рубцовое укороченіе кожи вѣка (послѣ ожоговъ, изъязвленій и пр.); продолжительная бленоррея глазъ съ сильнымъ набуханіемъ слизистой оболочки и спазматическимъ сокращеніемъ круговой мышцы вѣка.

Приведеніе вѣка въ нормальное положеніе достигается различными оперативными приѣмами. Но кромѣ того очень важно лѣченіе, предупреждающее выворотъ, направленное противъ основной болѣзни, вызывающей таковой (блефаритъ, экзема, язвы, параличъ вѣка, болѣзнь слизистой оболочки, особенно у старыхъ людей и т. д.)

**Выворотъ
вѣка.**

II. Болѣзни слезнаго аппарата.

Слезный аппаратъ состоитъ изъ слезоотдѣляющей или слезной железы и слезопроводящихъ путей (слезныхъ канальцевъ, слезнаго мѣшка и носоваго слезнаго канала). Слезная железа лежитъ одной частью въ слезной ямкѣ лобной кости, непосредственно позади наружной части верхняго края глазницы, другой частью — непосредственно на сводѣ конъюнктивальнаго мѣшка, образуемаго слизистой (соединительной) оболочкой. Слезные канальцы представляютъ два узкихъ хода и каждый изъ нихъ начинается точечнымъ отверстіемъ у внутренняго конца свободнаго края вѣкъ; въ углу глаза имѣется такъ

**Строеніе
слезнаго
аппарата.**

называемое слезное озеро. Оба слезные канальца проникают въ слезный мѣшокъ, находящійся на переднемъ краю внутренней нижней стѣнки глазницы. Въ нижней своей части слезный мѣшокъ переходитъ въ носовую каналь. Собирающіяся въ конъюнктивальномъ мѣшкѣ слезы, если ихъ немного, какъ, именно, въ нормальномъ состояніи, отчасти испаряются, большей же частію проводятся въ носъ черезъ слезопроводящіе каналы.

Дакриоаденитъ.

1. Воспаленіе слезной железы (Дакриоаденитъ) встрѣчается очень рѣдко. Слезная железа, какъ выше сказано, лежитъ снаружи и сверху отъ глазного яблока. Въ этомъ-то мѣстѣ, при остромъ воспаленіи железы, образуется болѣзненная опухоль, вѣко отечно, а глазное яблоко смѣщено книзу и кнутри; отдѣленіе слезъ уменьшено. Воспаленіе это оканчивается обыкновенно нагноеніемъ. Въ хронической формѣ дакриоаденита воспалительныя явленія почти отсутствуютъ, а на мѣстѣ слезной железы имѣется бугристая, плотная, неболѣзненная опухоль. Причиной является чаще поврежденіе. Лѣченіе, какъ при воспаленіяхъ вообще (см. стр. 389).

Киста и новообразованія слезной железы относятся всецѣло къ области хирургіи.

2. Болѣзни слезопроводящихъ путей.

Болѣзни слезныхъ канальцевъ.

1. Болѣзни слезныхъ канальцевъ. Слезные каналы, какъ сказано выше, воспринимаютъ слезы изъ конъюнктивальнаго мѣшка посредствомъ слезныхъ точекъ. Стало быть, при неправильномъ положеніи послѣднихъ, особенно же — нижней, этотъ процессъ нарушается, и слезы, вмѣсто того, чтобы попадать въ носъ, текутъ изъ глаза на щеку, развивается слезотеченіе. Неправильное положеніе слезныхъ точекъ обыкновенно наблюдается при выворотѣ вѣкъ. Помощь въ такихъ случаяхъ, поскольку дѣло идетъ объ уменьшеніи слезотеченія, получается только отъ расщепленія слезныхъ канальцевъ.

Съуженіе и непроходимость слезныхъ канальцевъ. Съуженіе если только оно не врожденное, бываетъ вслѣдствіе изъязвленій края вѣкъ въ мѣстѣ слезныхъ точекъ, на примѣръ, послѣ прижиганій, ожоговъ, язвеннаго блефарита и пр. Симптомъ — слезотеченіе, при отсутствіи другихъ причинъ такового. Лѣченіе: при съуженіи — расширеніе зондами. Непроходимость слезныхъ канальцевъ на протяженіи ихъ, внѣ слезныхъ точекъ, обусловливается присутствіемъ въ нихъ инородныхъ тѣлъ, напр., рѣсницъ, или грибовъ, иногда и полиповъ. Кромѣ слезотеченія, имѣются въ данномъ случаѣ легкая болѣзненность и опухоль въ области слезнаго канальца. Лѣченіе—оперативное.

2. Воспаленіе слезнаго мѣшка и носоваго канала (Дакріоциститъ). Воспаленіе это бываетъ катаррально-гнойное и флегмонозное; первое ограничивается только слизистой оболочкой слезнаго мѣшка, второе охватываетъ всю сумку его и окружающія мягкія части. Воспаленіе слезнаго мѣшка рѣдко бываетъ лишь катарральнымъ, въ большинствѣ случаевъ оно очень скоро становится гнойнымъ. Начинается болѣзнь слезотеченіемъ, а затѣмъ изъ слезныхъ точекъ, или лишь изъ одной, начинаетъ выдѣляться слизистая, слизисто-гнойная или гнойная жидкость при давленіи пальцемъ на область слезнаго мѣшка. При этомъ имѣется почти всегда припухлость въ этой области, зависящая отъ накопившагося въ слезномъ мѣшкѣ воспалительнаго продукта; вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаются явленія блефарита и конъюнктивита (см. ниже) вслѣдствіе раздраженія края вѣкъ и слизистой оболочки воспалительнымъ выдѣленіемъ. Ощущенія больного вообще не тягостны при этой болѣзни, теченіе же болѣзни—хроническое, длительное.—Къ причинамъ дакріоцистита относятся: воспаленіе сосѣднихъ частей, съ которыхъ таковое переходитъ на слезный мѣшокъ (воспаленіе, особенно хроническое, слизистой оболочки носа); поврежденіе носовыхъ костей, костотѣда; болѣзни соединительной оболочки; общія заболѣванія (сифилисъ, золотуха, острые сыпи).—Предрасполагающимъ обстоятельствомъ служитъ неправильное строеніе носа, обуславливающее суженіе носоваго канала, наприм., широкая и низкая спинка носа, узкое основаніе и проч.—Флегмонозное воспаленіе оканчивается образованіемъ абсцесса со вскрытіемъ его черезъ кожу и съ образованіемъ часто фистулезнаго отверстія (свища), черезъ которое постоянно или время отъ времени просачивается гнойная матерія.

Лѣченіе — преимущественно хирургическое (зондированіе и промываніе слезно-носоваго канала), предпринимаемое лишь тогда, когда острые явленія воспаленія прошли. Пока же острые явленія имѣются, примѣняются обычныя при воспаленіяхъ лѣкарства: *Беллад.*, *Меркур. солуб.* въ началѣ, а при нагноеніи—*Гермаф. сульф.*, *Силиція*. При фистулѣ слезнаго канала: *Ацид. нитрик.*, *Ацид. флуор.*, *Силиція*, *Калькар. карбон.*, *Сульфур*.—Если при фистулѣ проходимость слезно-носоваго канала не можетъ быть восстановлена, то самымъ вѣрнымъ средствомъ для ея устраненія служитъ уничтоженіе (облитерация) слезнаго мѣшка.

Дакріо-
циститъ.

III. Воспаленія соединительной (слизистой) оболочки глазъ.

(Конъюнктивы).

Строеніе конъюнктивы Болѣзни соединительной или слизистой оболочки суть самыя частыя страданія глазъ; онѣ составляютъ третью часть всѣхъ болѣзней глазъ. Оболочка эта (конъюнктивa) образуетъ мѣшокъ, открытый только на мѣстѣ глазной щели и сообщающійся съ полостью носа посредствомъ слезопроводящихъ путей (смъ выше), въ ней различаются три части. 1) конъюнктивa вѣкъ, 2) конъюнктивa глазного яблока, которая покрываетъ переднюю часть бѣлой оболочки (склеры) глазного яблока до роговой (прозрачной) оболочки и 3) переходная складка или сводъ конъюнктивы, которая лежитъ между двумя первыми. Конъюнктивa состоитъ изъ 3 слоевъ, и имѣетъ вообще тонкое и сложное строеніе, и заключаетъ въ себѣ кровеносныя сосуды и нервы. Во внутреннемъ углу глаза лежитъ слезное мясо, представляющее кругловатый кусочекъ измѣненной кожи. О физиологическомъ назначеніи соединительной оболочки упомянуто уже выше, оно заключается именно въ увлажненіи глазного яблока и облегченіи подвижности вѣкъ и глаза. Это достигается отдѣленіемъ изъ ея железъ, смѣшивающимся съ выдѣленіемъ слезной железы и Мейбоміевыхъ железъ.

Изъ разныхъ формъ воспаления слизистой оболочки глазъ наиболѣе часты: катарральное, гнойное и трахоматозное, и лишь рѣдко наблюдаются: крупозное и дифтеритическое. Различіе формъ воспаления конъюнктивы обусловливается характеромъ воспалительнаго продукта.

Приливный конъюнктивитъ. 1) Гиперемія конъюнктивы. Въ каждомъ случаѣ начало воспаления выражается въ гипереміи слизистой оболочки, въ покраснѣніи ея отъ прилива крови. Гиперемія конъюнктивы можетъ быть, однако, и самостоятельной—въ острой и хронической формѣ. Субъективныя ощущенія при этомъ очень незначительны въ однихъ случаяхъ и довольно неприятны—въ другихъ, выражаясь, именно, въ постоянномъ давленіи и треніи подъ вѣками, особенно по вечерамъ, при занятіяхъ въ душной атмосферѣ и т. д.—Причинами острой гипереміи являются: механическое раздраженіе, напр., отъ попавшаго въ глазъ инороднаго тѣла, завернутой рѣсницы и проч., также воспаление окружающихъ частей (вѣкъ, слезнаго мѣшка и пр.).—Хроническая гиперемія конъюнктивы бываетъ отъ продолжительнаго вліянія пыли, дыму, вѣтра, отъ напряженной мелкой работы, особенно при искусственномъ освѣщеніи, отъ бессонницы, общихъ разстройствъ кровообращенія, отъ злоупотребленія спиртными напитками и т. д., также при хроническихъ страданіяхъ вѣкъ, слезнаго аппарата и пр.—При лѣченіи надо прежде всего устранить причину, которая вызываетъ

или поддерживает гиперемію; кромѣ того, обмывать глаза утромъ и вечеромъ чистой комнатной водой или еще лучше, растворомъ изъ 20—30 капель *Эвфразія* Θ въ стаканъ воды. Полезно обмыванія эти дѣлать посредствомъ глазной ванночки, приставляемой къ глазу на 2—3 минуты плотно, такъ чтобы содержимое ванночки не выливалось (при этомъ цѣлесообразно время отъ времени открывать вѣки, дабы жидкость обмывала глазное яблоко). При сильномъ раздраженіи глазъ всего лучше переносятся влажные компрессы, часто смѣняемые въ течение 10—15 минутъ, и такъ нѣсколько разъ въ день. Внутрь противъ гипереміи принимается *Аконитъ* $\times 3$; при болѣе сильной степени ея: *Беллад.*, *Гельземинъ*, *Русъ*.

2) Катарральное воспаление соединительной оболочки (катарральный конъюнктивитъ) получается, когда къ гипереміи послѣдней присоединяется отдѣленіе слизистое или гнойно-слизистое. Въ острой формѣ замѣчается краснота и легкое отечное состояніе вѣкъ, именно—у угловъ глаза. Въ хронической формѣ имѣются тѣ же явленія, но они выражены слабѣе; при томъ же замѣчается всегда большее или меньшее увеличеніе сосочковъ на конъюнктивѣ вѣкъ, придающее поверхности ея мелкозернистый видъ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда слизистая оболочка представляется разрыхленной, набухшей, поверхность ея кажется какъ бы бархатистой.—Отдѣляющаяся слизь при хронической формѣ мутна, иногда какъ бы пѣниста, и нерѣдко раздѣдаетъ вѣки, особенно въ углахъ глазъ, и ведетъ къ вывороту ихъ.—При катаррѣ конъюнктивы больные жалуются часто на постоянное треніе и давленіе подъ вѣками, какъ бы отъ инороднаго тѣла или песка въ конъюнктивальномъ мѣшкѣ (особенно въ первое время остраго катарра), особенно по вечерамъ; также на тяжесть вѣкъ и трудное раскрываніе ихъ, особенно по утрамъ, когда бываетъ и слипаніе вѣкъ (вслѣдствіе засохшаго за ночь отдѣленія); зрѣніе временами затуманивается (вслѣдствіе скопленія отдѣленій на роговой оболочкѣ) и, чтобы видѣть ясно, больнымъ приходится протирать себѣ глаза и т. д. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно въ началѣ остраго катарра, больные страдаютъ отъ слезотеченія, свѣтобоязни и сильныхъ болей въ глазахъ.

Катарральн.
конъюнктивитъ.

При слизистогнойномъ отдѣленіи изъ глазъ трудно бываетъ рѣшить, имѣется ли катарръ или бленоррея слизистой оболочки, да и вообще трудно провести рѣзкую границу между сильноразвившимся катарромъ и бленорреей, и въ такихъ случаяхъ лучше

поступать всегда такъ, какъ если бы дѣло шло навѣрное о бленорреѣ. Лѣчение см. ниже.

**Бленоррейный
конъюнктивитъ.**

3. Гнойное воспаление (бленоррея) соединительной оболочки.—Эта форма воспаления имѣетъ гораздо болѣе практическое значение, нежели предыдущая, такъ какъ она во 1) заражительна, во 2) очень опасна для глазъ, особенно у новорожденныхъ (см. стр. 451). Бленоррея слизистой оболочки отличается сильнѣйшей гипереміей и отекомъ этой оболочки, а также вѣкъ, и значительнымъ гнойнымъ отдѣленіемъ.

Больные испытываютъ при этомъ, именно при острой формѣ, въ періодѣ развитія болѣзни, сильныя боли, жаръ и жжение въ глазу и окружающихъ частяхъ, свѣтобоязнь, если только еще больной въ состояніи открывать вѣки. Этотъ первый періодъ (періодъ раздраженія) продолжается нѣсколько дней, послѣ чего идетъ второй (періодъ разрыхленія): краснота и отекъ вѣкъ уменьшаются, отдѣление становится чисто гнойнымъ, поверхность слизистой оболочки вѣкъ становится менѣе гладкой и даже шероховатой, вслѣдствіе выступающихъ мелкихъ красныхъ возвышеній (набухающихъ сосочковъ), и болѣе красной. Такъ процессъ тянется недѣли 2—4, послѣ чего всѣ воспалительныя явленія медленно и постепенно уменьшаются, и въ 6—8 недѣль болѣзнь оканчивается.—Такое теченіе болѣзни нарушается и отягчается въ случаѣ осложненія со стороны роговой оболочки, которая можетъ изъязвиться въ большей или меньшей степени.

Хроническая форма бленорреи развивается изъ острой или же самостоятельно. Воспалительныя явленія тѣ же, но въ болѣе слабой степени. И эта форма осложняется пораженіемъ роговой оболочки, а также еще выворотомъ вѣка. Хроническая бленоррея можетъ тянуться долгое время съ временными обостреніями, и нерѣдко ведетъ къ развитію трахомы.

Причиной бленоррейнаго конъюнктивита является чаще всего прямое зараженіе вслѣдствіе переноса на слизистую оболочку глаза бленоррейнаго выдѣленія. Переносъ такой можетъ происходить не только прямымъ путемъ, наприм., руками, полотенцемъ и т. п., но и черезъ воздухъ, если въ послѣднемъ находятся частицы засохшаго триппернаго гноя. Зараженіе происходитъ часто и отъ попаданія въ глазъ трипперногнойнаго выдѣленія изъ мочеиспускательнаго канала и влагалища. Бленоррея влагалища чаще всего обусловливаетъ бленоррейное воспаление глазъ у новорожденныхъ. Лѣчение см. ниже.

4. Трахома. На слизистой оболочкѣ вѣкъ появляются **Трахома.** многочисленныя возвышенія, представляющія собою новообразования въ видѣ зеренъ или сосочковъ. Новообразования эти отличаются большой стойкостью и ведутъ къ рубцовому перерождению, сморщиванію слизистой оболочки. Трахома простая, въ чистомъ своемъ видѣ, не сопровождается воспалительными явленіями и не вызываетъ особенно тягостныхъ ощущений. Но въ такомъ видѣ она не часто наблюдается; въ большинствѣ случаевъ трахоматозный процессъ осложняется воспаленіемъ слизистой оболочки роговицы, особенно въ болѣе поздней стадіи его и при давнемъ его существованіи (хроническая воспалительная трахома). Воспалительная трахома, въ противоположность простой, заразительна и гораздо скорѣе вызываетъ заболѣваніе и роговой оболочки, изъязвление ея и помутнѣніе.—Особенно характернымъ для трахоматознаго пораженія роговой оболочки является помутнѣніе ея съ развитіемъ сосудовъ (въ нормальномъ состояніи роговица не заключаетъ въ себѣ кровеносныхъ сосудовъ), такъ наз. **паннусъ.** Паннысъ. Помутнѣніе въ этомъ случаѣ можетъ сдѣлаться очень густымъ вслѣдствіе пропитыванія (инфильтраціи) роговицы клѣточными тѣльцами, отъ чего могутъ образоваться на ней даже зернистыя возвышенія. Паннысъ развивается медленно, начиная съ верхняго края роговицы, и нерѣдко ограничивается только верхней половиной ея; въ застарѣлыхъ же случаяхъ онъ распространяется на всю роговицу. Предсказаніе относительно выздоровленія тѣмъ благоприятнѣе, чѣмъ трахоматозный процессъ поверхностнѣе и свѣжѣе и чѣмъ раньше приступлено къ лѣченію. При глубокомъ же пораженіи, и въ случаяхъ застарѣлыхъ, предсказаніе довольно неблагоприятное, если не совсѣмъ плохое.

Причины, т. е. тѣ вліянія, которыя вызываютъ трахому, далеко еще не выяснены наукой, равно какъ и то, есть ли она лишь мѣстный процессъ или имѣетъ связь съ состояніемъ крови и лимфы, какъ и новообразования въ другихъ тканяхъ организма. Развитію трахомы во всякомъ случаѣ способствуютъ хотя и незначительныя, но долго дѣйствующія на слизистую оболочку глазъ раздраженія. О заразительности воспалительной трахомы упомянуто уже выше. Можетъ ли заразить и неосложненная, чистая трахома? На этотъ вопросъ большинство специалистовъ отвѣчаетъ отрицательно. Если же и такая трахома появляется у многихъ лицъ, живущихъ вмѣстѣ, то это можетъ быть объяснено общностью условій, ведущихъ къ образованію трахомы. Далѣе не рѣдки случаи

даже при воспалительной трахомѣ, когда трахома у одного субъекта, не смотря на его общеніе съ другими (наприм., въ одной семьѣ), не передается послѣднимъ, а также, что трахома въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ имѣется только на одномъ глазу, другой же глазъ остается свободнымъ. Подобные случаи, однако, не должны порождать безпечности въ отношеніи предохраненія отъ возможной передачи болѣзни, и на нихъ надо смотрѣть, какъ на исключенія. Лѣченіе см. ниже.

Лѣченіе воспаленій слизистой оболочки глазъ

(Лѣченіе конъюнктивитовъ и трахомы).

**Лѣченіе
катарра
глазъ.**

Въ началѣ остраго воспаленія, когда имѣется краснота (гиперемія) слизистой оболочки, или еще и слезоточеніе и свѣтобоязнь, примѣняются тѣ средства, какія указаны при гипереміи конъюнктивы (стр. 590). Когда же отдѣленіе изъ глазъ стало болѣе густымъ, и явленія раздраженія уменьшились, принимаютъ внутрь *Меркур. солуб.* 3 въ теченіе 2—3 дней, а затѣмъ—*Гепаръ сульф.* 3 и *Пульсатилла* × 3. Въ глазъ полезно впускать, въ этомъ дальнѣйшемъ періодѣ болѣзни, слабый растворъ ляписа ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ грана на унцію воды) или сѣрнокислаго цинка (въ такомъ же растворѣ).

**Способъ
впусканія
капель.**

Капли впускаются въ глазъ (въ конъюнктивальный мѣшокъ), по отяженіи нижняго вѣка, раза 2—3 въ день. Такъ какъ впусканіе капель въ глазъ вызываетъ въ послѣднемъ легкое раздраженіе, по вечерамъ же раздраженіе въ больномъ глазу и безъ того всегда усилено, то впусканіе капель всего лучше производить лишь въ утренніе и первые послѣполуденные часы. Стеклянку съ глазными каплями цѣлесообразно предварительно слегка нагрѣть, вставивъ ее на короткое время въ теплую воду. Капли всего лучше впускать въ глазъ съ помощью глазного капельника (пипетки).

Страдающіе катарромъ глазъ должны избѣгать пыли, дыму, вѣтра и прочихъ вредныхъ вліяній; если причиной катарра болѣзнь вѣкъ, слезныхъ путей и проч., то должно быть соответствующее въ каждомъ случаѣ лѣченіе.

**Лѣченіе
бленорреи
глазъ.**

При гнойномъ воспаленіи слизистой оболочки глаза не слѣдуетъ упускать изъ виду, между прочимъ, заразительности болѣзни для окружающихъ; поэтому больной долженъ имѣть отдѣльные для себя полотенца, платки, губки и т. п.; кромѣ того требуется соблюденіе самой тщательной чистоты въ уходѣ за больнымъ глазомъ; отдѣленіе должно быть удаляемо возможно чаще и основательнѣе, не ватой, а чистой мягкой тряпочкой, смоченной

въ растворѣ изъ 5—10 капель *Календула* Θ въ рюмкѣ (2—3 столов. ложки) воды. Для этой же цѣли можно брать растворъ борной кислоты изъ чайной ложки на стаканъ воды. Если одинъ только глазъ боленъ бленорреей, то необходимо защитить другой глазъ отъ возможнаго зараженія, наложивъ соотвѣтствующую повязку и вообще слѣдя за тѣмъ, чтобы гной изъ больного глаза не попадалъ въ здоровый.—Холодныя примочки показаны лишь въ самомъ началѣ гнойнаго воспаления, и то, если онѣ хорошо переносятся; въ противномъ случаѣ, и вообще въ дальнѣйшемъ теченіи, примѣняются теплыя примочки или согрѣвающие компрессы. Безусловно же противопоказаны въ остромъ періодѣ всякія раздражающія средства, особенно прижиганія ляписомъ и т. п., такъ какъ они могутъ значительно усилить воспалительный процессъ.

Внутрь при остромъ гнойномъ воспаленіи глаза дается *Меркур. корроз.* 2—3 попеременно съ *Беллад.* $\times 3$; когда отдѣленіе стало болѣе густымъ, желтымъ, переходятъ къ *Гепарѣ сульф.* 3 попеременно съ *Пульсат.* $\times 3$.—Изъ другихъ лѣкарствъ главными являются слѣдующія: *Аписъ* $\times 3$: ярко-красный, опухшій глазъ; слезотеченіе жгучее и обильное, но не ѣдкое; вѣко отечно.—*Эвфразія* $\times 2$: обильное жгучее слезотеченіе, слизисто-гнойное, изъязвляющее вѣки и щеки.—*Эвфорбій* $\times 3$: гнойное отдѣленіе, разѣдающее вѣки, особенно въ углахъ глазъ; ощущеніе тягостной сухости въ глазу.—*Арсеник.* 3: жгучія боли, особенно ночью; жгучее отдѣленіе; отекъ вѣкъ или слизистой оболочки.—*Ацид. нитрик.* 3: особенно при перелойномъ воспаленіи (послѣ Меркур. корроз.); вѣки опухши, тверды и болѣзненны; поражена и роговая оболочка; гнойное отдѣленіе, обильное, ѣдкое. Въ такихъ случаяхъ уместно и *Аргент. нитр.* 3.—*Сульфур.* и *Калькар. карбон.*—въ позднѣйшей стадіи болѣзни, особенно у золотушныхъ субъектовъ.—При хроническомъ воспаленіи слизистой оболочки, особенно у золотушныхъ дѣтей, надо имѣть въ виду еще слѣдующія лѣкарства: *Графитъ*: особенно при экзематозной сыпи на головѣ и за ушами; свѣтобоязнь, если она есть, усиливается обыкновенно рано утромъ, и вообще дневной свѣтъ дѣйствуетъ на глазъ хуже, чѣмъ свѣтъ искусственный (лампъ, свѣчи и др.). Важнымъ характернымъ признакомъ для Графита служатъ трещины въ наружныхъ углахъ глазъ съ кровоточивостію ихъ.—*Барита карбон.* и *Барита іодата*: при одновременномъ опуханіи шейныхъ лимфатическихъ железъ.*Циннабар.*: главное показаніе для этого средства—боль, начинающаяся во внутреннемъ углу глаза и распространяющаяся къ бровямъ, чаще

кругомъ глаза.—*Антимон. круд.*: гнойнички роговой оболочки, особенно у капризныхъ дѣтей (рядомъ съ Хамомила) и при симптомахъ Графита.—*Конимъ* воспаление ограничивается почти исключительно роговой оболочкой, но тѣмъ не менѣе можетъ быть сильная свѣтобоязнь съ судорожно-сомкнутыми вѣками

Лѣчение
сухой
трахомы

Лѣчение трахомы должно быть какъ мѣстное (наружное), такъ и общее (внутреннее); то и другое различно, смотря главнымъ образомъ по осложнениямъ со стороны слизистой и роговой оболочекъ. При чистой, сухой трахомѣ полезно слегка раздражающее мѣстное лѣчение, которое, вызывая временную гиперемію (приливъ крови), усиливаетъ обмѣнъ веществъ въ слизистой оболочкѣ и тѣмъ способствуетъ распаденію и всасыванію трахоматозныхъ новообразованій. Вредно же, и даже можетъ сдѣлаться опаснымъ для глаза, примѣненіе такихъ средствъ, которыя прямо разрушаютъ эти новообразованія (наприм., выскабливаніе острой ложечкой), такъ какъ послѣ нихъ образуются рубцы на слизистой оболочкѣ, которые и являются главнымъ опаснымъ послѣдствіемъ трахоматознаго процесса.—Для указанной цѣли съ наибольшей пользой примѣняется мѣдный купоросъ (*Купрумъ сульфурик.*) въ кристаллѣ („синій камень“), которымъ дѣлаются смазыванія слизистой оболочки въ теченіе продолжительнаго времени (нѣсколько мѣсяцевъ), вначалѣ ежедневно разъ, а затѣмъ, по мѣрѣ улучшения, все рѣже и рѣже, пока наступитъ излѣченіе. Само собой разумѣется, что смазыванія эти продолжаются лишь въ томъ случаѣ, если они хорошо переносятся, т. е. даютъ хороше результаты.

Способъ
смазыванія
глазъ

Выворачиваніе
вѣкъ

Смазываніе это должно производиться врачомъ или же человѣкомъ основательно наученнымъ этой процедурѣ. Кристаллъ синяго камня долженъ быть совершенно гладкимъ (имѣются въ продажѣ специальные штифты такогого), что достигается оттираніемъ его влажной тряпочкой. Важнѣе смазываніе слизистой оболочки верхняго вѣка, нежели нижняго. Выворотъ верхняго вѣка производится такъ: больному предлагаютъ смотрѣть книзу, и при такомъ положеніи глазъ захватываютъ большимъ и указательнымъ пальцемъ (правой или лѣвой руки) рѣсницы посрединѣ вѣка, оттягиваютъ послѣднее книзу, слегка при этомъ удаляя его отъ глазного яблока, затѣмъ указательнымъ пальцемъ другой руки (или палочкообразнымъ предметомъ) надавливаютъ на вѣко у самаго верхняго края глазницы и въ то же время потягиваютъ его за рѣсницы кверху. Вѣко удерживается въ вывернутомъ положеніи верхушкой указательнаго пальца лѣвой руки приложеннаго къ свободному его краю, правой же рукой дѣлается, что требуется (въ данномъ случаѣ—смазываніе), больной во все это время долженъ смотрѣть книзу. Для приведенія вѣка въ прежнее положеніе достаточно больному направить глаза кверху.—Для выворота нижняго вѣка предлагаютъ больному смотрѣть вверхъ и, приложивъ палецъ къ

жѡкъ на скулъ, оттягиваютъ ее слегка внизъ — Для временнаго удержанія обѡихъ вѣкъ въ вывернутомъ положеніи (для смазыванія ихъ въ одно время), удерживаютъ верхнее (вывороченное) вѣко лѣвымъ указательнымъ пальцемъ, а большимъ пальцемъ той же руки оттягивается нижнее вѣко книзу, при этомъ, для закрытія глазной щели, предлагаютъ больному сжать вѣки. При выворачиваніи вѣка надо стараться не производить давленія на глазное яблоко, такъ какъ такое очень непріятно ощущается больнымъ, да оно можетъ и глазу повредить

Послѣ смазыванія, если чувствуется боль въ глазу, прикладываютъ къ послѣднему холодныя примочки, пока почувствуется облегченіе. Для смазыванія примѣняется также съ пользой *Алюмень* (въ кристаллѣ), *Плѹмбумъ ацетик.* (въ растворѣ 20% — смазываніе посредствомъ кисточки). Вмѣсто смазыванія можно примѣнять и мази изъ тѣхъ же средствъ (2 грана на драхму вазелина), но послѣднія менѣе дѣйствительны, чѣмъ первыя. Ляписа для смазыванія при сухой трахомѣ не слѣдуетъ употреблять, такъ какъ онъ дѣйствуетъ слишкомъ сильно, — больше прижигающимъ, нежели лишь раздражающимъ образомъ

При воспалительной трахомѣ всякое раздражающее лѣченіе совершенно неумѣстно, такъ какъ такое можетъ причинить большой вредъ, лѣченіе должно быть противовоспалительное (см. выше).

**Лѣченіе
воспалит
трахомы**

Раздражающее лѣченіе также вредно при осложненіи со стороны роговой оболочки во всѣхъ случаяхъ, когда страданіе послѣдней острое, сопровождающееся болью, слезотеченіемъ, свѣтобоязнью. Но если измѣненіе роговой оболочки имѣетъ форму паннуса (см. стр. 593), то лѣченіе должно быть какъ при сухой трахомѣ, самъ же по себѣ паннусъ не требуетъ отдѣльнаго леченія, и онъ уменьшается или совсѣмъ проходитъ по мѣрѣ улучшенія со стороны трахомы вѣкъ.

**Лѣченіе
паннуса.**

Въ рубцовомъ періодѣ трахомы мѣстное лѣченіе такое же, какъ въ раннемъ періодѣ, но если, вслѣдствіе рубцеванія, вѣки стали тѣсны для глаза, или они искривлены, то облегченіе можетъ быть достигнуто операцией (расщепленіе наружной спайки вѣкъ). Если слизистая оболочка превратилась въ сплошную рубцовую ткань (ксерозъ слиз. оболочки), то всякое лѣченіе бесполезно, для облегченія же непріятнаго ощущенія, и вообще послѣдствій сухости внутренней поверхности вѣкъ, впускаютъ въ конъюнктивальный мешокъ смягчительныхъ жидкостей, наприм. молока).

Изъ внутреннихъ лѣкарствъ при трахомѣ показаны слѣдующія: *Аурумъ муріатик.*, *Кали бихромик.*, *Туя*, *Гепар. суль-*

**Внутреннія
лѣкарства**

фур., *Алюменъ* (при сухости вѣкъ), *Меркур. прецип. руберъ* (при отсутствіи воспаленія), *Меркур. биіодат.* (при воспаленіи, когда глаза красные, при свѣтобоязни, при изъязвленіи роговой оболочки), *Аписъ*, *Силиція Сульфуръ*.

**Лѣченіе
поврежденій
глаза.**

При воспаленіяхъ глазъ вслѣдствіе механическихъ поврежденій (раненія и т. п.), если не требуется прежде всего хирургической помощи, или послѣ послѣдней, даютъ *Арника*, для скорѣйшаго всасыванія кровоподтека и вообще заживленія (также наружно въ примочкахъ). *Акон.*: если имѣется воспалительное состояніе (также *Календула* — внутренно и наружно). *Кантарисъ*: особенно при ожогахъ глазъ отъ пороха, наприим., при фейерверкахъ. *Гаммелисъ*: при ожогахъ и другихъ поврежденіяхъ, съ воспаленіемъ (также *Ледумъ*), внутренно и наружно.

IV. Болѣзни роговицы и внутреннихъ частей глаза.

Изъ прочихъ еще многочисленныхъ болѣзней глаза приводятся здѣсь, сообразно цѣлямъ настоящей книги, лишь слѣдующія, притомъ въ самомъ краткомъ изложеніи, такъ какъ и эти болѣзни могутъ лишь въ крайне ограниченной мѣрѣ быть предметомъ самопомощи и самонаблюденія.

**Кератитъ.
Бѣльмо.**

Воспаленіе роговой оболочки (*Кератитъ*), т. е. прозрачной части глаза, въ которой виденъ зрачекъ, бываетъ частичное и общее, поверхностное и глубокое; послѣдствіемъ воспаленія являются часто язвы роговой оболочки, а послѣдствіемъ язвъ, послѣ и вслѣдствіе ихъ зарубцеванія, пятна (*бѣльма*) этой оболочки. Причины воспаленій роговицы: золотуха, болѣзни слизистой оболочки, ожогъ, поврежденіе. Въ остромъ періодѣ воспаленія всякія мѣстные раздражающія средства противопоказаны, и слѣдуетъ ограничиваться защитой глаза отъ вѣтра, жара, свѣта, пыли и проч. посредствомъ соотвѣтствующей повязки, слегка давящей, для приданія глазу возможно болѣе покойнаго положенія.

**Глазная
повязка.**

Давящая или защищающая повязка накладывается такъ: послѣ предварительнаго очищенія глаза, если въ немъ имѣются постороннія вещества (кровь, гной и проч.), больной закрываетъ глаза, какъ во снѣ; на всю область больного глаза кладутъ кусокъ тонкаго мягкаго полотна или мягкой марли и поверхъ него гигроскопическую вату, которою выполняютъ сначала углубленіе въ углу глаза, и затѣмъ еще слой ваты, такъ чтобы вся область глаза представляла одну ровную поверхность, безъ углубленій и выпячиваній, въ чемъ можно убѣдиться, прикладывая ладонь. Накладывать ваты лишь столько, сколько требуется для этой цѣли. Затѣмъ обвязываютъ бинтомъ, который

долженъ быть шириною $2\frac{1}{2}$ —3 пальца и длиною $2\frac{1}{2}$ аршина, полотняный или фланелевый. Свободный конецъ свернутаго бинта, если повязка накладывается лишь на одинъ глазъ (что чаще всего приходится), кладется на послѣдній косо и обводится кругомъ головы изъ подъ уха соотвѣтствующей стороны къ виску противоположной, и затѣмъ по лицу снова ведется въ прежнемъ же направленіи, чтобы удержать свободный конецъ; наконецъ—косые ходы бинта укрѣляются однимъ круговымъ (на лбу и кругомъ головы).—Это давящая повязка; когда же требуется легкая повязка, исключительно для защиты глаза отъ внѣшнихъ вліяній, то можно ограничиться короткимъ бинтомъ съ тесемками на концахъ его.—Если требуется повязка на оба глаза одновременно, то первый кругъ дѣлается поперечно на оба глаза, и затѣмъ въ косомъ направленіи на одномъ и другомъ, и послѣ этихъ косыхъ ходовъ дѣлается еще одинъ поперечный укрѣпляющій оборотъ бинта.

Когда воспалительныя явленія прошли, но осталась еще чувствительность глазъ къ свѣту, повязка замѣняется защищающими очками (консервами); у женщинъ или дѣтей консервы-очки могутъ быть замѣнены вуалью (сѣраго, чернаго или синяго цвѣта), которая должна быть гладкою.

Изъ внутреннихъ лѣкарствъ при воспаленіи роговой оболочки примѣняются: при остромъ воспаленіи—*Беллад.*, *Меркур. солуб.*, *Эвфразія*, при хроническомъ — *Гепаръ сульф.*, *Кали бихром.*, *Силиція*; и др.

Противъ остающихся послѣ глубокихъ язвъ роговой оболочки пятенъ послѣдней (бѣлыя) показаны: *Аписъ*, *Калькар. карб.*, *Каннабисъ*, *Силиція*, *Графитъ*, *Сульфуръ*.

Послѣдствіемъ воспаленія роговой оболочки бываетъ въ пя- **Стафилома.**
чиваніе ея (стафилома), иной разъ съ прободеніемъ ея и выпаденіемъ радужной оболочки. Отъ лѣкарственного лѣченія тутъ мало чего можно ожидать, такъ же мало и отъ хирургическаго. Ношеніе давящей повязки (см. выше) во всякомъ случаѣ необходимо. Изъ внутреннихъ лѣкарствъ показаны и могутъ быть испробованы: *Аписъ*, *Коніумъ*, *Беллад.*, *Эвфразія*, *Калькар.*, *Гепаръ*, *Ликопод.*, *Сульфуръ*.

Катаракта (помутнѣніе хрусталика). Вполнѣ созрѣвшая **Катаракта.**
катаракта внутреннему лѣченію не поддается, напротивъ же того легко и безболѣзненно устраняется оперативнымъ вмѣшательствомъ; правильно произведенная операція катаракты совершенно безопасна и всегда возвращаетъ больному зрѣніе, такъ какъ она удаляетъ изъ глаза помутнѣвшій и застилающій зрѣніе хрусталикъ. Внутренними же лѣкарствами можно тогда только разсчитывать на проясненіе послѣдняго, и вмѣстѣ съ тѣмъ зрѣнія, когда болѣзнь не зашла еще далеко.

Лѣченіе катаракты.

Основаніемъ для лѣченія катаракты внутренними лѣкарствами служить тотъ несомнѣнный фактъ, что помутнѣніе хрусталика можетъ происходить отъ разстройства питанія его; въ такомъ случаѣ можно разсчитывать и на разсосаніе помутнѣнія, на полученіе хрусталикомъ своей нормальной прозрачности, что нерѣдко и наблюдается въ практикѣ при лѣченіи этой болѣзни гомеопатическими лѣкарствами.

Главными лѣкарствами считаются слѣдующія:

Каустик., когда вертикальная половина поля зрѣнія помутнена; потребность постоянно протирать глаза, что приноситъ какъ бы облегченіе.—*Аммон. карбон.*: при катарактѣ особенно праваго глаза.—*Сульфуръ*: при переходѣ катаракты съ праваго глаза на лѣвый, а также при катарактѣ послѣ скрывшейся сыпи, особенно чесотки.—*Магнез. карбон.*: при переходѣ катаракты съ лѣваго глаза на правый и при расположеніи къ головнымъ болямъ и чирьямъ.—*Силиція*: при катарактѣ вслѣдствіе прекращенія пота ногъ, или послѣ появленія лишая или же воспаления глазъ.—*Кониумъ*: при катарактѣ вслѣдствіе поврежденія.—*Калькар. карб.*, также *Барита карб.*: при катарактѣ у золотушныхъ субъектовъ (послѣ *Каннабисъ*).—*Ликопод.*: при хронической диспепсии; также при катарактѣ послѣ тифа или прекращенія регуль. Кромѣ того съ успѣхомъ примѣнялись еще: *Эвфразія*, *Хелидоній*, *Пульсатилла*, *Химафилла*.

Зеленая вода.

Глаукома (Зелѣная вода) является нерѣдко на подагрической и сифилитической почвѣ, вообще же причины неизвѣстны. Въ основѣ этой болѣзни, какъ и при катарактѣ, лежитъ общее разстройство питанія глаза, а сущность ея заключается въ безпрерывномъ увеличеніи внутриглазного давленія, такъ что эта болѣзнь, предоставленная самой себѣ, ведетъ неизбѣжно къ неустранимой слѣпотѣ. Главный признакъ глаукомы—большая плотность глазного яблока, доходящая до твердости камня; затѣмъ, зрачекъ при глаукомѣ обыкновенно расширенъ; онъ часто имѣетъ овальную форму и грязнозеленоватый цвѣтъ; почти всегда при глаукомѣ имѣется разлитое помутнѣніе роговой оболочки и уменьшеніе ея чувствительности. Внутреннія измѣненія при глаукомѣ имѣются въ каждомъ случаѣ и могутъ быть опредѣлены лишь специалистомъ съ помощью глазного зеркала. Слѣдствіемъ этихъ измѣненій являются слѣдующіе симптомы: быстрая утомляемость глазъ отъ занятій вблизи, пониженіе остроты зрѣнія, суженіе поля зрѣнія или неравномѣрность его, видѣніе радужнаго круга

вокругъ пламени; главное же — боли, которыя рѣдко ограничиваются больнымъ глазомъ, но распространяются обыкновенно и на лобъ, високъ и всю половину головы и достигаютъ самой высокой степени; боли являются часто періодически или съ временными ожесточеніями и послабленіями. Глаукома бываетъ простая, невоспалительная и воспалительная (острая и хроническая). Предрасполагающими къ глаукомѣ условіями являются: пожилой возрастъ, дальнорзкость, а также всѣ тѣ состоянія, которыя ведутъ къ застою или вообще къ увеличенію крови въ глазу, какъ-то — запоры, задержка выдѣленій (регулъ, геморроя), невралгии тройничнаго нерва (мигрень и пр.).

При малѣйшемъ подозрѣніи на глаукому, нельзя впускать въ глазъ атропиновыхъ (расширяющихъ зрачокъ) капель, такъ какъ отъ этого лѣкарства внутриглазное давленіе еще болѣе усиливается, стало быть — ухудшится и болѣзнь. Въмѣсто атропина въ аллопатіи примѣняется для уменьшенія этого давленія *Эзеринъ*. Въ гомеопатіи противъ глаукомы показаны: *Белладонна* (или *Атропинъ*) — не въ низкихъ, а въ высокихъ дѣленіяхъ (не ниже 6-го), въ каковыхъ это лѣкарство не увеличиваетъ, а уменьшаетъ внутриглазное давленіе, и именно, при приливахъ крови къ головѣ, при воспаленіи въ глазу. — *Рододендронъ* (періодическія боли внутри и вокругъ глаза, усиливающіяся передъ грозой и облегчающіяся во время грозы). — *Колоцинтъ* (сильныя, жгучія, рѣжущія боли, облегчающіяся отъ движенія въ теплой комнатѣ и усиливающіяся отъ покойнаго и согнутаго положенія). *Прунусъ стиноза* (сильнѣйшія боли, точно глазъ раздавливается, пронизывающія всю соотвѣтственную половину головы). — *Фосфоръ*, *Кольхик.*, *Спигелія*, *Натр. нитрик.*, *Натр. муриат.*, *Нафталинъ* и еще другія, смотря по общему состоянію глазъ и всего организма.

Долго, однако, задерживаться съ лѣкарственнымъ лѣченіемъ при этой болѣзни не слѣдуетъ, такъ какъ своевременно сдѣланной операцией, именно — въ начальной стадіи, можно предупредить дальнѣйшее развитіе этого опаснаго для глаза болѣзненнаго процесса.

Амбліопія и Амаврозъ (Темная вода). Подъ амбліопіей **Темная вода.** разумѣютъ ослабленіе зрѣнія, а подъ амаврозомъ — полное отсутствіе его; въ томъ и другомъ случаѣ не имѣется никакихъ видимыхъ измѣненій глаза, ни наружныхъ, ни внутреннихъ. О сущности этихъ болѣзненныхъ состояній извѣстно лишь то, что они кроются

въ зрительно-нервномъ аппаратѣ и составляютъ лишь различныя степени одного и того же болѣзненнаго процесса.

Причинами могутъ быть: злоупотребленіе спиртными напитками, чрезмѣрное куреніе табаку, отравленіе свинцомъ, чрезмѣрное и продолжительное употребленіе большихъ дозъ хинина, салициловыхъ препаратовъ, укушеніе змѣи и пр.; далѣе—общія заболѣванія, какъ сахарная болѣзнь, болѣзни почекъ (уремія), обильныя кровотеченія, сифились и пр.; нервныя болѣзни и проч. Къ тому же роду болѣзни относится куриная слѣпота, при которой больные въ сумерки или ночью дѣлаются болѣе или менѣе слѣпыми, при яркомъ же освѣщеніи видятъ хорошо.

Лѣченіе сводится къ устраненію вредныхъ вліяній и основныхъ болѣзненныхъ разстройствъ, причемъ главными лѣкарствами являются: *Беллад.*, *Нуксъ вомика*, *Фосфоръ*, *Рута*, *Аргент*, *Аурумъ*, *Игнація*, *Сеня*, *Сульф.*, *Гепар. сульф.*, *Іод.*, *Коніумъ* и проч. (Выборъ лѣкарствъ надо дѣлать соотвѣтственно общему состоянію организма, о чемъ справляться въ другихъ мѣстахъ этой книги).

Астенопія (болѣзненная утомляемость глаза) зависитъ чаще всего отъ близорукости, дальнозоркости и другихъ ненормальностей рефракціи и можетъ быть устранена только ношеніемъ соотвѣтственныхъ очковъ. Временное облегченіе даютъ: *Аконитъ*, *Агарик.*, *Коніумъ*, *Гельзем.*, *Рута*, *Арника*.

Глазная невралгія. Лѣкарства тѣ же, какія указаны при лицевой невралгіи (стр. 120).

Косоглазіе. Исправляется преимущественно соотвѣтственными очками, но также оперативнымъ путемъ. Изъ лѣкарствъ показаны: у дѣтей, во время прорѣзыванія зубовъ—*Беллад.*, *Агарик.*, *Гіосціам.*, *Нуксъ вом.*, *Страмон.*, при глистахъ—*Цина*, *Цикла мѣнъ*, *Стигелія*; при внутреннемъ косоглазії у дѣтей—*Цикута вироза*, *Яборанди*.—Косоглазіе можетъ быть исправлено оперативнымъ путемъ.

Ушныя болѣзни.

Ушныя болѣзни могутъ въ гораздо меньшей еще мѣрѣ быть предметомъ самопомощи, нежели глазныя, и поэтому имъ удѣляется здѣсь очень немного мѣста. Ухо, по своему строенію, состоитъ изъ трехъ частей: первую часть составляютъ ушная раковина и ушной каналъ, въ глубинѣ котораго находится барабанная

перепонка, съ которой начинается средняя часть уха, а за послѣднею—внутренняя часть; послѣднія двѣ части, особенно же внутренняя, находятся глубоко въ черепѣ и отличаются очень сложнымъ и тонкимъ устройствомъ. Внутреннее ухо сообщается съ полостію глотки посредствомъ Евстахіевой трубы, проводящей въ эту часть уха воздухъ.

Болѣзни ушной раковины и ушного канала суть такія же, какъ и болѣзни кожи, поэтому лѣчатся по общимъ правиламъ (см. „Болѣзни кожи“).

Болѣзни среднего уха, особенно же внутреннего недоступны даже для прямого врачебнаго вмѣшательства, именно вслѣдствие глубокаго положенія этихъ частей въ кости (височной). Оперативное вмѣшательство простирается только до вскрытія полости среднего уха со стороны барабанной перепонки или со стороны части черепа, лежащей за ухомъ, и до продуванія Евстахіевой трубы. Болѣзни внутреннего уха представляютъ еще много загадочнаго даже для специалистовъ, и диагнозы ихъ въ большинствѣ случаевъ не выходятъ изъ предѣловъ однихъ лишь предположеній, а лѣчение является исключительно паллиативнымъ.

Въ виду сказаннаго, тутъ приводятся лишь нѣкоторые симптомы болѣзней среднего и внутреннего уха съ указаниемъ соотвѣствующихъ гомеопатическихъ средствъ.

Ушная боль.

Если причина боли не воспаление (нарывъ) въ ткани наружнаго слуховаго канала, то таковою можетъ быть: острое воспаление въ глубинѣ уха за барабанной перепонкой, или острое воспаление горла, изъ котораго боль отзывается въ ухѣ; или ушная боль можетъ быть ревматической (отъ простуды) или нервной (невралгической), нервная боль отличается тѣмъ, что она не постоянна, а является периодами и бываетъ часто то въ одномъ, то въ другомъ ухѣ.

Въ началѣ ушной боли, какая бы ни была ея причина, если только не поврежденіе (послѣ котораго принимается, главнымъ образомъ, *Арника*), слѣдуетъ принимать *Аконитъ* $\times 3$; если послѣ нѣсколькихъ приемовъ его не чувствуется облегченіе, то принимаютъ *Беллад.* $\times 3$ попеременно съ *Меркур. солуб.* $\mathfrak{z}$, также *Хамомилла* $\times 3$, особенно у дѣтей и у нервныхъ чувствительныхъ субъектовъ.—Если выясняется, что боль чисто нервная, то подходятъ *Гельземинъ*, *Игнація*, *Хамомил.*, *Сетя*, *Пульсатил.*, *Вербаск.*, *Спигеля*, *Арсеник.* и др. (см. „Невралгии“, стр. 119).

Наружно примѣняется теплота: вливаніе въ ухо теплаго миндальнаго масла или *белладоннаго масла*, которымъ смазываютъ также область уха кругомъ, послѣ чего обкладываютъ слоемъ обыкновенной ваты и обвязываютъ.

Ушная течь.

Причиной является чаще всего предшествующее острое воспаленіе среднего уха, и въ этомъ случаѣ течь гнойная. Острое воспаленіе среднего уха является съ своей стороны рѣже отъ простуды или отъ воспаленія сосѣднихъ органовъ (горла, носа), а гораздо чаще какъ осложненіе при острыхъ заразныхъ болѣзняхъ, особенно при скарлатинѣ. Хроническое воспаленіе среднего уха бываетъ преимущественно у золотушныхъ дѣтей. У людей золотушныхъ наблюдаются и истеченіе жидкой ушной сѣры; или ушная сѣра, образуясь въ обильномъ количествѣ, затвердѣваетъ и закупориваетъ ушной каналъ (см. ниже). Ушная течь бываетъ временно при гнойномъ нарывѣ въ наружномъ ушномъ каналѣ, а также, чтó, впрочемъ, очень рѣдко наблюдается, при появленіи и размноженіи въ послѣднемъ особаго рода бѣлыхъ червяковъ.

При первомъ появленіи ушной течи дается *Гепар. сульф.* и *Пульсат.*, а затѣмъ *Силиція*. Въ упорныхъ случаяхъ: *Арсен.*, *Арсен. іодат.*, *Ацид. нитрик.*, *Ацид. флуорик.*, *Аурумъ*, *Графитъ*, *Манган.* и др. При истеченіи ушной сѣры: *Сульф.*, *Гепаръ сульф.*, *Калькареа*, *Коніумъ*.

Наружно при ушной течи примѣняются вначалѣ осторожныя, раза два въ день, спринцеванія ушного канала теплымъ растворомъ *Календула* (30 капель на стаканъ воды), а затѣмъ вытиранія ваткой, навернутой на спичку и смоченной въ растворѣ 1 чайной ложечки *Календула* Θ въ полустаканъ воды. Когда истеченіе значительно уменьшилось, лучше всего смазывать въ ушномъ каналѣ *масломъ - Календула*, также *масломъ - Пульсатилла* 1 — 2 раза въ день. Упомянутые червячки удаляются вліяніями въ ушной каналъ теплаго масла и послѣдующимъ промываніемъ теплой водой.

Шумъ и звонъ въ ушахъ. Тугость слуха.

Эти состоянія встрѣчаются часто одновременно, но также и отдѣльно, и либо имѣютъ нервное происхожденіе, либо зависятъ отъ приливовъ къ головѣ, или, наоборотъ, отъ малокровія мозга, чаще же всего отъ остраго или хроническаго воспаленія среднего

уха. Нерѣдко единственной причиною является чрезмѣрное скопленіе ушной сѣры, выполняющей и закупоривающей слуховой каналъ. Нервные шумы въ ушахъ и тугость слуха часто очень упорны. Соотвѣтственно особенностямъ cadaго случая, чаще всего подходятъ: *Беллад.*, *Коніумъ*, *Игнація*, *Валеріана*, *Нитри ацид.*, *Меркур. солуб.*, *Пульсат*, *Барита карб.*, *Калькар. іодата* и проч.—Чрезмѣрное скопленіе ушной сѣры требуетъ механическаго ея удаленія промываніями и ушной лопаточкой.

ОТДѢЛЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

Отравленія.

Общее о ядахъ и противоядіяхъ.

Всѣ три царства природы, минеральное, растительное и животное, производятъ яды. Всякій ядъ дѣйствуетъ только въ растворенномъ видѣ принятый, или растворившись въ организмѣ послѣ того, какъ онъ въ послѣдній попалъ. Вотъ почему противоядіе должно имѣть прежде всего свойство привести попавшій въ организмъ ядъ въ возможно болѣе нерастворимое химическое соединеніе.—Количество яда, могущее вызвать явленія отравленія, различно для различныхъ организмовъ. Наблюдается нерѣдко среди людей и необычайная восприимчивость въ этомъ отношеніи, такъ называемая идіосинкразія, въ силу которой количество яда, само по себѣ считающееся не отравляющимъ, вызываетъ тѣмъ не менѣе явленія отравленія. Примѣръ, такой идіосинкразіи приведенъ относительно рвотнаго корня на стр. 25; идіосинкразія наблюдается часто и къ такимъ веществамъ, какъ хининъ, салицилъ, морфій, кокаинъ, ртуть и проч. Но бываетъ и противоположное: дѣти, наприм., переносятъ сравнительно большія дозы каломеля и белладонны, нежели взрослые. — Имѣетъ значеніе и мѣсто, черезъ которое ядъ попадаетъ въ организмъ. Напримѣръ, кураре и змѣиный ядъ могутъ въ сравнительно большихъ количествахъ безнаказанно восприниматься желудкомъ, тогда какъ очень малые количества ихъ, попавшія прямо въ кругъ кровообращенія, дѣйствуютъ смертельно. И наоборотъ, имѣются такія вещества, которыя, впрыснутыя подъ кожу, не производятъ дѣйствія, введенныя же въ желудокъ черезъ ротъ вызываютъ жестокия явленія отравленія, вслѣдствіе отщепленія ядовитаго начала подъ вліяніемъ

соковъ желудочно-кишечнаго канала; наримѣръ, Амигдалинъ (изъ горькаго миндаля), изъ котораго образуется синильная кислота; наоборотъ, соли желѣза лишь мало всасываются со стороны кишечника.—Вообще же, яды дѣйствуютъ всего сильнѣе, когда они попадаютъ прямо въ кровь, или въ подкожную клѣтчатку, или черезъ дыхательные пути. Яды могутъ всасываться со стороны не только желудка, но и прямой кишки и влагалища. Наблюдались также отравленія отъ продолжительнаго употребленія свинцовой воды для глазныхъ примочекъ, отъ прижиганій слизистой оболочки глаза мѣднымъ купоросомъ, отъ употребленія содержащаго свинецъ нюхательнаго табака. Черезъ неповрежденную кожу могутъ попадать въ кровь улетучивающіеся яды, нарим.:—ртуть, никотинъ, или ядовитыя вещества, растворенныя въ улетучивающихся жидкостяхъ.

Ядъ изъ организма выводится железистыми органами (кишечными железами, почками, слюнными, потовыми и молочными железами, печенью), также легкими. Выведеніе яда изъ организма, въ отношеніи скорости и количества, не одинаково для различныхъ ядовъ, равно какъ отдѣльные яды поражаютъ прежде всего избранные органы; нарим.—ртуть и слюнныя железы, мышьякъ и кишечныя железы, кантариды и почки и т. д. Или еще такъ, что ядъ выводится тѣмъ органомъ, который ко времени отравленія былъ наиболѣе дѣятельнымъ; нарим., при сильномъ потѣніи—кожа, при поносѣ—кишечникъ.

Дѣйствіе яда можетъ быть мѣстное или общее, или такое и другое вмѣстѣ. Такъ, минеральныя кислоты, ѣдкія щелочи, соли металловъ разрушаютъ ткани мѣстно химическимъ путемъ; другіе яды дѣйствуютъ исключительно на нервную систему (кокаинъ, морфій, аконитинъ, вератринъ), другіе опять вліяютъ разрушающимъ образомъ на важные органы тѣла, послѣ всасыванія ихъ въ кровь.

Отравленіе можетъ произойти различными путями. Не говоря объ убійствѣ и самоубійствѣ посредствомъ яда, отравленіе можетъ быть промышленное, хозяйственное, лѣкарственное; далѣе—отравленіе образовавшимися внутри организма ядами, или отъ укусовъ ядовитыхъ животныхъ и насѣкомыхъ.—Промышленное отравленіе бываетъ особенно у рабочихъ, имѣющихъ дѣло съ мышьякомъ, свинцомъ, ртутью, фосфоромъ и проч.—Хозяйственнымъ путемъ возможно отравленіе водою, содержащею свинецъ, яръ-мѣдянкой отъ нечистой мѣдной посуды, отъ нечаян-

ной замѣны пищевого вещества ядовитымъ (наприм., замѣна муки, или сахара мышьякомъ, съѣдобныхъ грибовъ несъѣдобными и проч.); далѣе—отъ употребленія въ пищу испорченныхъ пищевыхъ продуктовъ, отъ присутствія спорыньи въ мукѣ и т. п., отъ косметикъ, отъ игрушекъ окрашенныхъ ядовитой краской и т. д. —Лѣкарственное отравленіе встрѣчается въ большей или меньшей степени, гораздо чаще, нежели всѣ прочіе отравленія, хотя лишь очень рѣдко доходятъ до суда, и это можно утверждать не только съ гомеопатической точки зрѣнія. Отравленіе такое случается не только отъ ненамѣренного назначенія слишкомъ большихъ дозъ со стороны врача, или ошибокъ со стороны аптеки, или отъ приемовъ внутрь наружныхъ средствъ, или отъ того, что пациентъ напуталъ въ отношеніи дозъ и времени приемовъ и т. д., но и при нормальныхъ условіяхъ практики, когда врачи старой школы назначаютъ свои средства съ самымъ лучшимъ намѣреніемъ оказать больнымъ помощь, но не считаются съ самымъ простымъ закономъ природы, по которому предѣлъ наивысшей дозы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ зависитъ не отъ ихъ личнаго соображенія, а отъ инстинкта больного. Симптомы излишняго дѣйствія лѣкарствъ въ такихъ случаяхъ называются въ аллопатіи „побочными“ лѣкарственными дѣйствіями. Къ этой же категоріи отравленій надо отнести и намѣренное, для научно-практической цѣли, испытаніе ядовъ на здоровыхъ людяхъ, путемъ котораго въ гомеопатической школѣ узнается характеръ дѣйствія таковыхъ; для этой цѣли лѣкарственное вещество дается, по опредѣленнымъ правиламъ, въ настолько большихъ дозахъ, чтобы получались неопасныя для жизни явленія отравленія, которыя проходятъ скоро по прекращеніи такихъ приемовъ. Такимъ, именно, путемъ получилось и получается гомеопатическое лѣкарствовѣдѣніе, служащее для гомеопатовъ руководствомъ для выбора лѣкарствъ въ болѣзняхъ по закону подобія (см. стр. 16), при чемъ такъ испытываются не только ядовитыя вещества, но и индифферентныя (безразличныя) по особымъ правиламъ.

Животные яды исходятъ отъ змѣй, нѣкоторыхъ пауковъ, скорпионовъ, нѣкоторыхъ жабъ, муравьевъ, пчелъ и проч. (Зараженіе нѣкоторыми животными ядами см. отдѣлъ 3-й, стр. 93).

Внутри организма развивающіеся яды представляютъ собою продукты обмѣна вещества въ нормальномъ и больномъ состояніи (эндогенные яды).

Распознаваніе отравленія бываетъ зачастую очень

затруднительно, когда вызвавший отравление ядъ неизвѣстенъ, а подвергшійся его дѣйствию человѣкъ еще живъ. Подозрѣвать же отравление слѣдуетъ всегда въ такихъ случаяхъ, когда, безъ вѣдомой причины, внезапно являются тяжелые болѣзненные симптомы, быстро усиливающеся, у человѣка, до тѣхъ поръ здороваго. Нѣкоторые яды, наприм., синильная кислота, могутъ вызвать смерть уже въ течение нѣсколькихъ минутъ, нѣкоторые въ теченіе одного часа (стрихнинъ, змѣиный ядъ, щавелевая кислота), или нѣсколькихъ часовъ (борецъ, опиумъ, красавка), или 1—1½ сутокъ (наперстянка, безвременникъ, мухоморъ и большинство металлическихъ ядовъ). Много зависитъ, конечно, и отъ количества принятаго яда. Распознаваніе при хроническихъ отравленіяхъ (свинецъ, ртуть) обыкновенно еще гораздо труднѣе, нежели при острыхъ. Въ цѣляхъ распознаванія не слѣдуетъ упускать specialнаго, химическаго и микроскопическаго анализа (изслѣдованія) рвотныхъ массъ, мочи и кала. Бываютъ однако случаи, когда опредѣленіе яда вообще невозможно, потому ли, что онъ въ организмъ разложился, потому ли, что неизвѣстенъ еще способъ для его опредѣленія, какъ напримѣръ, при растительныхъ ядахъ.

Общее лѣченіе отравленій. Противоядія.

Лѣченіе отравленія можетъ быть механическое, противодѣйствующее (антидотное) и симптоматическое.

**Механическія
противоядія.**

I. Механическое лѣченіе состоитъ въ возможно быстромъ и полномъ удаленіи яда; оно и наилучшее, потому что радикальное. Если ядъ попалъ подъ кожу, наприм., при укусѣ ядовитой змѣи, то соотвѣтствующая часть тѣла должна быть безъ малѣйшаго промедленія (такъ такъ ядъ быстро всасывается въ кровь) перевязана, ядъ же долженъ быть высосанъ, или же удаленъ съ кровью путемъ надрѣза, или уничтоженъ прижиганіемъ (ѣдкимъ веществомъ) или жаромъ.

Удаленіе яда изъ желудка достигается путемъ искусственно вызываемой рвоты или выкачиваніемъ посредствомъ желудочнаго насоса. Для первой цѣли врачи прописываютъ впрыскиваніе подъ кожу. Апоморфина (наибольшая доза—1½ грана), или черезъ ротъ рвотный камень (наибольшая доза—2 грана), или порошокъ рвотнаго корня (доза—отъ 2 до 10 гранъ), мѣдный или цинковый купоросъ (до 15 гранъ); изъ домашнихъ рвотныхъ средствъ, рвоту могутъ вызвать, наприм.: горчичный порошокъ (1—2 чайн. ложки на

чайный стаканъ воды), теплая мыльная вода, оливковое масло, нюхательный табакъ ($1\frac{1}{2}$ чайн. ложки на стаканъ красного вина), а также раздраженіе зѣва пальцемъ или чѣмъ либо подобнымъ, потряхиваніе больного.

Такъ какъ рвотный актъ сильно ослабляетъ организмъ, то рвотныя средства умѣстны лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда ядовитое вещество навѣрное еще находится въ желудкѣ.—Рѣдко приходится примѣнять слабительныя средства для удаленія яда изъ кишечника, равно какъ и мочегонныя.—При хроническихъ отравленіяхъ металлами, выведеніе послѣднихъ изъ организма возможно до нѣкоторой степени путемъ усиленія потоотдѣленія.

II. Антидотное лѣченіе состоитъ въ введеніи въ организмъ химическихъ и фізіологическихъ противоядій для ослабленія или уничтоженія дѣйствія ядовитаго вещества.

а) Къ химическимъ противоядіямъ относятся: 1) бѣлокъ, Химическія
противоядія. который съ большинствомъ металлическихъ и минеральныхъ солей образуетъ нерастворимыя соединенія и тѣмъ препятствуетъ ихъ всасыванію. Бѣлокъ въ такихъ случаяхъ дается въ большихъ количествахъ (изъ десятка яицъ въ литрѣ воды или молока).— 2) Дубильная кислота (танинъ), которая дѣлаетъ трудно-растворимыми большинство алкалоидовъ и сурьмовыхъ соединеній (15—30 гранъ); для той же цѣли можетъ служить отваръ изъ дубовой или ивовой коры или бобового кофе.— 3) Животный уголь въ состояніи связывать на короткое время нѣкоторые алкалоиды и ядовитые металлы.— Наружное примѣненіе хлорной воды или раствора хлорной извести можетъ быть полезнымъ при животномъ ядѣ, уничтожая его путемъ извлеченія водорода.— 4) Щелочные яды обезвреживаются кислотами, и наоборотъ—кислоты щелочами. Изъ кислотъ сподручнѣе всего бываютъ: уксусъ (1 ч. на 10 чч. воды), лимонный сокъ ($1\frac{1}{2}$ лимона на $\frac{1}{4}$ литра воды); изъ щелочей—двууглекислая сода (1 ч. на 20 част. воды); противъ щавелевой кислоты всего лучше известковая вода. 5) Противъ азотнокислаго серебра—поваренная соль; противъ мышьяка—свѣжеосажденная водная окись желѣза; противъ цианистой ртути—свѣжеосажденное сѣрное желѣзо съ магнезіей; противъ іода—крахмалъ; противъ фосфора—старый (озонированный) скипидаръ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ умѣстно еще и послѣдовательное промываніе желудка.

Все это—химическія противоядія.

**Физиологич.
противоядія.**

б) Изъ физиологическихъ же противоядій, вызывающихъ дѣйствіе противоположное ядовитому, надо упомянуть слѣдующія:

Морфій противъ атропина, аконитина, синильной кислоты, стрихнина. Атропинъ противъ физостигмина, пилокарпина и мускарина. Паралдегидъ противъ стрихнина. Камфора противъ шпанскихъ мухъ. Кофеинъ противъ наркотиковъ (противъ морфія, опія и т. п.). Салициловая кислота противъ спорыньи. Кокаинъ противъ аминнитрита.—Не всегда, однако, наблюдается и обратное или взаимное отношеніе; такъ, наприм., кураре и физостигминъ; оба они дѣйствуютъ какъ разъ противоположно на мышцы; однако, если ихъ ввести подкожно одновременно вмѣстѣ, то ядовитыя дѣйствія ихъ не утрачиваются, не уничтожаются взаимно, а только раньше дѣйствуетъ кураре и затѣмъ, $\frac{1}{2}$ часа спустя, физостигминъ уничтожаетъ дѣйствіе перваго.

**О гомеопатич.
антидотахъ.**

Сомнительно, являются ли приводимыя въ гомеопатическихъ лѣкарствѣднiяхъ такъ наз. физиологическія противосредства (антидоты) противоядіями при дѣйствительныхъ отравленіяхъ большими дозами, равно какъ сомнительно и то, обладаютъ ли высокія дѣленія свинца или ртути и т. п., „изгоняющей“ силой при соответствующихъ хроническихъ отравленіяхъ этими и т. п. металлами. Вопросъ о гомеопатическихъ антидотахъ далеко еще не разработанъ настолько, чтобы о немъ можно было сказать что либо опредѣленное. Одни авторы полагаютъ, что тутъ идетъ дѣло не такъ о противоядіяхъ, какъ скорѣе о противодачахъ, о средствахъ, даваемыхъ противъ гомеопатическихъ первичныхъ ухудшеній, а также для ослабленія и уничтоженія слишкомъ бурныхъ дѣйствій, случающихся при испытаніи лѣкарствъ на здоровыхъ людяхъ, въ слишкомъ большихъ дозахъ, и наконецъ, для излѣченія такъ наз. лѣкарственного истощенія организма (вродѣ морфинизма и т. п.), которое наблюдается только при лѣкарственномъ лѣченіи аліопатовъ и всего меньше можетъ относиться къ лѣкарствамъ въ гомеопатическихъ дозахъ. Поэтому иные не могутъ согласиться на терминъ „противодача“, вмѣсто противоядія. Ибо даже гомеопатическое первичное ухудшеніе должно бы являться только тогда, когда доза гомеопатическаго средства для даннаго, можетъ быть, очень чувствительнаго субъекта была слишкомъ велика, поэтому и произвела отравленіе. Надо, однако, сказать, что необычайно рѣдко наблюдаются въ практикѣ несомнѣнные случаи первичныхъ гомеопатическихъ ухудшеній. Предполагается, что антидотное воздѣйствіе лѣкарствъ другъ на друга вытекаетъ изъ гомеопатическаго принципа, изъ закона подобія, что, именно, физиологическія дѣйствія одного средства уничтожаются дѣйствіями другого въ здоровомъ и больномъ организмѣ—полностью или частью, смотря по болѣе или менѣе полно выраженному подобію. Такъ, наприм., камфора частью уничтожаетъ дѣйствіе шпанскихъ мухъ на мочевые органы, между тѣмъ какъ она не можетъ сдѣлать того же на другихъ слизистыхъ оболочкахъ. Однако, этотъ вопросъ, для окончательнаго своего разрѣшенія, нуждается еще въ дальнѣйшихъ основательныхъ изслѣдованіяхъ, доказательствахъ, въ несомнѣнно под-

тверждающих фактах. Считается, наприм., что дѣйствіе морфія имѣетъ свое подобіе въ дѣйствиі его антидотовъ — аконитина, атропина, стрихнина; такое подобіе является однако довольно поверхностнымъ; равнымъ образомъ трудно понять, почему именно камфора должна быть всеобщимъ гомеопатическимъ антидотомъ, равно какъ недостаточно обосновано подобіе быстропроходящаго дѣйствія этого вещества съ дѣйствіемъ Фосфор.-ацид., Барита-карб., Калькар.-карб. и даже съ меркуріальнымъ истощеніемъ организма.

Болѣе понятной является антидотность въ томъ смыслѣ, что дѣйствіе одного лѣкарства не такъ усиливаетъ или ослабляетъ, какъ скорѣе дополняетъ или видоизмѣняетъ дѣйствіе другого лѣкарства; на этомъ основано практикуемое въ гомеопатіи попеременное употребленіе средствъ, часто „антидотныхъ“ и тѣмъ не менѣе дающихъ въ сочетаніи несомнѣнный цѣлбный результатъ. Совмѣстимость или несовмѣстимость гомеопатическихъ лѣкарствъ исчерпывается тѣми тремя положеніями, которыя приведены на стр. 29-ой.

III. При отравленіяхъ бываетъ полезно также симптоматическое лѣченіе. Такъ, мѣстнымъ смягчительнымъ средствомъ при воспаленіи, вызванномъ ѣдкимъ веществомъ, является гуммозный порошокъ (по чайной ложкѣ съ водой), или растворъ арабской камеди (гумми-арабикъ) — 1—2 столовыхъ ложки на стаканъ воды, или остуженный настой изъ алтейнаго корня, или жидкій крахмальный клейстеръ, овсяный слизистый отваръ, молоко и растворъ бѣлка (изъ 10—12 яицъ на литръ воды). Мѣстное воспаленіе облегчается льдомъ или ледяной водой, полезными и противъ чрезмѣрной рвоты. Боли отъ отравленія облегчаются обыкновенно лишь опиѣмъ или морфіемъ. При отравленіи наркотическимъ веществомъ (опій, морфій) показаны теплыя укутыванія и растиранія тѣла. — При потерѣ сознанія и обморочномъ состояніи — холодныя обливанія затылка съ держаніемъ ногъ въ горячей водѣ, растиранія тѣла, нашатырный спиртъ, кофе, чай, вино, камфора, подкожныя впрыскиванія эфира или камфоры, мускусъ. При судорогахъ отъ отравленія: опій, хлоралгидратъ, хлороформъ. При слабомъ дыханіи — искусственнсе дыханіе (стр. 105), холодныя обливанія, фарадизація грудобрюшнаго нерва (отрицательный электродъ на подложечную ямку, положительный на переднюю (сбоку) часть шеи; все — при низкомъ положеніи головы (вслѣдствіе малокровія мозга).

IV. О гомеопатическомъ лѣченіи отравленій можно идти рѣчь лишь въ отношеніи остающихся послѣ нихъ болѣзненныхъ состояній, при чемъ лѣкарства назначаются по общимъ правиламъ, или въ видѣ извѣстныхъ соответствующихъ антидотовъ (см. „Лѣкарствовѣдніе“).

Симптоматическое лѣченіе отравленій.

Гом. лѣченіе отравленій.

Отравленія въ отдѣльности.

Изъ отдѣльныхъ отравленій тутъ приводятся лишь главнѣйшія, наиболѣе часто встрѣчающіяся.

Угарь.

Отравленіе угарнымъ газомъ (угарь). Первое, что ощущается угорѣвшимъ, это — жженіе въ лицѣ, съ дурнотой и постепенно усиливающеюся головной болью, особенно въ вискахъ, съ пульсацией въ послѣднихъ, также мельканіе искръ передъ глазами, шумъ въ ушахъ, помраченіе и потеря сознанія. Потерѣ сознанія предшествуетъ сильная тоска, дурнота, рвота, возбужденное состояніе. Отъ благополучно перенесшихъ угарное отравленіе можно слышать иной разъ оставшееся у нихъ воспоминаніе о предшествовавшемъ потерѣ сознанія радостномъ чувствѣ съ экстазомъ. — Кожа отравленныхъ, особенно на лицѣ, въ началѣ красна отъ переполненія кровью, при потерѣ же сознанія она большей частью бываетъ блѣдна, и лишь подъ конецъ жизни дѣлается багровой и синей.

Въ легкихъ случаяхъ отравленія угарнымъ газомъ достаточнымъ пособіемъ является удаленіе отравленного изъ угарнаго помѣщенія въ другое, хорошо провѣтренное, или на открытый воздухъ. Въ случаяхъ болѣе тяжелыхъ требуется еще продолжительное производство искусственного дыханія (стр. 105) и раздраженіе кожи опрыскиваніемъ холодной водой, растираніями и пр. Въ случаѣ остающихся послѣ отравленія болѣзненныхъ состояній, послѣднія надо лѣчить по общимъ гомеопатическимъ правиламъ.

Отравленіе
опіемъ или
морфіемъ.

Отравленіе опіемъ и морфіемъ. По своему дѣйствію, оба эти яда очень сходны между собою. Отравленія ими, принадлежатъ большей частью къ медицинскимъ (см. выше). Далѣе надо знать, что имѣются такія преступно-лѣнивыя няньки, которыя даютъ своимъ питомцамъ, съ цѣлью усыпленія ихъ, настой маковыхъ головокъ. Восприимчивость къ этимъ ядамъ бываетъ у людей очень различная, въ зависимости отъ индивидуальности; она сравнительно не велика у душевно-больныхъ, а также при столбнякѣ, бѣлой горячкѣ, водобоязни, отравленіяхъ стрихниномъ, атропиномъ, также при ракѣ, при болѣзняхъ брюшины, при невралгіяхъ и др. Восприимчивость уменьшается также по мѣрѣ привыканія къ опію или морфію (морфинизмъ). — Дѣти, чѣмъ они моложе, тѣмъ болѣе восприимчивы къ этимъ ядамъ. Въ литературѣ имѣются случаи смерти дѣтей даже отъ $\frac{1}{90}$ грана опія или отъ 1 капли опійной настойки

Явленія остраго отравленія опіємъ или морфіемъ слагаются изъ первоначальнаго болѣе или менѣе продолжительнаго возбужденія и послѣдовательнаго угнетенія нервныхъ центровъ до степени глубокаго сна или непробудной спячки (кома) или, наконецъ, до полнаго угасанія жизни. Поворотъ къ выздоровленію выражается улучшеніемъ дыханія и пульса и постепеннымъ ослабленіемъ коматознаго состоянія. Можетъ, однако, случиться и такъ, что больной приходитъ въ себя, и ужъ кажется, что выздоровѣетъ, а тѣмъ не менѣе дѣло оканчивается смертію вслѣдствіе новаго припадка комы, завершающейся общимъ параличемъ.

Кома.

Привычное употребленіе морфія, (морфинизмъ) или опіофагія (опіоиднѣе) вызываетъ явленія хроническаго отравленія тѣмъ или другимъ. Явленія опіофагіи состоятъ главнымъ образомъ въ общемъ исхуданіи, блѣдномъ, полиняломъ цвѣтѣ лица, въ вялости мышцъ, отсутствіи аппетита, упадкѣ питанія, въ упорныхъ запорахъ вначалѣ, а затѣмъ въ поносахъ, похожихъ на дизентерію. Къ этому присоединяется рядъ мозговыхъ явленій: капризное дурное настроеніе, головокруженіе, головная боль, всевозможныя невральгіи, ослабленіе памяти, притупленіе умственныхъ способностей, потеря силъ и воли; нравственное чувство пропадаетъ; далѣе развиваются параличи, болѣзни мочевого пузыря и т. д. У морфинистовъ главнымъ образомъ поражается нервномозговая и душевная система при довольно долго еще сохраняющемся аппетитѣ и удовлетворительномъ на видъ питаніи, но въ концѣ концовъ и у нихъ развивается общій развалъ организма. Куреніе опія (видъ опіофагіи) ведетъ къ тѣмъ же плачевнымъ результатамъ.— Морфинизмъ участился до громадныхъ размѣровъ съ тѣхъ поръ, какъ подкожное впрыскиваніе морфія въ болѣзняхъ вошло въ общее употребленіе.

Морфинизмъ.

При остромъ отравленіи черезъ полость рта и желудокъ прежде всего надо опорожнить послѣдній — всего лучше посредствомъ желудочнаго насоса, такъ какъ рвотныя средства могутъ усилить въ значительной мѣрѣ упадокъ силъ, происходящій отъ дѣйствія яда. Кромѣ того, примѣняется таннинъ и проч., какъ связывающія ядъ средства (см. стр. 609). Надо стараться не давать развиваться наркозу, для чего два человѣка водятъ больного подолгу по комнатѣ, но это возможно лишь до наступленія коматознаго состоянія. При послѣднемъ — средства возбуждающія нервные центры: черное хрѣпкое кофе, эфиръ и т. п.—Атронинъ можетъ быть антидотомъ морфія только въ малыхъ дозахъ, такъ

Лѣченіе остраго отравленія морфіемъ.

какъ въ большихъ онъ имѣетъ такое же парализующее дѣйствіе на сердце, какъ и морфій въ такихъ же дозахъ.

**Лѣченіе
морфинизма.**

Лѣченіе хроническаго отравленія морфіемъ (или опиѣмъ) сопряжено съ громадными трудностями, потому, именно, что отвыканіе отъ него необычайно трудно. Почти безнадежны тѣ случаи, въ которыхъ не удастся пріостановить пріемы того или другого яда; не удастся же это потому, что общее изнеможеніе при такой пріостановкѣ пріобрѣтаетъ угрожающій характеръ. Въ томъ и другомъ случаѣ примѣняются возбуждающія и укрѣпляющія средства: кофе, вино, камфора; кромѣ того: Фосфориацид., Каннабисъ инд., Нуксъ вомика и другія, смотря по особенностямъ каждаго отдѣльнаго случая.

**Отравленіе
кокаиномъ.**

Отравленіе кокаиномъ. Въ зависимости отъ степени (дозы) отравленія являются слѣдующіе симптомы: возбужденіе или опьянѣніе, веселость, болтливость, бредъ и буйство, съ послѣдующимъ сномъ и недомоганіемъ; или упадокъ силъ съ головокруженіемъ до обморока; или судороги; эти троякой формы явленія отравленія могутъ и сочетаться. Въ конечномъ результатѣ сильнаго отравленія является непробудная спячка, коматозное состояніе. Лѣченіе: металлическое удаленіе яда изъ организма. Химическое связываніе его танниномъ съ углекислымъ или уксуснокислымъ натромъ; при упадкѣ сердечной дѣятельности—камфора, амилъ-нитритъ; при коматозномъ состояніи — холодныя обливанія; при судорогахъ — бромистый калий.

**Отравленіе
мышьякомъ.**

Отравленіе мышьякомъ (французской зеленью). При остромъ отравленіи, спустя $\frac{1}{2}$ —2 часа послѣ попаданія яда въ желудокъ, являются признаки желудочно-кишечнаго воспаленія, такіе, именно, какъ при сильной азіатской холерѣ: жестокая боль подъ ложечкой, рвота, обильные жидкіе поносы; мышьяковое отравленіе отличается отъ холеры тѣмъ, что при первомъ испражненіи обыкновенно кровянистыя и въ нихъ можно доказать присутствіе мышьяка, при холерѣ — испражненія лишь очень рѣдко бываютъ кровянистыми, содержатъ желчь; сомнѣніе въ происхожденіи болѣзни можетъ быть лишь при господствующей эпидеміи холеры. Имѣется также сходство между симптомами отравленія мышьякомъ и отравленія сулемой, съ той разницей, между прочимъ, что сулемовыя явленія обнаруживаются обыкновенно моментально послѣ принятія яда, и теченіе значительно болѣе бурное (см. ниже — отравленіе ртутью). Дальнѣйшими, послѣдовательными явленіями отравленія могутъ быть: параличи, потеря чув-

ствительности, разнаго рода пораженія кожи и слизистыхъ оболочекъ, хроническій катарръ и язвы желудка и кишекъ, общее исхуданіе.—Хроническое отравленіе мышьякомъ можетъ являться у рабочихъ на мышьяковыхъ фабрикахъ, отъ приемовъ мышьяка, какъ лѣкарства, въ крупныхъ дозахъ, отъ проживанія въ комнатахъ, оклеенныхъ зелеными обоями, содержащими мышьякъ и проч. Первымъ признакомъ является обыкновенно воспаленіе слизистой оболочки глазъ, затѣмъ разстройство пищеваренія и питанія. Больные жалуются на боли въ надбрюшіи, на ощущеніе сухости и стѣсненіе въ горлѣ, на тошноту и рвоту; они худѣютъ и теряютъ силы. Далѣе являются головная боль, страхъ, тоска, охриплость, кашель. Волосы и ногти выпадаютъ, кожа покрывается высыпями, и въ ней ощущается какъ-бы ползаніе мурашекъ, члены дрожатъ, расслабляются, отекаютъ.

Лѣченіе должно быть механическое и химическо-фізіологическое въ острыхъ случаяхъ отравленія (см. выше) и симптоматическое въ хроническихъ, а также противъ послѣдствій остраго отравленія.

Отравленіе ртутью. Меркуріализмъ. Чаше всего отравленіе случается отъ нечаянной замѣны каломеля сулемой, также отъ одновременнаго приема каломеля, какъ слабительнаго средства, и хлористаго препарата, наприм. — соляной кислоты), или отъ употребленія большихъ дозъ ртутныхъ препаратовъ или отъ приема сулемы — нечаяннаго или съ цѣлью самоотравленія. Сулема дѣйствуетъ какъ сильно раздражающій и прижигающій ядъ и вызываетъ симптомы жестокаго воспаленія желудка и кишекъ. Уже во рту она вызываетъ металлическій вкусъ, ощущеніе жженія, затрудненіе глотанія и рѣчи. Языкъ припухшій съ сѣровато-бѣлымъ налетомъ, простирающимся и на всю полость рта и глотку. Въ животѣ появляется сильнѣйшая рѣзь и онъ сильно вздувается; при этомъ безпрестанная рвота бѣлыми, часто и кровавыми массами; поносъ очень напоминаетъ поносъ дизентерическій; отдѣленіе мочи задерживается и въ ней содержится бѣлокъ. Ко всему этому присоединяются сильная тоска, слабость, бредъ, подергиванія, обмороки, потеря кожной чувствительности, икота; при такихъ явленіяхъ наступаетъ смерть спустя 2 до 10 часовъ, а то и всего лишь минутъ 30 послѣ принятія яда, но иной разъ муки отравленія длятся цѣлыми днями, даже до двухъ недѣль. — При затянувшемся теченіи ртутнаго отравленія, а также при длительномъ употребленіи не смертельныхъ дозъ ртути получается картина медленнаго разрушенія организма въ самыхъ

**Отравленіе
ртутью.**

разнообразныхъ формахъ, въ зависимости отъ индивидуальности организма, начиная отъ язвеннаго воспаленія рта и слюнотеченія и кончая общимъ истощеніемъ (меркуріальная кахексія). Лѣченіе при остромъ отравленіи должно быть прежде всего механическое и химическое (молоко, бѣлокъ, древесный уголь, свѣжеосажденное сѣрнистое желѣзо); затѣмъ, и въ случаяхъ хроническаго отравленія—фізіологическое: іодистый кали, сѣрные препараты, сѣрные и соленныя ванны, паровыя ванны и проч.

Отравленіе спиртомъ (алкоголемъ) стр. 169.

Отравленіе кислотами. Противоядіе—щелочи, стр. 609.

Отравленіе щелочами. Противоядіе—кислоты, стр. 609.

**Отравленіе
колбаснымъ
ядомъ.**

Отравленіе колбаснымъ ядомъ. Испорченныя колбасы имѣютъ на свѣжихъ разрѣзахъ грязный сѣро-зеленоватый цвѣтъ и маркую мягкость, на подобіе сыра. Запахъ отъ нихъ, какъ отъ гнилого сыра, вкусъ—противный. Теченіе явленій отравленія этимъ ядомъ не скоротечное, нерѣдко хроническое, длительное. Первые признаки являются 18—24 часа послѣ принятія испорченной пищи. Время скрытаго періода колеблется между 1 и 9 днями, выражаясь желудочными и нервными расстройствами, особенно послѣдними. Между прочимъ разстраивается и зрѣніе, которое ослабляется и двоится, являются искры передъ глазами, движеніе глазъ затруднено, верхнее вѣко опущено и не можетъ подниматься (вслѣдствіе паралича), зрачки расширены. Парализуются и мышцы, языка, глотки и гортани. Дѣятельность сердца ослабляется и т. д. пока въ коматозномъ состояніи не наступитъ смерть. При благополучномъ оборотѣ болѣзни выздоравливаніе идетъ очень медленно. Въ первое время послѣ отравленія необходимы энергическія опорожненія пищеварительныхъ путей, а въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни симптоматическое лѣченіе.

**Отравленіе
рыбн. ядомъ.**

Отравленіе рыбнымъ ядомъ, также сырнымъ, сходно съ отравленіемъ колбасн. ядомъ и лѣчится тѣми же способами.

**Отравленіе
ядовитыми
грибами.**

Отравленіе испорченными грибами вызываетъ явленія сильнѣйшаго желудочно-кишечнаго катарра спустя 6—8 часовъ, рѣдко раньше, но за то часто позже—чрезъ 18—24 часа. Болѣзнь начинается жестокими коликами живота, тошнотой и слюнотеченіемъ, за которыми слѣдуетъ рвота, упорная, многократная, и такъ до 3 дней и болѣе. Вскорѣ же являются поносы, упорные, водянистые, холероподобные. Исходъ отравленія въ большинствѣ случаевъ, однако, благопріятный. Лѣченіе сводится къ возможно быстрому выведенію испорченной пищи изъ желудка и кишекъ. Въ остальномъ лѣченіе симптоматическое.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

**Общія основы діэты
и
способы примѣненій
вспомогательныхъ мѣръ.**

СОДЕРЖАНІЕ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

I. Общія основы нормальной діеты.

II. Лѣчебныя діеты.

- 1) Обезжиривающая діета: а.— Гарвей-Бентинга; б.— Шрота; в.— Эртеля
г.—Эбштейна; д.— Ламана.
- 2) Упитывающая діета Вейръ Митчеля.
- 3) Вегетарианская діета.
- 4) Молочная діета.—Кефиръ.—Кумысъ.

III. Способы примѣненій вспомогательныхъ мѣръ.

A. Наружныя примѣненія воды.

Обмыванія. Компрессы. Обертыванія. Ванны. Паровыя ванны. Холодныя обтиранія. Обливанія.

Б. Внутреннія примѣненія воды.

Питье воды съ лѣчебной цѣлью. Полосканія водой. Промыванія органовъ. Клистиры.

В. Массажъ и Лѣчебная гимнастика.

I. Общія основы нормальной діеты.

Діета или цѣлесообразный пищевой укладъ обусловливается жизненными потребностями организма, послѣднія же въ свою очередь регулируются присущимъ организму процессомъ обмѣна веществъ. Процессъ обмѣна веществъ въ организмѣ состоитъ изъ послѣдовательнаго ряда претерпѣваемыхъ вводимыми въ него пищевыми веществами измѣненій (пищевой метаморфозъ) и усвоения необходимыхъ ему составныхъ частей этихъ веществъ (ассимиляція). Пока организмъ здоровъ, обмѣнъ веществъ происходитъ въ немъ правильно, въ противномъ случаѣ правильный ходъ его нарушается, и наоборотъ—пока обмѣнъ веществъ происходитъ правильно, организмъ здоровъ, но какъ только онъ нарушенъ организмъ заболѣваетъ.

**Обмѣнъ
веществъ.**

Правильный обмѣнъ веществъ обусловливается прежде всего правильнымъ пищевареніемъ; для правильнаго же пищеваренія требуется прежде всего правильный составъ пищи и питья.

Каждое пищевое вещество заключаетъ въ себѣ вообще бѣлокъ, жиръ, углеводы, воду и соли. Бѣлокъ въ свою очередь состоитъ химически изъ углерода, водорода, азота, кислорода и сѣры, а также фосфора и желѣза; жиры и углеводы—изъ углерода, кислорода и водорода; вода—изъ водорода и кислорода; соли—изъ ряда соединений калия, натрія, кальція (извести), земель (преимущественно магнезій), желѣза, фосфора, сѣры, кремня, хлора.

**Составъ
пищевыхъ
веществъ.**

Подъ бѣлкомъ разумѣютъ не только бѣлокъ яйца: бѣлокъ находится во всѣхъ пищевыхъ веществахъ и бываетъ разнаго рода, съ разными химическими и физиологическими свойствами; такъ, къ бѣлкамъ относятся альбумины, пептоны, фибринъ и проч. То же надо сказать о жирахъ и углеводахъ. Къ послѣднимъ, напр., относятся всѣ сахаристыя вещества, а также декстринъ, крахмалъ, гумми, клѣтчатка и проч., которые въ организмѣ переходятъ въ сахаръ. Это превращеніе въ сахаръ весьма важно для пищеваренія и начинается уже во рту подъ вліяніемъ слюны. Поэтому-то весьма важно тщательное разжевываніе пищи.

Въ желудкѣ пищевареніе происходитъ подъ вліяніемъ отдѣляемыхъ железами желудка пепсина и соляной кислоты и продолжается въ кишечникѣ подъ вліяніемъ желчи (продукта печени), которая дѣлаетъ удобовсасываемыми особенно жиры. Тутъ же дѣйствуетъ весьма важный пищеварительный сокъ, отдѣляемый поджелудочной желѣзой и обладающій свойствами слюны, желудочныхъ соковъ и желчи. Подъ воздѣйствіемъ всѣхъ

**Процессъ
пищеваренія.**

этихъ соковъ пища превращается въ концѣ концовъ въ пищевую гущу (кашицу), изъ которой, на дальнѣйшемъ протяженіи кишечнаго канала (имѣющаго въ длину 5—6 метровъ), питательныя части пищевой кашицы всасываются усѣянными на слизистой оболочкѣ его лимфатическими желѣзками и, путемъ лимфатической и кровеносной системы, распространяются по всему организму, для возмѣщенія въ немъ тканей, ставшихъ негодными и выдѣляемыхъ, въ видѣ конечныхъ продуктовъ разложенія, почками, кожей и легкими. Остатки пищевой кашицы, которые не всосались, отходятъ, какъ отбросы пищеварительнаго производства, изъ кишечника вонъ.

О значеніи минеральныхъ солей для питанія. Бѣлокъ считается главнѣйшимъ питательнымъ веществомъ, но не въ томъ смыслѣ, чтобы преимущественно или исключительно бѣлками члѣовѣкъ могъ жить; точно также члѣовѣкъ не могъ бы жить, питаясь одними жирами, одними углеводами, однѣми солями, или одной водой. Дѣло сводится къ надлежащему, наиболѣе здоровому пропорціональному сочетанію всѣхъ этихъ составныхъ частей пищи. Въ этомъ отношеніи новѣйшая діететика много обязана врачу-природнику д-ру *Lahmann* у (*Dresden*), впервые указавшему на надлежащую роль минеральныхъ солей въ питаніи организма^{*)}. До Ламана фізіологи не придавали особеннаго значенія этимъ солямъ и знали лишь объ общемъ ихъ содержаніи въ пищѣ, но не знали ни ихъ процентнаго состава, ни того, сколько ихъ нужно члѣовѣку для нормальнаго его питанія.

Научно-поставленными опытами и вычисленіями д-ръ Ламанъ доказалъ, что обычная питательная смѣсь (смѣсь пищевыхъ веществъ), образцомъ которой является молоко, представляетъ у европейскихъ народовъ не только абсолютный недостатокъ (меньшее содержаніе) минеральныхъ солей, но, что главнѣе всего, и самый составъ послѣднихъ совершенно уклоняется отъ нормы, отъ того, какъ должно бы быть по самой природѣ организма, по его составу.

Вслѣдствіе этого, по мнѣнію Ламана, развивается благоприятная почва для развитія болѣзней, именно диземія, т. е. испорченность крови, ненормальный химическій ея составъ, влекущій за собою и химически-ненормальный составъ тѣла вообще.

Недостатокъ, равно какъ и ненормальный составъ питательныхъ солей, можетъ быть однако легко выравненъ прибавкой къ пищѣ корневой или листовой зелени, салатовъ, плодовъ, такъ какъ эти вещества содержатъ минеральныя соли и въ болѣшихъ количествахъ и въ болѣе выгодномъ для организма процентномъ содержаніи натрія и кальція (извести) т. е. главнѣйшихъ изъ недостающихъ въ обычной пищѣ солей.

*) D-r. H. Lahmann; „Die diätetische Blutentmischung als Grundursache aller Krankheiten“.

Изъ сказаннаго ясно, чѣмъ слѣдуетъ руководствоваться при выборѣ пищевыхъ веществъ для возможно болѣе здороваго питанія.

**О выборѣ
пищевыхъ
веществъ.**

Вообще говоря, выборъ этотъ не трудно сдѣлать и такимъ образомъ, чтобы онъ соотвѣтствовалъ современнымъ физиологическимъ требованіямъ относительно бѣлковъ, жира и углеводовъ и въ то же время содержалъ достаточное количество минеральныхъ солей.

Это достигается, какъ сказано, прибавленіемъ къ пищѣ достаточнаго количества зелени и фруктовъ, при томъ лишь, однако, условіи, чтобы способъ приготовленія пищевыхъ веществъ былъ правильный, а главное, — чтобы при варкѣ не выщелачивались изъ нихъ минеральныя соли, какъ это обыкновенно бываетъ.

На нижеслѣдующей таблицѣ дается примѣръ нормальнаго дневнаго раціона, соотвѣтствующаго составу молока.

Въ приведенномъ раціонѣ можно бы съ пользою для организма большую часть мяса *) или чечевицы, а также хлѣба и муки замѣнить плодами или свѣжими овощами, такъ какъ такимъ путемъ содержаніе извести въ питательной смѣси увеличится, а содержаніе капія уменьшится, чѣмъ легко достигнуть состава надлежащихся въ молоко солей.

Дальнѣйшей обычной погрѣшностью въ пищевомъ режимѣ является чрезмѣрное употребленіе жидкостей (воды) и поваренной соли. Чрезмѣрная потребность людей въ томъ и другомъ объясняется недостаткомъ минеральныхъ солей въ общепринятой пищѣ. Обыкновенно употребляютъ до 25 грам. (около 2 лотовъ) соли на человѣка въ день. Такое количество ея слѣдуетъ считать ядомъ для организма, ибо изъ клѣточекъ и тканей послѣдняго извлекаются солюы органическія и неорганическія вещества, которыя, какъ уже ненужные тѣлу продукты, выводятся изъ него почками. Поэтому употребленіе поваренной соли надо довести до крайней малости, что легко достигается богатой минеральными питательными солями пищей.

**Вредъ чрезм.
употребленія
жидкостей и
поварен. соли.**

Поваренная соль, принимаемая въ излишкѣ, есть также причина чрезмѣрнаго введенія въ организмъ воды для, такъ сказать, промывки тканей отъ накопившихся въ немъ вредныхъ продуктовъ ненормальнаго обмѣна веществъ.

Вслѣдствіе же чрезмѣрнаго введенія воды въ организмъ получается не только диземія, т. е. испорченность состава крови, но и гидремія, т. е. разжиженіе ея, ибо, не смотря на усиленную дѣятельность сердца и почекъ, выдѣленіе жидкости изъ тѣла идетъ слишкомъ медленно, въ сравненіи съ вновь вводимыми жидкостями (см. стр. 625).

*) При преимущественно мясной пищѣ въ крови накапливается излишекъ калийныхъ, желѣзныхъ и фосфорныхъ соединений, въ то время какъ содержаніе натронныхъ и известковыхъ уменьшается, падаетъ ниже нормы. Такое состояніе крови не можетъ считаться здоровымъ.

ДНЕВНОЙ РАЦИОНЪ.		Бѣлокъ.	Жиръ.	Углероды.	Общая зола.	Калій.	Натрій.	Кальцій.	Магnezія.	Желѣзо.	Фосфоръ.	Хлоръ.
		В ъ г р а м м а х ъ.										
200	граммъ хлѣба (ржаного и пшеничнаго) .	12,20	0,85	98	2,89	1,06	0,05	0,03	0,22	0,06	1,41	—
212	„ мяса или 160 } мясо	39,20	26,30	—	2,10	0,80	0,21	0,05	0,07	0,01	0,90	0,01
	гр. чечевицы } чечевица	41,20	3,20	86	4,68	1,68	0,64	0,32	0,12	0,10	2,00	0,24
250	„ цѣльнаго молока	8,30	9,00	12	1,70	0,40	0,16	0,35	0,05	0,01	0,46	0,23
100	„ муки къ блюдамъ	11,50	1,00	72	1,00	0,30	—	0,06	0,12	—	0,50	—
250	„ картофеля	4,90	—	52	2,00	1,20	0,04	0,04	0,09	0,02	0,38	0,05
200	„ шпината	5,00	1,16	10	4,18	0,70	1,45	0,50	0,25	0, 3	0,42	0,25
40	„ шоколада или какао.	2,00	7,00	35	1,00	0,40	0,02	0,05	0,17	—	0,40	0,01
150	„ кочаннаго салата	2,00	0,50	5	1,55	0,66	0,13	0,26	0,10	0,09	0,15	0,13
200	„ крыжовника (или земляники или черники)	1,56	—	12	2,04	0,80	0,22	0,28	0,13	0,10	0,44	0,01
100	„ сухихъ винныхъ ягодъ	4,01	—	50	2,86	0,80	0,80	0,51	0,25	0,04	0,04	0,08
50	„ творогу	12,52	2,65	1,8	1,75	0,22	0,02	0,60	0,04	0,01	0,66	0,12
50	„ рѣдиси	0,60	0,07	2,0	0,37	0,11	0,07	0,05	0,01	0,01	0,04	0,03
40	„ масла коровьяго	—	33,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Смѣшанная пища (считая мясо во второй графѣ).		103,79	81,43	349,8	23,44	7,45	3,17	2,78	1,50	0,48	5,80	1,01
Правильная вегетаріанская пища (считая во второй графѣ чечевицу		105,79	58,33	435,8	26,20	8,33	3,60	3,05	1,55	0,57	6,90	1,15

Очень важна и предложенная Ламаномъ кухонная реформа, Способъ при которую слѣдовало бы ввести въ интересахъ наибольшей пита-готовленія з тельности приготовляемой пищи *). Ошибочно мнѣніе, будто вся-лени и оовоще каго рода зелень и овощи трудно переваримы. Общеизвѣстно, на-противъ того, что зеленый листовой салатъ, красная и бѣлая капуста легко перевариваются, если они приготовлены съ малымъ количествомъ уксуса, или еще лучше—съ свѣжимъ лимоннымъ сокомъ. Если же эта зелень становится труднопереваримой, то причина тому не что иное, какъ лишь неправильное кухонное приготовленіе, при которомъ теряются питательныя соли. Всякую зелень слѣдуетъ не вымачивать и варить, а лишь тушить, жарить или готовить на пару. Послѣ надлежащаго ея размягченія заправляютъ ее какимъ либо соусомъ изъ масла или молока или крѣпкаго бульона и т. п. Варка въ большомъ количествѣ воды, если хотятъ достигнуть бѣлаго цвѣта, потребуетъ лишь при цвѣтной капустѣ, обвариваніе же кипяткомъ нужно лишь при слишкомъ душистомъ шпинатѣ. Словомъ, свѣжую листовую зелень надо по возможности готовить такъ, какъ овощи, которые также большею частію лишь тушатся, варятся въ собственномъ соку или жарятся. При такомъ способѣ можетъ быть значительно ограничено употребленіе поваренной соли, которая обычно служитъ лишь къ выщелачиванію зелени; она потребуется развѣ лишь при картофелѣ и бобовыхъ плодахъ и, въ самомъ незначительномъ количествѣ, въ другихъ блюдахъ. При такомъ режимѣ совершенно достаточны 3,5 грамма поваренной соли на человѣка въ сутки (вмѣсто обычныхъ 20—25 граммъ). Недостатокъ ея не ощущается, а, когда надо, онъ замѣщается безвредными растительными пряностями.

Ниже (стр. 624 и 625) приводится таблица процентнаго содержанія составныхъ частей разныхъ питательныхъ веществъ. На основаніи всего сказаннаго, таблицей этой можно съ пользою руководствоваться при выборѣ и установленіи здороваго питательнаго режима.

Что касается вопроса, откуда предпочтительнѣе извлекать необходимое количество бѣлковъ, жировъ, углеводовъ и солей, изъ пищи ли мясной или растительной, то большинство врачей склоняется къ тому мнѣнію, что въ здоровомъ состояніи человѣкъ долженъ питаться равномѣрно смѣшанной пищею. Такъ какъ мясо содержитъ мало углеводовъ, то при питаніи исключительно мясомъ человѣкъ терялъ бы въ силахъ и худѣлъ бы, такъ какъ на образованіе силъ онъ расходовалъ бы жиръ и прочія ткани собственного тѣла. Чрезмѣрное употребленіе мяса насыщаетъ кровь бѣлкомъ и, несмотря на ускоренный и усиленный обмѣнъ веществъ, организмъ не успѣваетъ выводить излишка его, равно какъ негодныхъ конечныхъ продуктовъ метаморфоза. Послѣдствіемъ злоупотребленія мясомъ является поэтому развитіе золотухи, а также

*) Въ продажѣ имѣется „Гигіеническая поваренная книга“, составленная по системѣ д-ра Ламана.

ПИЩЕВЫЯ ВЕЩЕСТВА	Процентный составъ пищевыхъ веществъ					Процентный составъ минеральныхъ солей, означенныхъ въ 5-й графѣ								
	Вода	Бѣлокъ	Жиръ	Углеводы	Минеральныя соли	Кали	Натрій.	Кальцій (известь).	Магnezия (земли)	Желѣзо	Фосфоръ	Сѣра	Кремeнь	Хлоръ
а Коровье молоко { Какъ нормальное питательное вещество	87,42	3,41	3,65	4,81	0,72	24,67	9,70	22,05	3,05	0,55	28,45	0,30	0,04	14,28
Женское молоко {	87,02	2,36	3,94	6,23	0,45	33,79	9,12	16,69	2,16	0,22	22,66	0,95	0,02	18,38
б Овощи и салаты														
Савойская капуста	87,09	3,31	0,71	6,02	1,64	27,50	10,16	21,38	3,59	1,73	14,75	8,20	4,78	7,91
Бѣлая капуста	89,97	1,89	0,20	4,87	1,23	36,86	9,46	17,63	4,00	0,69	8,99	13,91	0,87	8,51
Шпинатъ	88,47	2,49	0,58	4,44	2,00	16,56	35,23	11,88	6,38	3,35	10,25	6,87	4,52	6,20
Цвѣтная капуста	90,89	2,48	0,34	4,55	0,83	44,36	5,89	5,58	3,66	1,02	20,22	13,01	3,76	3,44
Крапива	82,44	5,50	0,67	7,13	2,30	32,04	2,39	28,24	7,16	4,77	7,84	8,35	4,03	6,66
Одуванчикъ	85,54	2,81	0,69	7,45	1,90	38,86	10,44	19,96	8,38	0,86	7,84	2,24	7,01	2,65
Спаржа	93,75	1,79	0,25	2,63	0,54	24,04	17,08	10,85	4,32	3,38	18,57	6,18	10,09	5,93
Огурцы,	95,60	1,02	0,09	2,28	0,39	41,16	10,04	7,30	4,15	1,40	20,00	6,92	8,03	6,59
Латукъ и полевой салатъ	93,41	2,09	0,41	2,73	0,49	46,01	9,43	6,05	2,17	—	8,52	3,89	20,23	4,75
Кочанный салатъ	94,33	1,41	0,31	2,19	1,03	37,63	7,54	14,68	6,19	5,21	9,19	3,76	8,14	7,65
Римскій салатъ	92,50	1,26	0,54	3,55	0,98	25,30	35,30	11,86	4,33	1,26	10,90	3,87	2,99	4,19
Поррей, чеснокъ	87,62	2,83	0,29	6,53	1,24	30,72	14,15	10,37	2,92	7,61	16,69	7,35	7,36	3,11
Лукъ	85,99	1,68	0,10	10,82	0,71	34,03	2,48	22,87	4,65	2,27	17,35	5,68	8,50	2,41
в Клубневые растенія и корни.														
Рѣдиска	93,34	1,23	0,15	3,79	0,74	32,00	21,15	14,94	3,10	2,84	10,86	6,47	0,91	9,15
Рѣдька	86,92	1,92	0,11	7,43	1,07	21,98	3,75	8,78	3,53	1,16	41,12	7,71	8,17	4,90
Сельдерей	84,09	1,48	0,39	11,80	0,84	43,19	—	13,11	5,82	1,41	12,83	5,58	3,85	15,87
Картофель	75,48	1,95	0,15	20,72	0,95	60,06	2,96	2,64	4,93	1,10	16,86	6,52	2,04	3,46
Земляная груша	79,59	1,98	0,13	15,66	1,17	47,74	10,16	3,28	2,93	3,73	14,00	4,91	10,03	3,87
Свекла.	89,90	3,52	0,14	11,34	1,28	46,93	5,65	11,33	3,68	0,61	14,51	9,62	1,06	6,59
Морковь	87,05	1,04	0,21	9,40	0,90	36,92	21,17	11,34	4,38	1,01	12,79	6,45	2,38	4,59
Кольраби	85,89	4,87	0,21	8,18	1,17	35,31	6,54	10,97	6,84	3,03	21,90	8,85	2,48	4,95

г Теряиетые и стручковые плоды

Озимая пшеница	13,65	12,35	1,75	67,91	1,81	31,16	2,07	3,25	12,06	1,28	47,22	0,39	1,96	0,32
Озимая рожь	15,06	11,52	1,79	67,81	1,81	32,10	1,47	2,94	11,22	1,24	47,74	1,28	1,37	0,48
Озимый ячмень	13,77	11,14	2,16	64,93	2,62	16,33	4,14	0,74	12,53	1,72	32,82	2,98	28,74	—
Овесъ .	12,37	10,41	5,23	57,78	3,02	17,90	1,66	3,60	7,13	1,18	25,64	1,78	39,18	0,94
Маисъ	13,12	9,85	4,62	68,51	1,51	29,78	1,10	2,17	15,52	0,76	45,61	0,78	2,09	0,91
Рисъ	13,11	7,85	0,88	76,52	1,01	25,04	4,21	3,73	11,08	1,43	53,76	0,50	2,59	0,13
Просо (пшено)	11,66	9,25	3,50	65,95	1,67	11,39	1,30	0,63	9,63	1,08	21,92	0,24	52,97	0,49
Горохъ	14,99	22,85	1,79	52,36	2,58	43,10	0,98	4,81	7,99	0,83	35,90	3,42	0,91	1,59
Чечевица	12,35	25,70	1,89	53,46	3,04	44,76	13,50	6,34	2,47	2,00	36,30	—	—	4,63
Бобы	14,76	24,27	1,61	19,01	2,26	41,48	1,06	4,99	7,15	0,46	38,86	3,39	0,65	1,78

д Сѣменные плоды.

Грецкии (волоскии) орѣхъ	4,68	16,37	62,86	7,89	2,03	31,11	2,25	8,58	13,03	1,32	43,70	—	—	—
Кокосовыи орѣхъ	46,64	5,49	35,93	8,06	0,97	43,88	8,39	4,63	9,44	—	16,99	5,09	0,50	13,42
Бобы какао	3,63	11,99	49,32	26,43	3,48	55,89	2,26	5,44	11,06	0,03	38,61	3,43	1,51	0,85

е Плоды

Яблоки	84,79	0,36	—	12,04	0,49	35,68	26,09	4,08	8,75	1,34	13,69	6,09	4,32	—
Груши	83,02	0,36	—	11,80	0,31	54,69	8,52	7,98	5,22	1,04	15,20	5,69	1,49	—
Вишни (черешни)	79,82	0,67	—	12,00	0,73	51,85	2,19	7,47	5,46	1,90	15,97	5,09	9,04	1,35
Виноградъ	78,17	0,59	—	16,32	0,53	56,20	1,42	10,77	4,21	0,37	15,58	5,62	2,75	1,52
Сливы	84,86	0,40	—	8,24	0,66	59,21	0,54	10,04	5,46	3,20	15,10	3,83	2,36	—
Земляника	87,66	0,54	0,45	7,29	0,81	21,07	28,48	14,21	—	5,89	13,82	3,15	12,05	1,69
Крыжовникъ	85,73	0,47	—	8,43	0,42	38,65	9,92	12,20	5,85	4,56	19,68	5,89	2,58	0,75

ж Животные продукты

Мясо млекопитающихъ	72,00	20,00	5,00	0,40	1,10	41,27	3,63	2,82	3,21	0,70	42,54	1,56	1,11	3,85
„ птицъ	76,22	19,72	1,42	1,27	1,37	37,04	10,14	2,42	3,23	0,44	41,20	0,98	0,69	4,66
„ морскихъ рыбъ	80,97	17,07	0,34	—	1,64	30,90 *)	18,70	3,25	4,15	—	36,40	—	—	8,05
Бычачья кровь	80,82	18,12	0,18	0,03	0,85	21,80**)	14,90	15,20	3,90	—	34,50	—	—	11,40
Свиная кровь	?	?	?	?	?	7,61	44,99	1,08	0,60	9,38	5,25	3,05	0,84	34,38
Куриное яйцо	73,67	12,55	12,11	0,55	1,12	23,29	29,43	1,30	1,40	8,86	12,15	1,03	—	28,52
Яичный бѣлокъ	85,75	12,67	0,25	0,74	0,59	17,37	22,87	10,91	1,14	0,39	37,62	0,32	0,31	8,98
Яичный желтокъ . .	50,82	16,24	31,75	0,12	1,09	31,41	31,57	2,78	2,79	0,57	4,41	2,12	1,06	28,82
Швейцарскии сыръ	32,61	32,42	29,67	—	4,78	9,29	5,87	13,04	2,13	1,65	65,46	—	0,86	1,85
						2,46	[33,01]	17,82	0,81	0,17	20,45	—	0,08	[3361]

*) Обезкровленное мясо

**) Мясо съ кровью

приливовъ, воспаленій, подагры, почечныхъ болѣзней, желчныхъ камней и проч.

Исключительная растительная пища, особенно въ томъ видѣ, какъ ее обычно готовятъ, также плохо переносится, хотя далеко не въ такой степени, какъ исключительно мясная, что зависитъ, между прочимъ, отъ содержащихся въ ней минеральныхъ солей.

Во многихъ болѣзненныхъ случаяхъ однако приходится временно или совсѣмъ исключить мясную пищу и замѣнить ее молочной и растительной; такъ, напр., у людей, страдающихъ головными болями, застоями въ легкихъ, подагрой, расстройствами почекъ и мочевого пузыря, половой раздражительностью, падучей.

**Послѣдствія
чрезмѣрнаго
употребленія
жидкостей.**

Введение жидкостей въ организмъ должно значительно ограничить. Выше уже отмѣчено было развитіе водянистости крови, но это ужъ дальнѣйшее послѣдствіе; болѣе же близкія послѣдствія будутъ слѣдующія: 1) излишекъ жидкости слишкомъ разжижаетъ пищеварительные соки, особенно — желудочный, парализуя ихъ дѣйствіе; 2) жидкая пища устраняетъ дѣйствіе слюны; 3) большія количества жидкости растягиваютъ стѣнки желудка, слѣдствіемъ чего можетъ явиться расширеніе его.

**Вредъ
чрезмѣрнаго
ядѣнія.**

Сколько слѣдуетъ ѣсть? На это можно отвѣтить, что чело-
вѣкъ не есть то, что онъ ѣсть, но что усваиваетъ. Съ этой точки зрѣнія, чело-
вѣкъ ѣсть въ два и даже нѣсколько разъ больше, чѣмъ необходимо для сохраненія его здоровья. Вредъ отъ этого замѣчается больше въ городахъ, гдѣ, какъ извѣстно, главную пищу составляетъ мясо. Этимъ объясняется, — еще больше, чѣмъ условіями городской жизни — замѣчаемая у городскихъ жителей чрезмѣрная нервная возбудимость, сердцебіеніе, головныя боли и другія болѣзни, между прочимъ и душевныя расстройства.

Дѣйствительное количество необходимой чело-
вѣку пищи обуславливается его занятіемъ, возрастомъ и временемъ года. Чѣмъ болѣе онъ работаетъ, тѣмъ болѣе онъ долженъ ѣсть, средній возрастъ требуетъ болѣе пищи, чѣмъ старческий и дѣтскій. Зимой и въ холодныхъ странахъ ѣдятъ больше, чѣмъ лѣтомъ и въ странахъ жаркихъ.

Совершенно лишнимъ и даже вреднымъ является переполненіе желудка рядомъ различныхъ блюдъ; чѣмъ „вкуснѣе“ они приготовлены, тѣмъ большій отъ нихъ вредъ, ибо они тѣмъ скорѣе даютъ поводъ объѣдаться и болѣть.

Очень вредна также привычка „поспать“ послѣ объѣда. Во время сна значительно уменьшается отдѣленіе желудочнаго сока, и пищевареніе вообще идетъ гораздо медленнѣе. Не слѣдуетъ и слишкомъ напрягать свои силы ни непосредственно до, ни сейчасъ послѣ ѣды, такъ какъ и въ такихъ случаяхъ пищевареніе страдаетъ. Непродолжительный отдыхъ или умѣренное движеніе всего полезнѣе послѣ ѣды, и если ужъ „поспать“, то лучше это сдѣлать до, чѣмъ послѣ нея.

Какъ часто ѣсть? Вообще говоря, для здороваго, крѣпкаго человѣка достаточно ѣсть 3—4 раза въ день. Частота ѣды, впрочемъ, дѣло привычки, и можно быть здоровымъ и при двухразовой ѣдѣ въ сутки. Дѣти, равно какъ и больные, нуждаются въ болѣе частыхъ пріемахъ пищи въ соотвѣтственно, конечно, меньшихъ количествахъ, при слѣдующемъ приблизительно распределеніи: въ полдень—главная ѣда (обѣдъ), остальные раза четыре—закуски, состоящія изъ молока, бутерброда, фруктовъ (до обѣда или часа 4 спустя), яицъ, кашекъ и овощей (вечеромъ).

Діететика (наука о діетѣ) учитъ также, какъ слѣдуетъ ѣсть и насколько ея правила, въ этомъ отношеніи, просты, настолько же они въ обычной жизни не исполняются. Слѣдуетъ ѣсть не слишкомъ быстро, не проглатывать пищу кусками, а тщательно и медленно разжевывать ее, такъ чтобы слюна проникала въ самыя мельчайшія ея частицы. При ѣдѣ должно соблюдать полное спокойствіе духа, такъ какъ возбужденіе, досада или гнѣвъ разстраиваютъ пищевареніе и вызываютъ нерѣдко даже рвоту и поносъ. Тѣсныя платья, корсеты, словомъ все, что стягиваетъ или сдавливаютъ желудокъ и другіе пищеварительные органы, имѣютъ вредное вліяніе на пищевареніе.

Обѣдъ долженъ состоять преимущественно изъ теплой пищи, закуски же могутъ быть холодныя. Чрезвычайно вредны горячія кушанья, особенно горячіе супы, горячіи чай и т. п. Поразительно, какъ иногда люди вливаютъ въ себя такія горячія жидкости, которыми можно чуть ли не обварить кожу, и не подумаютъ, что слизистая оболочка рта, пищевода и желудка гораздо нѣжнѣе наружной кожи. Никогда поэтому не слѣдуетъ вводить въ ротъ и проглатывать жидкости, если температура ихъ выше, чѣмъ могутъ переносить дотрагивающіяся до нихъ губы. Послѣдствіями употребленія горячей пищи являются часто катарры, язвы и даже ракъ желудка, не говоря ужъ о томъ, что и зубы страдаютъ отъ этого, лишаясь эмали и подвергаясь гніенію.

Слѣдуетъ еще упомянуть о вкусовыхъ веществахъ, къ которымъ принадлежатъ всѣ пряности, чай, кофе, табакъ, спиртные напитки и т. п. Эти вещества ничего не замѣщаютъ собою въ организмъ, поэтому они и совершенно лишніи, въ большихъ же количествахъ, какъ средства раздражающія, и прямо вредны. Въ здоровомъ состояніи еще куда ни шло; тутъ чашка некрѣпкаго кофе или чая, пожалуй, и вызываетъ нѣсколько усиленное отдѣленіе желудочнаго сока; но для больныхъ напитки эти, особенно — кофе, положительно вредны, такъ какъ и безъ того ослабленная слизистая оболочка желудка ослабляется еще болѣе отъ излишняго раздраженія. По этой же, между прочимъ, причинѣ вредны и спиртные напитки, острые пряности и табакъ. Особенно слѣдуетъ всего этого избѣгать больнымъ, страдающимъ желудкомъ. Табакъ дѣйствуетъ вредно тѣмъ, что никотинъ попадаетъ со слюной въ желудокъ. На этомъ основанъ замѣченный фактъ, что сигара послѣ обѣда способствуетъ будто пищеваренію. До поры

Вкусовые
вещества.

до времени, пожалуй, она это действительно дѣлаетъ, усиливая, раздраженіемъ слизистой оболочки, отдѣленіе желудочнаго сока; въ концѣ концовъ, однако, послѣдняя въ такой степени ослабляется, что пищевареніе совсѣмъ разстраивается. О томъ ужъ не говоримъ, сколько пропадаетъ слюны понапрасну отъ частаго выплевыванія ея при куреніи.

Всѣ упомянутыя вкусовыя вещества слѣдуетъ поэтому, независимо отъ противодѣйствія ихъ многимъ гомеопатическимъ лѣкарствамъ, строжайше запретить всѣмъ страдающимъ желудочными болѣзнями (катарромъ, язвами и ракомъ), болѣзнями почекъ, мочевого пузыря, мозговыми страданіями и проч. Но и здоровымъ вредно чрезмѣрное ихъ употребленіе. Крѣпкій кофе и крѣпкій чай производятъ, какъ извѣстно, и у здоровыхъ сердцебіеніе, бессонницу, приливы къ легкимъ, къ брюшнымъ органамъ и къ мозгу; послѣдняя причина можетъ у полнокровныхъ привести и къ удару.

Всѣ пряности ослабляютъ слизистую оболочку желудочно-кишечнаго тракта и раздражаютъ почки и мочевой пузырь; мускатный орѣхъ, перецъ производятъ запоры и вызываютъ сильную жажду.

Спиртные напитки.

Спиртные напитки вредны даже въ умѣренныхъ количествахъ, если только употребленіе ихъ вошло настолько въ привычку, что человѣкъ не въ состояніи приняться за ѣду, не выпивъ предварительно рюмочки водки, или продолжать обѣдъ, не запивая виномъ или пивомъ. Пиво считается обыкновенно наименѣе вреднымъ изъ спиртныхъ напитковъ. Если, однако, можно бы еще допустить это въ отношеніи очень малыхъ количествъ, то это отнюдь невѣрно въ отношеніи большихъ, въ какихъ пиво вызываетъ изжогу, жженіе въ мочевомъ пузырь и каналѣ. (Первое средство противъ этихъ непріятностей—легкая діета, особенно —молоко, какъ временно исключительная пища).

Здѣсь умѣстно упомянуть еще о тѣхъ физическихъ агентахъ, которые необходимы для поддержанія въ организмѣ здороваго питанія.

1. Свѣжій, чистый, здоровый воздухъ и достаточное количество солнечнаго свѣта. Какъ для растеній вредны недостаточность и недоброкачественность воздуха и свѣта, такъ и у людей, особенно—у дѣтей, развиваются при этомъ условіи малокровіе, блѣдная немочь, золотуха, англійская болѣзнь и проч. Поэтому о свѣжемъ, чистомъ, здоровомъ воздухѣ и достаточномъ свѣтѣ надо заботиться въ такой же мѣрѣ, какъ и о свѣжей, здоровой пищѣ. Дневное провѣтриваніе комнатъ разумѣется въ такомъ случаѣ само собою, но даже на ночь слѣдовало бы оставлять форточку окна (если ужъ не все окно) открытой (при не очень холодной, конечно, погодѣ) въ спальнѣ или, по крайней мѣрѣ, въ смежной съ нею комнатѣ, дабы испаренія отъ спящихъ имѣли свободный выходъ.

Значеніе для здоровья воздуха обуславливается заключающимсяъ въ немъ кислородомъ, безъ котораго ни одно живое существо не проживетъ и пяти минутъ. Проникая черезъ легкія въ кровь, кислородъ способствуетъ обмѣну веществъ, образованію тканей и выдѣленію негодныхъ продуктовъ метаморфоза.

Солнечный свѣтъ не только еще изслѣдованъ относительно своего вліянія на организмъ человѣка, но во всякомъ случаѣ онъ безспорно вліяетъ на настроеніе духа и состояніе нервной системы вообще, т. е. на тѣ моменты,

которые, как мы уже видѣли, имѣютъ выдающееся значеніе для здороваго пищеваренія.

2. Вода (содержаніе тѣла въ чистотѣ). Въ здоровомъ состояніи достаточно примѣнять воду лишь въ той мѣрѣ, въ какой это необходимо для поддержанія чистоты тѣла; кромѣ обычныхъ умываній, лѣтомъ — по возможности ежедневное купанье въ прохладной водѣ, а въ холодное время года — отъ 2 до 4 тепловатыхъ ваннъ въ мѣсяцъ.

Важное значеніе для пищеваренія имѣетъ также чистое содержаніе рта, а именно — удаленіе остатковъ пищи, застрявшихъ межъ зубами, и прополаскиванія рта чистой водой. Этимъ предупреждается порча зубовъ, иначе говоря — развитіе разнаго рода вредныхъ бактерій. Ежедневно слѣдуетъ употреблять зубную щетку, равно какъ зубной порошокъ (см., „Уходъ за зубами“, стр. 191).

3. Движеніе (моціонъ) и покой. И то и другое необходимы лишь въ умѣренной степени, въ видахъ сохраненія здоровья. Гимнастика, какъ родъ движенія, въ здоровомъ состояніи полезна лишь при преобладающемъ сидячемъ образѣ жизни. Какъ средство для спеціальнаго развитія мускульной силы и ловкости, она не входитъ, конечно, въ область діететики. Массажъ есть также родъ движенія, но исключительно для болѣзненныхъ случаевъ. Продолжительный покой, бездѣятельность, лѣнь, влечетъ за собою вялость пищеваренія съ неизбѣжными болѣзненными послѣдствіями. То же надо сказать о слишкомъ продолжительномъ снѣ. Спать 6—7 часовъ въ сутки — норма для здороваго взрослого человѣка. Дѣти же въ здоровомъ состояніи лишняго обыкновенно не спятъ, а лишь столько, сколько надо по свойственной имъ природѣ.

II. Лѣчебныя діеты.

Изложенная выше нормальная діета, приуроченная къ здоровому состоянію человѣка, требуетъ обыкновенно тѣхъ или другихъ видоизмѣненій, когда имѣемъ дѣло съ человѣкомъ больнымъ. Поэтому во второй части этой книги, діета указана при болѣшинствѣ болѣзней, также особо діета новорожденныхъ.

Здѣсь же приводятся нѣсколько пользующихся извѣстностію діететическихъ режимовъ, которые имѣютъ свою цѣлью видоизмѣняющимъ образомъ вліять на весь организмъ или на опредѣленную группу болѣзней, съ поясненіемъ ихъ основъ. Режимы эти — слѣдующіе: 1) обезжиривающій (противъ тучности), 2) упитывающій, 3) вегетаріанскій, 4) молочный, 5) виноградный.

1) **Обезжиривающая діета.** Отложеніе (накопленіе) жира въ тѣлѣ происходитъ въ томъ случаѣ, если жиры доставляются въ пищу рядомъ съ такими количествами бѣлка и углеводовъ, которые сами по себѣ достаточны для потребностей тѣла; затѣмъ извѣстно, что накопленіе жира можетъ произойти безъ жирной пищи въ томъ случаѣ, когда въ организмъ вводятся бѣлокъ и углеводы въ большемъ количествѣ, чѣмъ сколько нужно для сохраненія тѣла.

а) На этомъ основано обезжириваніе по способу Гарвей-Діета Бентинга, состоящему въ употребленіи лишь малыхъ количествъ бѣлковыхъ и въ полномъ выключеніи жировыхъ и углеводистыхъ веществъ; разрѣшаются именно: мясо, яйца, рыба, немного овощей, исключая картофель, чай безъ сахара, немного сухарей, вино красное (нѣсколько стакановъ въ день); строго запрещаются

кромѣ картофеля и сахара, жиры, хлѣбъ, шампанское, портвейнъ, пиво и проч. История этой діеты такова: англійскій купецъ Banting (Бентингъ), чтобы избавиться отъ сильной тучности, питался, по совѣту врача Harwey'a, такимъ образомъ и дѣйствительно въ течение 6 мѣсяцевъ потерялъ 6 килограммъ (15 ф.) вѣсу, но за то онъ до такой степени ослабъ, что ужъ не въ силахъ былъ вновь оправиться, а въ оставшихся послѣ него письмахъ онъ съ проклятіемъ вспоминаетъ объ этой варварской діетѣ. Однако, при осторожномъ примѣненіи, діета эта можетъ принести пользу при тучности.

ита Шрота

б) Извѣстна еще обезжиривающая діета Schroth'a (Шрота), состоящая въ употребленіи преимущественно бѣлаго хлѣба при возможнѣйшемъ воздержаніи отъ питья. И эта діета ведетъ, конечно, довольно скоро къ отощанію, но въ то же время и къ полному истощенію силъ. Въ измѣненномъ видѣ, впрочемъ, нѣкого-рые хвалятъ этотъ способъ питанія, особенно при сифилисѣ, подагрѣ, золотухѣ и накожныхъ болѣзняхъ. Проводится этотъ способъ такъ, что въ течение трехъ дней даютъ лишь каши, сухари и бутылку вина, болѣе этого—ни одной капли жидкости; на четвертый день дозволяется пить сколько угодно при діетѣ, лишенной мяса. Но даже защитники такой діеты, считаютъ нужнымъ предостеречь отъ примѣненія ея у лицъ слабыхъ.

Способъ Шрота основанъ между прочимъ на томъ, что жидкости способствуютъ образованію и отложенію жира въ организмѣ, предрасположенномъ къ ожирѣнію. Причина тутъ, надо полагать, та, что кожа у тучнаго субъекта менѣе дѣятельна, въ смыслѣ выдѣленія черезъ нее избытка воды, притомъ же сердце у тучныхъ слабѣе, нежели у здоровыхъ субъектовъ, и оно также легко можетъ стать несостоятельнымъ въ исполненіи такой работы черезъ посредство почекъ.

эта Эртеля.

в) Діета Эртеля (Oertel) противъ ожирѣнія допускаетъ кромѣ мяса, яицъ и хлѣба, также зеленый салатъ, овощи и плоды, молоко и вино, хотя и въ малыхъ количествахъ, жиры же исключаются.

Діета
Эбштейна.

г) Обезжиривающій способъ Эбштейна (Ebstein) совершенно противоположенъ предыдущему и заключается въ томъ, что введение бѣлковъ значительно ограничивается, жиры же вводятся въ большомъ количествѣ. Этотъ способъ основанъ на томъ, что введеніемъ жировъ предупреждается образованіе жира въ тѣлѣ изъ бѣлковъ, сохраняющихъ въ такомъ случаѣ характеръ лишь строительнаго материала. Кромѣ того, введение жира по Эбштейну уменьшаетъ потребность въ питѣѣ, а также въ введеніи прочихъ пищевыхъ веществъ.

Какъ первый способъ, такъ и второй, примѣняемые осторожно и осмотрительно, даютъ несомнѣнно благоприятные результаты, если только примѣняются въ подходящихъ случаяхъ.

Какъ извѣстно, тучные больные бываютъ различнаго рода, прежде всего—полнокровные и малокровные. И Эбштейновская

дѣта будетъ цѣлесообразнѣе для первыхъ, нежели для вторыхъ. Затѣмъ, играетъ роль и образъ жизни больного: если послѣдній вынужденъ къ усиленнымъ движеніямъ, то ему необходимо большее количество жировъ и углеводовъ, если образъ жизни больше сидячій, тѣ и другіе должны быть значительно уменьшены, не ограничивая при этомъ введенія бѣлковъ.

Примѣръ діеты по Эртелю: утромъ — хлѣба 50 грам., 1—2 яйца; обѣдъ — мяса жаренаго 150 грм., зеленого салата 50, овощей 50, мучныхъ блюдъ 70—100, хлѣба 25, плодовъ 100 грам., вечеромъ — 2 яйца, жаренаго мяса 150, зелен. салата 50, хлѣба 50, плодовъ 50 грам. Напитки: утромъ — молока 150, въ обѣдъ — вина 125, вечеромъ — вина или воды 125 грм

Примѣръ діеты по Эбштейну (все въ граммахъ) завтракъ — чаю 250 (безъ молока и сахара), хлѣба 50 — съ обильнымъ количествомъ масла; обѣдъ — супъ, мяса 120—180 (жаренаго или варенаго съ жирнымъ соусомъ), овощи (за исключеніемъ рѣпы и картофеля), салатъ, печеные плоды (безъ сахара), свѣжіе плоды, легкаго бѣлаго вина 2—3 стакана; послѣ обѣда — чай (какъ при завтракѣ,) вечеромъ — чай (какъ утромъ и днемъ); 1 яйцо, немного жирнаго жаркаго или окорока, копченой рыбы, хлѣба около 30 грамъ съ обильнымъ масломъ, сыръ (немного) и свѣжіе плоды

Всѣ приведенные способы обезжириванія тѣла при тучности имѣютъ между собою то общее, что они стремятся этого достигнуть посредствомъ голоданія, большаго или меньшаго. Поэтому примѣненіе ихъ на практикѣ сопряжено съ большими трудностями и во всякомъ случаѣ не можетъ становиться длительнымъ, привычнымъ.

д) Поэтому и въ цѣляхъ обезжириванія всего лучше придерживаться приведенной выше нормальной діеты Ламана при условіи сколь возможной умеренности въ приемахъ пищи и питья.

2. Упитывающая діета имѣетъ цѣлью поднять питаніе посредствомъ введенія въ организмъ все большихъ и большихъ количествъ легко усваиваемыхъ питательныхъ веществъ. Напримѣръ, діета Вейръ-Митчелля (Weir Mitchell) рекомендуется особенно для истеричныхъ больныхъ, страдающихъ параличами, безсонницей, расстройствомъ пищеваренія и сильнымъ исхуданіемъ. Дневной рационъ постепенно доводится приблизительно до 2000 граммъ молока, 350 грам. мяса, 7—8 яицъ, 30 грам. бѣлаго хлѣба, 300 грам. сухарей, 200 грам. картофеля, 100 грам. овощей, 20 — масла, 100 — сладкаго (все разсчитано на общее содержаніе 200 грам. бѣлка). — Такая діета рекомендуется также при сильной слабости послѣ кровотеченій и тяжелыхъ болѣзней, при малокровіи и т. п. — Прот и в о п о к а з а н і я: мозговые возбужденія, истеричныя судороги, расстройство пищеваренія.

3. Вегетаріанская діета (всего лучше — по системѣ д-ра Ла-Вегетар. діета. мана): молоко, какао, хлѣбъ (изъ непросѣянной муки, съ отрубями), яйца, масло, сыръ, стручковые плоды, корневые овощи, картофель, зеленые овощи и плоды; запрещаются: мясо, алкоголь, кофе, чай (китайскій), пряности. Діета эта весьма полезна при многихъ болѣзняхъ, особенно при полнокровіи, головныхъ боляхъ, головокруженіи, шумѣ въ ушахъ, значительной нервозности (осо-

Діета Вейръ-
Митчелля.

бенно вслѣдствіе слишкомъ роскошной жизни), при подагрѣ, почечныхъ и пузырныхъ страданіяхъ и желчныхъ камняхъ.

ичн. діэта.

4. Молочная діэта: вначалѣ молоко пьютъ по 150 ($\frac{3}{4}$ стак). граммъ 4 раза въ день; постепенно повышаютъ порцію на 100 грам. каждый разъ, пока дойдутъ до 3 литровъ въ день. Употребляютъ молоко можно въ разныхъ видахъ: сырымъ или варенымъ, въ видѣ простокваши или пахтанья (маслянки), въ видѣ молочныхъ кашъ или суповъ, также въ видѣ сыворотки (которой не слѣдуетъ пить больше 4—5 стакановъ въ день).

Къ молочной діетѣ относится и употребленіе кефира, который готовится изъ молока помощью броженія, происходящаго подъ вліяніемъ специальныхъ грибовъ.

готовленіе

ефира.

Каждый можетъ готовить этотъ чрезвычайно полезный для желудочныхъ и легочныхъ больныхъ напитокъ у себя дома, нужно только знать и въ точности исполнять всѣ правила его приготовленія и сохраненія. Правила эти слѣдующія *).

Приступая къ приготовленію кефира, слѣдуетъ прежде всего обмыть сухіе грибки тепловатой водой, чтобъ удалить приставшую пыль, въ которой могутъ быть вредные зародыши; затѣмъ слѣдуетъ оставить грибки въ теплой кипяченой водѣ часа на 3, чтобъ размочить ихъ и уже послѣ этого опустить въ двойное, по объему, количество слегка свареннаго молока (нѣкоторые считаютъ лучшимъ цѣльное молоко—сырое, неваренное, разведенное на треть водой,—или снятое безъ сливокъ), которое слѣдуетъ мѣнять ежедневно, при чемъ лучше всего употреблять глиняную эмалированную посуду, закрытую кисеей (для доступа воздуха); сосудъ съ грибами долженъ сохраняться при постоянно ровной температурѣ, приблизительно градусовъ въ 12 Р., причемъ его слѣдуетъ каждые 2—3 часа легко встряхивать. Первые порціи молока совершенно не похожи на кефиръ, только приблизительно сутокъ черезъ 6 получается характерный напитокъ.

Подготовивъ такимъ образомъ грибки, можно приступить къ систематическому приготовленію кефира: въ глиняную эмалированную банку кладутъ подготовленные описаннымъ способомъ грибки, обливаютъ ихъ тройнымъ по объему количествомъ молока, съ котораго сняты сливки. Банку закрываютъ густой кисеей, сложенною вчетверо, ставятъ въ прохладное мѣсто (12° Р.) и слегка встряхиваютъ каждые 2—3 часа. Черезъ 24 часа закваска готова; тогда помощью сита отдѣляютъ жидкость отъ грибовъ, разбавляютъ двойнымъ количествомъ молока, разливаютъ въ бутылки въ полтора стакана, но не слѣдуетъ наполнять бутылки совершенно полными, во избѣжаніе разрыва газомъ. Закупоривъ и обвязавъ бутылки, ихъ держатъ при той же температурѣ, что и закваску, и также слегка встряхиваютъ. Черезъ 24 часа кефиръ готовъ къ употребленію и называется слабымъ кефиромъ; оставляя при

*) Изложено по брошюрѣ д-ра В. Н. Дмитріева: „Кефиръ, лѣчебный напитокъ изъ коровьяго молока“ 1899. Ц. 60 к.

тѣхъ же условіяхъ слабый кефиръ еще на 24 часа, получаютъ средній, а черезъ 48 часовъ—крѣпкій. Можно употреблять и четырехъ- и пяти-суточный кефиръ: вообще кефиръ не скоро портится.

Отдѣленные отъ первой закваски грибки обливаются новымъ количествомъ молока, для приготовленія закваски на слѣдующій день и т. д. Черезъ 2—3 дня грибки необходимо промывать на ситѣ въ тепловатой водѣ, пока на нихъ не останется слѣдовъ творага; если же грибки получаютъ кисловатый запахъ, то надо къ водѣ прибавить немного соды.

Начинать лѣченіе нужно съ малыхъ порцій (1—1½ стак.); увеличивать приемы слѣдуетъ постепенно, ежедневно или черезъ день по 1—1½ стакана; высшій суточный приемъ зависитъ отъ свойства болѣзни и отъ охоты больного, причемъ слѣдуетъ помнить, что кефиръ не лѣкарство, котораго лишняя порція можетъ повредить, а хорошій удобоваримый питательный напитокъ, количество котораго должно соразмѣрять съ аппетитомъ больного и силами его желудка. Самая обыкновенная суточная порція — 6 стакановъ.

Лѣченіе
кефиромъ.

Суточная порція дѣлится на три равныхъ части: двѣ изъ нихъ выпиваются до обѣда, а третья послѣ обѣда. Первую порцію лучше всего пить натощакъ, такъ какъ при пустомъ желудкѣ кефиръ быстрѣе всосется въ кровь, и потери организма за ночь быстрѣе будутъ пополнены. Черезъ ½ часа по окончаніи первой порціи можно пить чай съ молокомъ, къ нему бѣлый хлѣбъ съ масломъ, и, еще лучше, скушать легкій завтракъ: яйца, одно мясное блюдо и т. п. Черезъ 1½ часа послѣ завтрака приступить ко второй порціи кефира, которую слѣдуетъ кончить за часъ—два до обѣда. Третью порцію пьютъ черезъ 2 часа послѣ обѣда. Кефиръ не слѣдуетъ пить залпомъ, а глотками. Окончивъ одинъ стаканъ, слѣдуетъ сдѣлать маленькій моционъ и приниматься за второй стаканъ не раньше чѣмъ черезъ 10—15 минутъ послѣ перваго. Кефиръ не слѣдуетъ пить холодный, а нужно его довести до комнатной температуры. Лучше всего пить его на воздухѣ (если возможно), дѣлая послѣ каждого стакана прогулку, которая не должна быть утомительна.

Вопросъ, какой въ данномъ случаѣ слѣдуетъ пить кефиръ: слабый, средній или крѣпкій, долженъ быть рѣшенъ врачомъ. Вообще говоря, слабый кефиръ показанъ при запорахъ, средній — при отсутствіи подверженности поносамъ, крѣпкій—при поносахъ. Пища, употребляемая при кефирѣ, должна быть легкая, удобоваримая и питательная: супы, мясо бѣлое, темячье, жареная дичь, безъ всякихъ соусовъ; когда желудокъ достаточно привыкнетъ къ кефиру, можно перейти къ болѣе разнообразному столу. Щи, борщъ, вареные овощи и плоды, спѣлыя ягоды и фрукты; рыбныя блюда, безъ острыхъ приправъ, могутъ быть разрѣшены, если нѣтъ противопоказаній со стороны желудка. Жирныя блюда, слоеное тѣсто, паштеты, маринады, копченья и

пикантные соусы никоимъ образомъ не допустимы. Чая и кофе, равно какъ горячительныхъ напитковъ слѣдуетъ совершенно избѣгать. Лучше отказаться также отъ молока (только къ чаю кипяченое), такъ какъ оно можетъ дать поводъ къ развитію газовъ, пученію живота и т. п. Образъ жизни долженъ быть вообще правильный и гигиеничный.

Для лѣченія кефиромъ не существуетъ никакого опредѣленнаго курса: окончить лѣченіе кефиромъ нужно тогда, когда въ немъ не предстоитъ болѣе надобности, т. е, когда питаніе больного возстановилось до нормы.

Если кефиръ надобѣтъ больному, то слѣдуетъ сдѣлать перерывъ недѣли на двѣ-три и потомъ опять вернуться къ нему, если состояніе больного еще требуетъ поддержки питанія.

Кумысъ.

Кумысъ — напитокъ, приготовляемый также путемъ грибковаго броженія, но не изъ коровьяго, а изъ кобыльяго молока. Для домашняго приготовленія онъ не подходитъ, что же касается его дѣйствія на организмъ, то оно ничѣмъ не отличается отъ дѣйствія кефира. Способъ лѣченія кумысомъ въ общемъ тотъ же, что и кефиромъ.

Молочное, вообще лѣченіе особенно показано въ началѣ туберкулеза, при язвахъ желудка, хроническихъ желудочныхъ страданіяхъ, ракъ желудка, при болѣзняхъ сердца, почекъ, мочевого пузыря и разстройствахъ питанія вслѣдствіе малокровія и нервозности.

Виноградная діета.

5) Виноградная діета особенно полезна при хроническомъ запорѣ, геморроѣ, ипохондріи, при нервной диспепсіи. при болѣзняхъ сердца, почекъ и мочевого пузыря, а также при желчныхъ и почечныхъ камняхъ.

Прочая пища при этой діетѣ должна быть легкая, состоящая изъ суповъ, хлѣба, небольшихъ количествъ тощаго мяса и овощей. Начинаютъ съ 1 килограмма ($2\frac{1}{2}$ ф.) и доходятъ постепенно до 3 килограммовъ въ день, раздѣленныхъ на 2—6 порцій. На разъ слѣдуетъ съѣсть не болѣе $1\frac{1}{2}$ килограммовъ. Дѣйствіе винограда: разжиженіе крови, измѣненіе состава соковъ и усиленные выдѣленія; въ этомъ смыслѣ онъ является дѣйствительнымъ кровоочистительнымъ средствомъ.

III. Способы примѣненія вспомогательныхъ мѣръ.

А. Наружныя примѣненія воды.

I. Обмыванія.

Цѣльныя обмыванія.

1. Цѣльныя или общія обмыванія представляютъ самое нѣжное примѣненіе воды и назначаются преимущественно малокровнымъ, слабымъ и нервнымъ особамъ. Самое удобное время для ихъ примѣненія — по утрамъ, прямо изъ постели.

Большой губкой или скомканнымъ полотенцемъ, смоченными въ 18-градусной (лѣтней температуры) водѣ, обмываютъ прежде всего лицо, грудь, спину, ноги. или же, еще лежа въ постели, прежде всего ноги и руки, а затѣмъ — животъ и спину и, наконецъ, грудь. Крайне чувствительные и слабонервные могутъ брать для этого вначалѣ воду потеплѣе (24°) и мало по малу переходить къ 18-градусной. Все обмываніе должно продолжаться не болѣе одной-двухъ минутъ при умѣренной температурѣ комнаты. Послѣ обмыванія не слѣдуетъ вытираться на-сухо, но быстро одѣться и дѣлать съ $\frac{1}{4}$ часа движенія, пока согрѣется тѣло, или столько же времени остаться еще въ постели (последнее рекомендуется особенно слабымъ лицамъ). Невытираніе на-сухо особенно полезно тѣмъ, что оставшаяся на тѣлѣ влага испаряется и этимъ весьма успокоительно дѣйствуетъ на кожные нервы, вызывая чрезвычайно пріятное ощущеніе. Особенно плохо переносятъ обсушивающія вытиранія нервныя лица, такъ какъ они дѣйствуютъ на послѣднихъ раздражающимъ образомъ.

Прохладные обмыванія представляютъ собою весьма надежное закаливашее средство для предохраненія отъ многихъ болѣзней, преимущественно—простудныхъ (болѣзней горла, груди, ревматизма и проч.), тѣмъ именно, что дѣлаютъ кожу болѣе стойкой, выносливой въ отношеніи перемѣнъ погоды, температуры воздуха вообще, сквозныхъ вѣтровъ.

Обмыванія дѣйствуютъ весьма благотѣльно во всѣхъ острыхъ болѣзняхъ, сопровождающихся жаромъ (тифъ, воспаление легкихъ, скарлатина, рожа и т. д.); а закаляющимъ образомъ въ хроническихъ случаяхъ, на примѣръ, у слабонервныхъ, малокровныхъ, и проч.

Частота обмываній—1 или 2 раза въ день въ хроническихъ состояніяхъ, въ острыхъ же—гораздо чаще, въ случаѣ сильнаго жара тѣла—даже каждыя $\frac{1}{2}$ часа.

2. Частичныя обмыванія. При опредѣленныхъ болѣзняхъ обмываются лишь однѣ или другія части тѣла: въ хроническихъ болѣзняхъ—грудь (1—2 раза въ день), при воспаленіи легкихъ (каждый часъ или полчаса), болѣзненные суставы—при ревматизмѣ (3—4 раза въ день), лицо—при рожистомъ воспаленіи. Температура воды—отъ 18 до 24 градусовъ, смотря по чувствительности больного.

Частичны
обмываніи

II. Компрессы.

1. Компрессы холодныя (примочки). Кусокъ полотна (или полотенце) складываютъ раза два, смачиваютъ въ холодной водѣ, умѣренно выжимаютъ и прикладываютъ къ больному мѣсту тѣла. Какъ только онъ согрѣется, его смачиваютъ вновь и прикладываютъ. Цѣль холодныхъ компрессовъ—способствовать уменьшенію мѣстнаго воспаления и жара путемъ ограниченія (суженіемъ кровяныхъ сосудовъ) притока крови, на прим., при вос-

Холодные
компрессы
примочки

палении мозга, приливахъ къ головѣ. Въ этихъ случаяхъ, однако, не ограничиваются одними головными компрессами, но прикладываютъ компрессы также къ шеѣ, къ области сердца съ цѣлью замедлить кровообращеніе, а этимъ самымъ—притокъ крови къ головѣ. На томъ же основаніи компрессы употребляются при всякихъ другихъ воспаленіяхъ — брюшныхъ органовъ, легкихъ и проч. при рожистыхъ воспаленіяхъ, а также при скарлатинѣ, кори, тифѣ—въ послѣднихъ случаяхъ они прикладываются къ головѣ и животу.

Совершенно нецѣлесообразно прикладываніе льда непосредственно къ тѣлу, такъ какъ черезчуръ сильное дѣйствіе холода производитъ какъ разъ обратное дѣйствіе на кровеносные сосуды, т. е. вызываетъ слишкомъ сильное сокращеніе ихъ, которое переходитъ въ расширеніе, обусловливаемое разслабленіемъ (параличемъ) сосудистыхъ стѣнокъ.

**Паровые
компрессы,
припарки.**

2) Компрессы паровые (припарки). Полотенце, сложенное 4—6 разъ, погружаютъ въ горячую (50° Р.) воду, слегка выжимаютъ, заворачиваютъ въ фланель и прикладываютъ къ больной части тѣла. Такой паровой компрессъ смѣняется черезъ каждыя 20 минутъ, в теченіи 1—2 часовъ, 2—3 раза въ день, съ послѣдующимъ каждый разъ прохладнымъ (22° Р.) обмываніемъ. Полотенце можетъ быть замѣнено и плоской жестяной или бутылкой, наполненной горячей водой и завернутой въ влажное полотенце. Паровой компрессъ прикрывается еще сверху фланелью или теплымъ платкомъ. Примѣненіе это очень благотворно дѣйствуетъ особенно при подагрѣ, мышечномъ и суставномъ ревматизмѣ, катаррѣ дыхательныхъ органовъ, при боляхъ въ маткѣ, печени, желудкѣ, почкахъ, при нарывахъ и т. п.

3). Компрессы согрѣвающие (См. обертыванія).

III. Обертыванія.

Влажное обертываніе заключается въ томъ, что опредѣленная часть тѣла обертывается мокрымъ компрессомъ, который покрывается еще на всемъ своемъ протяженіи какой либо сухой тканью, фланелью или шерстяной матеріей. Когда обертываніе охватываетъ все тѣло, съ ногъ до шеи, оно называется общимъ, цѣльнымъ, въ отличіе отъ частичнаго обертыванія, покрывающаго сравнительно меньшую часть тѣла, наприм., шею, грудь, животъ.

При примѣненіи обертываній должно соблюдать слѣдующія правила:

**Правила для
обертываній.**

1) Температура воды должна быть въ острыхъ болѣзняхъ отъ 22 до 16 градусовъ (по Реом.), вообще же говоря — градусовъ 18 (лѣтней температуры); въ хроническихъ—отъ 25 до 18 градусовъ, въ среднемъ 22°. Послѣдняя температура считается наиболѣе употребительной при примѣненіи воды для обертываній, полуваній, полосканій, клистировъ, впрыскиваній.

3) Покрывающая влажный компрессъ сухая ткань, фланель или шерстяная матерія (теплый платокъ, шерстяное одѣяло и т. п.). должна быть всегда шире компресса и плотно прилегать къ нему, какъ и послѣдній—къ тѣлу. Полотно, смачиваемое водой, должно быть мягкимъ, не новымъ, а бывшимъ уже неоднократно въ стиркѣ.

4) Тѣло или часть тѣла, подлежащая обертыванію, должны быть достаточно теплы, въ противномъ случаѣ ихъ надо предварительно согрѣть бутылками съ теплой водой, теплыми плоскими жестянками (въ продажѣ имѣются специально приспособленныя для разныхъ частей тѣла), нагрѣтыми платками и т. п. Поэтому, лучшее для обертываній время—утромъ, въ кровати, предъ тѣмъ какъ встать, въ тѣхъ случаяхъ, когда больной лѣжится на ходу; притомъ, послѣ сдѣланнаго обертыванія, больного надо тщательно укрыть шерстянымъ одѣяломъ или, еще лучше, легкой периной.

5) Въ цѣльномъ обертываніи больной долженъ оставаться, пока онъ вполне согрѣется и начнетъ потѣть. Это и есть та реакція, которая ожидается отъ обертыванія. Если она медлитъ своимъ обнаруженіемъ, ее можно вызвать добавочнымъ согрѣваніемъ помощью обкладыванія больного теплыми бутылками или чѣмъ либо подобнымъ. Наступившее же потѣніе есть тотъ моментъ, когда надо больного освободить отъ обертыванія. Обыкновенно это бываетъ спустя 1—2 часа, вообще—часа черезъ 1½. Частичное обертываніе (согрѣвающий компрессъ) можетъ оставаться и болѣе долгое время, даже всю ночь, если требуется особое спокойствіе больного. Вообще же его можно снять или смѣнить черезъ 2—3 часа.

6) Послѣ обертыванія весьма полезно сдѣлать общее обмываніе тѣла 18-градусной водой (см. стр. 634) или полуванну (22°—25° см. стр. 643), продолжительностью 5 минутъ.

Вліянія обертываній заключаются въ слѣдующемъ:

1) Усиливая кожную дѣятельность, они способствуютъ болѣе энергичному выдѣленію угольной кислоты и воды, кромѣ того, вслѣдствіе ускореннаго обмѣна веществъ, усиливается и мочеотдѣленіе. Поэтому общія обертыванія и болѣе значительныя частичныя (напр. туловища) благотворно дѣйствуютъ особенно при расстройствахъ питанія (мало кровіе, нервная слабость, золотуха, почечныя страданія, ожирѣніе и проч.). У слабыхъ и нервныхъ больныхъ продолжительность обертыванія можетъ ограничиться однимъ часомъ.

2) Обертыванія выравниваютъ неправильное кровообращеніе, отвлекая кровь изъ тѣхъ частей тѣла, гдѣ имѣется избытокъ ея, въ тѣ, гдѣ чувствуется въ ней недостатокъ; такъ, напримѣръ, ножныя обертыванія при болѣзняхъ сердца, печени, брюшныхъ органовъ, обертыванія живота—при приливахъ къ головѣ, болѣзняхъ легкихъ и проч.

3) Обертыванія успокаиваютъ боли, сильное возбужденіе, раздражительный кашель и т. п.

4) Обертыванія унимаютъ жаръ тѣла при лихорадкахъ путемъ расширенія кожныхъ сосудовъ, т. е. усиленной отдачи тепла

**Вліянія
обертываній**

тѣломъ; послѣднее достигается особенно въ томъ случаѣ, если за обертываніемъ слѣдуетъ еще общее обмываніе или полуванна. Этимъ объясняется превосходное дѣйствіе обертываній при всѣхъ острыхъ, сопровождающихся жаромъ, болѣзняхъ (тифъ, дифтеритъ, воспаление легкихъ, скарлатина, корь и т. п.). Въ этихъ случаяхъ обертыванія дѣлаются отъ двухъ до нѣсколькихъ разъ въ сутки, каждый разъ, какъ только температура тѣла (жаръ) превышаетъ 39 градусовъ (по Цельсию).

Частичныя и общія обертыванія.

Частичныя
обертыванія

Къ частичнымъ относятся, во-первыхъ, обертыванія сравнительно незначительныхъ областей тѣла: живота, поясницы, нижнихъ и верхнихъ конечностей, головы, лица, шеи, груди, и обычно называются въ такихъ случаяхъ согрѣвающими компрессами, въ противоположность компрессамъ холоднымъ (см. стр. 635); во-вторыхъ къ нимъ же относятся болѣе значительныя обертыванія, приближающія больше къ типу общихъ, а именно—обертыванія туловищныя (короткій викаль) и ножно-подмышковыя (съ ногъ до подмышекъ).

набрюшный
согрѣвающий
компрессъ

1. Набрюшный согрѣвающий компрессъ. Кусокъ полотна такой величины, чтобы сложенный вдвое или втрое, соотвѣтствовалъ всей поверхности живота, считая и боковыя части, а вверхъ—до подложечной ямки, погружаютъ въ 18—22-градусную воду, выжимаютъ, какъ сказано выше, и кладутъ на животъ такъ, чтобы онъ всюду равномернo, безъ складокъ, прилегалъ къ тѣлу. Поверхъ кладутъ, плотно налаживая, кусокъ фланели или шерстяной матеріи такой величины, чтобы переходилъ границы влажнаго компресса пальца на три. Непромокаемая ткань (клеенка) между влажнымъ компрессомъ и сухой настилкой не необходима, но если она имѣется подъ руками, ее можно употребить для этого. Наконецъ, все забинтовывается полотенцемъ или чѣмъ либо подобнымъ, хотя, при спокойномъ лежаніи, въ этомъ необходимости нѣтъ. Не безпокоя больного, это можно сдѣлать такъ: подъ больнымъ, попережъ поясницы, просовываютъ разглаженное полотенце, которымъ, послѣ наложенія согрѣвающего компресса, закрываютъ послѣдній, съ одной и другой стороны, и пристегиваютъ парой швовъ или такъ называемыми безопасными булавками. Болѣе узкій компрессъ, лишь полосой, на область желудка и печени, можно, приспособивъ такимъ образомъ, носить и на ходу.

Болѣзни, при которыхъ набрюшный согрѣвающий компрессъ, примѣняется, суть: болѣзни головы и шеи (горла и гортани), дифтеритъ, крупъ, болѣзни сердца, желудка, кишекъ, печени, геморрой, судороги, поносъ и рвота у дѣтей, лихорадочныя болѣзни, корь, скарлатина и проч.

Поясное
обертываніе.

2. Поясное обертываніе (Тобразное).—Какъ влажная, такъ и сухая часть его имѣютъ внизу трехугольную

пришивку, однимъ концомъ идущую къ промежности. Правила наложения этого согрѣвающего компресса тѣ-же, что и при набрюшномъ. Примѣняется и благотворно дѣйствуетъ при болѣзняхъ мочевого пузыря и половыхъ органовъ, какъ мужскихъ, такъ и, въ особенности, женскихъ.

3. Обертываніе верхнихъ и нижнихъ конечностей (всей конечности или части ея). О дѣйствии такихъ обертываній см. стр. 637. Вода въ такихъ случаяхъ должна быть холодноѣе, градусовъ 20, а продолжительность обертыванія (лежана согрѣвающего компресса) большая (по меньшей мѣрѣ 3 часа). Производится по общимъ правиламъ (см. стр. 636), или же проще такъ, что надѣваютъ двѣ пары чулокъ, одну—бумажную, смоченную и умѣренно выжатую, на голыя ноги, а поверхъ—другую пару, шерстяную, сухую, которая должна быть нѣсколько длиннѣе первой. Бинтованіе ноги или руки сначала, наголо, влажнымъ полотнянымъ бинтомъ, а поверхъ—шерстянымъ, нецѣлесообразно, такъ какъ вслѣдствіе неизбѣжныхъ, при бинтованіи, перегибовъ бинтовъ, образующихъ складки и неравномѣрныя на слоенія, (что отзывается на кожѣ соотвѣтственными вдавленіями), не только не достигается цѣль обертыванія, но оно можетъ оказаться даже вреднымъ.

4. Обертываніе головы и лица. Влажный платокъ, сложенный надлежащимъ образомъ, кладется на большое мѣсто и укрѣпляется бинтомъ или (на головѣ) плотно прилегающимъ ночнымъ колпакомъ. Такія обертыванія часто полезны при зубныхъ, лицевыхъ и головныхъ боляхъ.

5. Шейное обертываніе (согрѣвающий компрессъ). Платокъ полотняный или шелковый, сложенный вчетверо, смачивается водою лѣтней температуры (18°), выжимается и кладется вокругъ шеи, поверхъ него—короткій фланелевый бинтъ. Между фланелью и компрессомъ можно положить еще тонкую клеенку. Обертываніе оставляется на шеѣ на 2—3 часа, послѣ чего, въ случаѣ надобности, смѣняется, или вновь накладывается спустя нѣкоторое время. Оно полезно при охриплости, катаррѣ зѣва, воспаленіи миндалинъ съ болѣзненнымъ глотаніемъ, во второмъ періодѣ дифтерита и крупа, когда опухоль и воспаленіе уменьшились. Въ первомъ періодѣ послѣднихъ болѣзней рекомендуются часто смѣняемые холодные компрессы.

6. Нагрудныя обертыванія. а. Наплечное обертываніе (шотландскій компрессъ). Дѣлается изъ двухъ полосъ полотна (изъ короткихъ полотенецъ), сложенныхъ такъ, чтобы вышла ширина 1½ ладоней (у дѣтей соотвѣтственно уже), и крестообразно надѣтыхъ на плечи; сзади концы доходятъ до верхнихъ угловъ лопатокъ. Смоченный въ водѣ (24-градусной) и надѣтый такимъ образомъ, компрессъ этотъ покрывается фланелевымъ бинтомъ нѣсколько большей ширины.

Обертываніе конечностей.

Обертываніе головы и лица

Обертываніе шен.

Шотландск. компрессъ.

Шаль

6. Шаль. Четырехугольный кусокъ полотна складывается вдвое углами, въ видѣ трехугольника, смачивается водой (24⁰), выжимается и надѣвается на плечи въ видѣ шали. Поверхъ него точно такъ же надѣвается соотвѣтственный (нѣсколько большій) шерстяной платокъ.

Обертываніе груди.

в. Обертываніе груди. Вокругъ груди обертывается смоченное въ 24-градусной водѣ полотенце, а поверхъ послѣдняго—фланель или шерстяная ткань обыкновеннымъ способомъ, какъ при обертываніи живота.

Обертываніе груди можно сочетать съ наплечнымъ или съ шалью; смѣняется каждые 2 часа; можетъ остаться также на всю ночь, или же снимается ночью, когда только больной начнетъ себя чувствовать въ немъ неприятно. Послѣ обертыванія, продолжавшагося болѣе чѣмъ 2 часа, слѣдуетъ всегда сдѣлать обмываніе груди 22-градусной водой. Примѣняется при всѣхъ грудныхъ болѣзняхъ (воспаленіе легкихъ, плевритъ, бронхитъ и проч.). Какъ отвлекающее средство оно, въ сочетаніи съ обертываніями рукъ и ногъ, употребляется при воспаленіи мозга, мозговомъ ударѣ и воспаленіяхъ брюшныхъ органовъ.

Обертываніе туловища

7. Туловищное обертываніе (короткій викель). Простирается отъ подмышекъ до бедеръ, или до колѣнъ, и примѣняется чаще, чѣмъ всѣ прочія большія обертыванія. Его легко сдѣлать самому, безъ посторонней помощи. Кусокъ полотна, сложенный вдвое или вчетверо, въ соотвѣтственную ширину, намачивается въ водѣ, выжимается и возможно плотнѣе прилагивается къ тѣлу; поверхъ идетъ сухая шерстяная ткань, со всѣхъ сторонъ плотно облегающая викель. По наложеніи викеля, укрываются теплымъ шерстянымъ одѣяломъ или периной. Продолжительность викеля 1—2 часа, вообще часа 1½. Вода для викеля тепловатая (26⁰), для слабыхъ и малокровныхъ, 22⁰—18⁰—для болѣе крѣпкихъ (дѣйствіе его см. стр. 637).

Обертываніе ногъ до под-

ниіе. При ножноподмышковомъ обертываніи—шея, руки и верх-
мышекъ, или нія часть груди остаются свободными, при цѣльномъ, напротивъ
всего тѣла. того, все тѣло, за исключеніемъ лишь головы, обертывается компрессомъ. Оба эти рода обертываній по дѣйствию мало чѣмъ отличаются другъ отъ друга и, въ виду большаго удобства перваго, его приходится въ большинствѣ случаевъ предпочитать второму. Главное ихъ примѣненіе въ лихорадочныхъ болѣзняхъ, гдѣ они смѣняются, смотря по жару тѣла, каждые ½ часа или каждый часъ и рѣже. Въ хроническихъ случаяхъ, гдѣ имѣются въ виду усиленные выдѣленія черезъ кожу и почки (золотуха, сифилисъ), такіа обертыванія оставляются на 2—3 часа. Температура воды въ лихорадочныхъ болѣзняхъ—18⁰, въ хроническихъ—потеплѣе (22⁰—24⁰), особенно у дѣтей. Надо слѣдить за скорымъ и надлежащимъ согрѣваніемъ обернутыхъ больныхъ. Въ случаѣ надобности—искусственное согрѣваніе (см. стр. 637).

IV. Ванны водяныя.

1. Головная ванна дѣлается обыкновеннымъ способомъ; вода для нея берется тепловатая (25°); примѣняется при на кожныхъ болѣзняхъ головы: разнаго рода сыпяхъ и язвахъ и вшивости. Въ послѣднемъ случаѣ голова натирается передъ ванной зеленымъ мыломъ и омывается горячимъ уксусомъ. Головные ванны примѣняются отъ 1 до 3 разъ въ день, или рѣже, смотря по надобности, каждый разъ продолжительностью 5 минутъ. Послѣ каждой ванны слѣдуетъ обмывать голову прохладной водой. Въ холодную погоду не слѣдуетъ выходить на воздухъ съ влажной головой.

Головная
ванна.

2. Глазная ванна. И въ этомъ случаѣ употребляется 25-градусная вода. Примѣняется при глазныхъ болѣзняхъ. Въ сосудъ, наполненный такой водой, опускаютъ лицо такъ, чтобы и лобъ былъ погруженъ, и это продѣлываютъ разъ 10 подрядъ, повторивъ въ течение дня 3 раза. Послѣ каждой ванны глаза обмываются прохладной водой. Глазную ванну можно дѣлать и при помощи специально при пособленныхъ глазныхъ рюмочекъ, которыя продаются въ оптическихъ магазинахъ, также въ аптекахъ. Наполнивъ ихъ 25-градусной водой, приставляютъ ихъ къ глазамъ, которые цѣлесообразно держать при этомъ открытыми. Такая глазная ванна можетъ продолжаться долѣе обыкновенной, 2—3 минутъ (см. стр. 591).

Глазная ванна.

3. Ванна ручной кисти и всей руки. Вода 25°—28°, продолжительность— $\frac{1}{4}$ часа, 3 раза въ день—при воспаленияхъ и чирьяхъ ручной кисти или всей руки. Холодная (12—15° Реомюра) ручная ванна примѣняется, какъ отвлекающее средство, при приливныхъ головныхъ боляхъ, головокруженіи, при воспаленияхъ важныхъ внутреннихъ органовъ (мозга, легкихъ и пр.), особенно же при значительной нервной слабости.

Ручная ванна.

4. Ножная ванна а. Мелкая ножная (ступневая) ванна (холодная) приближается по дѣйствію къ хождению босикомъ по мокрой травѣ. Вода употребляется холодная, 10—15° Реомюра, и наливается въ сосудъ въ такомъ количествѣ, чтобы въ нее погружались лишь ступни ногъ. Купанье ногъ происходитъ при этомъ такимъ образомъ, что одна другую натираетъ. Продолжительность такого купанья — минуты три. И тутъ рекомендуется осторожность и постепенный переходъ отъ болѣе теплыхъ къ болѣе прохладнымъ ваннамъ, особенно у лицъ съ нѣжнымъ сложеніемъ и нервныхъ. Ступневая ванна, какъ и другія примѣненія воды (ножная паровая ванна, холодное обтираніе ногъ и массажъ ихъ) показаны при приливахъ къ головѣ, головныхъ боляхъ, головокруженіи, особенно же онѣ полезны при привычно-холодныхъ ногахъ. Время для ножныхъ холодныхъ ваннъ самое лучшее по утрамъ, прямо изъ постели. Послѣ ванны надо дѣлать движения, пока ноги согрѣются;

Ножная ванны.

непривычнымъ или слабымъ слѣдуетъ, для согрѣванія ногъ, лечь на короткое время обратно въ постель.

6. Глубокая ножная ванна (теплая). Вода употребляется 30—27-градусная (по Реомюру), и высота ея въ сосудѣ такая, что ноги погружаются въ нее по икры; продолжительность— $\frac{1}{4}$ часа. Весьма полезна при изъязвленіяхъ и садненіи пальцевъ, а также при болящихъ мозоляхъ. Послѣ теплой ножной ванны слѣдуетъ всегда обмыть ноги холодной водой, для предупрежденія простуды.

**Ванны до
колѣнъ.**

5. Доколѣнная ванна. Погруженіе ногъ до колѣнъ. Этотъ родъ ножной ванны дѣлается въ большинствѣ случаевъ изъ холодной воды и продолжается минутъ пять. Въ ванну или другую подобную посудину наливается вода въ требуемомъ количествѣ, и больной ступаетъ въ ней взадъ и впередъ. Такая ванна особенно полезна при приливныхъ головныхъ боляхъ, тяжести въ головѣ, при затрудненномъ дыханіи, сердечныхъ болѣзняхъ, значительной нервозности. Въ послѣднемъ случаѣ, а также у лицъ нѣжныхъ и слабыхъ, слѣдуетъ начинать съ болѣе теплой воды (25° R.) и постепенно переходить къ болѣе прохладной (18° R.).

Теплая доколѣнная ванна (30°—28° Реом.), продолжительностью — $\frac{1}{4}$ часа, благотворно дѣйствуетъ при язвахъ голени, составляющихъ часто послѣдствіе расширенныхъ венъ.

6. Колѣнная ванна. Стояніе въ водѣ на колѣняхъ. Эта ванна, какъ и предыдущая, дѣйствуетъ подобно полуваннѣ, но менѣе энергично, при головныхъ боляхъ, геморроѣ, при болѣзняхъ легкихъ, печени, почекъ, желудка, кишекъ и при нервныхъ страданіяхъ. И тутъ требуется постепенность перехода отъ болѣе теплой (25° R.) къ болѣе прохладной (18° R.) водѣ, особенно—при ревматизмѣ и у нервныхъ лицъ.

**Сидячая
ванна**

7. Сидячая ванна. Специально устроенная ванна (изъ цинка), или же другая подходящая посуда, наполняется водою съ такимъ расчетомъ, чтобы послѣдняя доходила лишь до пупка больного, когда онъ сядетъ въ нее. Ноги, находящіяся внѣ ванны, должны быть одѣты или тепло укутаны. Температура воды 25—18 градусовъ, продолжительность ванны отъ 3 до 10 минутъ. Холодная сидячая ванны не должны продолжаться долѣе $\frac{1}{2}$ —1 минуты. Сидячіе ванны можно соединять съ массажемъ живота, производимымъ при сидѣннн больного въ водѣ.

Сидячіе ванны дѣйствуютъ благотворно при всѣхъ болѣзняхъ живота, особенно же—при женскихъ болѣзняхъ, а также при запорѣ. Кромѣ того онѣ дѣйствуютъ и сильно отвлекающимъ образомъ, поэтому показаны при головныхъ боляхъ и другихъ страданіяхъ мозга, при бессонницѣ, а также при болѣзняхъ легкихъ.

8. Полуванна. Температура воды—25—20° Реом. Въ хроническихъ болѣзняхъ употребляются выше градусы, въ острыхъ—болѣе низкіе, при чемъ иногда бываетъ нужно, путемъ добавленія холодной воды, понизить температуру ванны до 16°. Воды должно быть въ ваннѣ столько, чтобы она не превышала верхней границы живота у сидящаго въ ней больного. На голову (лобъ) больного кладется холодный компрессъ, для предупрежденія прилива крови къ мозгу, и помощникъ, набирая въ ваннѣ воду рукою, обливаетъ верхнюю часть тѣла и растираетъ мягкимъ полотномъ (или губкой) плечи и спину; переднюю часть груди больной самъ себѣ обмываетъ руками. Въ ваннѣ же растираются и ноги и, наконецъ, слегка массируется (разминается) все тѣло. Продолжительность ванны—5—10 минутъ.

Полуванна пользуется широкимъ примѣненіемъ при всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ, при кори, скарлатинѣ, дифтеритѣ, воспаленіи легкихъ и тифѣ.

Полуванны дѣйствуютъ успокаивающимъ и отвлекающимъ образомъ при хроническомъ суставномъ и мышечномъ ревматизмѣ, при одышкѣ, геморроѣ, а также при ипохондріи, истеріи и нервныхъ состояніяхъ. У слабонервныхъ надо начинать съ болѣе теплыхъ ванъ (25°), такъ какъ холодныя возбуждаютъ и вызываютъ бессонницу, и постепенно доходить до 22-градусныхъ. Послѣ ванны слѣдуетъ всегда сдѣлать обливаніе болѣе прохладной водой (22—18° Р.), По окончаніи такого купанія цѣлесообразно, особенно для нервныхъ, не обтираться насухо, а одѣться и дѣлать движенія, пока тѣло согрѣется, или же лечь въ постель и тепло укрыться, что предпочтительнѣе или даже необходимо для слабыхъ лицъ.

9. Полная ванна отличается отъ полуванны тѣмъ, **Полная ванна.** что вода достигаетъ до самой шеи больного. Дѣйствіе ея нѣжнѣе, чѣмъ дѣйствіе полуванны, такъ какъ въ ней больной сидитъ спокойно и надъ нимъ не производятъ никакихъ манипуляцій, вродѣ обмываній, растираній, разминаній. Притомъ эти ванны дѣлаются обыкновенно теплыми, 27—28°, продолжительность—10 минутъ. Ванны эти противопоказуются у тѣхъ больныхъ, которые не выносятъ или для которыхъ можетъ быть вредно давленіе воды на грудь (легочнымъ, сердечнымъ больнымъ).

При ревматизмахъ, а также при очень сильной нервозности полная ванна весьма успокоительно дѣйствуетъ; она способствуетъ также лучшему и болѣе спокойному сну.

V. Паровыя ванны.

По дѣйствію своему паровыя ванны приближаются къ теплымъ водянымъ ваннамъ, но дѣйствуютъ гораздо энергичнѣе послѣднихъ. Полныя паровыя ванны вызываютъ обильное выдѣленіе пота, учащаютъ дѣятельность сердца и усиливаютъ обмѣнъ веществъ.

**Вліаніе
паровыхъ
ваннъ.**

Поэтому въ примѣненіи ихъ надо быть разборчивымъ и не назначать ихъ лицамъ, страдающимъ легкими и сердцемъ, а также труднымъ больнымъ и лицамъ слабымъ и нервнымъ. У такихъ умѣстны лишь частичныя паровыя ванны, т. е. примѣненные лишь на отдѣльных частяхъ тѣла, а также, въ случаѣ крайней необходимости, постельная паровая ванна (см. стр. 646). Не нуждаются въ паровыхъ ваннахъ тѣ, которые и безъ того легко потѣютъ. Вообще говоря, паровыя ванны примѣняются во многихъ болѣзняхъ, въ простудахъ, при насморкѣ, кашлѣ, при горловыхъ, ушныхъ, глазныхъ болѣзняхъ, особенно же при мышечномъ ревматизмѣ, невралгіяхъ, ишиасѣ и пострѣлѣ (пояснично-крестцовой боли); затѣмъ въ болѣзняхъ, при которыхъ цѣлесообразны усиленные выдѣленія кожей (сифилисѣ, золотуха, подагра, водянка почечнаго, а не сердечнаго, происхожденія).

Полная паровая ванна

1 Полная паровая ванна. Тутъ разумѣется не русская паровая баня, гдѣ воздухъ насыщенъ горячимъ паромъ, и не такъ назыв. римская баня, гдѣ потѣние вызывается влияніемъ сухого горячаго воздуха. Эти бани не переносятся и многими здоровыми людьми, дѣйствуя сильно на голову и на легкія, хотя, при умѣренномъ пользованіи ими, онѣ вообще полезны. Для такихъ, которые не переносятъ общей высокой температуры окружающаго воздуха, въ водолечебницахъ, а также иной разъ въ баняхъ, устрены такъ называемыя паровыя камеры, въ видѣ ящиковъ, бочекъ и т. п., въ которые садятся такимъ образомъ, чтобы голова была внѣ камеры. Паръ впускается въ камеру изъ аппарата, находящагося внѣ ея. Гдѣ такого аппарата нѣтъ, можно камеру приспособить такъ, чтобы удобно было вставить сосудъ, наполненный до половины кипяткомъ, а надъ сосудомъ стулъ, на которомъ усаживается берущій паровую ванну. Въ сосудъ съ водой вкладываютъ раскаленные камни для образования паровъ, если таковыхъ отъ кипятка не достаточно.

Домашнюю паровую ванну можно легко устроить и такъ, чтобы больной могъ ее принять лежа, а не стоя или сидя. Два стула ставятся, на соответственномъ росту больного разстояніи, съ обращенными другъ противъ друга передними краями сидѣній, и на нихъ кладутъ нѣсколько узкихъ досчатыхъ латъ, такъ чтобы вышло ложе, вродѣ походной кровати, и что либо замѣняющее подушку для головы. Желаящій подвергнуться пару ложится раздѣтый на латахъ, и на него накидывается шерстяное одѣяло такимъ образомъ, чтобы оно со всѣхъ сторонъ достигало земли, и плотно охватывало шею, а голова осталась бы открытой. Затѣмъ подъ ложемъ ставятся въ равномѣрныхъ промежуткахъ три сосуда съ кипяткомъ, одинъ — подъ лопатками, другой — подъ серединой тѣла, третій — подъ голеньями. Шерстяное одѣяло не даетъ выхода пару, и такимъ образомъ достигается весьма основательное потѣние. Потѣющий лежитъ 10—15 минутъ на спинѣ, а затѣмъ столько же времени на животѣ. Въ случаѣ недостатка пара, можно

быстро возобновить кипятокъ или, еще лучше, въ каждый сосудъ бросить раскаленный камень или кирпичъ. Если паръ слишкомъ горячъ, можно частью прикрыть сосуды крышками, такимъ образомъ, чтобы между крышкой и сосудомъ находились двѣ деревянные перекладки; тогда паръ будетъ выходить боковыми щелями и не жечь.

Если больному не трудно сидѣть въ пару, можно еще проще устроить ванну слѣдующимъ образомъ: берущій ванну садится на стулъ и его заворачиваютъ (вмѣстѣ со стуломъ) шерстянымъ одѣяломъ наглухо, оставивъ свободной лишь голову. Затѣмъ, приподнявъ у пола одѣяло, ставятъ одинъ сосудъ съ кипяткомъ подъ сидѣниемъ, а другой, съ деревянной перекладкой, подъ ноги сидящаго. Опустивъ одѣяло на свое мѣсто, даютъ пару собираться въ этомъ закрытомъ пространствѣ. Для усиления пара поступаютъ такъ, какъ сказано выше. Продолжается такая ванна полъ-часа.

Цѣлесообразно сѣсть (или лечь) въ паровую ванну не голымъ, а обернутымъ въ простыню; это и приятнѣе, особенно не выносящимъ прикосновения шерсти къ тѣлу, и дѣйствие пара болѣе основательное.

Послѣ всякой паровой ванны слѣдуетъ сдѣлать общее обмывание тѣла прохладной волей (18° R.), или же принять прохладную сидячую ванну, какъ описано выше (см. стр. 642).

2. Частичныя паровыя ванны. Ихъ можно такъ же просто дѣлать, какъ и предыдущія.

а. Паровая ванна для головы и шеи. Необходимыя принадлежности: 2 стула, сосудъ съ кипяткомъ и шерстяное одѣяло, которымъ больной накрывается съ головой до пояса. Стулья ставятся сомкнутыми передними краями. Берущій паръ садится верхомъ на одномъ стулѣ, руками опираясь на спинку другого стула, на которомъ помѣщается сосудъ съ кипяткомъ. Продолжительность ванны 20—40 минутъ. Послѣ ванны холодное обмывание головы, шеи и верхней половины туловища. Эта ванна примѣняется при разныхъ болѣзняхъ глазъ, ушей, носа, горла и полости рта. Паренье головы и шеи

б. Паровая ванна для рукъ. Разнится отъ предыдущей лишь тѣмъ, что голова остается свободной. Если одна лишь рука нуждается въ парѣ, можно другую освободить, хотя цѣлесообразнѣе заодно ужъ и другую парить, такъ какъ въ этомъ случаѣ происходитъ равномерное кровообращение. Продолжительность ванны 30—40 минутъ. Послѣ ванны—обмывание рукъ, шеи и верхней половины туловища. Паренье рукъ

в. Ножная паровая ванна. Принадлежности: 2 стула, сосудъ съ кипяткомъ и шерстяное одѣяло, накрывающее стулъ вмѣстѣ съ ногой. На одномъ стулѣ садится берущій паръ, а на другой стулъ, подъ которымъ ставится сосудъ съ кипяткомъ, помѣщается его нога. И тутъ цѣлесообразнѣе во всякомъ случаѣ парить обѣ ноги сразу, одновременно, съ цѣлью равномернаго кровообращения. Паренье ногъ

Ножную паровую ванну можно сдѣлать и такъ: на сосудѣ съ кипяткомъ кладутъ перекладину, на которую упираются ноги, соответственнымъ образомъ накрытыя до бедеръ.

При частичныхъ ваннахъ, какъ и при полныхъ, надо заботиться о томъ, чтобы паръ имѣлъ возможно меньше выхода наружу. Продолжительность ножной паровой ванны—20—30 минутъ. Послѣ ванны—обмываніе ногъ до колѣнъ.

Ручныя и ножныя паровыя ванны примѣняются, какъ отвлекающее средство, при головныхъ боляхъ, также при зябкости ногъ, лицевыхъ и зубныхъ боляхъ, одышкѣ. Онѣ примѣняются также, часто съ большой пользой, при отравленіяхъ крови, опухоляхъ, злокачественныхъ язвахъ, лишаяхъ, нагноеніяхъ и т. п.

**Парень
въ постели.**

3. Постельная паровая ванна. Принадлежности: постель, широкое и длинное шерстяное одѣяло, 2—3 простыни и нѣсколько бутылокъ, наполненныхъ горячей водой и плотно закупоренныхъ. На постели (матрацѣ) разстилаютъ прежде всего шерстяное одѣяло, а поверхъ него—намоченныя въ водѣ (20°) и выжатые простыни (2—3 вмѣстѣ). Больной ложится на простыни, которыми его (все тѣло) тщательно обертываютъ (см. стр. 640). Затѣмъ его обкладываютъ горячими бутылками, приготовленными заранѣе и завернутыми въ горячія мокрая полотенца: одна бутылка кладется у ступней, другія двѣ или четыре вдоль тѣла (по 1 или по 2 съ каждой стороны). Въ случаѣ надобности можно число бутылокъ увеличить. Послѣ этого больного укутываютъ въ шерстяное одѣяло, накрывая имъ его съ одной и другой стороны и со стороны ногъ, такъ что свободной остается лишь голова. Поверхъ всего кладется еще другое одѣяло.

Уложенному и укутанному такимъ образомъ больному даютъ потѣть часть другой, смотря по его самочувствію.

Эту постельную паровую ванну можно сдѣлать помощью не цѣльнаго, а лишь ножно-подмышковаго (см. стр. 640) обертыванія, чтó особенно умѣстно у дѣтей, которыхъ трудно держать долго въ цѣльномъ обертываніи.

По окончаніи паровой ванны слѣдуетъ всегда сдѣлать общее обмываніе тѣла прохладной водой (18—20° Р.) или же полуванну изъ 20—24 градусной воды.

Постельная паровая ванна дѣйствуетъ менѣе сильно, чѣмъ паровая камера (см. стр. 644), поэтому годится для болѣе слабыхъ лицъ, а именно—малокровныхъ, нервныхъ, а также для легочныхъ и сердечныхъ больныхъ.

**Песочная
паров. ванна.**

4. Песочная паровая ванна дѣйствуетъ подобно обыкновенной паровой, но въ болѣе сильной степени. Она производится слѣдующимъ образомъ. Деревянную ванну наполняютъ нагрѣтымъ до 40° Р. (въ печи) морскимъ или рѣчнымъ пескомъ и сажаютъ въ нее больного, по самую шею. Продолжительность такой ванны отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ часа. Послѣ нея—полу-или полная водяная ванна (27—25° Р.) съ слѣдующимъ общимъ обмываніемъ 22-градус-

ной водой. За отсутствіемъ водяной ванны, можно ограничиться общимъ обмываніемъ (22—24° R.). Песочныя ванны могутъ быть и частичныя, а именно—для рукъ и ногъ.

Благотворнѣе дѣйствуютъ песочныя ванны, если ихъ дѣлать изъ песка, нагрѣтаго солнцемъ, и сочетать съ купаньемъ въ морѣ или, по крайней мѣрѣ, въ рѣкѣ, что возможно лишь, конечно, лѣтомъ, при соотвѣтственно подходящихъ условіяхъ.

Песочныя ванны вызываютъ сильное выдѣленіе пота (отъ 1½ до 5 фунтовъ за разъ) и очень полезны при подагрѣ, хроническомъ ревматизмѣ, ишіасѣ, почечныхъ болязняхъ и ожирѣніи.

VI. Холодныя обтиранія (влажныя).

Холодныя обтиранія производятся слѣдующими двумя способами.

1) Простыню погружаютъ въ воду (22—18°), слегка выжимаютъ и набрасываютъ, въ видѣ плаща, на плечи больного. Одной рукой собравъ ее на груди его, другою, собирая по 2—3 складки простыни, крѣпко растираютъ всю заднюю поверхность тѣла, а затѣмъ тоже продѣлываютъ съ переднею поверхностію. Послѣ этого простыню снимаютъ и еще разъ основательно, но уже по голу, растираютъ все тѣло какой либо жесткой тканью (или специальными губчатыми перчатками), пока кожа не станетъ всюду красною.

2) Обтираніе производится лишь тканью или перчатками, намоченными въ холодной водѣ (16—18° R.); порядокъ обтиранія таковъ: животъ, затѣмъ—грудь, шея, лицо, верхнія конечности, спина, подъ конецъ—нижнія конечности. Какъ только перчатки или т. под. согрѣются, ихъ повторно погружаютъ въ воду. Это обтираніе можно дѣлать самому, безъ помощи посторонняго. Оно же предпочтительнѣе, когда нужно обтирать больного въ постели: въ послѣднемъ случаѣ обтираютъ раньше переднюю поверхность тѣла, а затѣмъ, при положеніи больного на животъ, и заднюю поверхность.

Обтираніе не должно продолжаться болѣе 3 минутъ, и всего лучше его дѣлать утромъ при вставаніи. Вечернія обтиранія въ большинствѣ случаевъ сильно возбуждаютъ и лишаютъ сна. Послѣ обтиранія надо остаться еще нѣкоторое время въ постели, или дѣлать движенія, пока тѣло согрѣется. Температура комнатнаго воздуха должна быть не ниже 14°.

Упомянутыя обтиранія можно назвать цѣльными въ противоположность частичнымъ, при которыхъ обтираются лишь отдѣльныя части тѣла.

Холодныя обтиранія служатъ для возбужденія кожной дѣятельности и дѣйствуютъ подобно холоднымъ обмываніямъ, но несравненно сильнѣе ихъ. Поэтому для малокровныхъ и нервзныхъ лицъ они не годятся—они слишкомъ возбуждаютъ и ослабляютъ.

**Способы
обтираній.**

Б. Внутреннія примѣненія воды.

**Питье воды
съ лѣчебной
цѣлью.**

1. Питье воды съ лѣчебной цѣлью. Утромъ, на тощакъ, стаканъ свѣжей холодной воды, сразу или же по столовой ложкѣ черезъ каждые полчаса, часто очень хрошее вспомогательное средство противъ запора. То же надо сказать о дѣйстви холодной воды при воспалительныхъ горловыхъ болѣзняхъ (дифтеритъ, крупъ, воспаленіи миндалинъ), при которыхъ ее даютъ каждый часъ по два—три глотка. Благодѣтельное дѣйствіе холодной воды у лихорадящихъ больныхъ извѣстно каждому, кто хоть разъ былъ свидѣтелемъ того, съ какой жадностью такіе больные хватаются за подносимый имъ глотокъ этого освѣжительнаго напитка, отстраняя всякое прочее питье.

При болѣзняхъ желудка, сопровождающихся рвотой, больнымъ часто изрыгается всякая пища и всякое питье, только не холодная вода, если давать ее не въ большихъ на разъ количествахъ: примѣрно, каждые полчаса по столовой ложкѣ (дѣтямъ—по чайной).

Точно такъ же малые количества холодной воды весьма полезны бываютъ и при поносѣ у маленькихъ дѣтей, будетъ ли онъ слѣдствіемъ расстройства пищеваренія или отражательнаго (рефлекторнаго) раздраженія при прорѣзываніи зубовъ. Можно растворить въ водѣ сырой бѣлокъ яйца и, прибавивъ немного сахара, давать ребенку по чайной ложечкѣ черезъ каждые полчаса. При недавнемъ поносѣ, одного этого средства бываетъ часто достаточно, чтобы остановить болѣзнь. Но и при остромъ поносѣ у взрослыхъ нѣтъ лучшаго успокоительнаго средства, какъ холодная вода (съ яичнымъ бѣлкомъ), каждый часъ по ложкѣ, и отваръ изъ риса, ячменной и овсяной крупы.

**Полосканіе
водой.**

2. Полосканія водою. Рядомъ съ другими лѣчебными приемами, систематическое, каждый часъ, полосканіе чистой комнатной водой (18°) весьма полезно при болѣзняхъ рта, языка, десенъ, зубовъ, при дифтеритѣ, крупѣ, воспаленіи миндалинъ, при катаррѣ гортани, зѣва и желудка. Если зубы не переносятъ прохладной воды, можно примѣнять ее и подогрѣтой (22°).

Дѣтямъ, которые не умѣютъ полоскать, даютъ, какъ, на примѣръ, при коклюшѣ, черезъ часъ по 2—3 глотка воды.

У грудныхъ дѣтей весьма важно слѣдить за содержаніемъ рта въ надлежащей чистотѣ. Возможно частыми вытираніями полости рта (языка, десенъ и зубовъ) тряпочкой, смоченной комнатной водой, предупреждаютъ образование кислотъ во рту и тѣмъ самымъ, желудочно-кишечныя расстройства—поносъ и рвоту.

Съ той же цѣлью надо заботиться о постоянной чистотѣ всего, что ребенокъ беретъ въ ротъ, прежде всего — о чистотѣ рожка (резинового соска), который, послѣ cadaго кормления, слѣдуетъ промыть водой и въ водѣ же сохранять до слѣдующаго кормления.

3. Носовой душъ. Спринцеванія, промыванія **Промыванія
носа.** Простѣйшій способъ промыванія носовой полости заключается въ слѣдующемъ. Резиновая трубка, длиною въ 1 метръ и толщиною приблизительно въ мизинецъ, и большой стаканъ представляютъ собою весь необходимый для этого приборъ. Больной, сидящій на стулѣ, беретъ одинъ конецъ трубки въ руку, а посторонній, ставъ на стулѣ около, беретъ другой конецъ и держитъ его въ стаканѣ, наполненномъ тепловатою (24⁰) водой. Помощь посторонняго является излишней, если имѣть специальный приборъ носового душа, поставленный на чемъ нибудь повыше головы больного. (Приборъ такой имѣется въ продажѣ) Присосавъ съ своего конца трубки, больной даетъ водѣ возможность вытекать черезъ нее изъ стакана струей. Прижавъ на время трубку пальцами, онъ вводитъ себѣ въ ноздрю конецъ ея, а, разжавъ, даетъ водѣ свободный доступъ въ носовую полость. Струя, входя въ одну ноздрю, выходитъ изъ другой обратно наружу.

Во все время прохождения струи черезъ полость носа, голову должно держать нѣсколько наклонной впередъ и не дѣлать глотательныхъ движеній (при глотаніи вода можетъ попасть въ ушную, Евстахievу трубу, начало которой въ носоглоточной полости).

5. Промыванія желудка **Промыванія
желудка.** Промыванія желудка нѣсколько не опасны и, при нѣкоторомъ навыкѣ, ихъ можетъ дѣлать надъ собою и самъ больной. Для этого требуется такъ наз желудочный зондъ (не слишкомъ мягкая резиновая трубка) съ воронкой на одномъ концѣ. Зондъ вводится (самимъ больнымъ или помощникомъ) черезъ ротъ и зѣвъ въ пищеводъ; глотательными движеніями больной можетъ способствовать болѣе легкому введенію зонда. Помощникъ вливаетъ чрезъ воронку около литра воды (24⁰), которая уходитъ въ желудокъ. Черезъ наклоненную затѣмъ внизъ (надъ посудой) трубку вода изъ желудка выходитъ обратно наружу, смѣшанная съ разжиженнымъ содержимымъ его, если таковое въ немъ было ко времени промывки. Если послѣднюю сдѣлать при пустомъ желудкѣ, то вытекающая обратно чистая вода, безъ примѣси слизи, свидѣтельствуетъ о томъ, что никакого серьезнаго страданія желудка не имѣется.

Промыванія желудка благотворно дѣйствуютъ при хроническихъ страданіяхъ желудка, катаррѣ, ракъ, расширеніи его. Они дѣлаются вначалѣ каждый день или черезъ день (втеченіи 1—5 недѣль), затѣмъ—рѣже, всего лучше—по утрамъ натощакъ.

6. Промываніе уха. Оно производится шаро-или грушевиднымъ резиновымъ шприцемъ 25-градусной водой. Въ продажѣ имѣются и специальные ушные шприцы (напр. шприцъ проф. Трельча). Промыванія эти примѣняются при загрязненіи и закупоркѣ ушного канала сѣрой, при гноетеченіи изъ уха (2—3 раза въ день), при катаррахъ средняго уха. При острыхъ воспаленіяхъ, съ сильной болью уха, воду для промыванія берутъ потеплѣе (28⁰).

**Промываніе
уха**

**Промываніе
половыхъ
органовъ.**

7. Промываніе половыхъ органовъ. Для мужчинъ употребляется маленькая спринцовка (вродѣ специальныхъ ушныхъ), для женщинъ—ирригаторъ, т. е. кружка съ приспособленной къ ней длинной резиновой трубкой, или клизопомпъ съ резиновымъ нагнетательнымъ шаромъ. Въ этихъ случаяхъ, болѣе чѣмъ въ другихъ, надо заботиться о содержаніи инструментовъ въ крайней чистотѣ. Воду всегда надо предварительно кипятить и затѣмъ лишь, остудивъ ее до опредѣленной температуры (25°), употребить въ дѣло. Холодной воды въ этихъ случаяхъ никогда не слѣдуетъ примѣнять. Исключеніемъ тутъ могутъ быть лишь кровотеченія изъ женскихъ половыхъ органовъ, хотя и въ этихъ случаяхъ гораздо болѣе дѣйствительными оказались горячія промыванія (отъ 45 до 65° Цельсія), ибо холодная вода вызываетъ сокращеніе сосудовъ, горячая же—свертываніе крови,

Для женщины самое лучшее и удобное положеніе при ея самою производимыхъ промываніяхъ—сидячее: на специально устроенномъ для этого стульчикѣ (бидѣ) или на доскѣ, положенной на раздвинутыхъ двухъ стульяхъ надъ посудиною, поставленной между послѣдними на полу. Количество воды, достаточное для основательной промывки влагалища, отъ 1 до 2—3 литровъ. Во время промыванія наконечникъ ирригатора или клизопомпы долженъ быть введенъ до самой шейки матки.

Такъ какъ систематически влагалищныя промыванія употребляются обыкновенно лишь въ случаяхъ болѣзней половыхъ органовъ (при бѣляхъ, зависящихъ отъ разныхъ причинъ), то приходится разводить въ водѣ лѣкарственные вещества: Календула, Гидрастисъ, Гамамелисъ и др. (см. „Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ“). О спринцеваніяхъ при мужскихъ половыхъ болѣзняхъ см. стр. 460.

Клистиры.

8. Клистиры. Клистирами преслѣдуются различныя цѣли.

Для клистира опорожняющаго берутся 2—4 стакана воды для взрослого и до 1 стакана для дѣтей. Температура клистирной воды—25°.

Часто полезно бываетъ послѣ испражненія ставить клистиръ для удержанія въ кишечникѣ. Количество воды въ такомъ случаѣ не болѣе полустакана, 18—20°. Это дѣлается съ цѣлью противодѣйствія брюшнымъ приливамъ и укрѣпленія кишечника. Ставятся такіе клистиры раза два или чаще въ день, всего лучше утромъ послѣ испражненія и вечеромъ—передъ отходомъ ко сну, продолжая нѣсколько недѣль.

Употребляются клистиры преимущественно при хроническихъ запорахъ, и не исключаютъ иной разъ, въ крайнемъ случаѣ, и слабительнаго средства, вродѣ столовой ложки прованскаго масла или какой нибудь діетической слабительной смѣси (см. стр. 219).

Клистиры показаны иной разъ и при поносахъ, разъ въ день 2—4 стакана. Этимъ преслѣдуется во 1) цѣль удаленія залежалыхъ каловыхъ массъ, которые раздражаютъ кишечникъ и

способствуютъ развитію газовъ, причиняя боли; во 2) какъ при промываніяхъ желудка, такъ и тутъ вода имѣетъ благотворное вліяніе на катарральную слизистую оболочку. При частыхъ болѣзненныхъ позывахъ на низъ полезны маленькіе клистиры (отъ 3 столов. ложекъ до $\frac{1}{2}$ стакана) изъ холодной, 15-ти градусной воды, 3—4 раза въ день. Вмѣсто чистой воды можно употребить для этого также густой отваръ льняного сѣмени или крахмала.

Въ рѣдкихъ случаяхъ (напр. при каловыхъ камняхъ) приходится прибѣгнуть къ такъ называемымъ высокимъ клистирамъ (проф. Nager'a) изъ нѣсколькихъ литровъ воды. Для этого употребляется длинная резиновая трубка, имѣющая на одномъ концѣ большую воронку, которую держатъ возможно выше, а на другомъ—наконечникъ (длиннѣе обыкновеннаго), который вставляютъ въ заднепроходную кишку. Вливаемая черезъ воронку вода, вслѣдствіе высокаго паденія, достигаетъ самыхъ отдаленныхъ отдѣловъ кишечника (до слѣпой кишки).

Для обыкновенныхъ клистировъ употребляютъ кружку Эсмарха съ длинной резиновой трубкой и наконечникомъ или клизопомпъ съ мягкимъ шаромъ. Для малыхъ клистировъ—разной величины резиновые шаро-или грушевидныя спринцовки.

В. Массажъ и лѣчебная гимнастика.

Массажъ и гимнастика суть способы механическаго воздѣйствія на кровообращеніе и обмѣнъ веществъ; дѣятельнымъ агентомъ при этомъ является движеніе при массажѣ—преимущественно пассивное, при гимнастикѣ—преимущественно активное.

1. Массажъ.

Массажъ состоитъ во 1) въ болѣе или менѣе слабомъ или сильномъ поглаживаніи или растираніи обнаженныхъ частей тѣла кончиками пальцевъ или всею ладонью; во 2) въ разминаніи и поколачиваніи (также похлопываніи) различныхъ мышечныхъ группъ.—Техника массажа гораздо сложнѣе и труднѣе, чѣмъ кажется, и для надлежащаго ея производства требуется не только точное знаніе строенія человѣческаго организма, но и значительная опытность и навыкъ, приобретаемый лишь продолжительнымъ упражненіемъ.

Поэтому, въ домашнемъ обиходѣ могутъ примѣняться лишь самые простые формы примѣненія массажа, въ случаѣ же болѣе серьезныхъ, если требуется массажъ, всего лучше обратиться къ помощи специалистовъ—массажиста или массажистки.

Въ острыхъ случаяхъ болѣзни массажъ почти не примѣняется, въ хроническихъ же онъ, какъ вспомогательное средство, приноситъ часто большую пользу, особенно когда примѣняется

въ связи съ другими вспомогательными мѣрами (паровыя ванны, обертыванія, лѣчебная гимнастика), также въ тѣхъ случаяхъ, когда больной лишенъ возможности или способности достаточнаго самостоятельнаго движенія.

Цѣлебное дѣйствіе массажа зависитъ до нѣкоторой степени, какъ можно думать, не отъ механическаго, а отъ магнетическаго вліянія, чѣмъ объясняется наблюдаемое часто утиханіе болѣе или исчезаніе чувства усталости подъ вліяніемъ самаго нѣжнаго поглаживанія или растиранія.

Весьма благотворное вліяніе массажъ имѣетъ въ нѣкоторыхъ женскихъ болѣзняхъ (неправильныя положенія матки и проч.), особенно массажъ по способу врачебнаго гимнаста—шведа Тюре-Брандта. Но этотъ родъ массажа—самый трудный, требующій большой опытности и технической ловкости, и онъ долженъ производиться только специалистами.

Здѣсь приводятся лишь нѣкоторые приемы массажа, которые каждый можетъ дѣлать и безъ особой подготовки.

**Массажъ
туловища.**

1) Поглаживаніе передней и задней поверхности и туловища производится на обнаженномъ тѣлѣ сухими руками или, если это непріятно массируемому, руками намасленными (вазелиномъ или прованскимъ масломъ, чистымъ или лѣкарственнымъ). Поглаживаніе производится прежде всего, сверху съ затылка внизъ, до крестца, нѣсколько разъ. Дѣйствіе массажа будетъ различное, смотря по тому, слабѣе или сильнѣе надавливается ладонями или кончиками пальцевъ. Вообще слѣдуетъ руководствоваться въ этомъ отношеніи ощущеніемъ массируемаго. Послѣднее служить указаніемъ и продолжительности массажа. Въ большинствѣ случаевъ она равняется 3—10 минутамъ. Промассировавъ спину указаннымъ образомъ, переходятъ къ передней поверхности туловища, которую массируютъ точно такъ-же, начиная съ шеи по направленію внизъ.

**Массажъ
живота.**

2. Массажъ живота примѣняется преимущественно для способствованія лучшему пищеваренію и для усиленія перистальтики кишекъ, и онъ болѣе дѣйствителенъ, если производится въ связи съ соотвѣтственными лѣчебно-гимнастическими упражненіями.

Первое условіе для правильнаго массажа живота—полная податливость (отсутствіе напряженія) брюшныхъ мышцъ, которая легче достигается при лежаніи на спинѣ съ нѣсколько притянутыми ногами.

Массажъ живота дѣлается различнымъ образомъ, причемъ всегда руководствуются положеніемъ и направленіемъ кишекъ, преимущественно—толстыхъ. Направленіе массажа, со стороны больного, идетъ справа налѣво. Чаще всего дѣлаютъ круговой массажъ такимъ образомъ, что, избравъ средоточіемъ пупокъ и поставивъ въ этомъ мѣстѣ большой палецъ, остальными пальцами обходятъ вокругъ него, какъ бы циркулемъ производя поглаживаніе въ такомъ направленіи, въ какомъ двигается стрѣлка на часахъ. Дѣй-

ствіе будетъ слабѣе или сильнѣе, смотря потому, съ какой силой надавливають поглаживающіе пальцы. Такой массажъ дѣйствуетъ преимущественно на тонкія кишки, при томъ—довольно сильно-раздражающимъ образомъ, особенно у женщинъ, а также у дѣтей и слабыхъ или слабонервныхъ лицъ. Въ такихъ случаяхъ поглаживаніе вокругъ пупка производятъ плашмя всей ладонью. Кругъ выйдетъ тутъ, конечно, шире, чѣмъ въ первомъ случаѣ, дѣйствіе же—болѣе нѣжное, хотя бы и надавливали ладонью довольно сильно.

Другой способъ массажа живота болѣе сложный. Слѣдуя направленію толстой кишки, кладутъ одну руку (или обѣ, одну надъ другой), на лѣвую сторону области желудка и проводятъ ея внизъ до паха, а отсюда, опять вверхъ, слѣва отъ пупка, до лѣвой области желудка. Получается такимъ образомъ овальной формы движеніе руки (или рукъ) въ лѣвой половинѣ живота. При этомъ надо стараться не производить никакого давленія, когда руки проводятся у пупка, а производится оно лишь на наружной сторонѣ живота до паха. Массажъ этотъ дѣлается плашмя ладонью, и лишь, когда достигаютъ паха, надавливають сильнѣе пальцами, какъ бы желая проникнуть въ малый тазъ. Такое овальное поглаживание повторяютъ отъ 15 до 30 разъ. Затѣмъ точно такъ же массируютъ и въ правой половинѣ живота: начиная съ области слѣпой кишки, проводятъ руку (или обѣ, одну надъ другой) вверхъ по правой сторонѣ живота; поворачивая влѣво и книзу, мимо пупка, возвращаются опять къ слѣпой кишкѣ. Надавливать можно лишь при движеніи руки вверхъ, напротивъ того при движеніи ея внизъ, мимо пупка, никакого давленія не должно производить. И этотъ овалъ дѣлаютъ разъ 15—30. Оба эти овала можно соединить и въ одинъ кругъ, тогда надавливаніе производится на лѣвой и на правой сторонѣ живота, т. е. соотвѣтственно восходящей и нисходящей части толстой кишки.

3. Массажъ желудка и печени. Обѣ руки кладутъ спереди на животъ такъ, чтобы онѣ концами пальцевъ сходились на средней линіи подъ ложечкой и дѣлаютъ обѣими одновременно поглаживаніе кнаружи, вдоль нижнихъ краевъ грудной клѣтки, каждый разъ, начиная сызнова съ срединной линіи, спускаясь руками все ниже, до пупка. Поглаживанія эти повторяютъ разъ 20—30, при надавливаніи не болѣе сильнымъ, чѣмъ это приятно больному.

**Массажъ
желудка и
печени**

4. Крестцово-позвоночный массажъ особенно полезенъ для беременныхъ, страдающихъ слабостью и болями въ крестцѣ, и можетъ производиться у нихъ (въ лежачемъ положеніи) каждый вечеръ, при отходѣ ко сну. Состоитъ изъ кругообразныхъ поглаживаній всей ладонью въ области крестца, при чемъ безразлично, идутъ ли они справа налѣво или слѣва направо. Массажъ такой продолжается 5—10 минутъ.

**Массажъ
крестца.**

5. Массажъ нижнихъ конечностей примѣняется обыкновенно при венозныхъ застояхъ и отекахъ, напри-

**Массажъ
ногъ.**

мѣрь у женщинъ во время беременности. Техника слѣдующая: обхватываютъ ногу такимъ образомъ, чтобъ большіе пальцы сходились на внутренней сторонѣ ноги, и поглаживаютъ обѣими руками одновременно, всегда снизу вверхъ по направленію къ животу, болѣе или менѣе надавливая не только всей ладонью, но и толстыми пальцами, которые идутъ при этомъ вдоль внутреннихъ венъ ноги; начинаютъ массированіе не у ступни, а близъ живота, снизу вверхъ, постепенно начиная ниже и ниже, но все въ одномъ направленіи снизу вверхъ. Итакъ, вначалѣ поглаживаютъ, исходя приблизительно изъ середины бедра (разъ 10—15), затѣмъ съ колѣна (столько же разъ), которое отдѣльно нѣкоторое время поглаживаютъ и съ котораго дѣлаютъ еще нѣсколько движеній вверхъ до живота. наконецъ со ступни вверхъ до живота, также разъ 10—15, послѣ чего тоже продѣлываютъ надъ другой ногой. Положеніе массируемаго — всегда лежачее. вполнѣ поперечное (горизонтальное) — на спинѣ, съ слегка приподнятой на подушкѣ головой.

II. Лѣчебная гимнастика.

Здѣсь не говорится о гимнастикѣ, какъ искусствѣ для развитія силы и ловкости въ здоровомъ человѣкѣ, а о тѣхъ гимнастическихъ упражненіяхъ, которыя могутъ оказаться полезными въ болѣзненныхъ случаяхъ и которыя удобоисполнимы при домашней обстановкѣ.

Какъ и массажъ, гимнастика имѣетъ довольно ограниченное примѣненіе въ лѣченіи. О томъ ужъ не говоримъ, что въ острыхъ болѣзняхъ гимнастика никогда не примѣняется, прежде всего по той простой причинѣ, что пациентъ — боленъ и физически не въ состояніи гимнастировать (въ остромъ ревматизмѣ, въ тифѣ и другихъ лихорадочныхъ болѣзняхъ и проч.); но и въ хроническихъ болѣзняхъ никто не станетъ лѣчиться одной лишь гимнастикой, а непремѣнно соединить ее съ другими способами, — съ массажемъ, съ лѣченіемъ воздухомъ, водой и проч.; въ этихъ случаяхъ гимнастика, конечно, желательна и полезна, но она можетъ быть замѣнена и обыкновеннымъ моціономъ, бѣганіемъ и т. п.

Есть однако случаи, гдѣ гимнастикѣ, какъ лѣчебному приему, надо отвести первое мѣсто, это — въ случаяхъ врожденнаго или пріобрѣтеннаго ненормальнаго состоянія костной или мышечной системъ тѣла (напр. сутуловатость, горбъ, искривленіе позвоночника, сведеніе членовъ и пр.). Въ такихъ случаяхъ лѣчебная гимнастика носитъ особое названіе, именно — ортопедія и требуетъ обыкновенно особыхъ механическихъ приспособленій, практикуемыхъ въ специальныхъ ортопедическихъ заведеніяхъ.

Здѣсь приводятся лишь свободныя гимнастическія упражненія, т. е. такія, какія больной можетъ дѣлать самъ, безъ посторонней помощи и безъ особыхъ затѣйливыхъ приборовъ.

Такия упражненія полезны для укрѣпленія мышцъ (при исхуданіи ихъ), для разминанія суставовъ (при хроническомъ суставномъ ревматизмѣ), для усиленія обмѣна веществъ (при разстройствахъ питанія: малокровіи, нервной слабости, золотухѣ, ожирѣніи). Они показаны также при подагрѣ, при болѣзняхъ желудка и кишекъ, при запорѣ, геморроѣ; затѣмъ при приливахъ къ головѣ (не всегда); головокруженіи; при зябкости ногъ (въ соединеніи съ массажемъ); при болѣзняхъ легкихъ болѣе глубока вдыханія и выдыханія достигаются опредѣленными гимнастическими упражненіями и проч.

При лѣченіи гимнастикою надо вооружиться терпѣніемъ: рѣдко производимыя упражненія безцѣльны, а надо ихъ продолжать втеченіи по меньшей мѣрѣ нѣсколькихъ недѣль, если желательно добиться успѣшныхъ результатовъ. Необходимо соблюдать при этомъ слѣдующія правила:

**Правила
свободной
гимнастики.**

1) надо знать, какъ производятся отдѣльныя гимнастическія упражненія: кромѣ отдѣльныхъ нижеприводимыхъ предписаній, необходимо спокойное, медленное, но въ то-же время ритмическое и энергичное выполненіе ихъ, по возможности—при дыханіи носомъ, а не ртомъ. Основное положеніе тѣла при гимнастическихъ упражненіяхъ есть прямое, на вытяжку, съ сомкнутыми каблуками (пятками) и съ нѣсколько наружу раздвинутыми кончиками ногъ.

2) Во время упражненій надо быть одѣтымъ легко и свободно, чтобы нигдѣ ничто не стѣсняло и не давило.

3) Надо заботиться о доступѣ достаточнаго количества свѣжаго воздуха; всего лучше, значить, гимнастировать на вольномъ воздухѣ или, по крайней мѣрѣ, при открытыхъ окнахъ,

4) и всегда передъ ѣдой; самое же удобное время—утромъ, послѣ сна, и вечеромъ, передъ ужиномъ.

5) Начинать надо всегда съ болѣе легкихъ упражненій и чередовать болѣе легкія съ болѣе трудными. Если во время упражненій появляется усталость или учащенное дыханіе или сердцебиеніе, необходимо отдохнуть въ достаточной мѣрѣ, прежде чѣмъ вновь начать упражненія

6) Гири и другія приспособленія можно употреблять лишь тогда, когда организмъ вполне и успѣшно освоился съ свободными упражненіями. Необходимости, однако, въ нихъ нѣтъ, насколько дѣло идетъ о лѣченіи, и во всякомъ случаѣ лучше выбрать болѣе легкія, чѣмъ тяжелыя гири и т. п.

7) Женщины во время регулъ должны прекратить упражненія, если онѣ при нихъ нехорошо себя чувствуютъ, или если регулы слишкомъ обильны.

8) При болѣе серьезныхъ разстройствахъ никогда не слѣдуетъ на собственный рискъ заниматься гимнастикой, а должно всегда посоветоваться предварительно съ врачомъ.

9) Во всякомъ случаѣ гимнастика безусловно неумѣстна при страданіяхъ костей, при серьезныхъ порокахъ сердца, при тяже-

лыхъ легочныхъ страданіяхъ и, какъ уже указано выше, во всѣхъ острыхъ болѣзняхъ, которыя всегда требуютъ покоя или вынуждаютъ къ этому больного.

Примѣненіе гимнастики въ отдѣльныхъ болѣзненныхъ состояніяхъ.

Различныя болѣзненные состоянія требуютъ и различныхъ упражненій. Поэтому могутъ быть даны лишь общія предписанія; въ каждомъ же отдѣльномъ случаѣ надо руководствоваться, при выборѣ тѣхъ или другихъ упражненій, свойственными ему особенностями. Это и нетрудно, если придерживаться слѣдующаго правила: всякое гимнастическое упражненіе надо оставить, коль скоро оно не подѣйствуетъ на силу больному или вызываетъ ощущение боли въ упражняемыхъ частяхъ тѣла, и не раньше предпринять другое, пока больной не отдохнетъ вполне, или пока не пройдетъ совершенно неприятное ощущеніе, оставшееся послѣ предыдущаго упражненія.

I. Гимнастическія упражненія при малокровіи, нервной слабости, нервозности, ожирѣніи, слабомъ тѣлесномъ сложеніи, слишкомъ быстромъ ростѣ.

Каждое упражн. повторяется отъ 4 до 10 разъ.

- | | | | |
|--|---|--------------|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Протянуть руки впередъ 2. Разводить руки въ стороны. 3. Складывать руки на груди, какъ бы обхватывая себя. 4. Толкать руками впередъ. 5. " " въ стороны. 6. " " вверхъ. 7. " " внизъ. 8. " " назадъ. 9. Поднимать руки въ стороны до поперечнаго положенія. 10. Поднимать руки въ стороны и вверхъ, описывая ими полукругъ. 11. Кружить руками, какъ бы чертя каждой рукой кругъ въ воздухѣ. 12. Вертѣть распростертыми въ стороны руками, какъ бы буравя (сверля) ими. 13. Сгибать кисти рукъ. 14. Разгибать кисти рукъ. 15. Кружить кистями рукъ въ одну и другую сторону. 16. Нагибать туловище впередъ. 17. Разгибать " " 18. " " назадъ. 19. Разгибать туловище въ правую сторону. 20. Разгибать туловище въ лѣвую сторону. | } | Подбоченъсь. | <ol style="list-style-type: none"> 21. Кружить туловищемъ (подбоченъсь): туловище при этомъ какъ бы описываетъ форму воронки, возможно большей. 22. Вертѣть туловищемъ (подбоченъсь), какъ если бы, не поворачивая головы, оглядываться то въ одну, то въ другую сторону. 23. Нагибать голову впередъ. 24. " " назадъ. 25. " " въ одну сторону. 26. " " " другую " 27. Вертѣть головой вправо. 28. " " влево. 29. Становиться поочередно то на кончики ножныхъ пальцевъ, то на подошвахъ. 30. Поднимать ногу въ стороны: сначала—одну, затѣмъ—другую. 31. Поднимать ногу впередъ: сначала—одну, затѣмъ—другую. 32. Кружить ногою, какъ бы описывая ею кругъ въ воздухѣ: сначала—правою, затѣмъ—лѣвою. 33. Поднимать и опускать колѣно: сначала—одно, затѣмъ другое. 34. Сгибать ногу въ колѣнѣ и разгибать ее, какъ бы отталкивая что |
|--|---|--------------|---|

- либо ногой: сначала — одну, затѣмъ—другую ногу.
35. Упражнения съ помощью палки *): держа палку близъ

*) Палка должна быть круглой и длиною отъ пола до подмышки упражняющагося. Последний беретъ ее близъ концовъ, такъ чтобы тылъ каждой руки былъ обращенъ кверху, а палка прикасалась къ тѣлу спереди, и, держа ее такимъ образомъ, описываетъ ею полукругъ впередъ и вверхъ; затѣмъ въ такомъ же полукругѣ ведетъ палку сверху, кзади и внизъ, пока она коснется тѣла сзади, соответственно тому мѣсту, гдѣ она прикасалась спереди.

II. Гимнастическія упражненія при брюшныхъ застояхъ, запорѣ, болѣзняхъ печени, геморроидальныхъ страданіяхъ, расстройствахъ менструаций.

Каждое упражн. повторяется отъ 6 до 12 разъ.

1. Нагибать туловище впередъ.
2. " " назадъ.
3. " " вправо.
4. " " влѣво.
5. Вертѣть туловищемъ (какъ выше указано при 22).
6. Кружить туловищемъ (см. выше при 21).
7. Приподнимать туловище, лежа на спинѣ съ протянутыми ногами, такъ чтобы изъ лежачаго положенія послѣдовало сидячее; при этомъ руки скрещиваютъ за затылкомъ, какъ бы поднимая ими туловище
8. Присѣдать, становясь на кончикахъ ногъ и сгибая колѣни.
9. Сгибать и разгибать колѣни (см. выше при 34).

Подбѣ-
нны

- концовъ ея обѣими руками, поднимать ее высоко надъ головою; опускать ее кзади внизъ; опускать палку сбоку, съ одной стороны и съ другой; съ продѣтой за спиной (въ сгибахъ локтей) палкой ходить и глубоко дышать
36. Игры на вольномъ воздухѣ, въ мячъ, крокетъ, кегли, лаунъ-тенисъ и т. п. очень полезны для малокровныхъ и слабыхъ субъектовъ.

10. Кружить ногами (см. выше при 32).
11. Упражнение съ палкой (переступаніе черезъ палку): держа палку въ рукахъ, протянутыхъ книзу, переступаютъ черезъ нее ногой, сначала — одной, затѣмъ—другой.
12. Полезны также пиленіе и рубаніе дровъ, игра въ кегли, верховая ѣзда, ѣзда на велосипедѣ, упражненія съ силомѣромъ (аппаратомъ, въ соевой единицей опредѣляющимъ силу), переступаніе черезъ палку, впередъ и назадъ, игра на биллиардѣ и проч.—всѣ подобныя средства способствуютъ правильному кровообращенію и нормальной дѣятельности кишечника.

III. Гимнастическія упражненія при приливахъ къ головѣ, головокруженіи, головныхъ болѣзняхъ и т. п.

Цѣль упражненій—отвлеченіе крови изъ верхней части тѣла въ нижнюю.

Каждое упражн. повторяется отъ 8 до 20 разъ.

1. Потирать руками.
2. Поднимать ноги впередъ, (сначала — одну, затѣмъ—другую).

3. Поднимать ноги въ стороны (сначала — одну, затѣмъ—другую).
4. Отводить ноги кзади (сначала — одну, затѣмъ—другую).

- | | |
|---|---------------------------------|
| 5. Кружить ногами (какъ при 32). | 9. Сгибать и разгибать руки. |
| 6. Прыгать на пальцахъ ногъ при сомкнутыхъ пяткахъ и раздвинутыхъ ступняхъ. | 10. Кружить стопами ногъ. |
| 7. То же въ положеніи присѣданія. | 11. Поднимать колѣни. |
| 8. Раздвигать ноги и сдвигать. | 12. Сгибать и разгибать колѣни. |
| | 13. Круженіе кистями рукъ. |

IV. Гимнастическія упражненія при одышкѣ (астмѣ).

Одышка чаще всего бываетъ при легочныхъ и сердечныхъ страданіяхъ; въ этихъ случаяхъ, если они тяжелые, гимнастика должна примѣняться лишь съ большой осторожностію. Одышка можетъ, однако, быть и чисто нервнаго происхожденія (астма). Въ этомъ случаѣ, какъ и вообще для укрѣпленія дыхательныхъ мышцъ, служатъ слѣдующія упражненія, во время которыхъ стараются воздухъ вдыхать носомъ, а выдыхать ртомъ.

Каждое упражн. повторяется отъ 5 до 15 разъ.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Руки въ стороны. | 10. Поднимать и опускать плечи, (какъ бы „пожимая“ плечами). |
| 2. „ „ обхватъ. | 11. Двигать плечами взадъ и впередъ. |
| 3. Толкать руками впередъ. | 12. Поднимать палку надъ головой. |
| 4. „ „ въ стороны. | 13. Опускать палку сзади. |
| 5. „ „ вверхъ. | 14. „ „ въ сторону. |
| 6. „ „ внизъ. | 15. Ходить съ продѣтой за спиной въ сгибахъ локтей палкой, и другія упражненія. |
| 7. „ „ назадъ | |
| 8. Кружить руками. | |
| 9. Вертѣть „ | |

V. Гимнастическія упражненія для усиленія дыхательной способности легкихъ, для развитія ихъ, кромѣ указанныхъ (при IV) упражненій цѣлесообразны еще слѣдующіе три приема:

1) держа руки по швамъ и наклонивъ голову впередъ—разъ 10 вдыхать и выдыхать.

2) упершись ладонями въ бокъ или скрестивъ руки на спинѣ и выставивъ грудь впередъ, а голову держа высоко—также 10 разъ вдыхать и выдыхать.

3) верхушечное дыханіе: къ сторонѣ груди, возможно выше къ подмышкѣ, прикладываютъ ладонь соотвѣтственной руки, а другая рука кладется на голову. Это дѣлается поочередно лѣвой и правой рукой и такимъ образомъ энергичнѣе расширяется при выдыханіи та или другая верхушка легкаго.

Глубокія выдыханія могутъ при подходящихъ условіяхъ достигаться и много проще. Такъ, если при выдыханіи считать по порядку числа, хотя бы и тихо, для себя только, сколько хватаетъ возможности, то при этомъ легкія сжимаются до возможной степени и тѣмъ энергичнѣе они, при послѣдующемъ вдыханіи, расширяются, втягивая въ себя большее количество свѣжаго воздуха.

Усиленное движеніе происходитъ также, какъ извѣстно, при восхожденіи на горы, бѣганы, верховой и велосипедной ѣздѣ и плаваніи, а также при чтеніи вслухъ, декламированіи, пѣніи и игрѣ на духовыхъ инструментахъ.

Цѣль легочной гимнастики— усилить притокъ кислорода въ легкія, т. е. въ кровь, что имѣетъ весьма благотворныя послѣдствія не только для страдающихъ легочными болѣзнями, но и для малокровныхъ, золотушныхъ, рахитичныхъ, ревматическихъ, нервныхъ и проч. больныхъ.

Ортопедическія упражненія, т. е. такія, которыя имѣютъ цѣлью выравнивать неправильное строеніе тѣла, вродѣ сутоловатости, горба и другихъ искривленій позвоночника и т. п., могутъ быть также свободныя, то есть, выполняемыя безъ особыхъ приспособленій, но, какъ таковыя, приносятъ и очень мало пользы. Вообще упражненія эти, т. е. свободныя, въ этихъ случаяхъ тѣ же, какія приведены выше. Болѣе или менѣ радикально подобныя болѣзни лѣчатся въ специальныхъ ортопедическихъ заведеніяхъ и клиникахъ, куда и слѣдуетъ обращаться въ болѣе серьезныхъ случаяхъ—

Изложенныя выше гимнастическія упражненія суть активныя, т. е. такія, которыя самъ больной выполняетъ, въ томъ размѣрѣ и съ той силой, какъ ему желательно или какъ можетъ.

Есть, однако, случаи, гдѣ больной не въ состояніи собственными силами производить гимнастическія упражненія, или лишентъ вообще способности движенія (параличъ); въ такихъ случаяхъ соотвѣтственныя упражненія надъ больнымъ производятся лицомъ постороннимъ. Такія п а с с и в н ы я упражненія требуютъ осторожнаго примѣненія, такъ какъ при слишкомъ большемъ усердіи можно разорвать связки, нарушить цѣлость мышцъ и даже переломать кости. Подобныя случайности происходятъ особенно тогда, когда больной оказываетъ сопротивленіе (невольное—обыкновенно) производимымъ надъ нимъ движеніямъ. (Въ такихъ случаяхъ стараются отвлечь вниманіе больного разговоромъ или чѣмъ либо другимъ). Вообще, пассивно-лѣчебная гимнастика—дѣло врача специалиста, въ домашнемъ же лѣченіи оно можетъ имѣть развѣ лишь весьма рѣдкое и незначительное примѣненіе.

Поясненіе къ нижеслѣдующей 4-ой части.

Гомеопатическое лѣкарствовѣдѣніе (или лѣкарствовознание) приобрѣталось и приобрѣтается путемъ испытанія разнаго рода лѣкарственныхъ веществъ на здоровыхъ людяхъ въ столь, именно, большихъ дозахъ, которыя способны вызвать и искусственно болѣзненные разстройства.

Рядъ такихъ разстройствъ, вызванныхъ испытываемымъ веществомъ на здоровомъ человѣкѣ, называется патогенезомъ*) этого вещества, а описание и толкованіе патогенеза составляетъ характеристику такового.

Патогенезъ вещества долженъ служить руководящей нитью для выбора послѣдняго съ лѣчебной цѣлью, въ случаѣ болѣзни, по „закону подобія“, т. е. по большему или меньшему сходству болѣзни естественной съ болѣзнію, искусственно вызываемой, или, иначе говоря, съ патогенезомъ соотвѣтственнаго вещества. Выбранное по такимъ даннымъ вещество дается съ лѣчебной цѣлью въ несравненно меньшей дозѣ—въ гомеопатической.

Подробнѣе обо всемъ этомъ сказано въ 1 ч., гл. 3 и 4.

Объ антидотахъ (противосредствахъ) подробно сказано на стр. 610. Въ этомъ „Лѣкарствовѣдѣніи“ антидоты приводятся лишь при тѣхъ лѣкарствахъ, относительно которыхъ о нихъ имѣются болѣе или менѣе достовѣрные свѣдѣнія. То же надо сказать о „продолжительности дѣйствія“ лѣкарствъ“, „дополняющихъ“ лѣкарствахъ и т. п.

Общая положенія о совмѣстимыхъ и несовмѣстимыхъ лѣкарствахъ, въ случаяхъ требующагося сочетанія таковыхъ, приведены на стр. 28—29.

Въ этомъ „Лѣкарствовѣдѣніи“ лѣкарства слѣдуютъ другъ за другомъ не въ порядкѣ алфавита, а такъ, какъ они приведены на страницахъ 35—40.

*) Отъ греческ. словъ „патосъ“—„генезисъ“, которыя означаютъ: болѣзнь—происхождение

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

**Краткое гомеопатическое
лѣкарствовѣдѣніе.**

Въ нижеслѣдующемъ списокѣ, для удобства въ отношеніи справокъ, лѣкарства слѣдуютъ другъ за другомъ въ алфавитномъ порядкѣ, и при каждомъ лѣкарствѣ обозначенъ тотъ номеръ, (а не страница), подъ которымъ оно описывается ниже въ „Лѣкарствовѣдѣніи“.

№№	№№
Абіесъ	121
Абсинтъ	122
Агарикусъ	101
Агнусъ кастусъ	123
Азарумъ	124
Акалифа	125
Аконитъ	1
Алоэ	126
Алюмень (Алюмина)	102
Алюминій	127
Амбра	103
Аммоніакумъ гумми.	128
Аммоніумъ броматумъ	104
Аммоніумъ карбоникумъ	49
Аммоніумъ муріатикумъ	129
Аммоніумъ фосфорикумъ	130
Анакардиумъ	50
Ангустура	131
Антимоніумъ курдумъ	25
Аписъ	2
Апоморфинъ 132 см. подъ №	44
Апоцинумъ каннабинумъ.	133
Аранеа	134
Аргентумъ нитрикумъ	51
Арника	3
Арсеникумъ	4
Асеник, юдат. см Арсеңик.	
Артемизія	135
Аса (или Аза) фетида	105
Аурумъ (муріатик.)	26
Арумъ трифиллумъ	136
Ацидумъ бензоикумъ, (или Бензсе ацид).	53
Ацидумъ муріатикумъ (или Муріат. ацид.).	54
Ацидумъ нитрикумъ (или Нитри ацид)	47
Ацидумъ пикриникумъ.	137
Ацид. сульф или Сульф. ацид. см. подъ №	19
Ацид. флуор. или Флуор. ацид. см. подъ №	35
Ацидумъ фосфорикумъ или Фосфо-ри ацидумъ.	47
Баптизія	28
Барита карбоника	29
Бензое ацид. или Ацид. бензоик.	53
Белладонна	5
Берберисъ	106
Бисмутумъ	107
Бовиста	138
Бораксъ	139
Бріонія	6
Бромъ	55
Буфо	140
Валеріана	56
Вакцининъ	108
Вератрумъ альбумъ	7
Вератрумъ вириде	141
Вербаскумъ	142
Вибурумъ	144
Винка миноръ	145
Вискумъ альбумъ	143
Гамамелисъ	30
Гвако	151
Гааякумъ	146
Геліантусъ	147
Геллеборусъ	109
Гелоніасъ	148
Гельземинъ	31
Гепаръ сульфурисъ	8
Гидрастисъ	57
Гидрокотиле	149
Гіосціамусъ	58
Глоноинъ	59
Графитъ	60
Гринделія	150
Даміана	152
Дигиталисъ	61
Діоскореа	110
Дрозера	32
Дулькамара	33

№№	№№
Евкалиптъ (Эвкалиптъ)	197
Евфразія (или Эвфразія)	48
Евпаторій (—Эвпаторій)	199
Евфорбій (—Эвфорбій)	198
Игнація	9
Ипеакауана	10
Ирисъ	153
Юбумъ	34
Кадмій	154
Кактусъ	62
Каладій	155
Кали броматумъ	112
Кали юдатумъ	63
Кали карбоникумъ	64
Калькареа ацетика	163
Калькареа юдата № 164, см. подъ № 35	
Калькареа карбоника	35
Кали нитрикумъ (Нитрумъ)	201
Калькареа флуорика (см. подъ Каль- кар. карб.)	35
Калькареа фосфорика № 65 см. подъ 35	
Кальмія	157
Камфора	66
Каннабисъ индика	36
Кантарисъ	37
Капсикумъ	67
Карбо анималисъ № 158, см. подъ 38	
Карбо вегетабилисъ	38
Кардусъ маріанусъ	111
Каулофиллумъ	159
Каустикумъ	67
Клематисъ	69
Коффеа	39
Коккулусъ	70
Коккусъ какти	160
Коллинсонія	113
Колоцинтъ	11
Кольхикумъ	71
Коніумъ	72
Копаиба	162
Коффеа	39
Крокусъ	73
Кротонъ	161
Купрумъ (ацетикъ)	40
Лаписъ альбусъ	165
Лауроцеразъ	166
Лахезисъ	74
Лелумъ	75
Лептандра	167
Ликоподій	41
Лилумъ	169
Литій карбон.	114
Лобелія	166
Меніантесъ	170
Мезереумъ	76
Миллефолій	77
Меркурій биодат. № 42 см. подъ № 12	
Меркурій коррозивъ № 43 см. подъ 12	
Меркурій солублисъ	12
Меркурій ціанат. № 13, см. подъ № 12	
Мосхусъ или Мошусъ	171
Мурексъ	172
Муріатисъ ацид. или Ацид. муріатик. 54	
Наія	173
Натр. муріат.	78
Нитрумъ (Кали нитрик.)	201
Нуксъ вомика	14
Нуксъ мосхата (или Н. мошата)	79
Нуфаръ	174
Олеандръ	175
Опіумъ	44
Палладій	176
Паулінія	177
Платина (муріатика)	80
Плантаго	178
Плумбумъ	81
Подофиллумъ	115
Пульсатилла	15
Ранункулусъ	82
Реумъ	179
Рододендронъ	83
Румексъ	116
Русъ токсикодендронъ	16
Сабадилла	180
Сабаль серулата	181
Сабина	84
Самбукусъ	182
Сангвинарія	85
Сарраценія	183
Секале корнутумъ	117
Селеніумъ	86
Сенега	184
Сенеціо	118
Сенія	45

	№№		№№
Сизигіумъ ямболаумъ	185	Филиксъ масъ	93
Силиція	17	Фиголакка	94
Спигелія	46	Фосфоръ	21
Спонгія	18	Фосфори ацидумъ или Ацид. фосф.	47
Станнумъ	87	Фукусъ везикулосусъ	193
Стафизагрія	88	Хамомилла	22
Стикта пульмонарія	186	Хелидоніумъ	95
Стиллингія	187	Химафилла	197
Страмоніумъ	89	Хина	23
Стронцій карбоник.	188	Цепа	194
Сульфуръ	19	Цикламенъ	195
Сульфур. ацид. или Ацид. сульфурик. —		Цикута	96
Сульфур. юдат. см. подъ	19	Цимицифуга	97
Табакумъ	189	Цина	24
Тарантула см. подъ №	134	Цинкъ.	98
Теридіонъ см. подъ №	134	Циннабарисъ см. подъ №	12
Тевкріумъ	190	Эвкалиптъ	197
Теребинтина	119	Эвпаторій	199
Тартар. эметик. (или Тартар. сти- біат.)	20	Эвфорбій	198
Туя	90	Эвфразія	48
Ува урси	191	Элантусъ	120
Уранумъ нитрик.	91	Эскулусъ	99
Фелландріумъ	192	Этуза	100
Феррумъ	92	Юглансъ	200

Существенными дополненіями къ этому „Лѣкарствовѣднію“ надѣо считать:

1) характеристики многихъ лѣкарствъ, приведенныя въ отношеніи разныхъ болѣзней, во 2-ой части этой книги; поэтому въ „Лѣкарствовѣдніи“ при такихъ лѣкарствахъ указаны, между прочимъ, страницы той части и соотвѣтствующія болѣзни;

2) наружныя примѣненія многихъ лѣкарствъ, изложенныя въ 1-ой части на страницахъ 41—47 (гл. VI);

3) все сказанное о лѣкарствахъ въ 1-ой же части, въ главахъ: I, II, III, IV, V

Обращается вниманіе читателя еще на слѣдующее:

тѣ лѣкарства въ „Лѣкарствовѣдніи“, при которыхъ не приведены страницы и названія болѣзней изъ 1-ой части, упоминаются въ послѣдней безъ характеристики ихъ, или же они вовсе тамъ не упоминаются, по причинѣ ихъ „второстепенности“ и во избѣжаніе чрезмѣрнаго нагроможденія вообще лѣкарствъ;

читатель, однако, долженъ знать, что „второстепенное“ или рѣдко употребляемое лѣкарство въ подходящемъ случаѣ можетъ оказаться даже весьма важнымъ;

поэтому слѣдуетъ удѣлять вниманіе этимъ второстепеннымъ или малоупотребительнымъ лѣкарствамъ въ такой же мѣрѣ, какъ и „главнымъ“, дѣлая себѣ, для памяти, соотвѣтствующія замѣтки при чтеніи „Лѣкарствовѣднія“.

№ 1. Акони́тъ.

Aconitum Napellus. Лютикъ голубой, Борецъ.

Основное дѣятельное начало (алкалоидъ) въ Акони́тъ — Аконитинъ (также Аконитовая кислота).

Акони́тъ дѣйствуетъ на органы кровообращенія и на нервномозговую систему. При испытаніи его на здоровыхъ людяхъ въ болѣе крупныхъ дозахъ наблюдается усиленіе сердечной дѣятельности съ состояніемъ возбужденія; слишкомъ большія дозы вызываютъ, наоборотъ, упадокъ жизнедѣятельности съ временнымъ исчезновеніемъ пульса, похолодѣніемъ кожи и слабостью до степени обморока. Лихорадочное состояніе отличается состояніемъ возбужденія и достигаетъ наивысшей степени въ вечерніе часы и около полуночи. Раскрываніе тѣла при этомъ больному непріятно, равно какъ страданія его усиливаются отъ свѣжаго воздуха и отъ движенія. Настроеніе духа подавленное, пугливое, тоскливое, до степени боязни смерти, или же оно смѣняется сильнымъ безпокойствомъ, нетерпѣливостью и порывистостью въ движеніяхъ и занятіяхъ. Сонъ, несмотря на то, что больного къ нему клонить, и на чувство усталости, отличается безпокойствомъ и метаніемъ больного въ постели, часто прерывается вздрагиваніями, сопровождается страшными сновидѣніями.

Акони́тъ умѣстенъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ лихорадочнаго состоянія, въ которыхъ нѣтъ процесса воспаленія, или когда воспаленіе или зараза не успѣли еще достигнуть значительнаго развитія; особенно онъ умѣстенъ въ лихорадкахъ катарральныхъ и ревматическихъ. Чѣмъ раньше онъ въ такихъ случаяхъ дается, тѣмъ лучше, при томъ въ тѣмъ болѣе частыхъ дозахъ, чѣмъ сильнѣе лихорадка. Въ случаяхъ простуды 2 — 3 дневное примѣненіе Аконита часто вполне достаточно, чтобы привести вновь въ порядокъ начинающееся разстройство отправления органовъ.

Безполезно давать Акони́тъ во второй стадіи воспаленія, особенно же при опасной лихорадочной болѣзни, наприм., при дифтеритѣ и т. п., когда требуются особые специфическія средства и когда начинать лѣченіе Аконитомъ равносильно напрасной потерѣ драгоценнаго времени; въ такихъ случаяхъ специфическое средство (Беллад., Меркур.) будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и противолихорадочнымъ.

Акони́тъ умѣстенъ и въ нелихорадочныхъ болѣзняхъ, когда имѣется усиленіе напряженія въ системѣ кровообращенія, характеризующееся быстрымъ, полнымъ и твердымъ пульсомъ, приливомъ крови къ головѣ, стучаніемъ въ вискахъ, какъ это бываетъ часто, наприм., у людей полнокровныхъ, или подъ вліяніемъ сильнаго жара, особенно жгучихъ солнечныхъ лучей (солнечный ударъ). Въ такихъ случаяхъ Акони́тъ можетъ спасти отъ мозгового удара или воспаленія.

Вообще говоря, Акони́тъ умѣстенъ больше въ острыхъ болѣзняхъ, нежели въ хроническихъ, и наиболѣе полезенъ у особъ молодыхъ, крѣпкихъ и полнокровныхъ.

Характеристика Аконита въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ; 108 (Мозгов. ударъ), 122 (Невральной), 139 (Астма), 176 (Катарръ рта), 190 (Бол. зубовъ), 224 (Кровотеч. изъ желудка), 235 (Боль живота), 268 (Желтуха), 306 (Охриплость, кашель), 310 (Катар. гортани), 316 (Крупъ), 331 (Гриппъ), 336 (Приливъ крови къ легкимъ), 337 (Кровохарканіе), 341 (Крупозн. восп. легк.), 352 (Чихотка легк.), 371, 376, 379, (Бол. сердца), 418 (Катар. матки), 440 (Головн. боль у беремен.), 442 (Кровотеч. маточн.), 443 (Бол. послѣ родов.), 451, 452, 453, 455 (Бол. новорожд.), 509 (Ломота, Подагра), 524 (Бол. костей), 528 (Бол. мышцъ), 561 (Крапивница), 569 (Экзема).

Подобными Акониту лѣкарствами являются *Беллад.*, *Феррумъ*, *Игнація*, *Пульсат.*, именно—въ отношеніи усиленія лихорадочнаго возбужденія къ вечеру и полуночи.—*Вератр. вириде* отличается отъ Аконита большей возбужденностью артеріальной системы и меньшей нервной раздражительностью; кромѣ того характерна для Вератр. вир. яркочерная полоска вдоль середины языка. — *Гельземинъ* отличается отъ Аконита мягкимъ и менѣе скорымъ пульсомъ, также сонливостью, спокойствіемъ, при краснотѣ лица.—При сердечныхъ болѣзняхъ *Кальмія* и *Русъ* характеризуются ощущеніемъ онѣмѣнія (засыпанія) и ползанія мурашекъ въ лѣвой рукѣ, какъ и Аконитъ. — При остромъ ревматизмѣ Акониту подобны *Бріонія* и *Актеа рацемота*.

Длительность дѣйствія Аконита — короткая; поэтому въ острыхъ болѣзняхъ приемы должны быть частые, въ хроническихъ—каждые 24—48 часовъ.

Противосредствами Аконита являются: *Хаомилла*, *Коффеа*, *Белладонна*; самъ же Аконитъ считается антидотомъ *Нуксѣ вом*. Ослабляютъ или совсѣмъ уничтожаютъ дѣйствіе Аконита слѣдующія средства: кислоты (уксусъ, лимонъ), кофе, крепкій чай.

Сульфуръ усиливаетъ дѣйствіе Аконита въ лихорадочныхъ болѣзняхъ, когда таковое недостаточно; Сульфуръ является также полезнымъ противъ послѣдствій злоупотребленія Аконитомъ.

Дѣленія: $\times 3$ — при не сильномъ лихорадочномъ состояніи и вообще во всѣхъ острыхъ (свѣжихъ) заболѣваніяхъ; при сильной же лихорадкѣ, ($39\frac{1}{2}$ до 40 и болѣе градус.) показано даже $\times 1$ — Θ въ хроническихъ заболѣваніяхъ, равно какъ въ такихъ, которыя не сопровождаются жаромъ предпочтительно 3-е (сотенное) дѣленіе. При невралгіи иногда лучше дѣйствуетъ *Аконитинъ* $\times 3$, вообще же при этой болѣзни и при нервномъ возбужденіи, равно какъ въ душевныхъ болѣзняхъ—высшія явленія, 12—15—30-е, предпочтительнѣе.

№ 2. Аписъ.

Apis mellifica. Пчелиный ядъ.

Тинктура готовится изъ всей пчелы, порошокъ же (Аписинъ) изъ растиранія содержимаго ядовитыхъ пузырьковъ пчелы съ молочнымъ сахаромъ.

Примѣненія Аписа для лѣчебныхъ цѣлей основаны на тѣхъ явленіяхъ, которыя получаютъ отъ зараженія пчелинымъ ядомъ, прежде

всего отъ ужаленія пчелы. Явленіе эти суть: быстро образующаяся опухоль съ очень сильной колющей, стрѣляющей или жгучей болью; опухоль желтовато-розоваго цвѣта, напряженная; если опухоль не сосалась вскорѣ, то она краснѣетъ все больше и больше и становится похожей на рожистое воспаленіе. Въ дальнѣйшемъ теченіи цвѣтъ опухоли принимаетъ синеватый оттѣнокъ, и въ окружности образуется отекъ. Въ худшихъ случаяхъ наступаетъ даже омертвѣніе тканей.—Рядомъ съ описанными явленіями претерпѣваетъ значительныя измѣненія и общее состояніе ужаленнаго субъекта, главнымъ образомъ со стороны душевной. Больному кажется, что онъ умретъ, хотя и не выказываетъ особаго страха смерти; является сильное душевное угнетеніе, апатія, общая слабость, до степени обморока; отяжелѣніе головы съ неодолимой склонностью ко сну; ощущеніе разбитости въ тѣлѣ, нервная дрожь, бредъ, вскрикиваніе.—Всѣ страданія усиливаются вечеромъ и ночью; лѣвая половина тѣла кажется болѣе пораженной, нежели правая; больной чувствуетъ себя хуже въ теплѣ.

Примѣняется главнымъ образомъ при водяночныхъ опухляхъ особенно почечнаго происхожденія, или явившихся вслѣдствіе воспаленія вообще, поэтому не подходитъ для водянки застойной, наприм., отъ цирроза печени или отъ порока сердца. При воспалительной водянкѣ сустава подобны Апису *Бріонія, Іодъ, Кали іодат.* и съ нимъ совмѣстимы.

Далѣе, Аписъ показанъ при рожистомъ или другомъ подобномъ пораженіи кожи и подкожной клѣтчатки, если имѣется отекъ вокругъ пораженнаго мѣста; при пузырчатыхъ пораженіяхъ кожи.

Въ лихорадочныхъ болѣзняхъ примѣненіе Аписа основано на его душевныхъ симптомахъ. Въ такихъ случаяхъ Аписъ подобенъ Арсенику и съ нимъ совмѣстимъ.

Аписъ вліяетъ на женскіе половые органы. Во время беременности, особенно въ послѣдніе 3—4 мѣсяца, его не слѣдуетъ брать въ слишкомъ низкихъ дѣленіяхъ изъ опасенія выкидыша. Симптомы: напіраніе матки книзу при отсутствіи регулъ, при приливахъ къ головѣ. Вліяетъ на яичники, особенно на правый, какъ *Лажезисъ* на лѣвый, и примѣняется при воспаленіи ихъ, особенно при кистахъ.

Равнымъ образомъ вліяетъ Аписъ и на мужскія яички, при ихъ воспаленіи и водянкѣ.

При глазныхъ болѣзняхъ: при воспалительномъ отека, при пораженіяхъ роговицы, при сильной утомляемости глазъ отъ чтенія, съ болью ихъ, съ зудомъ въ вѣкахъ или жженіемъ и колотьемъ (подобно *Арсенику.*, *Кали бихром.*).

Аписъ показанъ при хрипотѣ и сухомъ кашлѣ и при хроническомъ катаррѣ гортани и дыхательнаго горла, подобно *Лажез.*, *Карб. вел.*, *Румекс.*, *Беллад.*, *Хамомил.*, *Кротал.*, *Нуксъ вом.*, *Бріонія*, *Игнац.*, *Арсен.*, *Гіосціамус.*

При поносахъ у дѣтей: исхудалость, явленія раздраженія мозга (пробужденіе со сна съ крикомъ, какъ при водянкѣ головы); испраженія водянисты, желты, произвольны, хуже по утрамъ.

Характеристика Аписа въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней при-

ведена на слѣдующихъ страницахъ: 66 (Малярія), 154 (Неврозы), 197 (Ангина), 518 (Ревматизмъ суставовъ), 535 (Бол. кожи), 549 (Рожа), 561 (Крапивница), 595 (Бленоррея глазъ).

Противосредства: *Лихезисъ*, отчасти *Русъ*, также *Ледумъ*.

Дѣленія: при острыхъ отечныхъ состояніяхъ $\times 3$; при водянкахъ — болѣе низкія, а при накожныхъ болѣзняхъ болѣе высокія, чѣмъ $\times 3$; при раздраженіи мочевого пузыря — 6-е дѣленіе; при глазныхъ болѣзняхъ — высшія дѣленія предпочтительны. *Аконитъ* умѣряетъ слишкомъ сильное дѣйствіе Аписа, если таковое имѣется.

№ 3. Арника.

Arnica montana. Баранья трава

Гомеопатическая тинктура готовится изъ корня этого растенія для внутренняго употребленія, изъ всего же растенія — для наружнаго. — Основныя дѣятельныя начала: эфирное масло, смолистое вещество, Арницинъ.

Арника дѣйствуетъ на капилляры (волосные сосуды, т е на самыя мелкія развѣтвленія кровеносныхъ сосудовъ); въ большихъ дозахъ она ихъ расширяетъ и тѣмъ способствуетъ выступленію изъ нихъ крови. Поэтому, въ малыхъ дозахъ она дѣйствуетъ цѣлбно при поврежденіяхъ (травмахъ) съ кровоподтеками, или застоями крови, или кровотеченіемъ, при сотрясеніи мозга и при кровоизліяніи въ мозгъ при ущемленіяхъ или растяженіяхъ мышцъ.

Арника уменьшаетъ или устраняетъ боль или ощущеніе разбитости въ мышцахъ, являющіяся вслѣдствіе чрезмѣрнаго ихъ напряженія, или вслѣдствіе простуды въ холодную сырую погоду. Показующее Арнику страданіе усиливается при движеніи

Арника вліяетъ и на сердечную мышцу при увеличеніи и усталости ея отъ чрезмѣрной работы; показаніями служатъ боль и ощущеніе разбитости во всей груди. особенно же въ лѣвой половинѣ ея, крайне чувствительной даже къ прикосновенію или давленію; она показана при грудной жабѣ и при ожирѣніи сердца.

Рѣже показана Арника при мышечномъ ревматизмѣ, при которомъ чаще подходятъ *Брюня* и *Цимицифуга*. Арника мало вліяетъ на сухожилія и суставныя связки, гдѣ ей предпочитать надо *Русъ*. При эваныхъ ранахъ больше подходитъ *Календула*. При поврежденіи нервовъ предпочтительнѣе *Гиперикумъ*, напримѣръ — при ущемленныхъ пальцахъ. При гладкихъ порѣзахъ — *Стафизагрия*. При колотыхъ ранахъ, если Арника не скоро унимаетъ боль, это дѣлаетъ обыкновенно *Ледумъ*. При пораженіи костей лучшимъ средствомъ является *Симфитумъ*.

Арника показана при тифозныхъ заболѣваніяхъ, также при гнилокровныхъ. Въ этихъ случаяхъ въ сильной степени нарушается нормальное состояніе кровеносныхъ сосудовъ съ застоями крови, разслабленіемъ сосудистыхъ стѣнокъ и просачиваніемъ изъ нихъ кровяныхъ элементовъ.

Арника можетъ *предупредить* нагноенія послѣ, напримѣръ, опе-

рацій, также послѣ родовъ. Въ послѣднемъ случаѣ Арника успокаиваетъ боль отъ послѣродовыхъ потугъ, способствуя въ то же время лучшему сокращенію матки.

Арника вызываетъ чирьеподобныя воспаленія кожи, поэтому она оказывается цѣлебною при фурункулахъ и язвахъ. Если нарывъ, готовый уже вскрыться, не вскрывается, то арника ускоряетъ процессъ его назрѣванія; данная же въ началѣ воспаленія (наружно и внутренно), она можетъ предупредить нагноеніе.

Арника имѣетъ нѣкоторое вліяніе на желудочно-кишечный аппаратъ, при разстройствѣхъ его, сопровождающихся приливомъ крови къ головѣ послѣ ѣды, головной болью и сонливостью; при этомъ отрыжка какъ бы тухлыми яйцами, испражненія натужныя и вонючія боли въ животѣ острыя и колющія.

Дополнительными симптомами, показывающими Арнику въ болѣзняхъ, служатъ: ощущеніе жара въ головѣ при отсутствіи такового или даже при холодѣ въ остальномъ тѣлѣ; больному постель все кажется твердой, хотя бы она и не была таковою; онъ то и дѣло старается мѣнять положеніе. Боль и ощущеніе разбитости упомянуты уже выше.

Замѣчательно, что при послѣдствіяхъ поврежденій Арника оказывается полезной не только, когда поврежденіе свѣжаго и недавняго происхожденія, но часто и тогда, когда уже много времени прошло съ момента такового; это необъяснимо, но на практикѣ подтверждается часто.

Характеристика Арники въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльных болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 100 (Мигрень), 122 (Невральгія), 127 (Судороги), 145 (Параличъ), 333 (Коклюшъ), 337 (Кровохарканіе), 371 (Бол. сердца), 418 (Остр. кагар матки), 442 (Кровотеч. изъ берем. матки), 443 (Послѣродов. бол.), 517 (Ревматизмъ суставовъ), 528 (Ревматизмъ мышцъ), 535 (Бол. кожи), 550 (Нарывы).

Дѣленія: обыкновенно нисшія до цѣльной тинктуры; высшія дѣленія умѣстны при послѣдствіяхъ давняго ушиба, равно какъ при мозговыхъ пораженіяхъ.

Длительность дѣйствія: малыхъ дозъ — 24 часа, большихъ дозъ — до 8 дней,

№ 4. Арсеникъ, (Арсеник. альб.)

1) *Arsenicum album* Бѣлый мышьякъ.

2) *Arsenicum iodatum*, йодистый мышьякъ. (Всюду, гдѣ приводится Арсеникъ, подразумѣвается Арсеникумъ альбумъ).

1) Бѣлый мышьякъ или мышьяковистая кислота примѣняется въ гомеопатіи либо въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ, либо въ разведеніяхъ. 1-е сотенное или 2-е десятичное разведеніе получается путемъ растворенія 1 ч. мышьяка въ 60 чч. горячей дестиллированной воды и прибавленія еще 30 чч. воды и 10 чч. алкоголя, и отсюда ужъ дальнѣйшія разведенія. Аллопатическій фюлеровъ растворъ содержитъ въ 30 граммахъ 0,2 грм. или въ 150 чч. — 1 ч. мышьяка, т. е. растворъ этотъ нѣсколько слабѣе гом 1-го

сотенного и значительно крѣпче 3-го десятичн. разведенія, ниже котораго Арсен. не примѣняется въ гомеопатіи.

Болѣзненные состоянія, въ которыхъ Арсеникъ является цѣлебнымъ средствомъ, зависятъ всегда отъ болѣе или менѣе серьезнаго расстройства въ тканяхъ, въ крови или въ нервахъ и выражаются сильными, мучительными страданіями, доводящими больныхъ до крайней степени безпокойства и тоски и вселяющими въ нихъ страхъ смерти. Расстройства въ организмѣ, наблюдаемые при случайныхъ отравленіяхъ мышьякомъ (см. стр. 614), и при испытаніяхъ его на здоровыхъ людяхъ для выясненія его фізіологическихъ дѣйствій, весьма многочисленны, чѣмъ объясняется весьма обширное и разнообразное примѣненіе очень малыхъ дозъ мышьяка на практикѣ при лѣченіи больныхъ.

Расстройства отъ мышьяка отличаются между прочимъ своею періодичностью, перемежаемостью, съ не совсѣмъ нормальными промежутками. Боли, являющіяся въ разныхъ нервныхъ областяхъ, имѣютъ жгучій характеръ и уменьшаются обыкновенно отъ сухой теплоты. Страданія сопровождаются большимъ безпокойствомъ, страхомъ (страхомъ смерти) и отчаяніемъ и нѣсколько облегчаются отъ наружной теплоты. Они появляются часто или ухудшаются во время покоя (при лежаніи), облегчаются же обыкновенно при стояніи, при ходьбѣ или вообще при движеніяхъ; рѣдко наблюдается обратное. Нѣкоторыя отдѣльныя расстройства, особенно — возбужденіе, безпокойство, астма, головокруженіе, ухудшаются въ предполуденные часы, другія же, напримѣръ, невралгіи — въ послѣполуденные; и тутъ рѣдко наблюдается обратное.

Характеристика Арсеника при нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзняхъ приведена на слѣдующихъ страницахъ: 64 (Малярія), 87 (Холерина), 90 (Дизентерія), 122 (Невральгіи), 139 (Астма), 163 (Меланхолія), 200 (Катар. желудка), 224 (Кровавая рвота), 259 (Геморрой), 279 (Бол. печени), 308 (Охриплость), 328 (Хрон. бронхитъ), 353 (Чихотка), 370, 372, 379 (Бол. сердца), 439 (Разстр. пищеварен. у берем.), 452 (Насморкъ у новорожд.), 482 (Малокровіе и Блѣдн. немочь), 489 (Раковая болѣзнь), 495 (Золотуха), 497 (Туберкулезъ), 503 (Сахарн. бол.), 518, 521 (Ревматизмъ суст.), 525 (Воспал. костей), 535, 554, 569 (Болѣзни кожи), 549 (Рожа), 595 (Бленоррея глазъ).

Отсюда видно, какъ обширно примѣненіе Арсеника въ болѣзняхъ и неудивительно поэтому, что онъ раздѣляетъ черты подобія съ очень многими лѣкарствами; всего ближе къ нему подходятъ *Меркур. корроз.*, *Кали бихромик.* и *Іодъ*.

Изъ дѣленій всего чаще примѣняются: 3 — при холерѣ, тифахъ, ракахъ, хроническихъ болѣзняхъ матки, при хроническихъ воспаленіяхъ и катаррахъ; 3-ѣе сотенное — при острыхъ воспаленіяхъ и катаррахъ. Дѣленія выше 3-го полезны особенно при невральгіяхъ, хроническихъ перемежающихся лихорадкахъ и при астмѣ.

Длительность дѣйствія, смотря по частотѣ и величинѣ пріемовъ отъ нѣсколькихъ часовъ до 3—4 недѣль.

Противосредства: *Ипекакуана*, *Хина*, *Нуксъ vom.*, *Купрумъ*, *Іодъ*; при послѣдствіяхъ хроническаго отравленія мышьякомъ — *Антимон. круд.*

2) **Арсеникъ іодатъ** *Arsenicum iodatum*. Іодистый мышьякъ.

Примѣняется какъ въ порошковомъ видѣ, такъ и въ разведеніяхъ.

Дѣйствіе этого лѣкарства слагается изъ дѣйствія его составныхъ частей—арсеника и іода, главнымъ образомъ — перваго. Примѣняется особенно часто при туберкулезныхъ пораженіяхъ разнаго рода, при легочной чахоткѣ (стр. 353), туберкулезѣ кожи (волчанки), лимфатическихъ железъ и проч.; далѣе при разныхъ сыпяхъ (экзема — стр. 569) лишаяхъ, при ракъ.

Для примѣненія надо брать возможно болѣе свѣжій препаратъ этого лѣкарства, особенно если онъ порошковый, и его слѣдуетъ сохранять въ темной стеклянкѣ. Въ формѣ таблетокъ онъ сохраняется всего лучше.

Дѣленіе — не ниже 3, но и таковое должно примѣняться лишь въ видѣ исключенія. Цѣлесообразнѣе всего дѣленія $\times 4$ до $\times 6$; послѣднее у слабыхъ и прикованныхъ къ постели больныхъ.

№ 5. Белладонна.

Atropa Belladonna. Красавка. Бѣшеная вишня

Эссенція готовится изъ сока находящагося въ цвѣту свѣжаго растенія путемъ смѣшенія съ равной частью 90% алкоголя.

Белладонна въ большихъ приѣмахъ ядовита, въ малыхъ же, гомеопатическихъ, она — одно изъ благотѣлнѣйшихъ цѣлебныхъ средствъ. Основное вещество, заключающееся въ этомъ средствѣ и обуславливающее его ядовитость, есть Атропинъ.

Явленія отравленія Белладонной (или Атропиномъ) суть слѣдующія:

Приливы крови, особенно къ головѣ, сильное біеніе сонныхъ артерій. Сильная головная боль въ области лба, глаза сухіе и налиты кровью; расширеніе зрачковъ. Ощущеніе покалыванія и зуда въ кожѣ, какъ бы отъ укуса насѣкомыхъ, при чемъ руки горячи и сухи; кожа красная, скарлатиноподобная. Сухость также слизистой оболочки рта и зѣва и затрудненное глотаніе, съ неодолимой потребностью производить глотательныя движенія. Сильная жажда, но отвращеніе къ водѣ. Пульсъ въ началѣ замедляется, затѣмъ учащается. Сильная боль въ мышцахъ, доходящая до дрожанія членовъ. Сильное душевное безпокойство и возбужденіе, какъ бы торопливость во всѣхъ движеніяхъ и неистовство. Несмотря на слабость — стремленіе къ непрерывному движенію. Галлюцинаціи зрѣнія и слуха. Веселый бредъ, дьявольскій смѣхъ, необычайный блескъ выступающихъ изъ орбитъ глазъ, стремленіе кусаться. — При болѣе сильномъ отравленіи — судороги, обморокъ, полная потеря чувствительности, параличъ сфинктеровъ мочевого пузыря и прямой кишки, коматозное состояніе.

Этотъ списокъ явленій, вызываемыхъ большими приѣмами Белладонны (Атропина), взятъ нарочито не изъ гомеопатическихъ источниковъ (въ которыхъ они также приводятся, но еще подробнѣе), а изъ „Руководства физиологической терапии“ профессора Г. Келера (аллопата въ Галле) Тамъ же сказано: „Послѣ того, какъ Ганеманъ, употребляя до невѣроятности раз-

бавленную настойку Белладонны, видѣлъ появленіе папулезной сыпи и сухости въ зѣвѣ, онъ полагалъ, что производитъ такимъ образомъ искусственную скарлатину, и совѣтовалъ употреблять столь до нельзя разведенный растворъ противъ скарлатины. Это,—продолжаетъ Келеръ,— было еще менѣ удивительно (разъ гомеопаты отклонились (?) отъ природы), чѣмъ тотъ фактъ, что такой клиническій учитель, какъ Гуфеландъ, (знаменитый профессоръ-аллопаты начала прошлаго столѣтія, во многомъ сходявшійся съ Ганеманомъ), въ своей брошюрѣ о предохранительной силѣ Белладонны противъ скарлатины пошелъ еще дальше, чѣмъ отецъ гомеопатическихъ настоекъ и крупинокъ, и дошелъ до утвержденія, будто (?) очень малыя количества Белладонны, принимаемыя во время скарлатинной эпидеміи, могутъ предупредить высыпание, или другими словами, что Атропинъ есть наилучшее профилактическое средство противъ скарлатины“. Книга Келера, въ которой это напечатано, издана въ 1875 году и ни съ Ганеманомъ ни съ Гуфеландомъ Келеръ, конечно, не согласенъ, но не на основаніи собственного опыта, а потому, что „длинный рядъ авторовъ“ времени Ганемана это отрицали. Того же Келеръ не принялъ во вниманіе, что съ того времени десятки тысячъ врачей, испытавшихъ Белладонну въ указанномъ отношеніи, вполне подтверждаютъ мнѣніе Гуфеланда и Ганемана.

Симптомы Белладонны по большей части ухудшаются въ послѣобѣденные и вечерніе часы; чувствительность къ холоду очень велика, особенно ухудшаются отъ холода нервныя боли; нервная боль, достигши наивысшей степени, вдругъ прекращается. чтобы появиться въ другомъ мѣстѣ.

Белладонна примѣняется въ очень многихъ болѣзняхъ при соотвѣствующихъ ей симптомахъ. Характеристика ея, въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзней, приведена на слѣдующихъ страницахъ: 122 (Невралгія), 125 (Судороги), 139 (Астма), 161 (Манія), 167 (Сумасшествіе), 176 (Катар. рта), 186 (Зубн. боль), 230 (Запоръ), 234 (Болъ живота), 259 (Геморрой), 268 (Бол. печени), 307 (Кашель), 310 (Катар. гортани), 316 (Крупъ), 327 (Хрон. бронхитъ), 336 (Приливъ крови къ легкимъ), 372 (Бол. сердца), 509 (Подагра), 524 (Бол. костей), 536 (Бол. кожи), 549 (Рожа), 550 (Нарывы), 564 (Опоясыв. лишай), 595 (Бленоррея глазъ).

Дѣленія: X3 (X2 въ исключительныхъ случаяхъ)—въ острыхъ болѣзняхъ, 3-е сотенное и болѣе высокія—въ хроническихъ и особенно въ болѣзняхъ нервной и душевной системы.

Длительность дѣйствія: при единичныхъ малыхъ дозахъ—лишь нѣсколько часовъ; послѣдовательное дѣйствіе большихъ дозъ — не дѣли двѣ.

Противосредства: *Камфора, Опіи, Цинк., Гепаръ сульф., Пульсат.*—Сама Беллад. считается противосредствомъ Хины, Валеріаны, Хамомил., Меркурія. Очень близокъ по дѣйствію къ Белладоннѣ—*Гюсциам.* особенно нервно-душевыми симптомами.

Атропинъ не отличается, вообще говоря въ своихъ дѣйствіяхъ отъ цѣльной Белладонны.

Отъ Атропина наблюдается впрочемъ лучшее дѣйствіе въ нервныхъ болѣзняхъ, при застарѣлой нервной головной боли и послѣ ли-

хорадки, при галлюцинаціяхъ и эпилепсіи, при раздраженіи горла и гортани, при коклюшѣ въ судорожной стадіи и при удушьи, при рвотѣ у беременныхъ, при боляхъ отъ язвы желудка Антропин. сульфурик. употребляется въ такихъ случаяхъ въ $\times 4 - \times 3$ дѣленіяхъ.

№ 6. Бріонія.

Bryonia alba. Переступень бѣлая.

Эссенція готовится изъ сока, выжатого изъ свѣжаго корня и смѣшаннаго съ виннымъ спиртомъ.

Отравляющія дозы Бріоніи вызываютъ боли въ животѣ, обильныя жидкія испражненія, даже рвоту. Свѣжій сокъ изъ корня, приложенный къ кожѣ, вызываетъ на ней красноту, воспаленіе съ болью и пузыри. При методическомъ испытаніи получается рядъ характеристическихъ явленій, свидѣтельствующихъ о вліяніи этого вещества на нервную систему, на кожу, на слизистыя и серозныя (сывороточныя) оболочки.

Боли и другіе симптомы Бріоніи усиливаются по большей части отъ движеній тѣла, отъ легкаго дотрагиванія и отъ свѣжаго воздуха; наоборотъ же, облегчаются въ покоѣ, при сильномъ давленіи на болящія мѣста, при пребываніи въ комнатѣ.

Примѣняется преимущественно въ острыхъ и лихорадочныхъ заболѣваніяхъ катаррального и ревматическаго характера.

Характеристики въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзней приведены на слѣдующихъ страницахъ: 64 (Малярія), 99 (Головн. боль) 122 (Бол. нервн.), 139 (Астма), 186 (Зубн. боль), 209 (Боль желудка), 214 (Хрон. катарр. желудка), 244 (Катар. кишекъ), 268 (Бол. печени), 307 (Кашель), 328 (Бронхитъ), 341 (Восп. легк.), 352 (Чихотка легкихъ), 509 (Ломота), 517 (Остр. ревматизмъ сустав.), 520 (Хрон. ревматизмъ сустав.), 529 (Ревм. мышцъ), 536 (Бол. кожи), 549 (Рожа), 561 (Крапивница), 564 (Опоясыв. лишай), 580 (Потливость).

Бріонія и *Русъ* слѣдуютъ хорошо другъ за другомъ, даваемые же одновременно, они взаимно уничтожаются.

Совмѣстимы съ Бріоніей *Аконитъ*, *Аписъ*, *Беллад.* въ болѣзняхъ серозныхъ оболочекъ; *Сульф.* въ такихъ случаяхъ усиливаетъ дѣйствіе Бріоніи.—Въ лихорадочныхъ болѣзняхъ съ ней совмѣстимы *Акон.* и *Беллад*—Въ болѣзняхъ слизистыхъ оболочекъ—*Фолф.* и *Тарт. змет.*

Дѣленія: низшія—при ревматизмѣ, острыхъ воспаленіяхъ, разстройствѣхъ пищеваренія; среднія: при болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ и въ хроническихъ случаяхъ.

Длительность дѣйствія: нѣсколько дней и недѣль.

Противосредства: *Камфора*, *Хиномил.*, *Акон.*, *Ичичія*, *Нуксъ вом.*, *Русъ*, *Кофе*.

№ 7. Вератрумъ альбумъ.

Veratrum album Чемерица бѣлая.

Тинктура получается изъ высушеннаго протертаго корня путемъ настоя въ 5 частяхъ 90% алкоголя.

Вератр. альб. не надо смѣшивать съ Вератр. вириде (зеленой чемерицей, см. ниже 141-е лѣкарство). Основное начало, содержащееся въ этомъ лѣкарствѣ, есть *Вератринъ*, который въ наружномъ примѣненіи, отъ 2 до 4 гранъ на унцію спирта или жира, имѣетъ болеутоляющее на нервы дѣйствіе, въ крѣпкомъ же растворѣ, приложенный къ кожѣ, производитъ на ней красноту съ образованіемъ пузырьковъ, также колющую боль, распространяющуюся и за предѣлы мѣста приложенія. Еще рѣзче и сильнѣе Вератринъ дѣйствуетъ на слизистыя оболочки: при соприкосновеніи даже въ малыхъ количествахъ со слизистой оболочкою глаза, онъ вызываетъ сильное жженіе, слезотеченіе и свѣтобоязнь, а попавъ на слизистую оболочку носа, вызываетъ щекотаніе и чиханіе, длящаяся по нѣсколько часовъ, и даже носовое кровотеченіе, насморкъ и сильное слюнотеченіе, также сухой кашель, жженіе въ горлѣ, поносъ и боли, распространяющіяся отъ мошонки въ паховую область (каковыя явленія представляютъ уже отдаленныя дѣйствія). При пріемахъ Вератрина внутрь, въ количествѣ болѣе или менѣе крупномъ, онъ производитъ, вмѣстѣ съ острымъ вкусомъ и чувствомъ царапанья въ горлѣ, ощущеніе теплоты, отъ глотки черезъ пищеводъ до желудка, рвоту, сильныя боли въ животѣ и поносы, которые, какъ и рвота, могутъ быть очень обильны. Что явленія эти не отъ мѣстнаго дѣйствія и не отъ воспаленія или изъявленія слизистой оболочки желудка и кишекъ, доказываетъ то, что они наступаютъ также послѣ втиранія Вератрина (въ сильной дозѣ) въ кожу или при подкожномъ впрыскиваніи. — Изъ дальнѣйшихъ симптомовъ отравленія Бѣлой чемерицей надо упомянуть: дрожаніе мышцъ, доходящее до судорогъ, пониженіе температуры тѣла, замедленіе и слабость пульса, замедленіе дыханія; поражается определеннымъ образомъ и нервномозговая дѣятельность, съ явленіями возбужденія и послѣдовательнаго угнетенія, паралича.

Съ лѣчебной цѣлью, въ гомеопатическихъ дозахъ, Вератрумъ примѣняется по большей части въ свѣжихъ и острыхъ случаяхъ, не имѣющихъ воспалительнаго характера, въ случаяхъ, зависящихъ отъ пораженія нервной системы и являющихся часто въ видѣ пароксизмовъ (приступовъ), какъ это бываетъ при судорогахъ и невралгіяхъ.

Характеристика Вератра въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 84 (Холера), 127 (Судороги), 139 (Астма), 163 (Меланхолія), 165 (Сумашествіе), 190 (Бол. зубовъ), 224 (Кровавая рвота), 232 (Поносъ), 333 (Коклюшъ), 372 (Бол. сердца).

Дѣленія: при кишечныхъ разстройствахъ— $\times 2 - \times 3$, въ другихъ случаяхъ—3 и болѣе высокія, особенно въ нервныхъ и душевныхъ болѣзняхъ.

Длительность лѣкарственнаго дѣйствія: нѣсколько часовъ.

Противосредства: *Камфора*, *Хина*, *Коффеа*, *Акон.*, *Стафизагія*. Съ своей стороны Вератр. является антидотомъ въ отношеніи *Арсен.*, *Хина*, *Феррумъ*.

№ 8. Гепаръ сульфурисъ.

Hepar sulphuris calcareum. Сѣрная печень съ известью.

Гепаръ сульф. есть сложное средство, получающееся отъ смѣшенія равныхъ частей мелкоистолченной устричной раковины и сѣрнаго

цвѣта путемъ нагрѣванія до бѣлокаленія въ теченіе 10 минутъ въ наглухо закупоренномъ тиглѣ. Смѣсь эта содержитъ въ себѣ сѣрнистую известь и небольшую часть фосфорнокислой извести, т. е. въ конечномъ разультатѣ сѣру (Сульфуръ), известь (Калькареа карб.) и Фосфоръ

До 5-го сотеннаго дѣленія Гепаръ можетъ примѣняться только въ порошковомъ видѣ, а далѣе—и въ разведеніяхъ.

Примѣненіе Гепар. сульф. въ болѣзняхъ очень обширное.

Характеристика его въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 201 (Катар. зѣва), 307 (Охриплость), 354 (Чихотка легкихъ), 463 (Трипперъ), 494 (Золотуха), 537 (Бол. кожи), 551 (Нарывы), 554 (Угри и прыщи), 578 (Сальность кожи), 598 (Бленоррея глазъ).

Общія состоянія, характеризующія это средство, суть слѣдующія: чувство общаго недомоганія во всѣхъ членахъ и усталость уже съ ранняго утра. съ неохотой вставать даже послѣ хорошаго сна; вялость, разбитость, тяжесть во всемъ тѣлѣ, сонливость, приступы сердцебіенія и обморочнаго состоянія въ теченіе дня; чрезмѣрная чувствительность и раздражительность всей нервной системы; свѣжій воздухъ ощущается неприятно; дрожаніе колѣнъ, тоска и жженіе въ подошвахъ ногъ при хожденіи на вольномъ воздухѣ; колотья въ суставахъ какъ въ покоѣ, такъ и при движеніи; боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла—сверлящія, рѣжущія, тянущія; припуханія, часто съ краснотой и ощущеніемъ жара, временами желтуха. Сонъ продолжительный, тяжелый, съ быстрой сильной смѣной сновидѣній изъ повседневной жизни; или трудное засыпаніе, безпокойный сонъ и безсонница при очень возбужденной фантазіи. Въ теченіе дня частая потягота и зѣвота. Настроеніе раздражительное, сердитое, угрюмое, или угнетенное и печальное. съ мыслями о самоубійствѣ.

Дѣленія: низкія—въ острыхъ и подострыхъ случаяхъ, также вообще для органовъ пищеваренія и дыханія; высшія предпочтительны въ хроническихъ случаяхъ, также въ нервныхъ болѣзняхъ.

Длительность дѣйствія: повторныхъ пріемовъ высшихъ дѣленій—7—8 недѣль;—низкихъ дѣленій—нѣсколько дней.

Подобныя лѣкарства: *Калк. карб.*, *Сульф.*, *Лазезисъ*, *Дулькам.*, *Ликопод.*, *Меркуръ*

Противосредства: *Беллад.*, *Хамомила*, *Меркур.*, *Пульсат.* растительныя кислоты. Съ своей стороны Гепаръ полезенъ противъ послѣдствій чрезмѣрнаго употребленія ртути и іода и антидотъ въ отношеніи: *Антим.*, *Арсен.*, *Белл.*, *Купр.*, *Феррумъ*, *Нитри ацид.*, *Силиц.*, *Цинкъ*

№ 9. Игнація.

Ignatia amara. Челибуха.

Тинктура готовится изъ сѣмянъ (бобовъ) Главнымъ дѣйствующимъ началомъ въ Игнаціи, какъ и въ Нуксъ вомикѣ, но даже еще въ большемъ количествѣ, является Стрихнинъ (также Бруцинъ и, вѣроятно, другіе еще алкалоиды); по дѣйствію своему, однако, эти два средства не совсѣмъ одинаковы.

Руководящими показаніями для примѣненія Игнаціи служатъ слѣдующіе общіе ея симптомы: нервныя боли, повышенная чувствительность органовъ чувствъ, общее волненіе, раздражительность, судорожныя состоянія, а также, какъ послѣдовательныя явленія, угнетеніе, параличъ (нервный, а не мозговой). Характерна для Игнаціи необычайная перемѣнчивость болевыхъ и душевныхъ симптомовъ; однако, тихая грусть и произвольныя слезы преобладаютъ надъ раздражительностью (чѣмъ, между прочимъ, Игнація отличается отъ Нуксъ вом.). боли же уменьшаются или проходятъ каждый разъ при перемѣнѣ положенія или мѣста, но только на самое короткое время. Большая чувствительность къ сквозняку и свѣжему воздуху, избѣганіе вольнаго воздуха и всякаго умственнаго или тѣлеснаго напряженія. Большая часть страданій является или ухудшается въ ранніе утренніе часы, на вольномъ воздухѣ и послѣ обильныхъ пріемовъ пищи, также отъ кофе, спиртныхъ напитковъ и табака.

Характеристика Игнаціи въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 65 (Малярія), 99 (Головн. боль), 126 (Судороги), 155 (Неврозы), 163 (Меланхолія), 166 (Сумашествіе), 215 (Катарръ желудка), 537 (Бол. кожи).

Хорошіе результаты получаютъ какъ отъ низшихъ, такъ и высшихъ дѣленій. Послѣднія, однако, дѣйствуютъ часто лучше и быстрѣе въ судорожныхъ болѣзняхъ.

Длительность дѣйствія: нѣсколько часовъ; послѣ частыхъ пріемовъ — недѣля и больше.

Противосредства: *Камфора, Коккула, Коффеа, Арника, Хамомил., Пульсат., Цинк.*

№ 10. Ипекакуана.

Radix Cephælis Ipecacuanhæ. Рвотный корень.

Тинктура получается изъ растертаго корня съ 5 чч. алкоголя. Примѣняются также растиранія его съ молочнымъ сахаромъ.—Основное дѣятельное начало—Эметинъ.

Ипекакуана влияетъ главнымъ образомъ на легочно-желудочный нервъ. Она вызываетъ судорожное раздраженіе въ груди и желудкѣ, съ преобладаніемъ тошноты и рвоты, также приливы крови въ однѣхъ областяхъ и отливы въ другихъ областяхъ тѣла, съ происходящими отсюда разстройствами въ органахъ и тканяхъ, мышцахъ, слизистыхъ оболочкахъ и пр. Разсройства эти имѣютъ часто перемежающійся характеръ. Къ общимъ симптомамъ Ипекакуаны относятся: чрезмѣрная чувствительность къ перемѣнамъ температуры; чувство усталости и сонливости въ теченіе дня; ночной сонъ то глубокой и крѣпкой, то безпокойный съ частымъ пробужденіемъ; настроеніе духа апатичное, угрюмое, часто раздражительное.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 64 (Малярія), 89 (Дизентерія), 139 (Астма), 215 (Катар. желудка), 224 (Кровавая рвота), 307 (Кашель), 537 (Бол. кожи).

Дѣленія: низшія растиранія и разведенія до 6-го сотеннаго. 1-е разведеніе или, лучше, растираніе (даже $\times 1$) часто необходимо бываетъ при астмѣ, сильномъ кровотеченіи изъ носа, при воспаленіи глазъ, тогда какъ болѣе высокія дѣленія предпочтительны при тяжелыхъ бронхитахъ. Аллопатическое ипекакуанное вино равняется приблизительно 1-му десятичн. разведенію.

Длительность дѣйствія: смотря по величинѣ дозы и частотѣ примовъ отъ нѣск. часовъ до 2 дней.

Противосредства: *Ари.*, *Арсен*, *Хина*, *Нуксъ вом*. Съ своей стороны *Ипекак.* есть, по Ганеману, антидотъ *Опія*.

№ 11. Колоцинтъ.

Colocynthis. Горькая тыква.

Тинктура готовится изъ плодовъ этого растенія.— Основное дѣятельное начало — Колоцинтинъ.

Въ аллопатіи Колоцинтъ извѣстенъ лишь какъ слабительное средство, между тѣмъ дѣйствіе его на организмъ далеко не ограничивается лишь этимъ свойствомъ.

Въ небольшихъ, но еще сильнодѣйствующихъ дозахъ Колоцинтъ вызываетъ ускореніе кишечной перистальтики, увеличенное отдѣленіе желчи и частыя кашицеобразныя испражненія. Послѣ большихъ же, отравляющихъ дозъ являюся: жгучій жаръ въ кишкахъ, частыя жидкія и кровянистыя испражненія, сильныя колики и вздутіе живота, задержаніе мочи, похолодѣніе тѣла съ выступаніемъ холоднато пота и смерть. Въ случаяхъ, дошедшихъ до вскрытія тѣла, находили воспалительныя измѣненія въ желудкѣ и кишкахъ, а также, хотя и въ менѣе значительной степени, въ печени, почкахъ, мочевомъ пузырьѣ, въ головномъ и спинномъ мозгу.

Къ явленіямъ, вызываемымъ вещественными дозами Колоцинта въ здоровомъ человѣкѣ, относятся: боли въ суставахъ, въ ихъ сумкахъ и сухожиліяхъ и въ окружающихъ частяхъ, съ ограниченіемъ подвижности соотвѣтственныхъ членовъ, особенно въ бедреномъ суставѣ, съ усиленіемъ боли окружающихъ частей (но не въ суставѣ) въ покой и облегченіемъ отъ движенія; послѣ отхожденія кишечныхъ газовъ, боли, тянущія и рвущія, въ разныхъ частяхъ тѣла уменьшаются; припуханіе лица, рукъ, ногъ и живота съ затрудненнымъ дыханіемъ; ощущеніе пульсаціи во всемъ тѣлѣ; стѣсненіе въ груди при малѣйшемъ напряженіи. Сонъ безпокойный, полный сновидѣній; сонливость днемъ. Душевное состояніе раздражительное, нетерпѣливое, или угнетенное и угрюмое.

Характеристика въ отнош. нѣкотор. отдѣльныхъ болѣзней приведена, на слѣд. страницахъ: 99 (Головная боль), 122 (Невралгій), 232 (Понось), 235 (Боль живота), 244 (Катар. толст. кишки), 405 (Остр. воспал. мочев. пузыря), 521 (Хрон. ревм. сустав.). Можетъ быть показанъ и при болѣзняхъ почекъ.

Дѣленія: при коликѣ и при поносѣ низшія дѣленія, при невральгіи же высшія, которыя часто скорѣе дѣйствуютъ, чѣмъ первыя.

Длительность дѣйствія: нѣсколько часовъ до нѣсколькихъ дней, смотря по величинѣ дозъ и по частотѣ пріемовъ.

Подобныя средства (въ невральгіи бедра): *Кали биззюмик.*, *Кали iodat.*, *Фитолакка*, *Гиафаллій*.

Противосредства; *Камфора*, *Хамомил.*, *Кауестик*, *Коффеа*.

№ 12. Меркурій (Ртуть) и его препараты,

Согласно списка лѣкарствъ на стр. 35, подъ № 12 долженъ бы быть одинъ изъ препаратовъ ртути, *Меркурій солюбилис*, но, удобства ради, тутъ приводится общая характеристика ртутныхъ препаратовъ, а также наглядное сопоставленіе наиболѣе употребительныхъ изъ нихъ.

Изъ препаратовъ Меркурія примѣняется въ гомеопатіи главнымъ образомъ слѣдующіе:

1. *Меркурій vivus* (*Mercurius vivus*, *Hydrargyrum vivum*, Живая ртуть, Живое серебро); примѣняются въ растираніи съ молочнымъ сахаромъ. Изъ этого препарата готовится сѣрая ртутная мазь.

2. *Меркурій*, безъ дальнѣйшаго добавленія, есть то же, что *Меркурій солюбилис Ганемана* (*Mercurius* или *Mercurius solubilis Hahnemann*); растворимая закись ртути, извѣстная и въ аллопатіи подъ этимъ названіемъ основателя гомеопатіи. Порошокъ этотъ получается сложнымъ химическимъ способомъ, имѣетъ черносѣрый, матовый видъ и растворяется въ уксусной кислотѣ. Составъ этого препарата: закись ртути, азотная кислота и Аммоніакъ. Примѣняется растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

3. *Меркур. коррозивъ или сублимат.* (*Mercur. sublimat. corrosivus* или *Hydrargyr. bichlorat. corros.*) двухлористая ртуть представляетъ бѣлый кристаллическій порошокъ, очень легко растворяющійся въ алкогольѣ и эфирѣ трудно — въ водѣ. Примѣняется въ разведеніяхъ.

4. *Меркурій преципитатъ альбус* (*Mercur. praecipitat. alb.*, Бѣлая осадочная ртуть) получается отъ прибавленія Аммоніака — нашатыря — къ сублимату. Примѣненіе преимущественно наружное въ мазяхъ.

5. *Меркурій дульцис* или *Каломель* (*Mercur. dulcis*, *Calomel*, *Hydrarg. chlorat. mile*, однохлористая ртуть), бѣлый съ желтоватымъ оттѣнкомъ порошокъ. Примѣненіе въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ.

6. *Меркур. iodat. flav.* *Mercur. iodat. flav.*, Одноіодистая ртуть, изъ 8 чч. ртути 5 чч. іода, зеленоватожелтый порошокъ, нерастворимый въ водѣ и алкогольѣ. Примѣняются растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

7. *Меркур. биодат.* (*Mercur. iodat. ruber*. Двуюдистая или красная іодистая ртуть) изъ 5 чч. іодистаго калия и 4 чч. двухлорист. ртути, красный кристаллич. порошокъ, едва растворимый въ водѣ (если не прибавитъ іодист. калия), растворимый въ 150 чч. алкоголя. Примѣняются въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ.

8. *Меркур. цианат.* (*Mercur. cyanat.*, Цианистая ртуть), безцвѣтные или бѣлые кристаллы, безъ запаха, но съ противнымъ металлич. вкусомъ. Примѣняются растиранія съ молочнымъ сахаромъ и спиртныя разведенія.

9. *Меркур. преципитат. рубер* (*Mercur. praecipitat. ruber* красная осадочная ртуть, составляется изъ меркур. вивусъ и Ацид. нитрик.: оранжево-красный порошокъ или въ видѣ красныхъ чешуевидныхъ кристалловъ, нерастворимъ въ водѣ и алкогольѣ. Примѣняются растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

10. *Меркур. сульфурат. руберъ* или Циннабарисъ (*Mercur. sulphuratus ruber* или *Cinnabaris*, Красная сѣрная ртуть, Киноварь), Примѣн. въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ.

Объ остромъ и хроническомъ отравленіи ртутью сказано на стр. 615.

Для испытанія ртути, съ цѣлью выясненія ея дѣйствій на здоровый человѣческій организмъ, брался Ганеманомъ и позднѣйшими испытателями главнымъ образомъ *Меркур. солюбилисъ*, также *Меркур. вивусъ*, которые чаще всего примѣняются въ гомеопатіи. Результаты испытанія суть въ общихъ чертахъ слѣдующіе:

1) Ртуть вліяетъ на кожу, слизистыя оболочки, железы и кости, вызывая въ нихъ приливъ крови, переполненіе кровью и воспаление; 2) въ области нервной и мозговой системы она вызываетъ состояние раздраженія и возбужденія и послѣдовательно — состояние разслабленія и угнетенія; 3) въ области кровообращенія: слабость сердечной мышцы, неправильность сердечной дѣятельности, застой крови въ сердцѣ и большихъ сосудахъ, лихорадочныя состоянія неправильнаго типа съ ночными ухудшеніями, съ выдѣленіемъ обильнаго, но необлегчающаго пота; 4) явленія прилива крови, воспаления и разрушенія въ дыхательныхъ органахъ, а также 5) — въ органахъ пищеваренія; 6) — въ органахъ мочевыхъ и половыхъ .

Разстройства и страданія, вызываемыя ртутью, чувствуются меньше при сухой и теплой погодѣ, въ теченіе дня и въ покой; напротивъ же того, они усиливаются въ ночное время, особенно при лежаніи подъ теплымъ одѣяломъ, также отъ всякаго мышечнаго движенія и напряженія и отъ вліянія холоднаго и влажнаго воздуха. Симптомы наблюдаются въ большемъ числѣ на лѣвой сторонѣ тѣла, нежели на правой.

Характеристика ртути (*Меркур. солюбилисъ*) въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 59 (Тифъ), 89 (Дизентерія), 123 (Болѣзни нервной системы), 187 и 189 (Болѣзни зубовъ), 196 (Ангина), 244 (Воспал. толст. кишки), 268 (Болѣзни печени), 299 (Насморкъ), 307 (Кашель), 463 (Трипперъ), 490 (Ракъ), 494 (Золотуха), 517 (Остр. ревматизмъ суставов.), 521 (Хронич. ревматизмъ суставов.), 525 (Болѣзни костей), 528 (Болѣзни мышцъ), 539, 554, 569, 578 (Болѣзни кожи).

О примѣненіяхъ прочихъ ртутныхъ препаратовъ можно сказать слѣдующее:

Меркурій коррозивъ. Очень сильно дѣйствующій препаратъ ртути; поэтому, во избѣжаніе ухудшенія болѣзни, его слѣдуетъ брать не въ слишкомъ низкомъ дѣленіи, не ниже $\times 4-3$ (сотеннаго), растиранія или разведенія. Дѣйствіе этого препарата такое же, какъ и Мерк. сол., но онъ предпочитается въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется болѣе быстрое и болѣе глубокое вліяніе на болѣзненный процессъ, когда теченіе бо-

лѣзни слишкомъ острое и бурное. Сюда относятся: очень сильныя воспаления зѣва, глотки, гортани, легкихъ, именно — у молодыхъ, полносочныхъ субъектовъ, когда воспаление сопровождается выпотными процессами; далѣе, при воспаленіи органовъ пищеваженія, особенно при дизентеріи; при воспаленіи мочевыхъ путей съ мочерѣзомъ; при мягкомъ шанкрѣ; при быстро развивающемся воспаленіи мозга; при сильныхъ воспаленияхъ глазъ и ушей.

Характеристику Мерк. корроз. въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльных болѣзней см. на слѣдующ. страницахъ: 465 (Мягк шанкръ), 469 (Вторичн. сифилисъ), 490 (Ракъ), 517 (Остр. ревматизмъ суставов.), 525 (Воспал. костей), 598 (Бленоррея глазъ).

Меркурій ціанатъ. Еще болѣе сильно дѣйствуетъ, нежели Меркур. корроз., и кромѣ того, благодаря содержащейся въ немъ синильной кислотѣ, имѣетъ парализующее вліяніе на дѣятельность органовъ. Поэтому брать его надо въ дѣленіи не ниже 3 сотеннаго разведенія или растиранія. Примѣняется особенно при дифтеритѣ.

Меркур. биодат. по силѣ дѣйствія не уступаетъ Мерк. корроз. примѣняется особенно при воспаленіи железъ, такъ же, какъ и *Меркур. iodat.*; первый преимущественно при воспаленіи на правой сторонѣ тѣла, второй — на лѣвой. Оба эти препарата примѣняются часто при сифилисѣ (*Меркур iodat.*) — при твердомъ шанкрѣ съ опуханіемъ паховыхъ железъ — см. стр. 469, также при воспаленіи радужной оболочки. До 3-го сотен. дѣленія — въ растираніи.

Меркур. преципитатъ руберъ — особенно при сифилисѣ и при болѣзняхъ глазъ. Низшія дѣленія — въ растираніи.

Циннабарисъ примѣняется почти только при сифилисѣ вторичнаго и третичнаго періода. Низшія дѣленія — въ растираніи.

Длительность дѣйствія ртутныхъ препаратовъ: повторныхъ приемовъ различныхъ дѣленій — нѣсколько дней до нѣсколькихъ недѣль.

Противосредства (противъ гомеопатическихъ дозъ); *Ацид. чистрик., Iод. и Кали iodat., Гепаръ сульф., Сульфуръ, Аурумъ, Дулькамара, Креозотъ, Беллад., Камфора Мезереумъ, Лихезисъ, Хина, Кирбо вегстаб., Купрумъ, Феррумъ, Копрумъ, Ликоподій, Мамал. ацет., Нитр. муріат., Нукъ вом., Отій, Фосфор. Фосфор. ацид., Сарсапарилла, Силиція, Селія, Стифизагрія. Уксусъ.* (Противоядія же противъ отравляющихъ дозъ см. Отдѣлъ 14-й — „Отравленія“).

№ 13. Меркурій ціанатъ.

См. выше въ статьѣ подъ № 12-мъ.

№ 14. Нуксъ вомика.

Нукъ vomica. Рвотный орѣхъ.

Тинктура, или же растворъ съ молочнымъ сахаромъ, приготовляются изъ сѣмянъ. Главное — основное дѣятельное вещество (алка-

лоидъ)—Стрихнинъ, кромѣ того еще Бруцинъ. Горечь Стрихнина ощущается еще въ растворѣ 1 на 600.000.

Нуксъ вомика дѣйствуетъ на центральные органы нервной системы особенно на спинной мозгъ, на двигательные нервы, вызывая судороги, а послѣдовательно и параличи; также—на сосудодвигательный центръ, ведя къ переполненію сердца, большихъ сосудовъ и легкихъ кровью; дѣйствуетъ также возбуждающимъ, а послѣдовательно парализующимъ образомъ на перистальтику (передвиженіе) кишекъ. Къ симптомамъ Нуксъ вомика относятся далѣе: усталость, слабость чувство разбитости, боли въ членахъ и суставахъ съ повышенной чувствительностію къ малѣйшему дотрагиванію; большая наклонность къ сидѣнію, лежанію и къ покою вообще, неохота ко всякому напряженію и движенію; неустойчивость, шатающаяся походка съ боязнію упасть, обморочное состояніе; трясеніе, подергиваніе или тугость членовъ. Сильная простужаемость и боязнь холодного воздуха. Большая сонливость раннимъ утромъ, послѣ вставанія, также въ послѣобѣденные часы.

Многіе симптомы Нуксъ вом. ухудшаются отъ движенія, свѣжаго воздуха и холода, также отъ умственного напряженія, отъ кофе и спиртныхъ напитковъ. Симптомы, являющіеся въ комнатномъ воздухѣ и въ покой, уменьшаются при умѣренномъ движеніи на вольномъ воздухѣ. При влажной погодѣ больные чувствуютъ себя лучше, нежели при сухой. Наблюдается часто какъ бы періодичность въ появленіи нѣкоторыхъ симптомовъ съ промежутками въ 36—48 часовъ (какъ при Игнаціи, Пульсат., Ипекак., Арсен., Хина, Натр. мур.).

Примѣняются одинаково часто какъ въ острыхъ, такъ и въ хроническихъ болѣзняхъ.

Характеристика Нуксъ вом въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 65 (Малярія), 123 (Невралгии), 126 (Судороги), 139 (Астма), 145 (Параличъ), 154 (Неврозы), 166 (Душевные болѣзни), 187 (Зубная боль), 209 (Боль подъ ложечкой), 214 (Хроническая катар. желудка), 224 (Желудочное кровоточеніе), 230 (Запоръ), 234 (Боль живота), 258 (Геморрой), 268 (Желтуха), 272 (Набуханіе печени), 277 (Хроническая воспал. печени), 291 (Круглые глисты), 307 (Кашель), 322 (Острый бронхитъ), 326 (Хронический бронхитъ), 379 (Нервное сердцебиеніе), 529 (Мышечный ревматизмъ).

Полезны всѣ дѣленія, отъ Θ до 30-го. Дѣленіе выбирается по болѣзни и по обособленности (индивидуальности) организма. Если Нуксъ вом. вполне показана и если какое дѣленіе не даетъ ожидаемаго результата, то надо испытать другое дѣленіе, раньше чѣмъ примѣнить другое лѣкарство.

Вообще же можно дать слѣдующія указанія въ отношеніи дѣленія Нуксъ вом.:

Чистая тинктура (Θ) и первыя дѣленія: при мышечной боли, при поясничной боли, при параличахъ, при столбнякѣ, и т. п. Болѣе высокія (среднія) дѣленія: при геморроѣ, дизентеріи, при болѣзняхъ головного и спинного мозга, при болѣзняхъ желудка и кишекъ, при болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ, грудной жабѣ, невралгіяхъ (также при столбнякѣ и т. п., если низшія дѣленія не оказываютъ надлежащаго

дѣйствія). При пораженіяхъ спинного мозга предпочтительно *Стрихнин. сульфурик.* 2—3.—Вышія дѣленія (12—30): при тѣхъ же болѣзняхъ, которыя только что упомянуты, если среднія дѣленія не дѣйствуютъ, особенно же при невралгіяхъ, мигрени, маляріи и при болѣзняхъ желудка.

Длительность дѣйствія: смотря по дѣленію и частотѣ приѣмовъ отъ нѣсколькихъ часовъ до двухъ недѣль

Противосредства. вино, кофе, *Камфора, Опій, Хамомил., Пульсат, Беллад., Кокакудусъ, Страмоній.*

№ 15. Пульсатилла.

Pulsatilla nigricans Вѣтреница.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія. Основное дѣятельное начало—Анемонинъ (Пульсатильная камфора).

Пульсатилла дѣйствуетъ особенно на всѣ слизистыя оболочки, также синовиальныя, вызывая въ первыхъ катарральное состояніе. во вторыхъ—подагрическое и ревматическое; она дѣйствуетъ также въ значительной степени на вены и на женскіе половые органы.

Характеристическія особенности Пульсатиллы суть слѣдующія: рвущія, тянущія и дергающія боли; чувство разбитости и тяжести въ членахъ, вялость, неохота къ движенію; быстрая утомляемость отъ самой короткой прогулки; боль въ икрахъ: частое дрожаніе съ холоднымъ потомъ: тугость и слабость въ суставахъ; тоска, безпокойство, общее нерасположеніе, плаксивость, угрюмость, недовольство. Боли бываютъ часто лишь на одной сторонѣ тѣла и сопровождаются припуханіемъ кожи. Ухудшеніе многихъ страданій къ вечеру и до полуночи, избѣганіе свѣжаго воздуха; періодичность (наприм. день чрезъ день) нѣкоторыхъ страданій. Сонливость и усталость днемъ, особенно послѣды; вечеромъ же трудно заснуть съ метаніемъ въ постели; безпокойный сонъ, съ ощущеніемъ жара и охотой раскрываться; больной предпочитаетъ лежать на спинѣ съ притянутыми ногами, лежаніе же на боку усиливаетъ страданія.

Примѣняется очень часто какъ въ острыхъ, такъ и хроническихъ болѣзняхъ, особенно у больныхъ тихаго нрава и нѣжнаго строенія и страдающихъ пораженіемъ лимфатическихъ железъ, кожи и слизистыхъ оболочекъ и малокровныхъ.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующ. страницахъ: 65 (Малярія), 99 (Мигрень), 123 (Невралгии), 163 (Меланхолія), 165 (Сумасшествіе), 187 (Зубн. боль), 215 (Хронич. катар. желудка) 244 (Катар. толст. кишки), 308 (Кашель), 326 (Хронич. бронхитъ), 413 (Аменоррея), 463 (Трипперъ), 481 (Малокровіе и блѣдн. немочь), 517 (Остр. ревматизмъ суставов.), 529 (Мышечн. ревматизмъ), 540 (Бол. кожи), 549 (Рожа), 595 (Бленоррея глазъ).

Пульсатилла полезна во всякомъ дѣленіи, чаще, однако, примѣняются низкія дѣленія. При аменорреѣ и въ нервныхъ болѣзняхъ высшія дѣленія оказываются часто болѣе полезными. Вдыханіе черезъ

ность чистой тинктуры облегчает насморкъ въ началѣ его развитія. Изъ Пульсатиллы готовится извѣстное противъ насморка средство — *Анемонъ* (для вдыханія).

Длительность дѣйствія: смотря по дѣленію и частотѣ пріемовъ — отъ нѣсколькихъ часовъ до 4 недѣль.

Противосредства: *Хамомил.*, *Меркур.*, *Игнация*, *Нуксѣ вои.*, *Хина*, *Беллад.*, *Аконитъ*, укусъ; съ своей стороны Пульсат. есть противосредство противъ *Сульфуръ*, *Феррумъ*.

№ 16. Русь.

Rhus toxicodendron. Сумахъ ядовитый.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ Русь дѣйствуетъ на кожу, слизистыя оболочки и фиброзныя ткани въ очень сильной степени, также на всѣ органы тѣла.

Общіе симптомы этого средства суть слѣдующіе; тянущія и сверлящія боли вдоль нервовъ, съ ухудшеніемъ въ полномъ покоѣ и потребностью къ движенію, отъ котораго больному становится легче, особенно подъ вліяніемъ холода и сырости; ощущеніе разслабленности и онѣмѣнія, съ хрустомъ въ суставахъ, также боль въ нихъ; припуханіе рукъ и ногъ, покалываніе въ нихъ и затеканіе (засыпаніе); большая слабость въ отдѣльныхъ мышцахъ съ подергиваніемъ въ нихъ, боль какъ отъ разбитости во всѣхъ мышцахъ, боль какъ отъ вывиха въ суставахъ, ощущеніе тугости и усталости въ членахъ, дрожаніе членовъ при малѣйшемъ напряженіи; большая чувствительность къ свѣжему воздуху и холоду. Судорожная зѣвота въ теченіе дня, сонливость со склонностью къ лежанію, ночью сонъ безпокойный или безсонница, приливъ крови къ головамъ, съ потребностью раскрываться. Настроеніе угнетенное, сердитое, печальное, плаксивое, безпокойное, съ потребностью къ движенію.

Примѣняется въ острыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, особенно когда причиной таковыхъ является холодъ или сырость (вѣтеръ и дождь), при ревматическихъ и ломотныхъ пораженіяхъ мышцъ, суставовъ и нервовъ, при растяженіяхъ и ушибахъ тканей, при вывихахъ, ущемленіяхъ, при чрезмѣрномъ напряженіи мышцъ — послѣ примѣненія Арники.

Характеристика Русь въ отношеніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 65 (Малярія), 99 (Головная боль), 123 (Невральгія), 146 (Параличъ), 187 (Зубн. боль), 232 (Понось), 244 (Катар. толст. кишки), 341 (Крупозн. воспал. легк.), 518 (Остр. ревм. сустав.), 520 (Хронич. ревм. сустав.), 528 (Мышечн. ревматизмъ), 540 (Бол. кожи), 549 (Рожа), 561 (Крапивница), 564 (Опоясыв. лишай), 569 (Экзема).

Дѣленія: среднія и высшія — при ревматизмѣ, среднія — при невральгіяхъ; низшія — при бозѣзняхъ кожи; совсѣмъ низкое дѣленіе и даже Ө рекомендуются при двустороннемъ параличѣ.

Длительность дѣйствія: въ зависимости отъ дѣленія и частоты

пріемовъ, также отъ состоянія организма — отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ недѣль.

Противосредства: *Бріонія, Сульфур., Камфора, Коффеа*; съ своей стороны Русъ — противосредство слѣдующимъ лѣкарствамъ: *Бріон.* *Рододендр., Рамнукул., Тартар. эметик.*; несовмѣстимыми съ Русъ считаются: *Аписъ, Анакордій, Кротонъ, Циприпедій; Бріонія и Русъ*, слѣдую другъ за другомъ, взаимно дополняются.

№ 17. Силиція.

Silicea. Кремнеземъ.

Примѣняется до 3 дѣленія въ растираніяхъ, а въ дальнѣйшихъ — въ разведеніяхъ. Дѣйствуетъ на всѣ ткани тѣла и имѣетъ симптомы, подобные тѣмъ, какіе наблюдаются при золотухѣ, подагрѣ, рахитѣ, ракѣ при болѣзняхъ костей, мышцъ, нервовъ и проч.; особенно же соотвѣтствуетъ процессамъ нагноенія. Кремнеземъ является скрѣпляющимъ началомъ въ живомъ организмѣ и въ потенцированной формѣ есть одно изъ важнѣйшихъ средствъ гомеопатіи при хроническихъ заболѣваніяхъ. Недостатокъ кремнеземныхъ соединений влечетъ за собою истощеніе тканей, особенно клѣтчатки, и уменьшаетъ устойчивость противъ вредныхъ вліяній, и наоборотъ, увеличеніе ихъ ведетъ къ укрѣпленію организма. Потенцированная Силиція способствуетъ усвоенію кремневыхъ соединений организмомъ въ надлежащемъ количествѣ изъ пищевыхъ веществъ.

Симптомы Силиціи суть вообще слѣдующіе; бѣль какъ отъ разбитости въ мышцахъ, вывихная боль въ суставахъ, общая болѣзненность всего тѣла, особенно утромъ послѣ пробужденія, болѣзненность мышцъ при движеніи, боль въ груди и слабость въ членахъ при вставаніи съ мѣста, зябкость при раскрываніи ночью съ жаждой и летучимъ жаромъ, онѣмѣніе рукъ и ногъ, подергиванія въ всемъ тѣлѣ, боли въ костяхъ, чувство общаго недомаганія во всѣхъ членахъ, обморочное состояніе передъ непогодой, большая усталость уже съ раннего утра, вялость и сонливость днемъ, безпокойный сонъ ночью; дрожаніе (особенно рукъ), тугость спины и членовъ, исхуданіе, истеричные и эпилептическіе судорожные припадки; особенно къ новолунію; ухудшеніе болѣе отъ движенія, ночные поты, или также утренніе въ теченіе нѣкотораго времени. Душевное состояніе — возбужденное, раздражительное, безпокойное, пугливое, или же угнетенное, грустное слезливое.

Характеристика Силиціи въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ; 166 (Сумасшествіе), 188 (Зубн. боль), 278 (Хронич. воспал. печени), 300 (Хронич. катар носа и носоглотки), 314 (Хронич. ларингитъ), 327 (Хронич. бронхитъ), 354 (Чихотка легкихъ), 389 (Воспал. лимфатич. железъ), 445 (Грудница), 463 (Трипперъ), 490 (Ракъ), 494 (Золотуха), 497 (Бугорчатка), 540 (Бол. кожи), 551 (Нарывы), 564 (Опоясыв. лишай), 569 (Экзема), 580 (Потливость), 600 (Катаракта).

Въ дѣленіяхъ ниже 3 сотеннаго Силиція дѣйствуетъ гораздо меньше, нежели въ дѣленіяхъ болѣе высокихъ.

Длительность дѣйствія — 7 до 8 недѣль.

Противосредства: *Камфора*, *Гепаръ сульф.*, съ своей стороны Силиция — противосредство въ отнош. *Меркур.*, *Фосфор.*, *Сульф.*

Подобные средства: *Меніантеевъ* — при головной боли, *Калькаръ сульфурика*, *Флуор.-ацид.* — при гнойныхъ процессахъ.

№ 18. Спонгія.

Spongia marina tosta. Губка морская жженная.

Тинктура готовится изъ 1 ч. жженной губки, и 5 чч. алкоголя. Основныя дѣятельныя начала въ этой губкѣ — іодистый натрій и соединенія хлористыя, бромистыя и ціанистыя, также кремневая кислота, известь, сѣра и фосфоръ. Въ силу своего состава Спонгія можетъ имѣть въ практикѣ гораздо большее примѣненіе, нежели то, какое она обычно имѣетъ, примѣняемая главнымъ образомъ при увеличеніи железъ, особенно — зубной, также яйца и сѣменнаго канатика (рядомъ съ *Клематисъ*), и при воспаленіи слизистыхъ оболочекъ, особенно — гортани и дыхательнаго горла.

Къ общимъ симптомамъ Спонгіи относятся; чувство разбитости во всей верхней половинѣ тѣла и слабости въ рукахъ и ногахъ; онѣмѣніе нижней половины тѣла; общая душевная и тѣлесная слабость, облегченіе страданій при лежаніи въ вытянутомъ положеніи. — Сонъ безпокойный съ тревожными сновидѣніями; при пробужденіи обильный потъ; сонливость съ зѣвотой въ послѣ полуденное время. — Душевное настроеніе боязливое, капризное, переменчивое, то веселое, то грустное. Характеристика въ отношеніи дыхательн. органовъ — стр. 307, 327. При легочной чахоткѣ Спонгія показана, когда кашель жесткій, металлическій, сопровождающійся чувствомъ слабости, чуть не до паденія, и ухудшающійся отъ глубокаго вдоха, отъ говоренія и отъ сухаго, холоднаго вѣтра. Больного какъ бы обдастъ жаромъ, и это повторяется каждый разъ, какъ больной объ этомъ думаетъ.

Припадки давленія и стѣсненія въ области сердца, не дающіе, больному лежать на спинѣ и съ низкоположенной головой; такіе припадки бывають часто при порокахъ сердца, также при плевритѣ.

Дѣленія: низшія — при пораженіяхъ гортани и сердца; при зобѣ, если низшія дѣленія не ведутъ къ его уменьшенію, слѣдуетъ испытать высшія.

Длительность дѣйствія: нѣсколько дней до 2 недѣль.

Противосредство: *Камфора*.

№ 19. Сульфуръ.

Sulphur. Сѣра.

Растиранія съ молочнымъ сахаромъ дѣлаются изъ сѣрнаго цвѣта, до 5-го сотен. дѣленія, изъ послѣдняго же — разведенія. (*Сульфур. Θ* (тинктура или *Сѣрный спиртъ*)) готовится кипяченіемъ сѣры въ 90⁰/₀-номъ alcoholѣ, и въ 100 чч. ея содержитъ около 1 ч. сѣры.

Сѣра находится въ каждой клѣточкѣ организма и поэтому она вліяетъ на каждый органъ и на каждую ткань его. Сѣра способствуетъ обмѣну кислорода въ клѣточкахъ, и этимъ самымъ—сгоранію бѣлка, и такъ регулируетъ усвоеніе веществъ и вообще жизнедѣятельность въ организмѣ. Недостатокъ сѣры, равно какъ и избытокъ ея, нарушаютъ жизнедѣятельность организма, ведя къ венознымъ застоямъ длительного характера и вызывая длинный рядъ всевозможныхъ разстройствъ, особенно у людей, обладающихъ жесткой, нечистой кожей, легко раздражимыхъ и неохотно примѣняющихъ воду; у нихъ имѣется склонность къ неряшливости, къ неопрятности, къ грубымъ привычкамъ. Къ характеристическимъ особенностямъ сѣры относятся еще: дурнота подъ ложечкой около полудня, безпокойный прерывистый сонъ или очень глубокой сонъ съ труднымъ утреннимъ пробужденіемъ; ощущеніе жара въ темени и жженія въ ладоняхъ и подошвахъ ногъ; слабость позвоночника, вслѣдствіе которой имѣется сутуловатость; больной пьетъ много, а ѣстъ мало; постоянная зябкость; блѣдность покрововъ съ темными кругами у глазъ; большая чувствительность къ холодному воздуху и простужаемость; потливость; ухудшеніе многихъ страданій въ покоѣ и отъ холода; улучшение отъ движенія, также отъ наружной теплоты; нервныя боли ухудшаются отъ очень теплаго укрыванія. Значительно нарушается и душевное состояніе: безпокойство, раздражительность, угрюмая молчаливость, меланхолія, ипохондрія.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 66 (Малярія), 84 (Холера), 124 (Невральгія), 146 (Параличъ), 188 (Зубн. боль), 210 (Хронич. катарръ желудка), 221 (Язвы желудка), 258 (Геморрой), 269, 272 и 278 (Бол. печени), 301 (Хронич. катар. носа и носоглотки), 308 (Охриплость, кашель), 326 (Хронич. бронхитъ), 493 (Золотуха), 520 (Хронич. ревматизмъ сустав.), 541 (Бол. кожи), 551 (Нарывы), 564 (Опояс. лишай), 569 (Экзема), 578 (Сальность кожи), 600 (Катаракта).

Дѣленія примѣняются одинаково часто и низшія и высшія. Низшія дѣленія во всякомъ случаѣ предпочтительны при болѣзняхъ пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ, также при ревматизмѣ, но если они не даютъ ожидаемыхъ результатовъ, при всемъ соотвѣтствіи симптомовъ, то необходимо испытать высшія дѣленія, особенно при преобладаніи душевныхъ и нервныхъ симптомовъ. *Сульфуръ* Ѳ умѣстенъ при хроническомъ запорѣ.

Длительность дѣйствія: при испытаніи на здоровыхъ до 6 недѣль.

Противосредства; *Камфора*, *Меркуръ*, *Нуксъ вом.*, *Пульсат.*, *Сетя Хамомил.*, *Аконитъ*. Съ своей стороны Сульф.—противосредство въ отношеніи *Хины*, *Іод.*, *Меркур.*, *Русъ*, *Сетя*, *Нитри ацид.*

Сульфуръ обладаетъ свойствомъ усилить дѣйствіе другого лѣкарства на организмъ, когда послѣдній, при явномъ соотвѣтствіи симптомовъ, не поддается тому дѣйствію, или приготовить въ немъ почву для лучшаго дѣйствія новаго лѣкарства.

Сульфуръ іодат. (*Sulphur iodatum*, Іодистая сѣра). Симптомы этого средства слагаются изъ дѣйствій его составныхъ частей—іода и сѣры. Рекомендуются при упорныхъ накожныхъ болѣзняхъ, особенно при си-

козѣ бороды, также при мокнущей, сильно зудящей экземѣ на нижнихъ конечностяхъ съ расширеніемъ венъ. Дѣленія $\times 3$ (въ порошокъ) и вышія.

Сульфуръ ацид. или Ацид. сульфурик. (*Sulphuris acidum*, Сѣрная кислота). Примѣняется въ разведеніяхъ. Болѣзни, въ которыхъ надо имѣть въ виду это средство, суть слѣдующія: нервныя боли, постепенно, нарастающія и затѣмъ внезапно прекращающіяся; головныя боли съ головокруженіемъ, слабостью и склонностью къ потѣнію; изнуряющіе утренніе поты; склонность къ кровотеченіямъ изъ носа, легкихъ, десенъ и проч.; плѣсневка у дѣтей, воспаление рта съ слюнотеченіемъ, изжога, упорныя запоры или водянистыя, желчныя поносы; ѣдкія слизистыя и съ кровью бѣли.

Противосредство — *Пульсатилла*

№ 20. Тартаръ эметикъ.

Tartarus emeticus. Рвотный камень.

Иначе еще называется, Тартаръ стибиат., Стибіо-Кали-Тартарик. Антимоній тартарикумъ.

Примѣняется въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ или въ разведеніяхъ.

При отравленіи рвотнымъ камнемъ, когда онъ вводится даже непосредственно въ кровь (при испытаніи на животныхъ), поражаются прежде всего мозгъ головной и спинной, особенно нервъ, вліяющій на дѣятельность сердца, легкихъ и желудочно-кишечнаго канала. Слѣдствіемъ этого являются слѣдующіе припадки: рвота раньше еще, чѣмъ успѣло развиваться воспаленіе слизистой оболочки желудка, сильное охлажденіе кожи и членовъ, большой упадокъ силъ и дрожаніе мышцъ; въ концѣ концовъ—смерть въ судорогахъ вслѣдствіе паралича мозга и сердца

Послѣ малыхъ, но еще сильно дѣйствующихъ дозъ наблюдается усиленная дѣятельность железистыхъ органовъ и слизистыхъ оболочекъ.

Въ гомеопатическихъ дозахъ Тартар. эметик. примѣняется главнымъ образомъ въ острыхъ катаррахъ, особенно—дыхательныхъ органовъ, а также — желудка и кишекъ, въ ревматическихъ и подагрическихъ заболѣваніяхъ съ обильными ночными потами, очень безпокойнымъ сномъ, приливами къ мозгу. Далѣе, при хронической, періодически являющейся боли въ желудкѣ спазматическаго характера, при нервной тошнотѣ и рвотѣ, наприм. у беременныхъ женщинъ, являющейся періодически, особенно по утрамъ при тощемъ желудкѣ.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 60 (Тифъ), 64, (Перемежающ. лихорадка), 109 (Мозговой ударъ), 139 (Астма), 308 (Кашель), 326 (Хрон. бронхитъ), 529 (Бол. мышцъ), 541 (Бол. кожи).

Дѣленія: преимущественно низкія.

Длительность дѣйствія: смотря по величинѣ дозъ и частотѣ приемовъ, отъ нѣсколькихъ дней до 4 недѣль (въ хроническихъ случаяхъ).

Противосредства: *Ипек.*, *Пульсат*, *Коккул*, *Хина*, *Сепія*.

№ 21. Фосфоръ.

Phosphorus.

Изъ 3 видовъ фосфора—бѣлаго, чернаго и краснаго—въ медицинѣ употребляется лишь бѣлый фосфоръ, который вслѣдствіе своей окисляемости, сохраняется постоянно въ водѣ и имѣетъ видъ легко рѣжущейся ножомъ массы. Въ гомеопатіи примѣняются растиранія фосфора съ влажнымъ молочнымъ сахаромъ по предписаніямъ, даннымъ Ганеманомъ, а также спиртные растворы, изъ которыхъ первый растворъ равняется 3-му десятичному дѣленію.

Самая меньшая смертельная доза фосфора составляетъ 1 гранъ, а $\frac{1}{4}$ грана можетъ вызвать уже тяжелыя явленія, которыя развиваются всегда очень медленно.

Фосфорныя явленія выражаются въ разстройствѣ пищеварительныхъ органовъ, въ воспалительныхъ состояніяхъ дыхательныхъ органовъ, въ своеобразномъ пораженіи челюстныхъ костей. Далѣе, у людей, работавшихъ долгое время съ фосфоромъ, наблюдались слѣдующія разстройства, которыя медленно развивались: слабость спины и ногъ, съ подергиваніемъ въ мышцахъ; дрожаніе и чувство ползанія мурашекъ по кожѣ, затрудненная рѣчь; вначалѣ усиленіе, а затѣмъ ослабленіе или потеря половой способности. При вскрытіи труповъ умершихъ отъ отравленія фосфоромъ, въ нихъ находятъ: явленія воспаления и распада въ слизистой оболочкѣ и стѣнкѣ желудка, также въ кишкахъ, тонкой и прямой (особенно у задняго прохода), далѣе (переполненіе кровью, жировое перерожденіе и проч.) въ печени, въ селезенкѣ, почкахъ, сердцѣ, легкихъ, мозговой ткани и др.

Фосфоръ, на основаніи болѣе подробныхъ испытаній его, примѣняется съ лѣчебной цѣлью (въ гомеопатическихъ дозахъ) въ острыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, сопровождающихся значительнымъ упадкомъ нервной дѣятельности, и когда имѣются притомъ слѣдующіе симптомы: большая чувствительность къ холодному воздуху съ склонностью къ простудѣ, раздражительность и слабость вслѣдствіе печали, гнѣва и заботъ, слабость и параличи вслѣдствіе половыхъ излишествъ, пораженія головного и спинного мозга, разстройства зрѣнія и слуха, боли въ суставахъ, особенно въ бедрахъ и плечѣ, параличи отдѣльныхъ нервовъ, нервныя боли, дрожаніе членовъ (также *Материя фосфорика*), душевныя состоянія угнетающаго характера, нервная бессонница, приливы крови съ сердцебиеніемъ, тифозныя состоянія и проч.

Характеристика Фосфора въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 109 (Мозговой ударъ), 124 (Невралгии), 139 (Астма), 146 (Параличъ), 157 (Неврозы), 202 (Катар. неба и глотки), 216 (Хронич. катар. желудка), 221 (Язвы желудка), 278 (Бол. печени), 301 (Катаръ носа и носоглотки), 308 (Охриплость), 328 (Хронич. бронхитъ), 354 (Чихотка легкихъ), 373 (Бол. сердца), 489 (Ракъ), 494 (Золотуха), 497 (Туберкулезъ), 541 (Бол. кожи), (581) Потливость.

Дѣленія: $\times 3$ и высшія; первыя предпочтительны при острыхъ болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ, также въ болѣзняхъ нервовъ. Во.

всѣхъ же прочихъ случаяхъ высшія дѣленія часто дѣйствуютъ лучше, чѣмъ низшія.

Противосредства: *Камфора, Хаомилл, Коффеа, Феррумъ, Арника, Сульфуръ, Калькар. карб., Хелидоній.*

№ 22. Хаомилла.

Chamomilla vulgaris. Ромашка обыкновенная, полевая.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растения. Хаомилла вліяетъ на чувствительные нервы, выходящіе изъ спинного мозга, вызывая въ нихъ состояние чрезмѣрной раздражительности (гиперэстезіи). Эта гиперэстезія сопровождается и повышенной душевной раздражительностью. Хаомилла вліяетъ и на пищеварительный каналъ и, въ большей или меньшей степени, на прочіе органы тѣла. Характерно для страданій и болей, соотвѣствующихъ Хаомиллѣ, что они появляются и ухудшаются преимущественно въ вечерніе часы и ночью, также послѣ ѣды; облегчаются же отъ наружной теплоты, при вставаніи изъ лежащаго положенія, при разныхъ движеніяхъ тѣла; невыносимыми онѣ становятся отъ сильнаго безпокойства и ощущенія жара. Боли являются приступами и оставляютъ послѣ себя ощущение большой слабости; онѣ особенно сильно выражаются у дѣтей и особъ женскаго пола.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 99 (Головная боль), 124 (Бол. нервн. системы), 127 (Судороги, Спазмы), 188 (Зубн. боль), 189 (Прорѣзыв. зубовъ), 197 (Ангина), 209 (Боль подъ ложечкой), 231 (Понось), 234 (Боль живота), 244 (Воспал. толст. кишки), 272 (Набуханіе печени), 517 (Остр. ревматизмъ сустав.), 541 (Болѣзни кожи)

Кромѣ того Хаомилла умѣстна при многихъ другихъ болѣзняхъ, рядомъ съ другими лѣкарствами, если имѣются указанные выше нервные и душевные симптомы, особенно же въ лихорадочныхъ катарральныхъ и ревматическихъ пораженіяхъ у дѣтей и у особъ женскаго пола, склонныхъ къ судорогамъ, спазмамъ; далѣе, при возбужденности кровообращенія (приливы, кровотеченія), при разстройствахъ регулы съ обильными кровями, при появленіи и усиленіи страданій отъ сильнаго душевнаго волненія, отъ гнѣва и раздраженія.

Дѣленія: X3—3 и высшія; послѣднія особенно въ нервныхъ и душевныхъ страданіяхъ. Полезнымъ оказывается часто и настой этого средства, въ видѣ чая, особенно для наружнаго употребленія (компрессы), для полосканія рта, для промываній маточнаго рукава и проч., а при количѣ наиболѣе дѣйствительной является чистая тинктура.

Длительность дѣйствія: большихъ дозъ — нѣсколько дней.

Противосредства: *Камфора, Пульсат., Каустик., Коккулусъ.*

№ 23. Хина.

Cortex Chinae. Хинная кора.

Тинктура готовится изъ 1 части Хинной коры и 5 частей алкоголя. Основные дѣятельныя начала: *Хининъ* и еще рядъ подобныхъ

алкалоидовъ, менѣ важныхъ въ практическомъ отношеніи. Хининъ въ большихъ дозахъ вызываетъ вначалѣ явленія раздраженія, которыя вскорѣ смѣняются явленіями расслабленія. При полномъ отравленіи хининомъ можетъ послѣдовать даже смерть вслѣдствіе паралича легкихъ и сердца.

Послѣдствія длительного употребленія Хины въ большихъ дозахъ суть слѣдующія: крайне повышенная чувствительность всего тѣла, особенно же органовъ чувствъ, и большая слабость; упадокъ силъ при малѣйшемъ напряженіи или движеніи, сопровождающійся побѣомъ, общимъ или мѣстнымъ (груди, спины, ладоней); подергивающія или колющія боли въ мягкихъ частяхъ, тянущія или сверлящія боли въ костяхъ и суставахъ, съ опуханіемъ тканей и лихорадочнымъ состояніемъ; страданія ухудшаются при дотрагиваніи и движеніи, въ вечерніе часы и ночью; чувство расслабленности въ суставахъ и онѣмѣлости въ членахъ, зябкость, приливы и волненія крови, обморочныя состоянія; легкое дрожаніе мышцъ; водяночныя и цыготныя состоянія.

Хина примѣняется въ лихорадочныхъ, а также въ нелихорадочныхъ состояніяхъ, сопровождающихся сильной раздражительностью и слабостью нервной системы и истощеніемъ силъ, особенно когда при этомъ имѣется желтоватый цвѣтъ лица или дряблая, склонная къ потѣнію кожа; далѣе, при кровотеченіяхъ изъ носа и вообще дыхательныхъ путей; при необыкновенномъ слюнотеченіи; при частыхъ доллюціяхъ съ сильнымъ половымъ возбужденіемъ, при обильномъ выдѣленіи слизи изъ слизистыхъ оболочекъ, при слишкомъ продолжительныхъ регулахъ при болѣзняхъ селезенки и печени, при бѣлокровіи, водяночныхъ состояніяхъ, малярійномъ истощеніи, при шумѣ и звонѣ въ ушахъ и проч.

Характеристика Хины въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 100 (Головная боль), 124 (Бол. нервной системы), 215 (Хронич. катар. желудка), 278 (Хронич. воспал. печени), 291 (Кругл. глисты), 353 (Чихотка легкихъ), 380 (Нервн. сердцебіеніе), 518 (Остр. ревматизмъ сустав.), 541 (Бол. кожи).

Препараты и дѣленія: Хина, Хинин. сульфурик., Хинин. бромат. *Хинин. сульфурик.* предпочтительнѣе Хины при лѣченіи недавней перемежающейся лихорадки, также при ревматизмѣ и при лихорадкѣ, обладающей въ ряду осложненій другихъ болѣзней. *Хина* же предпочтительнѣе въ застарѣлой перемежающейся лихорадкѣ и въ подагрическихъ состояніяхъ. Въ томъ и другомъ случаѣ болѣе дѣйствительны крупныя дозы, даваемая незадолго до приступа болѣзни или вообще въ промежуточное время (см. стр. 63). Во всѣхъ прочихъ случаяхъ примѣняется *Хина* преимущественно въ низшихъ дѣленіяхъ, но нерѣдко высшія дѣленія дѣйствуютъ лучше, нежели низшія. При шумѣ и звонѣ въ ушахъ предпочтительнѣе *Хинин. бромат.*

Длительность дѣйствія: 2 - 3 недѣли.

Противосредства: *Арсен.*, *Ипекакуана*, *Лазехизь*, *Пумсат.*, *Феррумъ*, *Верапр.* -- *Селен.* усиливаетъ дѣйствіе Хины.

№ 24. Цина.

Сина. Цытварное сѣмя.

Тинктура готовится изъ цвѣтовъ растенія (*Artemisia Cina*) съ 5 чч. алкоголя. Основное дѣятельное начало — *Сантонинъ*, вещество ядовитое. Въ большихъ дозахъ Цина или Сантонинъ вызываютъ рядъ явленій, подобныхъ тѣмъ, какія наблюдаются у дѣтей, страдающихъ глистами, круглыми и мелкими аскаридами. Примѣняется поэтому главнымъ образомъ въ такихъ случаяхъ у дѣтей, и не только, когда глисты являются причиной болѣзненныхъ явленій, но и тогда, когда подобныя явленія преобладаютъ при другомъ болѣзненномъ состояніи. Въ случаяхъ послѣдняго рода примѣняется не Сантонинъ, а Цина. Такимъ образомъ, Цину надо имѣть въ виду при судорожныхъ страданіяхъ у дѣтей, вскрикиваніи и метаніи во снѣ, скрежетаніи зубами; при капризномъ, нервномъ, раздражительномъ состояніи; при расстройствахъ пищеваренія съ обжорливостью и неутолимымъ голодомъ; при коклюшѣ; при непроизвольномъ мочеотдѣленіи и проч. Примѣненіе при глистахъ см. на стр. 290.

Дѣленія: низшія. Длительность дѣйствія: смотря по частотѣ и величинѣ пріемовъ—отъ нѣсколькихъ часовъ до 2 дней.

Противосредства: *Брюня, Хина, Гіосціам., Инпекакуана.*

№ 25. Антимоніумъ крудумъ.

Antimonium crudum. Трехсѣрнистая сурьма.

До 5 дѣленія—растиранія, а далѣе—разведенія.

Дѣйствуетъ преимущественно на слизистыя оболочки, на кожу и на легочно-желудочный нервъ. Въ состояніяхъ, требующихъ Антимон. круд., наблюдаются часто слѣдующія явленія: чувство общей разслабленности, дрожаніе членовъ, общая тоскливость тѣла, мышечныя подергиванія; общее набуханіе тѣла. Страданія усиливаются отъ солнечнаго жара и теплаго воздуха, отъ горячительныхъ напитковъ, отъ движенія и тѣлеснаго напряженія; улучшаются же отъ покоя и прохладнаго воздуха. Раздражительное, сердитое настроеніе. Наклонность къ потѣнію, особенно ночью.

Примѣняется въ болѣзняхъ, сопровождающихся значительнымъ катарромъ дыхательныхъ путей, или желудка и кишекъ; въ состояніяхъ ослизненія съ истощающими ночными потами; при кожныхъ сыпяхъ, при ревматизмѣ и подагрѣ; при слизистыхъ истеченіяхъ изъ половыхъ органовъ.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣд. страницахъ: 215 (Хронич. катар. желудка), 259 (Геморрой), 300 (Хронич. катар. носа и носоглотки), 535 (Бол. кожи), 596 (Бленоррея глазъ).

Дѣленія: у нервныхъ больныхъ и при болѣзненныхъ пораженіяхъ желудка высшія дѣленія дѣйствуютъ часто лучше, чѣмъ низшія, во всѣхъ же прочихъ случаяхъ примѣняются послѣднія.

Длительность дѣйствія: смотря по величинѣ и частотѣ пріемовъ, отъ нѣсколькихъ дней до 4 недѣль.

Противосредства: *Меркур*, *Гепаръ сульф.* Съ своей стороны—противъ хронич. отравленія свинцомъ, ртутью, мышьякомъ.

№ 26. Аурумъ.—Аурумъ муріатикумъ.

Aurum praecipitatum. Золото осадочное.

Aurum muriaticum natronatum. Золото соляно-натронное.

Оба эти средства въ общемъ очень сходны между собою по дѣйствію. Второму отдается въ практикѣ преимущество при хроническихъ опуханіяхъ, особенно—железистыхъ органовъ, при сифилитическихъ пораженіяхъ (въ послѣднемъ случаѣ примѣняется и *Аурумъ іодат.*, йодистое золото).

Аурумъ и Аурумъ іодат. примѣняются (до 5 дѣленія) въ растираніяхъ, Аурумъ муріат. въ разведеніяхъ.

При испытаніи препаратовъ золота на здоровыхъ людяхъ получаютъ: отъ меньшихъ пріемовъ—усиленіе аппетита, ускоренное пищевареніе, увеличенное выдѣленіе мочи, повышенная половая раздражимость, ощущение чрезмѣрной внутренней теплоты, стремленіе къ движенію; отъ большихъ же (отравляющихъ) дозъ: позывы на рвоту, рвота, поносъ, колика, стѣсненіе въ груди, судороги, параличъ сердца.

Къ общимъ явленіямъ относятся: боль какъ отъ разбитости въ крестцѣ и колѣнѣ при лежаніи; костныя боли въ головѣ, спинѣ и членахъ; усиленіе болей отъ прикосновенія, иногда и отъ движенія; повышенная чувствительность къ разнаго рода впечатлѣніямъ; усталость. Сонъ безпокойный, безсонница, необычное слишкомъ раннее по утрамъ пробужденіе; непріятные, устрашающіе сны. Настроеніе угрюмое, меланхолическое, или раздражительное и сварливое; безпокойное стремленіе къ занятію, но не надолго; тоска и отчаяніе съ влеченіемъ къ самоубійству, разочарованіе въ жизни. Приливы къ головѣ, шумъ и звонъ въ ушахъ, особенно по утрамъ, ослабленіе зрѣнія, тянущая боль въ затылочныхъ мышцахъ и проч.

Характеристика Аурумъ и Аурумъ мур. въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣд. страницахъ: 140 (Астма), 155 (Неврозы), 163 (Меланхолия), 201 (Хронич. катар. мягк. неба), 372, 377 (Бол. сердца), 489 (Ракъ), 536 (Бол. кожи).

Вообще же эти средства примѣняются преимущественно въ хроническихъ заболѣваніяхъ, не сопровождающихся лихорадочнымъ состояніемъ или съ очень небольшимъ повышеніемъ температуры по вечерамъ, у людей раздражительнаго темперамента или глубоко-меланхолическихъ, безотчетно чающихъ смерти (подобно какъ при мышьякѣ) и склонныхъ къ самоубійству; къ хроническимъ заболѣваніямъ, показующимъ Аурумъ, относятся особенно: вонючій насморкъ на сифилитической или золотушной почвѣ; дурной запахъ изо рта при воспаленныхъ рыхлыхъ деснахъ, пученье живота, расслабленіе паховыхъ (Пупартовыхъ) связокъ съ склонностію къ образованію грыжи; при

воспаленіи яичниковъ, матки, яичекъ; при застарѣлыхъ воспаленіяхъ глазъ золотушнаго происхожденія.

Дѣленія: низкія—при пораженіяхъ костей и всякаго рода опуханій и разростаній (миндалевидныхъ железъ, матки и проч.), болѣе высокія—при нервныхъ заболѣваніяхъ).

Длительныя дѣйствія: нѣсколько недѣль; дѣйствія развиваются постепенно, спустя нѣсколько часовъ послѣ приѣма этого средства.

Противосредства: *Камфора, Иод., Купрумъ, Аса фетиди, Бглад., Хина, Меркур.,* вино.

№ 27. Ацидумъ нитрикумъ или Нитри ацидумъ.

Acidum nitricum или *Nitri acidum*. Азотная кислота.

Разведеніе готовится изъ воднаго раствора 1 части кислоты съ 2 ч.ч. воды, принимаемаго за 1-е десятичное дѣленіе.

Азотная кислота дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистыя оболочки, особенно у отверстій тѣла, гдѣ кожа и слизистая оболочка сходятся. Она вызываетъ раздраженіе и разрушительныя изъязвленія до степени омертвѣнія; она дѣйствуетъ также на железы и кости и на прочіе органы и ткани тѣла.

Особенно характеристичны для этого средства дурнопахучія, ѣдкія выдѣленія и боли какъ бы отъ вѣдрѣнія осколковъ дерева.

Примѣняется въ острыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, происходящихъ отъ ненормальнаго состава крови, вслѣдствіе ли зараженія или какихъ-либо другихъ причинъ. Облегченіе симптомовъ отъ ѣзды въ экипажѣ.

Характеристика Ацид. нитр. въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 80 (Дифтеритъ), 278 (Бол. печени), 463 (Трипперъ), 490 (Ракъ), 536 (Бол. кожи) 595 (Бленоррея глазъ).

Дѣленія: низкія—въ большинствѣ случаевъ.

Длительность дѣйствія: при испытаніяхъ на здоровыхъ до нѣсколькихъ недѣль, въ остро протекающихъ болѣзняхъ 1—2 часа.

Противосредства: *Калькар карбон., Коніумъ, Камфора, Гепаръ сульф., Меркуръ, Мезереумъ, Петролеумъ, Фосфоръ, Сульфуръ.* Съ своей стороны—антидотъ противъ *Кальк. карб., Иод., Меркуръ*; въ отношеніи Меркурія именно—при слѣдующихъ симптомахъ: при безпокойствѣ, страхѣ, костныхъ боляхъ, воспаленіи глазъ, слюнотеченіи, при язвахъ въ полости рта и зѣва и при костоѣдѣ.

№ 28. Баптизія.

Baptisia tinctoria. Дикій индикъ.

Тинктура—изъ корневой коры.

Общіе симптомы этого средства суть слѣдующіе: большая сонливость и слабость; безпокойный сонъ съ страшными сновидѣніями; очень крѣпкій сонъ почти до оглушенія; нервная раздражительность

съ упадкомъ силъ длительное лихорадочное состояние, мышечныя боли и подергиванія въ отдѣльныхъ мышцахъ, сильное жжение въ подошвахъ ногъ, боли въ суставахъ

Далѣе боль во лбу и вискахъ, головокруженіе, нерасположеніе къ умственной работѣ, трудность соображенія, голова чувствуется какъ бы слишкомъ большой и тяжелой тяжесть въѣкъ и боль въ глазахъ съ краснотой шумъ въ ушахъ съ тугостью слуха, болѣзненность носа съ густымъ слизистымъ выдѣленіемъ; охриплость, безголосье, судорожный кашель одышка съ сильнымъ сердцебиеніемъ, языкъ набухшій и сухой, желто обложенный, краснота зѣва, опуханіе миндалярныхъ железъ, скопленіе слизи въ глоткѣ съ изъязвленіемъ —Симптомы разстроеннаго пищеваренія съ стороны желудка и кишекъ: горькій вкусъ, тошнота и рвота, вздутіе живота газами, болѣзненность желудка и печени при давленіи, темныя, вонючія, слизистыя и кровавыя испражненія Моча горячая, жгучая, въ небольшомъ количествѣ, тянущая боль въ области почекъ съ лѣвой стороны.—Регулы обильныя и раньше срока, острыя и дурнопахнущія бѣли съ язвами влагалища и шейки матки

Баптизю надо имѣть въ виду особенно въ тифозныхъ лихорадкахъ, дизентеріи и при язвахъ кишекъ, также при дифтеритѣ и въ тяжелыхъ случаяхъ гриппа

Дѣленія преимущественно низкія и даже Ө

Подобныя Баптизисы лѣкарства *Гельземинъ, Русъ, Ацид. мургатик*

№ 29 Барита карбоника.

Baryta carbonica Углекислый баритъ

До 3 дѣленія примѣняются растиранія съ молочнымъ сахаромъ, выше же—разведенія

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на лимфатическую систему, вызывая увеличеніе и изъязвленіе железъ. Изъ общихъ симптомовъ Барита главными являются слѣдующіе: слабость и тяжесть во всемъ тѣлѣ, одеревенѣлость и онѣмѣніе въ членахъ; судорожныя подергиванія мышцъ, чувство дрожанія, проходящаго по всему тѣлу, особенно рано утромъ, колющія и давящія боли въ разныхъ мѣстахъ, большая чувствительность къ холоду, склонность къ простудѣ (къ ангинѣ), волненія крови съ пульсацией въ головѣ и груди —Сонъ безпокойный, частыя пробужденія и тревожныя сновидѣнія, большая сонливость днемъ съ частой зѣвотой.—Душевное настроеніе угрюмое, капризное, придавленное и нелюдимое, тоскливое, плаксивое

Барита умѣстна особенно въ хроническихъ болѣзняхъ, особенно —золотушнаго происхожденія, вообще же—у больныхъ лимфатическаго тѣлосложенія

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ 145 (Параличъ), 201 (Хронич катарръ зѣва), 221 (Язвы желудка), 327 (Хронич бронхитъ), 536 (Бол кожи), 581 (Потливость), 595 (Бленоррея глазъ)

Дѣленія низкія и среднія дѣленія, но часто примѣняются и вы-

сокия, особенно въ упорныхъ случаяхъ, также при нервныхъ и душевныхъ болѣзняхъ

Длительность дѣйствія отъ 2 дней до 4 недѣль, смотря по частотѣ приемовъ

Противосредства *Беллад*, *Камфора*, *Душк.*, *Меркур*

№ 30 Гамамелисъ

Hamamelis virginica Волшебный виргинскій орѣхъ

Эссенция готовится изъ свѣжей коры вѣтвей и корня Кромѣ того—и жидкій *экстрактъ-Гамамелисъ*

Средство это имѣетъ въ своемъ дѣйствіи много общаго съ Арникой и Аконитомъ, особеннымъ же образомъ оно дѣйствуетъ на венозные и капиллярные сосуды

Симптомы этого средства суть слѣдующіе

Приливы крови къ головѣ, давяще головныя боли Краснота глазъ безъ боли. Приливы крови къ брюшнымъ органамъ; боль въ поясницѣ и крестцѣ Тянущая боль отъ плечевого сустава до суставовъ кисти руки и пальцевъ съ ощущеніемъ колотья въ подкожныхъ венахъ обѣихъ рукъ; тугость пальцевыхъ суставовъ Чувство усталости и тугости въ нижнихъ конечностяхъ, или тупая, тянущая боль въ нихъ слабость колѣнныхъ суставовъ, рвущія боли въ ступняхъ Расширение венъ

Частыя кровотеченія изъ носа или изъ прочихъ дыхательныхъ путей, съ стѣсненіемъ въ груди и одышкой

Воспаленіе слизистой оболочки рта или зѣва съ образованіемъ пузырьковъ и припуханіемъ миндалевидныхъ железъ

Неприятное ощущеніе подъ ложечкой, какъ бы жжение, тошнота, скверный вкусъ, боль въ области печени и селезенки, пученье живота съ коликой, запоръ, смѣняющійся отхожденіемъ твердыхъ и темноокрашенныхъ массъ, или тщетные позывы на низъ, геморроидальные узлы

Воспаленіе почекъ, съ выдѣленіемъ малыхъ количествъ темной мочи, жгучее ощущеніе въ каналѣ съ частыми позывами къ моченію

Гамамелисъ вліяетъ и на половую сферу сильное возбужденіе съ поллюціями и съ послѣдующей общей слабостью Отсутствіе полового влеченія Нервная боль въ яичкахъ и сѣменныхъ канатикахъ, идущая вверхъ до брюшной полости, холодный потъ мошонки —Кровотеченія изъ матки въ промежуткѣ между двумя менструаціями, судорожное и воспалительное состояніе влагалища, болѣзненная менструація, приливы къ маткѣ и яичникамъ

Примѣняется при кровотеченіяхъ изъ внутреннихъ органовъ, при воспаленіи и расширеніи венъ, при геморроидальныхъ страданіяхъ, при воспаленіи матки и яичниковъ при невралгии яичекъ, при ревматическихъ пораженіяхъ суставовъ, не сопровождающихся лихорадочными явленіями, при поврежденіяхъ съ подкожными кровоподтеками

Наружное примѣненіе см на стр 42

Внутрь низкія дѣленія, даже Θ , рѣже высокія дѣленія

№ 31. Гельземинъ.

Gelsemium sempervirens. Дикій или желтый жасминъ.

Гельземинъ есть собственно алкалоидъ, основное дѣятельное начало растенія Гельземиа, и такъ какъ эссенція готовится изъ корня растенія, и изъ нея—разведенія, то правильнѣе называть это средство *Гельземи*. Однако, названіе „Гельземинъ“ принятое въ русскихъ лѣчебникахъ, оставлено и въ этомъ.

Гельземинъ дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервную систему, вызывая въ различной степени состоянія разслабленія двигательныхъ нервовъ, а затѣмъ — также и чувствительныхъ. Характеристичны для этого средства состоянія угнетенія и нервности, вялости и помраченія. Чувство общаго недомоганія. Внезапно появляющаяся боль на протяженіи нерва, глубокосидящая, тупая. Судорожныя состоянія. Сонъ безпокойный и полный сновидѣній; глубокій сонъ или бессонница отъ возбуждающаго наплыва мыслей; сонливость днемъ, особенно по утрамъ. — Душевное настроеніе раздражительное и нетерпѣливое, или же апатичное и придавленное. -- Временами являющийся зудъ въ разныхъ мѣстахъ тѣла, безболѣзненные высыпи на внутреннихъ поверхностяхъ бедеръ. Цвѣтъ лица красный или необычайно блѣдный. — Припуханіе паховыхъ железъ на правой сторонѣ.

На основаніи еще другихъ симптомовъ Гельземинъ примѣняется часто въ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ, также въ нелихорадочныхъ; при воспалительныхъ пораженіяхъ мозга, головного и спинного, и его оболочекъ, при душевныхъ и нервныхъ болѣзняхъ; при глазныхъ и ушныхъ страданіяхъ; при болѣзняхъ печени съ желтухой, при коликахъ и поносахъ, являющихся послѣ душевнаго волненія, испуга, горя; при судорогѣ мочевого пузыря, непроизвольномъ мочеиспусканіи; при катаральномъ пораженіи мочеиспускательнаго канала, невралгій яичка, половой слабости съ сѣмяистеченіемъ, при коликахъ матки съ бѣлями.

Характеристика Гельземина въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 99 (Мигрень), 108 (Мозговой ударъ), 145 (Параличъ), 167 (Сумасшествіе), 441 (Зубная боль у беременныхъ).

Дѣленія: низкія преимущественно и даже Ө.

Нѣкоторое средство съ Гельземиномъ имѣютъ *Акон.* и *Беллад.*

№ 32. Дрозера.

Drosera rotundifolia. Росянка круглолистная.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

Обычнымъ примѣненіемъ Дрозеры при судорожномъ кашлѣ (коклюшъ — стр. 333) не исчерпывается ея дѣйствіе, а, соотвѣтственно цѣлому ряду своихъ симптомовъ, Дрозера можетъ съ пользой примѣняться еще и въ другихъ болѣзненныхъ состояніяхъ, къ которымъ относятся: нервныя пораженія глазъ и ушей; лицевыя боли; ревматиче-

скія боли въ ногахъ съ судорогами отдѣльныхъ мышечныхъ группъ, разстройства пищеваренія: отсутствіе аппетита съ волчьимъ голодомъ, рвота слизью и желчью раннимъ утромъ или натошакъ, рвота кровью съ коликой; перемежающіяся лихорадки съ пароксизмами въ утренніе часы и затяжномъ теченіи отдѣльныхъ стадій ихъ.

Характеристическіе симптомы Дрозеры суть слѣдующіе грызуще-колющія боли въ членахъ, особенно въ суставахъ; слабость и мышечная боль; подергиванія въ членахъ; ухудшеніе страданій по ночамъ и въ ранніе утренніе часы. — Головная боль, давящая, надъ глазами и въ области скулы при каждомъ сдѣланномъ шагѣ и при каждомъ наклоненіи тѣла, и съ улучшеніемъ при выпрямленіи головы — Жгучая боль въ вѣкахъ и глазномъ яблокѣ, ухудшеніе зрѣнія при переходѣ съ вольнаго воздуха въ комнату. — Колотье и ломота въ ушахъ; тугость слуха съ жужжаніемъ и гудѣніемъ въ ушахъ — Повышенное обоняніе къ кисловатымъ запахамъ; кровотеченіе изъ носа. — Ревматическія боли въ затылкѣ, вдоль спины, между лопатками, до поясницы и крестца; также — въ плечевомъ и локтевомъ суставахъ, и въ кисти руки, съ тугостью пальцевъ и колотьемъ въ кончикахъ ихъ; боль въ бедреномъ суставѣ съ большой слабостью ногъ, или съ дрожаніемъ ихъ и судорогой икръ. — Кашель судорожный, являющійся приступами, особенно въ ночное время, со рвотой; мокрота слизистая или съ кровью; охриплость и стѣсненіе въ груди, особенно при разговорѣ.

Дѣленія примѣняются обычно низкія и среднія; рекомендуется также Θ, особенно при чахоткѣ и коклюшѣ, если разведенія недостаточно дѣйствуютъ.

Длительность дѣйствія: нѣсколько дней. Противосредство — *Камфора*.

33. Дулькамара.

Solanum Dulcamara. Пасленъ сладкогорькій

Основное дѣятельное начало — Соланинъ. Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ и молодыхъ вѣтвей

Дулькамара дѣйствуетъ на кожу, железы и пищеварительные органы, также на слизистыя оболочки и мышцы, производя катарральныя и ревматическія страданія.

Ухудшеніе страданій въ вечерніе часы и ночью и отъ свѣжаго воздуха, также въ холодную и влажную погоду.

Къ симптомамъ Дулькамары относятся особенно слѣдующіе:

Давящая или сверлящая боль въ головѣ съ чувствомъ тяжести и оглушенія, боль во лбу и вискахъ, особенно передъ полуднемъ и вечеромъ; головокруженіе со склонностью къ обмороку. Подергиванія губъ и вѣкъ. Затрудненіе рѣчи вслѣдствіе ограниченной подвижности языка. — Стягивающая боль затылочныхъ мышцъ съ тугоподвижностію ихъ; тупыя покалыванія вдоль поясницы и рѣжущая боль въ поясницѣ. Такого же рода боли въ верхнихъ конечностяхъ, съ дрожаніемъ рукъ и потѣніемъ ладоней. Рвуція, стучащія боли въ суставахъ нижнихъ конечностей, исчезающія при ходьбѣ и возвращающіяся въ покоѣ

рѣжущая боль въ подошвѣ ногъ, не прекращающаяся при ходьбѣ (см. еще характеристику при ревматизмѣ суставовъ на стр. 519 и при параличѣ — стр. 145). — Разстройства пищеваренія; изжога, тошнота рвота густой слизью по утрамъ; вздутіе желудка, пученіе живота, частое отхожденіе вонючихъ газовъ, частое жилие на низъ или слизистые поносы съ коликой въ животѣ (см. еще стр. 244 при катаррѣ толстой кишки). — Болѣзненные измѣненія кожи (см. стр. 537; также: 561 (Крапивница), 564 (Опоясывающій лишай). — Въ отношеніи дыхательныхъ органовъ: очень сильное кровотеченіе изъ носа, изъ лѣвой ноздри; кровохарканіе съ сильнымъ стѣсненіемъ во всей груди при вздохѣ и выдохѣ. Короткій, отрывистый кашель съ колотьемъ въ груди и отхаркиваніемъ тягучей слизи. — Въ отношеніи неба и глотки см. стр. 201. — Очень сильная рвущая боль въ ухѣ ночью; сильный шумъ въ ухѣ по прекращеніи боли; рѣзкій звонъ въ ушахъ. — Воспаленія глазъ съ водянистымъ истеченіемъ; начинающійся параличъ зрительнаго нерва; параличъ верхняго вѣка.

Дѣленія : $\times 3 - 3$, но въ случаяхъ недостаточныхъ результатовъ, примѣняются еще болѣе низкія дѣленія до Θ

Длительность дѣйствія: послѣ частыхъ пріемовъ — до 2 недѣль

Противосредства: *Камфора*, *Кали карбон.*, *Капсик.*, *Ипек.*, *Меркур* — Съ своей стороны Дульк. — противъ *Купрум*.

№ 34. Іодумъ.

Iodum purum. Іодъ.

Тинктура готовится изъ раствора чистаго іода въ алкоголь. Кромѣ того Іодъ примѣняется въ видѣ своихъ химическихъ соединений: *Кали іодат.*, *Арсеник. іодат.* (см. подъ № 4), *Калькар. іодат.* (см. подъ № 35), *Меркур. іодат.* и *биіодат.* (см. подъ № 12), *Сульфур. іодат.* и проч.

Принятый въ большомъ, отравляющемъ количествѣ, Іодъ вызываетъ воспаленіе желудка и кишокъ и смерть; при продолжительныхъ пріемахъ меньшихъ количествъ развивается іодное истощеніе организма съ цѣлымъ рядомъ разстройствъ, къ которымъ относятся отсутствіе аппетита и волчій голодъ, головокруженіе, слабость, дрожаніе и онѣмѣніе членовъ, подергиванія, головныя боли; лихорадочное состояніе, катарръ дыхательныхъ органовъ, глазъ и проч., стѣсненіе въ груди. нѣкоторыя сыпи съ зудомъ, разстройство пищеваренія съ поносомъ, слюнотеченіемъ, усиленное выдѣленіе мочи, исхуданіе и мышечная слабость, уменьшеніе железъ, кровотеченія изъ внутреннихъ органовъ.

Примѣняется въ острыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, развивающихся на почвѣ лимфатическаго тѣлосложенія, при сифилисѣ (Калиодат) и проч.

Характеристика Іода въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 201 (Хронич. катарръ зѣва), 307 (Охриплость), 327 (Хронич. бронхитъ), 353 (Чихотка легкихъ), 494 (Золо-

туха), 497 (Туберкулезъ), 521 (Хронич. ревматизмъ суставовъ), 554 (Красн. угри);—*Кали iodat.*: 341 (Крупозн. воспал. легкихъ), 371 (Бол. сердца) 469 (Тверд. шанкръ, Сифились), 521 (Хронич. ревм. сустав.) (Красн. угри).

Дѣленія: въ большинствѣ случаевъ низкія и среднія, но надо имѣть въ виду и высшія дѣленія, особенно при чахоткѣ и при болѣзняхъ нервовъ.

Длительность дѣйствія: смотря по продолжительности пріемовъ, отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Противосредства: *Камфора, Гепаръ сульф., Сульфур., Антимон. круд. Арсен., Спонгия, Хина, Олій, Коффеа, Фосфоръ.* Съ своей стороны Іодъ — антидотъ *Меркуря.*

№ 35. Калькареа карбоника.

Calcareo carbonica. Углекислая известь. Мѣлъ.

Мѣлъ есть осадочная углекислая известь, которая рѣже употребляется въ гомеопатіи для приготовления растираній съ молочнымъ сахаромъ. обычно же для этой цѣли берется углекислая известь Ганемана, представляющая собою внутреннюю бѣлоснѣжную часть устричныхъ раковинъ, состоящую изъ 94—96 чч. углекислой извести, 2—3 фосфорно-кислой извести, $\frac{1}{2}$ ч. кремнезема и небольшого количества слизистаго вещества. Примѣняется до 5 дѣленія въ растираніяхъ, а далѣе—въ разведеніяхъ.

Къ *Калькареа* - препаратамъ относятся, кромѣ Калькар. карбон., еще: *Калькар. ацетика, Калькар. iodata, Калькар. флуорика, Калькар. фосфорика, Калькар. сульфурика* и *Гепаръ сульф. калькар.* Изъ нихъ *Гепар.* приведенъ отдѣльно подъ № 8. Остальные же приводятся здѣсь, такъ какъ въ общихъ чертахъ дѣйствія ихъ сходны съ дѣйствіемъ Калькар. карбон.; послѣдняя помѣщена во главѣ этихъ средствъ, такъ какъ наиболѣе испытана.

Калькареа карбон. дѣйствуетъ глубоко на организмъ, на процессы обмѣна веществъ въ немъ и вообще на всю его жизнедѣятельность. Такъ глубоко дѣйствуетъ еще только Сульфуръ, Силиція, Натр. muriatic. и Фосфоръ.

Къ симптомамъ этого средства относятся: боли въ мышцахъ, суставахъ и костяхъ, появляющіяся или ухудшающіяся подъ вліяніемъ свѣжаго, холоднаго воздуха, сырости и воды; значительная нарушенность нервнаго состоянія, ощущеніе тяжести и общаго недомоганія, болѣзненная напряженность и слабость во всемъ тѣлѣ, сильное утомленіе отъ малѣйшаго напряженія. Состоянія обморочныя съ холоднымъ потомъ; приливъ крови къ головѣ и груди и къ другимъ органамъ, кровотеченія; отливы крови изъ меньшихъ сосудовъ съ ощущеніемъ онѣмѣнія, особенно въ пальцахъ рукъ и ногъ.—Душевное настроеніе большей частью придавленное, угнетенное.—Сонъ, несмотря на усталость и сонливость въ теченіе дня, наступаетъ лишь поздно ночью, вслѣдствіе безпрестаннаго наплыва и теченія мыслей. Сонъ безпокойный, съ массой неприятныхъ сновидѣній, нисколько не освѣжающій.

Калькареа карбон. примѣняется преимущественно въ хроническихъ болѣзненныхъ состояніяхъ.

Характеристика ея въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ 155 (Неврозы), 166 (Душевно. болѣзни), 201 (Хронич. катар. неба и глотки), 216 (Хронич. катар. желудка), 278 (Бол. печени), 300 (Хрон. катар. носа и носоглотки), 327 (Хрон. бронхитъ), 353 (Чихотка), 405 (Воспал. мочево. пузыря), 413 (Отсутствіе регулы), 463 (Трипперъ), 475 (Полово. разстройства), 482 (Малокровіе и блѣдн. немочь), 493 (Золотуха), 497 (Туберкулезъ), 537, 569, 578, 580 (Болѣзни кожи), 600 (Катаракта)

Дѣленія : 3—6 и болѣе высокія; чѣмъ хроничнѣе и упорнѣе болѣзнь, тѣмъ высшее должно брать дѣленіе, низшія дѣленія предпочтительнѣе, вообще говоря, при подагрѣ, золотухѣ, эпилепсіи, и только, если результаты недостаточно успѣшныя, можно испытать и высшія.

Длительность дѣйствія—высшихъ дѣленій—около 7 недѣль, низшихъ—болѣе короткая.

Противосредства: *Ацид. нитр.*, *Камфора*, *Бромия*, *Нукс. вои.*, *Сулфур.*

Калькареа ацетика (уксуснокислая известь) примѣняется при безболѣзненномъ поносѣ, обильномъ, но не истощающемъ, подобно Фосфори ацид., но при наличности Калькереа - симптомовъ вообще. Дѣленія низшія.

Калькареа ацетика солюта Ганемана (*Calcarea acetica soluta Hanemann*) примѣняется при запорѣ у беременныхъ женщинъ, также у маленькихъ дѣтей. Дѣленія низшія (въ разводеніяхъ)

Калькареа іодата (*Calcarea iodata*) примѣняется особенно при увеличенныхъ миндалинныхъ железахъ и вообще опуханіи железъ, при гнойныхъ процессахъ въ костяхъ, при гнойной ушной течи и проч. у золотушныхъ дѣтей. Дѣленія низшія въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ.

Калькареа флуорика. (*Calcarea fluorica*, фтористая известь)—при состояніяхъ разслабленія эластическихъ тканей, при расширеніи венъ, при кровяныхъ опухоляхъ и т. п.; при затвердѣніяхъ железъ и плохомъ состояніи костей, особенно зубовъ, при костоѣдѣ вслѣдствіе сифилиса или злоупотребленія ртутью. Дѣленія. до 5-го—растиранія съ молочнымъ сахаромъ, болѣе высокія—въ разводеніяхъ. Примѣняются и тѣ и другія.

Калькареа фосфорика (*Calcarea phosphorica*, фосфорнокислая известь). До 5 дѣл.—растиранія съ молочнымъ сахаромъ, а далѣе (выше)—въ разводеніяхъ.

Примѣняется съ пользой при недостаточномъ питаніи, какъ укрѣпляющее средство послѣ острыхъ болѣзней и при боли въ такихъ мѣстахъ, гдѣ кости образуютъ швы и сращенія; способствуетъ образованію костной мозоли при переломахъ костей.—Далѣе, при медленномъ развитіи и быстрой порчѣ зубовъ; при страданіяхъ зубовъ у слабыхъ, тощихъ дѣтей, съ большой головой и съ долго незарастающими родничками; дѣти такія медленно научаются ходить. При поносѣ у рахитичныхъ дѣтей, особенно во время прорѣзыванія зубовъ; испражненія

зеленыя, слизистыя, съ неперевавленными остатками пищи, или водянистыя, дурнопахнуція, обиліе газовъ въ кишкахъ.

Калькареа карбон. и Калькареа фосфорика отличаются другъ отъ друга, вообще говоря, слѣдующими признаками.

Калькар. карбоника:

Животъ большой, выпуклый, напряженный.

Аппетитъ особенно на яйца.

Испражнения жидкія, бѣлыя, смѣшанныя съ свернувшимся молокомъ.

Передній родничекъ открытъ.

Волосы свѣтлыя, глаза синіе

Калькареа фосфорика:

Животъ впалый, съ вялыми стѣнками.

Аппетитъ особенно къ соленому и копченому.

Испражнения зеленыя, слизистыя, горячія съ обиліемъ газовъ.

Оба родничка открыты.

Волосы и глаза темныя.

Калькареа сульфурика (*Calcareea sulphurica*, Сѣрнокислая известь) примѣняется при процессахъ нагноенія, особенно въ миндалевидныхъ железахъ, въ роговой оболочкѣ, въ легкихъ и проч., когда уже нарывъ вскрылся. Умѣстна послѣ Силиціи, если послѣдняя недостаточна дѣйствуетъ, напримѣръ—при гноящихся свищахъ

№ 36. Каннабисъ индика и сатива.

Cannabis indica и *Cannabis sativa*. Конопля.

Оба эти рода конопли содержатъ одинаковыя основныя дѣятельныя вещества (алкалоиды), именно—Каннабинъ и еще нѣсколько подобныхъ, съ тою лишь разницей, что въ индійской коноплѣ содержитсяъ больше этихъ алкалоидовъ, особенно одного изъ нихъ—Каннабинона. На Востокъ изъ цвѣтовъ этого растенія добывается одуряющее вещество—Гашишъ

Эссенція и Тинктура приготавливаются изъ свѣжихъ цвѣточныхъ верхушекъ и верхнихъ лепестковъ.

Дѣйствіе этихъ средствъ въ общемъ одинаковое, съ тою лишь разницей, что Каннабисъ индика дѣйствуетъ сильнѣе на мозгъ, нежели Каннаб сатива.

Чаще всего Каннабисъ примѣняется при уретритѣ (воспаленіи мочеиспускательнаго канала) съ гноетеченіемъ и сильнымъ жженіемъ и болью при мочеиспусканіи. Головка члена темнокрасна и опухша Тянущая боль отъ почекъ по направленію къ мочевому пузырю вдоль мочеточниковъ. Отъ Кантарисъ въ этихъ случаяхъ Каннабисъ отличается тѣмъ, что при ней жженіе въ каналѣ преобладаетъ, при первой же имѣется больше мочерѣзъ.—Набуханіе сѣменнаго канатика и увеличеніе предстательной железы; усиленное половое влеченіе, частыя эрекціи, поллюціи У женщинъ усиленная похоть, слишкомъ раннія и обильныя регулы, наклонность къ выкидышамъ; катарръ влагалища съ острымъ, гнойнымъ выдѣленіемъ.

Далѣе, показана Каннабисъ (индика) при нервныхъ и мозговыхъ болѣзняхъ, при наличности такихъ симптомовъ, какъ: возбужденная фантазія, быстрая смѣна мыслей и представлений, экстазъ, приподнятость

настроения, съ необыкновенной легкостью въ движенияхъ и съ послѣдовательной усталостью, какъ бы ооченѣніемъ, особенно — верхнихъ конечностей и туловища, и съ ослабленіемъ памяти и соображенія. Приливы къ головѣ съ біеніемъ височныхъ артерій Легкія подергиванія различныхъ мышцъ. Колющія боли въ груди и спинѣ, или въ поясницѣ и крестцѣ, и именно всегда въ направленіи нервовъ; боль плечевого нервнаго сплетенія. Разслабленность и дрожаніе рукъ и ногъ съ пониженной чувствительностью.

Имѣются симптомы и со стороны другихъ органовъ, какъ-то:

Судорожное ощущеніе въ области сердца; сильное и неравномѣрное сердцебіеніе; малый, нитевидный, замедлительный пульсъ. Лихорадочное состояніе. Ощущеніе жара въ головѣ и холода въ прочихъ частяхъ тѣла.

Чиханіе, сильное кровотеченіе изъ носа; явленія, какъ при катаррѣ дыхательныхъ путей; кашель съ тягучей мокротой; затрудненное дыханіе, сильное стѣсненіе въ груди; облегченіе дыханія въ сидячемъ положеніи.

Разстройства пищеваренія, какъ при катаррѣ желудка и кишекъ. Болѣзненное набуханіе печени. Запоръ и вялость кишечника, или поносъ съ судорожнымъ сокращеніемъ сфинктера прямой кишки.

Каннабисъ имѣетъ вліяніе и на глаза. Симптомы какъ при золотушномъ воспаленіи ихъ съ помутнѣніемъ роговицы; помутнѣніе хрусталика.

Подобныя лѣкарства: *Глюциам.*, *Страмоній.*

Дѣленія: низкія до Θ при пораженіяхъ мочевого пузыря, болѣе высокія — при неврозахъ, въ которыхъ предпочтеніе надо отдавать Каннаб. инд

Противосредства: *Камфора*, *Беллад.*, растительныя кислоты.

№ 37. Кантарисъ.

Cantharis. Шпанская муха

Основное дѣятельное вещество — Кантаридинъ.

Тинктура готовится изъ высушенной и растертой всей мухи съ виннымъ спиртомъ.

Большія отравляющія дозы производятъ сильнѣйшее жженіе и судорожное стягиваніе въ глоткѣ, также въ желудкѣ и кишкахъ, слюноотеченіе, тоску, одышку, сильную жажду, сухость слизистой оболочки рта, рвоту, боль почек и мочевого пузыря, мочерѣзъ, кровавую мочу, болѣзненные эрекции, выкидышъ, бредъ, судороги, столбнякъ и смерть. Отъ менѣе сильныхъ дозъ: разнаго рода боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла, чувство разбитости и большая слабость во всѣхъ членахъ, кровотеченія; припадки судорогъ и бѣшенства; обморочное состояніе; водяночныя опуханія.

При испытаніи Кантарисъ для выясненія терапевтическихъ свойствъ его получаютъ слѣдующія состоянія: пониженная энергія мозговой дѣятельности, явленія безумія, сильная головная боль во лбу

и затылкѣ, со стученіемъ въ вискахъ, головокруженіе, судорожныя подергиванія лицевыхъ мышцъ. Явленія, какъ при воспаленіи глазъ, помутнѣніе зрѣнія. Колотье въ ушахъ съ ощущеніемъ, какъ-бы горячій паръ шелъ изъ нихъ. Кровотеченіе изъ носа. Боли вдоль позвоночника, невральгіи отдѣльныхъ нервовъ, судороги или расслабленность, дрожаніе членовъ. Сильное сердцебіеніе съ лихорадочнымъ состояніемъ. Явленія, какъ при остромъ катарѣ дыхательныхъ путей. Разстройство желудочно-кишечнаго аппарата, особенно же: судорога глотки при глотаніи жидкости, сильная жажда, отсутствіе аппетита, сильное жлєніе на низъ съ малымъ испражненіемъ или поносъ, какъ при дизентеріи, колющая боль въ заднемъ проходѣ. Явленія, какъ при воспаленіи почекъ и мочевого пузыря, особенно же мочерѣзъ (см. стр. 405, 459); продолжительныя и сильныя эрекціи, усиленная похоть, истеченіе сѣмени; явленія воспаленія члена и клѣтчатки мошонки. Зудъ и жженіе половыхъ частей у женщинъ; болѣзненныя обильныя регулы, потугообразныя боли; нимфоманія. Явленія воспаленія кожи (см. стр. 538).

Дѣленія: высшее при пораженіи мочевыхъ путей, и при неврозахъ; при бленорреѣ—3-ье или болѣе низкое; то-же и при пораженіи серозныхъ оболочекъ (плевритъ) и кожи (особенно при рождѣ, экземѣ и ожогѣ).

Длительность дѣйствія: нѣсколько недѣль.

Противосредства: *Камфора*, уксусъ, алкоголь.—Кофе ухудшаетъ.

№ 38. Карбо вегетабилисъ и анималисъ.

Carbo vegetabilis. Уголь растительный.

Carbo animalis. Уголь животный.

Оба эти рода угля настолько близки между собою по дѣйствію, что ихъ можно разсматривать какъ одно и тоже лѣкарство, подобно тому какъ Аурумъ—металлъ и Аурумъ муріатик. натронат. или какъ разные препараты Калькареа и т. п. Различія въ оттѣнкахъ дѣйствія вытекаютъ не изъ наблюденій надъ дѣйствіями при испытаніи на здоровыхъ людяхъ, а больше изъ наблюденій у постели больного: въ однихъ случаяхъ дѣйствуетъ лучше одинъ препаратъ, въ другихъ — другой, смотря по индивидуальности больного и по болѣзни. Одно во всякомъ случаѣ несомнѣнно: дѣйствіе на нервныя центры замѣтнѣе всего отъ высшихъ дѣленій (6—30), какъ и при Калькареа и т. п.

Для приготовленія растираній съ молочнымъ сахаромъ до 5 дѣленія (и дальше—разведеній) примѣняется прокаленный уголь березоваго или буковаго дерева или обугленная (въ желѣзномъ тиглѣ на умѣренномъ огнѣ) кожа рогатаго скота.

Патогенезъ (см. стр. 660) угля полученъ путемъ методическаго испытанія его на здоровыхъ людяхъ въ очень измелѣченномъ, атомизированномъ видѣ (въ высокыхъ дѣленіяхъ), причемъ оказалось, что вещество это очень сильно поражаетъ кровь и нервы и всѣ органы тѣла, нарушая всѣ процессы его жизнедѣятельности.

Особенно характерными симптомами Карбо являются: дурнопах-

нушія выдѣленія, гніеніе и жженіе, холодъ ногъ, особенно колѣнь венозная вялость до степени застоевъ, скопленіе газовъ въ кишкахъ. Кромѣ того, наблюдаются еще слѣдующія явленія: колющія, тянущія, жгучія и давящія боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла, подергиванія въ членахъ, разслабленіе суставныхъ связокъ съ наклонностію къ вывиханію, потрескиваніе и боли въ суставахъ съ вечерними ухудшеніями, чувство сильной усталости и разбитости, тяжесть въ членахъ съ засыпаніемъ ихъ при испытываемомъ ими давленіи; приливы крови, общее недомоганіе, ощущеніе пульсацій, припадки головокруженія, судорогъ. Поражается преимущественно лѣвая сторона тѣла. Ухудшеніе страданій по вечерамъ, отъ свѣжаго воздуха, отъ холода.— Сонливость днемъ съ частой позѣвотой; трудно засыпается ночью вслѣдствіе ощущенія жара; безпокойство во всемъ тѣлѣ, зудъ кожи: сонъ безпокойный съ раннимъ пробужденіемъ; устрашающія сновидѣнія, кошмары и проч.

Характеристика Карбо въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 66 (Малярія), 217 (Хронич. катар. желудка), 221 (Язвы желудка), 234 (Боль живота), 259 (Геморрой), 278 (Бол. печени), 314 (Хронич. катар. гортани), 328 (Хронич. бронхитъ), 490 (Ракъ), 504 (Сахарн. болѣзнь), 538 (Бол. кожи), 551 (Нарывы).

Карбо анимались предпочтительнѣе, нежели вегетаб., при пораженіи железъ, увеличеніи и затвердѣніи ихъ, особенно—грудной, окологрудушной, яичекъ и проч., также при затвердѣніяхъ паховыхъ и подмышечныхъ железъ сифилическаго (также—меркуріальнаго) происхожденія; затѣмъ животный уголь примѣняется при очень сильномъ пученіи живота, особенно при брюшномъ тифѣ.

Дѣленія: о нихъ сказано уже въ началѣ этой статьи, т. е. болѣе дѣйствительны вообще высшія дѣленія, низкія же предпочтительны при диспепсіи у старыхъ людей.

Длительность дѣйствія: смотря по степени измельченія (атомизації), отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ недѣль.

Противосредства *Камфора*, *Арсен.*, *Лазез.*, *Феррумъ*.

№ 39. Коффеа.

Coffea arabica. Кофе (арабскій). Зеленые кофейные бобы.

Основное дѣятельное вещество—Коффеинъ (то же, что Теинъ).—Тинктура—изъ бобовъ. Примѣняется еще въ видѣ лимоннокислаго коффеина—*Коффеинумъ цитрикумъ* (*Coffeinum citricum*).

Кофе вызываетъ явленія раздраженія и возбужденія въ нервномозговой системѣ. Оно вліяетъ и на обмѣнъ веществъ, ограничивая выдѣленіе плотныхъ составныхъ частей мочи черезъ почки, за исключеніемъ лишь фосфорнокислыхъ солей; оно уменьшаетъ также выдѣленіе угольной кислоты и воды черезъ легкія; оно препятствуетъ также правильному обновленію кровяныхъ тѣлецъ.

Въ случаяхъ отравленія большимъ количествомъ кофе, какъ напиткомъ, наблюдались слѣдующія явленія: рвота, головокруженіе, жаръ,

и потъ, головная боль, судорожное стягиваніе въ горлѣ, хрипящее дыханіе, потеря способности рѣчи, бессонница, задержаніе мочи, потеря аппетита, боль желудка. Далѣе, особенно послѣ большихъ дозъ Кофеина: сильное возбужденіе сосудистой и нервной системы, сердцебіеніе, учащенный, неправильный и часто выпадающій пульсъ, стѣсненіе въ груди, жужжаніе въ ушахъ, видѣніе искръ, эрекции, дрожаніе, безпрестанное напираніе на мочеотдѣленіе, возбужденная фантазія съ послѣдовательной спутанностью мыслей, видѣнія, бредъ и на послѣдокъ глубокой сонъ.

Характеристика Кофеа въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзненныхъ состояній: Головная боль (мигрень), какъ бы отъ гвоздя, вбиваемаго въ черепъ, ухудшающаяся на вольномъ воздухѣ.—Зубная боль, временно значительно облегчается при держаніи холодной воды во рту.—Бессонница сопровождается обостреніемъ всѣхъ чувствъ, особенно слуха, также безпрестаннымъ теченіемъ мыслей, создаваніемъ плановъ и т. п.; на слѣдующій день больной испытываетъ внутреннее дрожаніе; бессонница также вслѣдствіе чрезмѣрной чувствительности кожи.

Кофеа примѣняется въ подходящихъ случаяхъ при нервныхъ боляхъ у неврастеничныхъ, истеричныхъ субъектовъ, при нервномъ сердцебіеніи, нервной диспепсiи, при кровотеченіи изъ носа, изъ матки, при маточной невралгiи и т. п.

Дѣленія. низкія.

Длительность дѣйствія: отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ дней, смотря по величинѣ и частотѣ пріемовъ.

Противосредства: *Хамомилла, Игнация, Нуксъ vom., Аконитъ, Опій.*

№ 40. Купрумъ и его препараты.

1. *Cuprum (metallicum)*, Купрумъ. Мѣдь
2. *Cuprum aceticum*, Купрумъ ацетикумъ, Уксуснокислая мѣдь.
3. *Cuprum arsenicosum*, Купрумъ арсеникозумъ, Мышьяковистая мѣдь.
4. *Cuprum sulphuricum*, Купрумъ сульфурикъ, Сѣрнокислая мѣдь, Мѣдн. купоросъ, Синій камень.

Для внутренняго употребленія примѣняется въ гомеопатiи лишь первые 3 препарата, 4-й же лишь для наружнаго. Дѣйствіе всѣхъ 3 препаратовъ въ общемъ одинаковое и обуславливается основой ихъ — мѣдью. Относительно различій между ними можно сказать то же, что сказано по поводу Карбо вегетабил. и анималисъ подъ № 38.

Купрумъ примѣняется до 5 дѣленія въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ, а далѣе — въ разведеніяхъ, остальные же растворимы и могутъ примѣняться въ разведеніяхъ уже и низшихъ дѣленій.

При хроническомъ отравленіи мѣдью являются слѣдующіе симптомы: металлическій вкусъ, зеленоватый цвѣтъ волосъ, расстройствъ пищеваренія, тошнота и рвота, колика и поносъ, судороги, параличи, послабляющая лихорадка; десны оттягиваются отъ зубовъ и имѣютъ пурпурно-красную кайму.

При острымъ отравленіи солями мѣди являются уже очень скоро:

головная боль, тошнота, большой упадокъ силъ, дрожь, малый и неправильный пульсъ, рвота, жестокая колика съ поносомъ или запоромъ, бредъ и судороги, параличи.

Съ лѣчебной цѣлью, въ гомеопатическихъ дозахъ, Купрумъ при-мѣняется въ подходящихъ случаяхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней. Въ отношеніи нѣкоторыхъ изъ таковыхъ приведена характеристика на слѣдующихъ страницахъ: 126 (Судороги), 145 (Параличи), 235 (Боль живота), 333 (Коклюшъ), 538 (Болѣзни кожи) Кромѣ того Купрумъ при-мѣняется, какъ одно изъ главнѣйшихъ лѣкарствъ, при поносѣ съ рвзью въ животѣ и болѣзненнымъ жиленіемъ, при холеринѣ, холерѣ (при судорогахъ икръ съ сильной жаждой), при которой очень цѣлесообразно давать Купрумъ арсеникозумъ $\times 4$ (въ порошокъ); далѣе, при душевныхъ болѣзняхъ, сопровождающихся бредовыми идеями и судорожными состояніями, при падучей (особенно когда судороги начинаются съ пальцевъ конечностей), при пляскѣ св. Вита, при очень сильной слабости ногъ, при дрожаніи, при общей нервной слабости и нервныхъ боляхъ, особенно въ животѣ (Купрумъ арсеникозумъ); при остромъ хроническомъ ревматизмѣ и проч.

Дѣленія: *Купрумъ метал.* слѣдуетъ брать всегда въ дѣленіи не ниже 3-го сотеннаго, но часто онъ лучше дѣйствуетъ въ болѣе высо-кихъ дѣленіяхъ; прочіе же препараты (Купрумъ ацетик. и Купрумъ арсеникоз.)—въ низшихъ.

Длительность дѣйствія: смотря по частотѣ приемовъ, отъ нѣсколь-кихъ дней до двухъ недѣль.

Противосредства: *Беллад.*, *Нуксѣ вом.*, *Коккул.*, *Хина*, *Дулькам.*, *Ипек. Сульф.*, *Кальк. карб.*

О примѣненіи мѣдныхъ пластинокъ для предупрежденія заболѣ-ванія холерой см. стр. 85

41. Ликоподій.

Lycopodium semen. Плауновое сѣмя.

Тинктура готовится изъ сѣмянъ, растертыхъ въ тѣстообраз-ную массу съ 5 ч.ч. 90% алкоголя. Порошковая (съ молочнымъ саха-ромъ) расиранія, если они долго сохраняются, портятся, такъ какъ освобожденное изъ сѣмянъ жирное масло горкнеть.

Основное дѣятельное начало—Полленинъ.

Страданія, которымъ Ликоподій соотвѣтствуетъ, происходятъ и медленно развиваются главнымъ образомъ изъ ослабленной дѣятель-ности пищеварительныхъ органовъ, особенно—печени, также изъ зна-чительныхъ разстройствъ мочевыхъ органовъ.

Характеристичны для Ликоподія слѣдующія особенности: ухуд-шеніе страданій между 4 и 8 часами пополудни; большая чувстви-тельность къ холоду; страданія идутъ справа влѣво; дурнопахнущія выдѣ-ленія, и густой, красный осадокъ въ мочѣ.

Характеристика Ликоподія въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 216 (Хронич. катар. желудка),

234 (Боль живота), 259 (Геморрой), 278 (Хрон. болѣзни печени), 327 (Хронич. бронхитъ), 354 (Чахотка легкихъ), 405 (Воспал мочеv. пузыря), 539, 569 (Бол. кожи), 600 (Катаракта).

Душевные симптомы Ликоподія: слабость и угнетенность духа, боязнъ одиночества; недовольство и нетерпимость, раздражительность, вспыльчивость, или тоскливость, грустное настроеніе, нелюдимость, пугливость, плаксивость; слабая память, больной часто заговаривается.

Сонъ неосвѣжающій, беспокойный ночью и, наоборотъ, частая позѣвота днемъ съ непреодолимой потребностью поспать послѣ обѣда, позднее вечеромъ засыпаніе; больной болтаетъ и смѣется во снѣ, или его душатъ кошмары; частая перемѣна положенія во время сна ночью, съ сердцебіеніемъ, волненіемъ крови, тянущими болями въ членахъ и т. п.

Еще слѣдующіе симптомы, характеризующіе Ликоподій.

Залеганіе носа, вынуждающее больного день и ночь дышать ртомъ; истеченіе изъ носа желтозеленой слизи; вѣерообразное движеніе носовыхъ крыльевъ.

Увеличенныя миндалевидныя железы, покрытыя маленькими изъязвленіями; поражена чаще правая железа (при *Лихезисъ*—лѣвая).

Жженіе, какъ отъ горячихъ угольевъ, между лопатками.

Импотенція съ холодомъ и разслабленіемъ половыхъ частей при усиленной похотливости, сперматоррея, поллюціи; боль въ промежности при сидѣніи; подергивающія и колющія боли въ головкѣ члена, бородавчатыя разрашенія на ней.

У женщины: давящія и тянущія ощущенія внизу живота недѣли двѣ послѣ регуль; жженіе во влагалищѣ во время и послѣ совокупленія; зудъ половыхъ частей; бѣли—цвѣта мясного настоя или молочнаго.

Дѣленія: 3—6 и болѣе высокія, которыя часто болѣе дѣйствительны, нежели низкія.

Длительность дѣйствія: послѣ частыхъ пріемовъ высшихъ дѣленій отъ нѣсколькихъ дней до 6 недѣль.

Противосредства: *Лихезисъ*, *Камфора*, *Коффеа* Съ своей стороны Ликопод.—средство противъ Меркурія.

№ 42. Меркурій биодатъ см. подъ № 12.

№ 43. Меркурій коррозивъ см. подъ № 12.

№ 44. Опій.

Opium, *Papaver somniferum* Сонный макъ.

Опій есть высушенный сокъ изъ незрѣлыхъ маковыхъ головокъ. Тинктура готовится изъ этого препарата съ 5 ч.ч. алкоголя.

Изъ основныхъ дѣятельныхъ началъ опія главныя суть: морфій (солянокислый и сѣрнокислый) и Кодеинъ, также Апоморфинъ.

Симптомы отравленія опіемъ (или морфіемъ) приведены на стр. 613 въ отдѣлѣ „Отравленій“.

Съ лѣчебной цѣлью, въ малыхъ, гомеопатическихъ дозахъ опій употребляется въ такихъ болѣзненныхъ состояніяхъ, которыя являются вслѣдствіе такихъ аффектовъ, какъ боязнъ, испугъ, имѣющихъ парализующее вліяніе на нервную дѣятельность, также при другихъ подобныхъ состояніяхъ, являющихся вслѣдствіе злоупотребленія спиртными напитками (состоянія угнетенія и расслабленія). Далѣе, опій умѣстень, противъ послѣдствій хроническаго отравленія нѣкоторыми ядами, особенно — свинцомъ или ртутью. Наконецъ, опій одно изъ главныхъ средствъ въ цѣломъ рядѣ опредѣленныхъ болѣзней при наличности подходящихъ симптомовъ.

Характеристика опія въ отношеніи нѣкоторыхъ изъ такихъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 108 (Мозговой ударъ), 127 (Судороги), 162 (Душевно. болѣзни), 190 (Бол. зубовъ), 230 (Запоръ), 235 (Боль живота), 244 (Катар. толст. кишки), 328 (Хронич. бронхитъ).

Кодеинъ 1 примѣняется для устраненія мучительнаго шекочущаго кашля, особенно у чахоточныхъ.

Апоморфинъ X3-- при рвотѣ, являющейся рефлексомъ, исходящимъ отъ мозга, при морской болѣзни, также при рвотѣ у беременныхъ.

Морфій для успокоенія болѣе примѣняется въ гомеопатіи очень рѣдко, такъ какъ послѣдняя обладаетъ для такой цѣли безвредными специфическими лѣкарствами, дѣлающими ненужнымъ прибѣганіе къ морфію, хотя, болеутоляющее свойство морфія въ сущности не противорѣчитъ гомеопатическому закону подобія; извѣстно, именно, что какъ опій, такъ и морфій, въ числѣ прочихъ своихъ симптомовъ, вызываютъ, при извѣстныхъ условіяхъ, боли въ различныхъ областяхъ нервной системы. Но, принимая во вниманіе вредность этихъ средствъ при продолжительномъ ихъ примѣненіи, притомъ же и кратковременность (паллиативность) ихъ болеутоляющаго дѣйствія, гомеопаты лишь крайне рѣдко прибѣгаютъ къ нимъ для указанной цѣли, когда, именно, обычные специфическія средства оказываются недостаточными, и не начинаютъ ихъ, какъ часто аллопаты дѣлаютъ, при всякомъ сколько нибудь сильномъ, раздражительномъ кашлѣ или при всякой болѣе или менѣе сильной боли.

Въ этомъ отношеніи современный врачъ съ правацовскимъ шприцемъ въ карманѣ напоминаетъ врача мольтерова, котораго нельзя себѣ представить безъ клистирнаго шприца, съ той разницей, что этотъ шприцъ несравненно невиннѣе перваго.

Дѣленія: *Опій*—X3—3; часто, однако, лучше дѣйствуютъ болѣе высокія дѣленія. Морфій можетъ приниматься только по прописи врача.

№ 45. Сепія.

Sepia. Каракатица.

Для приготовленія гомеопатическаго препарата Сепіи, свѣжій сокъ, содержащее мѣшка моллюски каракатицы, растирается съ 9 частями молочнаго сахара или растворяется въ алкоголь.

Къ симптомамъ Сепіи относятся;

Чрезмѣрная чувствительность къ внѣшнимъ вліяніямъ, боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла, предрасположеніе къ надсадѣ, тѣлесная и душевная вялость, тяжесть во всѣхъ членахъ, ощущеніе слабости при малѣйшемъ напряженіи; обморочныя состоянія; волненіе крови и приливы къ головѣ и груди; застой крови; нервныя и судорожныя состоянія, ощущеніе холода въ спинѣ или онѣмѣнія въ разныхъ мѣстахъ, то являющееся, то исчезающее головокруженіе и сердцебіеніе при хожденіи на вольномъ воздухѣ. Ухудшеніе всѣхъ страданій по вечерамъ и ночью; улучшеніе при спокойномъ лежаніи или же очень быстромъ движеніи, боли часто улучшаются отъ сухой теплоты.

Сонливость днемъ послѣ хорошаго ночного сна; бываетъ также, что сонъ ночью безпокойный или онъ вовсе отсутствуетъ, или прерывается часто то отъ сердцебіенія, то отъ кашля, то отъ позывовъ на мочеотдѣленіе.

Сепія вліяетъ на всѣ органы тѣла, больше же всего на женскіе половые органы. Поэтому она и вообще подходит особенно для особъ женскаго пола, притомъ преимущественно въ хроническихъ болѣзняхъ. Въ такихъ случаяхъ можно часто слышать жалобу на ощущеніе напирания книзу въ животѣ. Сепія соотвѣтствуетъ часто также въ болѣзняхъ у людей слабаго сложенія и обладающихъ нѣжной, чувствительной кожей.

Характеристика Сепіи въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 100 (Головная боль), 157 (Неврозы), 215 (Хрон. катар. желудка), 230 (Запоръ), 268—278 (Бол. печени), 300 (Хрон. катар. носа), 439 (Разстройства пищеваренія у беремен.), 540 (Бол. кожи).

Дѣленія: 3—6. Низкія дѣленія предпочтительны при болѣзняхъ матки, кожи и горла; при блѣдной немочи необходимо бываетъ даже X 1.

Длительность дѣйствія: при испытаніяхъ на здоровыхъ 6—8 недѣль.

Противосредства: *Аконитъ*, *Тартъ эмет.*, винный уксусъ; съ своей стороны Сепія — средство противъ *Кальк. фосфор.*, *Хина*, *Сарсапар.*, *Сульфуръ*.

№ 46. Спигелія.

Spigelia anthelmintica. Глистница.

Тинктура готовится изъ высушеннаго корня. Основные дѣятельныя вещества: Спигелинъ и эфирное масло.

Спигелія дѣйствуетъ главнымъ образомъ на мышцы глаза и сердца и подходит особенно для малокровныхъ, ослабленныхъ субъектовъ съ ревматическимъ предрасположеніемъ, и для золотушныхъ дѣтей, страдающихъ глистами.

Спигелія въ подходящихъ случаяхъ оказывается полезной при разнаго рода острыхъ и хроническихъ болѣзненныхъ состояніяхъ, сопровождающихся такими симптомами, какъ: головокруженіе съ умственной вялостью, ослабленіе памяти и быстро мѣняющееся настроеніе

головныя боли, періодическія и вызываемыя особенно тѣлесными движеніями ходьбой; слабость и дрожаніе членовъ, мышечныя подергиванія и общая чрезмѣрная чувствительность, безсонница съ игрой фантазіи.—Страданія глазъ—подагрическія и ревматическія воспаленія сопровождаются колющими и тянущими болями съ наружнаго угла глаза по направленію къ внутреннему, или напряженной болью въ глазномъ яблокѣ, особенно при движеніи, слезоточеніемъ, труднымъ различеніемъ предметовъ вдали, тяжестью или спазмомъ вѣкъ.—Шумъ въ ушахъ и тугость слуха;—нервныя боли, подагра, ревматизмъ при симптомахъ пораженія сердца (стр. 373).—Глисты съ такими явленіями, какъ косоглазіе, блѣдность лица съ подергиваніями, синіе круги вокругъ глазъ, слабость и тошнота съ коликами въ области пупка.

Дѣленія: низкія и даже Θ чаще всего подходятъ для болѣзней сердца; то или другое дѣленіе, смотря по воспримчивости больного при грудной жабѣ, при невралгіяхъ, равно какъ при воспаленіи радужной оболочки глаза высокія дѣленія (30-е) даютъ иной разъ лучшіе результаты, нежели болѣе низкія.

Длительность дѣйствія: при испытаніяхъ на здоровыхъ людяхъ до 4 недѣль; дѣйствіе одной сильной дозы повышается въ теченіе 7—9 дней.

Противосредства: *Камфора* въ повторныхъ частныхъ пріемахъ; съ своей стороны Спигелія—противосредство Меркурія.

№ 47. Фосфори acid. или Ацид. фосфорик.

Phosphori acidum или *Acidum phosphoricum*. Фосфорная кислота.

Первое десятичное дѣленіе есть водный растворъ фосфорной кислоты, дальнѣйшія же дѣленія готовятся на спирту.

Фосфорная кислота и Фосфоръ отличаются между собою развѣ лишь въ предѣлахъ отъ $\times 1$ до $\times 3$ дѣленія, въ дальнѣйшихъ же и особенно въ высокихъ дѣленіяхъ разницы въ дѣйствіяхъ того и другого препарата не наблюдаются вовсе. Поэтому, сказанное о дѣйствіи Фосфора (№ 21) относится въ значительной мѣрѣ и къ Фосфори acid. Но, въ виду важности этого средства для практики, здѣсь приводятся еще и отдѣльно главные симптомы его, а именно:

Длительный приливъ крови къ головѣ съ трудностію соображенія, апатія; необычайная тѣлесная слабость; безпокойный сонъ, изнурительные поты; невыносливость свѣта и слезотеченіе; скарлатиноподобныя и гнойниковыя сыпи; кровоточивость; опуханіе и длительное гноеніе железъ; тифозныя состоянія; страданія дыхательныхъ органовъ съ наклонностію къ кровохарканію; лученіе живота съ урчаніемъ и переливаніемъ въ немъ, поносныя и свѣтлоокрашенныя испражненія; геморройныя явленія (стр. 260) съ очень болѣзненными набухшими и кровоточащими шишками и съ болью въ прямой кишкѣ; явленія хроническаго катарра мочевыхъ путей (хронич. триппера), непроизвольное истеченіе мочи при ходьбѣ, кашлѣ и чиханіи, частые позывы на мочу

съ обильнымъ выдѣленіемъ ея (см. Сахарная болѣзнь—стр. 504); половая слабость и истеченіе сѣмени при слабомъ членѣ; общая нервная слабость, какая является вслѣдствіе половыхъ излишествъ, длинныхъ переходовъ, заботъ, горя и вообще угнетающихъ обстоятельствъ всякаго рода; явленія меланхоліи и наклонность къ плачу; больному слышится какъ бы звонъ колокола.

Дѣленія: преимущественно низкія: въ нервныхъ и душевныхъ болѣзняхъ—болѣе высокія.

Длительность дѣйствія: повторныхъ приемовъ, особенно же вышихъ дѣленій, нѣсколько недѣль.

Противосредства: *Камфора, Нуксъ вом., Коффеа, Арника, Ферруж., Коккулусъ.*

№ 48. Эвфразія или Евфразія.

Euphrasia (officinalis). Очанка.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

Эвфразія дѣйствуетъ преимущественно на слизистыя оболочки главнымъ образомъ—глазъ и верхнихъ дыхательныхъ путей.

Глазные симптомы: вялость вѣкъ. или судорожное смыканіе и подергиваніе ихъ, ощущеніе давленія и кусанія въ глазахъ съ слезотеченіемъ, явленія катарра глазъ, помутнѣніе и слабость зрѣнія.

Симптомы со стороны дыхательныхъ органовъ: текучій насморкъ съ чиханіемъ; явленія, какъ при катаррѣ дыхательнаго горла съ трудновыдѣляемой мокротой, особенно днемъ, и съ стѣсненіемъ въ груди.

Дополнительными показаніями для Эвфразіи могутъ служить еще другіе ея симптомы: летучія, зудящія колотья, то тутъ, то тамъ, въ кожѣ, ломота въ локтѣ и кисти, боли—давящія въ длинныхъ костяхъ конечностей и судорожныя въ мышцахъ; сонливость съ позѣвотой днемъ и частое пробужденіе ночью; ипохондрическое и раздражительное настроеніе съ неохотой ко всякой работѣ; частое познабливаніе, ночное потѣніе.—Тяжесть головы; колотье въ вискахъ, головная боль съ ощущеніемъ жара.—Боль въ ушномъ каналѣ.—Затрудненная рѣчь, заиканіе (подобно Дулькамарѣ).—Кровоточивость десенъ, расстройство пищеваренія, боли въ животѣ, икота, твердыя испражненія.—Частое отхожденіе свѣтлой мочи; зудъ крайней плоти, тонкія покалыванія въ локтѣ члена, судорожно притянутыя яички.

Дѣленія: внутрь—низкія. Наружное примѣненіе Θ см. на стр. 44.

Длительность дѣйствія: смотря по величинѣ и частотѣ приемовъ—отъ 2 дней до нѣсколькихъ недѣль.

Противосредства: *Белл., Камфора, Пульсат.*

Подобныя средства: *Аммуъ цепа, Аписъ, Ар. нитр., Арсен., Гепаръ сульф., Камъ бизром., Камъ іодит., Меркур. и Пульсат.*

№ 49. Аммоніумъ карбоникумъ.

Ammonium carbonicum. Углекислый аммоній или амміакъ.

Примѣняется въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ и въ разведеніяхъ.

Дѣйствуетъ на кровь и нервную систему и черезъ нихъ на органы тѣла. Продолжительное употребленіе крупныхъ дозъ этого вещества вызываетъ у человѣка кровотеченія изъ десенъ, изъ носа и задняго прохода, выпаденіе зубовъ, исхуданіе, гнойничковыя сыпи, выдѣленіе вонючей и сильноокрашенной мочи, изнурительную лихорадку, упадокъ силъ. Большія количества вызываютъ у животныхъ воспаленіе желудка и тонкихъ кишокъ, усиленное сердцебіеніе, одышку, судороги и смерть. Кровь оказывалась въ такихъ случаяхъ темной, со слабой щелочной реакціей и неспособностію къ свертыванію.

Характерныя особенности этого средства; поражается преимущественно правая сторона тѣла, страданія ухудшаются вечеромъ, ночью или рано утромъ, также отъ свѣжаго воздуха; необычайная слабость ночные припадки возбужденія, волненія крови со страхомъ смерти и холоднымъ пѣтомъ. Настроеніе духа :придавленное, плаксивое, безпокойное и боязливое; склонность къ гнѣву.

Подходить главнымъ образомъ въ острыхъ, лихорадочныхъ болѣзняхъ у больныхъ съ необычайно раздражимой нервной системой и слабымъ сложеніемъ. Характеристика для нѣкоторыхъ другихъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 139 (Астма), 416 (Менструальная колика), 535 (Болѣзни кожи), 600 (Катаракта).

Дѣленія преимущественно низкія.

Длительность дѣйствія, смотря по величинѣ и частотѣ пріемовъ отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ дней и недѣль.

Противосредства: *Артика, Камфора, Гепаръ сульф., Латезис.*

Въ цѣляхъ наглядности, здѣсь приводятся еще другіе препараты аммонія, а именно: *Аммон. муратик.* (№ 129), *Аммон. фосфорик.* (№ 130) *Аммон. бромат.* (№ 104), *Аммон. каустик.* и *Аммон. годат.*

Аммоніумъ муріатикумъ (*Ammonium muraticum*, нашатырь).

Растиранія съ молочнымъ сахаромъ до 5 дѣленія, а затѣмъ разведенія. Дѣйствуетъ на кровь и нервную систему въ общемъ такъ же, какъ Аммон. карбоник., но въ гораздо менѣе сильной степени. Для практики имѣетъ значеніе дѣйствіе Аммон. муріат. на слизистыя оболочки, выражающееся въ явленіяхъ катарра таковыхъ, особенно носа, гортани и дыхательнаго горла, въ такихъ, именно, какъ щекотаніе и жженіе въ пораженныхъ частяхъ; жестокой насморкъ; охриплость; сухой кашель съ колотьемъ въ груди, съ першеніемъ и выхаркиваніемъ слизистыхъ мокротъ, тяжесть и чувство стѣсненія въ груди, учащенное и короткое дыханіе, особенно ночью.

Показанъ и при катаррахъ другихъ органовъ, когда выдѣляются необыкновенно большія количества слизи, у больныхъ раздражительныхъ и плаксивыхъ и съ очень слабыми мышцами; страданія ухудшаются ночью.

Дѣленія: $\times 3$ — 3 и болѣе высокія.

Противосредства. *Хина, Феррумъ.*

Подобныя средства: *Пульсат, Антимон круд.*

Аммоніумъ фосфорикумъ (Ammon. phosphoric.). Растиранія съ молочнымъ сахаромъ и разведенія. Показанъ при ломотѣ съ узловатыми утолщеніями и затвердѣніями въ суставахъ. Дѣленія: низкія.

Аммоніумъ броматумъ (Ammon. bromat.). Растиранія съ молочнымъ сахаромъ или разведенія. Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистыя оболочки, головной и спинной мозгъ. Страданія облегчаются отъ тепла и теплыхъ напитковъ; ухудшаются въ холодномъ воздухѣ. Нѣкоторые симптомы проявляются при пробужденіи около 3 часовъ ночи. Средство это полезно бываетъ при остромъ и хроническомъ катаррѣ зѣва и гортани, при хриплости и щекочущемъ кашлѣ особъ, которымъ приходится много и громко говорить, при крупѣ; далѣе, при невралгическихъ головныхъ боляхъ съ ощущеніемъ какъ бы повязки вокругъ головы, также при боляхъ въ груди и конечностяхъ сопровождающихся подобнымъ ощущеніемъ.—Дѣленія: $\times 1$ — $\times 3$

Подобныя средства: *Бромъ, Аргент. нитр., Кали бихромик.*

Аммоніумъ іодатумъ (Ammon. iodat.). Растиранія съ молочнымъ сахаромъ. Дѣленія: $\times 3$ — $\times 4$. Дѣйствуетъ какъ *Іодъ* (см. № 34), но сильнѣе. Показанъ при катаррахъ дыхательныхъ органовъ (въ перемежку съ Тарт. эмет) съ трудноотдѣляющейся мокротой. Препарат этотъ легко портится, поэтому надо заботиться о томъ, чтобы онъ былъ свѣжеприготовленный.

Аммоніумъ каустикумъ (Ammon. caustic.). Растворъ этого препарата содержитъ около 10% послѣдняго, равняется поэтому 1-му десятичному дѣленію и носитъ названіе „Нашатырный спиртъ“. Вдвое болѣе крѣпкій растворъ извѣстенъ подъ названіемъ „спиртъ Дзондіа“ (Liquor Ammonii caustici Dzondii) — Аммон. кауст. потенцируется по обычнымъ правиламъ и показано при безголовьи съ ощущеніемъ жгучей жесткости въ горлѣ, при хроническомъ насморкѣ, при ревматическихъ страданіяхъ (см. стр. 520).—Наружно примѣняется противъ послѣдствій укусовъ насѣкомыхъ, также для нюханія при дурнотѣ и обморочномъ состояніи, равно какъ—въ слабомъ растворѣ при насморкѣ.

№ 50. Анакардій.

Anacardium orientale. Индѣйскій бобъ.

Приготавливаются какъ тинктура, такъ и растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

Дѣйствуетъ угнетающимъ образомъ особенно на нервную систему, вызывая симптомы мозговой и общей нервной слабости (см стр. 154), также на кожу, вызывая явленія воспаленія и сыпь пузырчатую и гнойничковую (См. при „Болъ кожи“ стр. 535).

Характерной для Анакардіа является периодичность страданій и болей, причемъ, прекращаясь на 1—2 дня, они возвращаются вновь, продолжаясь столько же времени. Нервная слабость выражается общей вялостью и сонливостью въ теченіе дня, особенно же послѣ обѣда. Необычайная чувствительность къ холоду и сквозняку. Сонъ очень без-

покойный, съ частыми пробужденіями отъ кошмаровъ, или же онъ очень крѣпкій, тяжелый. Душевное настроеніе тоскливое и грустное; воля какъ бы раздвоена; большая раздражительность и неопределимая страсть къ ругани и клятвѣ. Ощущеніе какъ бы клина въ разныхъ мѣстахъ тѣла, наприм. въ головѣ, въ животѣ, въ прямой кишкѣ, въ заднемъ проходѣ и т. д.—Разстройства также со стороны органовъ пищеваренія (вялость), дыханія (ночной судорожный кашель), кровообращенія (усиленное сердцебіеніе, приливы), половыхъ (усиленная страсть съ ночными поллюціями; у женщинъ—бѣли съ сильнымъ зудомъ наружныхъ половыхъ частей).

Примѣненіе Анакардія въ отдѣльныхъ болѣзняхъ видно изъ перечисленныхъ симптомовъ.

Дѣленія : $\times 3$, но также и болѣе высокія.

Длительность дѣйствія: смотря по величинѣ и частотѣ пріемовъ, отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ дней.

Противосредства; *Камфора, Коффеа.*

Подобныя средства: въ отношеніи нервномозговомъ—*Фосф. ацид.* и *Цинк.*, въ отношеніи кожи—*Русь, Аписъ, Кротонъ, Мезереумъ, Петролеумъ.*

№ 51. Аргентумъ нитрикумъ.

Argentum nitricum. Азотнокислое серебро, Ляписъ.

Гомеопатическія дѣленія (растиранія съ молочн сахаромъ и разведенія) дѣлаются изъ кристалловъ азотнокислаго серебра; ляписъ же, употребляемый лишь наружно, есть смѣсь этого средства съ хлорнымъ серебромъ или же съ Хали нитрик. Разведенія Аргент. нитр. до 4-го дѣленія дѣлаются не спиртными, а водными.

При остромъ отравленіи (черезъ ротъ) азотнокислымъ серебромъ выступаютъ на первомъ планѣ ѣдкія свойства этого вещества, которое съ живою тканью образуютъ плотные, сухіе, не очень глубоко идущіе струпья бѣловатаго цвѣта, темнѣющаго скоро отъ дневного свѣта. При хроническомъ отравленіи продолжительными пріемами крупныхъ дозъ развивается такъ наз. Аргирія, потемнѣніе слизистыхъ оболочекъ и кожи, также ногтей, отъ образующихся подъ этими тканями нерастворимыхъ органическихъ соединеній серебра, темнѣющихъ подъ вліяніемъ свѣта. Вмѣстѣ съ тѣмъ развиваются явленія разслабленія (атоніи) и воспаленія слизистыхъ оболочекъ, также симптомы пораженія нервномозговой системы, какъ-то: головная боль, помраченіе сознанія, тяжесть членовъ, судороги, параличи и потеря чувствительности, а въ болѣе трудныхъ случаяхъ и разрушительные процессы въ легкихъ, почкахъ, печени и т. д.

Въ малыхъ, гомеопатическихъ дозахъ Аргент. нитрик. примѣняется преимущественно въ хроническихъ заболѣваніяхъ. Характеристика его въ отношеніи нѣкоторыхъ изъ таковыхъ приведена на слѣдующихъ страницахъ: 145 (Параличъ), 154 (Неврозы), 200 (Хрон. катар. зѣва), 221 (Язва желудка), 300 (Хронич. катар. носа), 462 (Хронич. трипперъ), 489 (Ракъ).

Головные симптомы Арг. нитр.: односторонняя сверлящая головная боль, облегчающаяся от тугй повязки вокруг головы или от тугоприлегающей шляпы; боль сильнѣе надъ лѣвымъ лобнымъ бугромъ; ощущение распиранія въ черепныхъ костяхъ.

Желудочно-кишечные симптомы: большая сухость во рту, изъязвленія слизистой оболочки, слизисто-бѣлый налетъ на языкѣ, краснота десенъ и зѣва, искрошенность зубовъ; отсутствіе аппетита, изжога, частая пустая отрыжка; боль подъ ложечкой, тошнота, рвота слизистыми массаами, съ поносомъ; вздутіе живота отъ газовъ, съ коликой. Поносы смѣняются часто запорами, съ испражненіемъ твердыхъ и сухихъ массъ.

Дѣленія: преимущественно низкія.

Длительность дѣйствія: малыхъ дозъ—24 часа, большіхъ до 8 дней.

Противосредства: *Камфора*, *Инок.*, уксусъ. Какъ противоядіе противъ отравленія: растворъ поваренной соли и пр. (см. ч. II, Отдѣлъ 14).

№ 52. Арсеникъ іодатъ см. подъ № 4.

№ 53. Ацид. бензоик. или Бензойе ацид.

Acidum benzoicum или *Benzoes acidum*. Бензойная кислота.

Приготавливаются спиртные растворы, также растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

Примѣняется въ острыхъ и хроническихъ случаяхъ ломотной болѣзни и ревматизма (см. стр. 518), а также при болѣзняхъ мочевыхъ органовъ, если моча больного мутная, желтая или ярк- или темно-красная, если она притомъ имѣетъ щелочную реакцію, образуетъ кирпичнаго цвѣта осадокъ и обладаетъ своеобразно-противнымъ запахомъ.

Соотвѣтственно своимъ симптомамъ Ацид. бенз. показанъ и при катаррѣ дыхательнаго горла съ кашлемъ сухимъ и съ одышкой, при воспаленіи легкихъ (въ позднѣйшей стадіи), при сердцебіеніи и стѣсненіи въ груди, при хроническомъ трипперѣ, при разстройствѣ пищеваренія.

Характерно для этого средства, что направленіе многихъ его симптомовъ—сверху книзу и справа влѣво; боли являются періодически, больше—въ покоѣ, и переходятъ часто съ мѣста на мѣсто.

Дѣленія : $\times 1$ — $\times 3$ — 6. — Длительность дѣйствія: до 8 дней и больше.

№ 54. Ацид. муріатик. или Муріатисъ ацидумъ.

Acidum muriaticum или *Muriatis acidum*. Соляная кислота.

1 часть чистой соляной кислоты съ 2 чч. дистиллированной воды составляютъ растворъ, который считается $\times 1$ дѣленіемъ; изъ этого дальнѣйшія дѣленія приготавливаются со спиртомъ.

Ацид. муріат. вліяєть глубоко на нервную систему и на составъ крови, также на кожу и на пищеварительный аппаратъ.

Главныя симптомы этого средства: ощущение сильной слабости во всемъ тѣлѣ, не дающая ни стоять, ни ходить; сонливость и вялость, боли въ костяхъ и суставахъ; боли всевозможныя въ разныхъ мѣстахъ тѣла; состояніе тоски; вздутіе живота. Сонъ безпокойный, не освѣжающій, съ частыми пробужденіями и метаніемъ въ постели. Повышенная раздражительность, склонность къ гнѣву; угрюмость и меланхолія. Давящія и помрачающія головныя боли, съ невѣрной походкой и головокруженіемъ, больше въ комнатѣ, нежели на свѣжемъ воздухѣ; приливы крови къ головѣ съ біеніемъ въ вискахъ; сильное сердцебіеніе съ перебоями; ощущение озноба и жара съ необычайной слабостью. Явленія катарра верхнихъ дыхательныхъ путей. Разстройства пищеваренія: тошнота съ сильной зѣвотой, отвращеніе къ мясу, икота, рвота. Испражненія съ гнилостнымъ запахомъ, вонючіе газы. Разстройства мочеотдѣленія, главнымъ образомъ—отъ разслабленія мочевого пузыря. Состояніе раздраженія и воспаленія въ половыхъ органахъ—См. характеристику на слѣд. страницахъ: 80 (Дифтеритъ), 162 (Манія), 536 (Бол. кожи). Показано особенно при тифѣ, сопровождающемся большой слабостью, необычайной сухостью языка, водянистыми поносами, похолодѣніемъ членовъ, слабостью пульса (съ перебоемъ на каждомъ третьемъ ударѣ).

Дѣленія : $\times 3$ и болѣе низкія, рѣдко болѣе высокія.

Длительность дѣйствія: повторныя пріемы высихихъ дѣленій—нѣсколько недѣль; въ болѣзняхъ, и отъ низкихъ дѣленій—нѣсколько часовъ.

Противосредства: *Бріонія*, *Камфора*. Химическія противоядія—щелочи (см. стр. 609).

№ 55. Бромъ.

Bromum. Бромъ.

Употребляется въ водномъ растворѣ, который долго сохраняться не можетъ, поэтому долженъ быть въ случаѣ надобности свѣжеприготовленъ.

Меньшія количества Брома вызываютъ жженіе и ощущение жара во рту и глоткѣ, также въ желудкѣ, тошноту, икоту, обильное выдѣленіе слюны и слюны, кожные сыпи. Отъ большихъ количествъ или болѣе продолжительнаго примѣненія являются: головныя боли, тоска, одышка, нечувствительность кожи,⁸ расширеніе зрачковъ, оглушеніе, спячка, бредъ. Большія количества Брома вызываютъ явленія сильнаго воспаленія дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ, быстрый упадокъ силъ, судороги и смерть.

Въ малыхъ, гомеопатическихъ дозахъ Бромъ находитъ свое примѣненіе при воспалительныхъ пораженіяхъ гортани и дыхательнаго горла (см. стр. 307) съ одышкой и удушливымъ кашлемъ, также при хронич. катаррѣ носа (см. стр. 301).

Дѣленія—низкія.—Длительность дѣйствія: нѣсколько дней.

Подобное средство: *Тодъ*, который тѣмъ отличается отъ Брома, что подходитъ больше для случаевъ съ лихорадочнымъ состояніемъ, котораго нѣтъ при показаніяхъ для Брома.

Противоядіе — Аммоніакъ и вообще щелочи.

Соли Брома см. подъ № 49 и № 112

№ 56. Валеріана.

Valeriana officinalis.

Тинктура готовится изъ высушеннаго корня.

Основныя дѣятельныя начала: валеріановая кислота и эфирное масло.

Симптомы: тянущія и колющія боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла, дергающія боли въ мышцахъ, особенно въ покое, съ облегченіемъ отъ движенія; крестообразно являющіяся боли (лѣваго плеча и правой ноги); необычайная раздражительность, возбужденность, съ послѣдовательнымъ разслабленіемъ, періодичность симптомовъ. Сонливость съ частой зѣвотой въ теченіе дня, безпокойный сонъ или бессонница ночью.

Душевное настроеніе оживленное и довольное; безудержная веселость; общее возбужденіе съ безпокойнымъ дрожаніемъ, смѣняющееся часто упадкомъ духа, тоской, чувствомъ страха. Перемѣнчивость настроенія характерна для Валеріаны.

Приведенные симптомы могутъ служить руководствомъ къ приписанію Валеріаны въ разнаго рода болѣзняхъ.

Дѣленія: низкія.—Длительность дѣйствія: при испытаніи на здоровыхъ—отъ нѣсколькихъ дней до нѣсколькихъ недѣль.

Противосредства: *Камфора* и *Коффеа*.

№ 57. Гидастись.

Hydrastis canadensis, Водолістъ канадскій.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня.

Основное дѣятельное начало: Гидастинъ (также Берберинъ).

Дѣйствуетъ на кровеносные сосуды, особенно на таковыя брюшныхъ органовъ, суживая ихъ и вызывая состояніе относительнаго обезкровленія; также—на кожу и слизистыя оболочки, и производитъ состояніе общей слабости, вродѣ ма́разма (старческаго истощенія).

Къ симптомамъ Гидаст. относятся: необычайная слабость съ головной болью и головокруженіемъ, чувство усталости съ болью даже по утрамъ послѣ вставанія, мышечныя боли въ поясницѣ, крестцѣ и нижнихъ конечностяхъ; больной бы все лежалъ; боли въ суставахъ, особенно въ вечерніе часы, блуждающія боли, какъ бы ревматическія; потребность вытягиваться съ зѣвотой. Сонъ глубокій, но не освѣжающій; сонливость въ теченіе дня. Душевное настроеніе бодрое, съ повышенной работоспособностію, или подавленное, грустное, раздражительное, со слабостью соображенія и памяти.

См. еще характеристику Гидраста на страницах: 415 (Маточное кровотечение), 489 (Ракъ), 537 (Бол. кожи). Примѣняется вообще въ случаяхъ болѣе глубокихъ разстройствъ растительной сферы организма, стало быть—въ болѣзняхъ крови и лимфы.

Дѣленія: низкія и Θ .

Подобныя лѣкарства: по дѣйствию на слизистыя оболочки—*Пульсат.*, *Кали бихром.*, *Антим. круд.*; по дѣйствию на прямую кишку—*Колмиксонія*, *Алоэ*, *Сетя*, *Сульф.*; по дѣйствию на грудную железу—*Фитолакка* и *Коніум*.

№ 58. Гіосціамусъ.

Hyosciamus niger. Бѣлена.

Эссенція готовится изъ свѣжаго сока находящагося въ цвѣту растенія съ виннымъ спиртомъ.

Бѣлена вызываетъ значительныя разстройства въ нервной системѣ; картина дѣйствія ея очень похожа на бѣшенство, на буйное помѣшательство, съ бредомъ, мышечными подергиваніями и судорогами. Гіосціамусъ имѣетъ много общаго съ Белладонной и Стрмоніемъ. Алкалоиды ихъ (Гіосціаминъ, Атропинъ, Датуринъ) одинаково вызываютъ суженіе зрачка, большую сухость слизистой оболочки рта и глотки, и дыхательныхъ органовъ, также кожи; далѣе—помраченность головы, головокруженіе, галлюцинаціи, бредъ; въ меньшихъ пріемахъ они ослабляютъ дѣятельность сердца и уменьшаютъ частоту пульса, въ большихъ же—послѣ быстронаступившаго замедленія пульса наступаетъ столь же быстрое его ускореніе свѣше нормы. Разница между этими тремя алкалоидами заключается въ степени ихъ дѣйствія, причемъ Датуринъ и Атропинъ сильнѣе дѣйствуютъ, нежели Гіосціаминъ. Гіосціаминъ имѣетъ и снотворное дѣйствіе, но отличается въ этомъ отношеніи отъ опія тѣмъ, что не производитъ запора. При болѣе продолжительномъ воздѣйствіи большихъ пріемовъ являются кровотечения изъ матки, поты и своеобразныя накожныя сыпи.

Многіе симптомы этого средства наступаютъ особенно послѣ пріемовъ пищи и усиливаются въ вечерніе часы.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 59 (Тифъ), 126 (Судороги), 161 (Манія), 167 (Сумасшествіе), 308 (Кашель), 328 (Хронич. бронхитъ), 537 (Бол. кожи).

Дѣленія: 3 и болѣе высокія.

Длительность дѣйствія: малыхъ и рѣдкихъ дозъ—нѣсколько часовъ, болѣе продолжительныхъ пріемовъ—недѣли двѣ.

Противосредства: *Камфора*, *Опій*, *Беллад.*, *Стрмоній*, *Хина*; Лимонный сокъ въ большихъ количествахъ.

№ 59. Глоноинъ.

Glonoinum или *Nitroglycerinum*. Нитроглицеринъ.

Это—безцвѣтная или желтая жидкость, при долгомъ нахожденіи на холодѣ превращающаяся въ иглообразные кристаллы. Вещество это

ядовито. Въ малыхъ же, гомеопатическихъ дозахъ оно очень полезное средство, особенно въ острыхъ заболѣваніяхъ, сопровождающихся разстройствами, именно — состояніями возбужденія и раздраженія, со стороны мозга и сердца.

Общіе симптомы Глоноина: Ощущеніе біенія артерій во всемъ тѣлѣ, приливы крови къ мозгу, къ легкимъ, къ сердцу, ощущеніе слабости и усталости съ зѣвотой; зудъ и ощущеніе холода въ рукахъ, приступы невралгій въ рукахъ, колѣнахъ и бедрахъ, щелканіе въ колѣнномъ и бедренномъ суставахъ при хожденіи. Улучшеніе нѣкоторыхъ страданій (головной боли) въ покоѣ, ухудшеніе отъ движенія, отъ солнечныхъ лучей, отъ холода и сырости. Сонъ, если только онъ не нарушается болью головы, спокойный и крѣпкій. Душевное состояніе безпокойное, съ ощущеніемъ тоски и страха. Блѣдность лица съ синеватыми кругами у глазъ, блѣдность даже при ощущеніи жара или при приливѣ крови къ головѣ.

Характеристику въ отношеніи болѣзней сердца см. стр. 372. Кроме того Глоноинъ показанъ бываетъ при солнечномъ ударѣ, апоплексіи, маніи, при воспаленіи мозга, при тифѣ, при мигрени, при морской болѣзни, при судорогахъ.

Дѣленія: 3 и болѣе высокія.

Длительность дѣйствія: смотря по частотѣ и величинѣ пріемовъ—отъ нѣсколькихъ часовъ до 8 дней.

Противосредства: *Камфора, Нукъ вои., Оній.*

№ 60. Графитъ.

Graphites.

До 5 дѣленія—растиранія съ молочнымъ сахаромъ, а далѣе—въ спиртныхъ разведеніяхъ. Графитъ состоитъ изъ 90—95% углерода, 1—5% кремнезема, 1—4% желѣза и слѣдовъ земель, извести и марганца. Въ мельчайше (особымъ фабричнымъ способомъ) растертомъ видѣ Графитъ представляетъ собою очень нѣжный, жирный на ощупь, блестящечернаго цвѣта порошокъ; цвѣтъ этотъ при послѣдовательныхъ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ пропадаетъ, принимая бѣлый цвѣтъ молочнаго сахара.

При испытаніи Графита, по гомеопатическому методу, на здоровыхъ людяхъ, проявляется длинный рядъ симптомовъ, указывающихъ на глубокое дѣйствіе его на организмъ; главнымъ образомъ вліянію его подвергаются: кожа, слизистыя оболочки, лимфатическія железы.

Къ сопровождающимъ симптомамъ Графита относятся: разнаго рода боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла; чувство разбитости и онѣмнія въ мѣстахъ тѣла, подвергающихся давленію во время сна; ощущеніе пульсаци въ тѣлѣ; ослабленіе съ дрожаніемъ тѣла, внезапный упадокъ силъ, состояніе слабости уже послѣ непродолжительнаго движенія на свѣжемъ воздухѣ; общее чувство недомоганія съ боязнію свѣжаго воздуха, наклонность къ простудѣ, большая чувствительность къ сквозняку. Сонъ безпокойный, безсонница, потребность во время ночи къ

очень частому мочеотдѣленію; въ теченіе дня большая сонливость съ частой зѣвотой, съ раннимъ засыпаніемъ вечеромъ и продолжительнымъ глубокимъ сномъ. Душевное состояніе легко раздражимое, вспыльчивое, но и отходчивое; общая вялость, озабоченность, склонность къ грусти и плачу.

Характеристика Графита въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 201 (Хрон. катар. нѣба), 300 (Хрон. катар. носа), 494 (Золотуха), 537 (Бол. кожи), 551 (Нарывы), 569 (Экзема), 578 (Сальность кожи), 581 (Потливость), 595 (Бленоррея глазъ).

Графитъ примѣняется преимущественно въ хроническихъ состояніяхъ болѣзней упомянутыхъ, а также—пищеварительныхъ органовъ, сопровождающихся запоромъ, вздутіемъ живота газами, гнилой отрыжкой и болью въ желудкѣ, улучшающейся отъ ѣды; отвращеніе къ мясу. Оно умѣстно бываетъ и въ другихъ вообще болѣзняхъ, при наличности приведенныхъ общихъ и мѣстныхъ симптомовъ.

Дѣленія: 3 и высшія дѣленія, которыя въ большинствѣ случаевъ болѣе дѣйствительны.

Длительность дѣйствія: нѣсколько недѣль, особенно послѣ высокихъ дѣленій.

Противосредства: *Нуксъ вом.*, *Арсен.*

Подобныя средства: *Ликоподій*, *Мезереумъ*, *Нитри ацид.*, *Силицій*.

№ 61. Дигиталисъ.

Digitalis purpurea. Наперстянка.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ. Примѣняется и въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ.

Основныя дѣятельныя начала: Дигиталинъ, Дигиталеинъ, Дигитинъ и Дигитоксинъ.

По новѣйшимъ даннымъ фізіологіи, Дигиталисъ въ меньшихъ дозахъ повышаетъ кровяное давленіе, уменьшаетъ частоту пульса, что въ свою очередь ведетъ къ усиленной дѣятельности сердца и къ суженію сосудовъ. Большія же дозы или продолжительныя приемы меньшихъ дозъ вызываютъ утомленіе сердца съ учащеніемъ пульса, постепенно падающимъ артеріальнымъ давленіемъ и, наконецъ, параличемъ сердца. Поэтому Дигиталисъ считается въ аллопатіи что ни на есть настоящимъ „сердечнымъ средствомъ“. Въ гомеопатіи же принимается во вниманіе вліяніе Дигиталиса не только на сердце, но и на другіе органы и ткани тѣла.

Общіе симптомы Дигиталиса суть, именно, слѣдующіе:

Нервные приступы, сопровождающіеся большой слабостью, по дергиванію и судороги, явленія воспаленія желудка и кишекъ, расширенные и нечувствительные зрачки, спячка, смерть (при отравленіи); падучеобразныя припадки съ послѣдующей слѣпотой (амаврозъ). Большая слабость при маломъ, неправильномъ пульсѣ; возбужденное кровообращеніе въ сосудахъ съ разрывомъ малыхъ сосудовъ. Тяжесть и дрожаніе членовъ; ощущеніе давленія и зуда въ разныхъ железахъ

повышенная дѣятельность лимфатическихъ сосудовъ и железъ. Желтушныя явленія, водяночныя опуханія. Сильный зудъ кожи съ послѣдующимъ шелушеніемъ; высыпаніе маленькихъ бутоновъ и пузырьковъ въ лицѣ, на шеѣ, на спинѣ и рукъ — Сонъ продолжительный, глубокій и крѣпкій, или легкій, не освѣжающій сонъ, безпокойный, прерывистый. Настроеніе безразличное, придавленное, грустное, или угрюмое, сердитое; безпокойство, угрызения совѣсти, страхъ смерти; маніакальные приступы.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 140 (Астма), 328 (Хронич. бронхитъ), 337 (Кровохарканіе), 352 (Чахотка легкихъ), 370, 372, 376 (Бол. сердца). Примѣняется также, въ подходящихъ случаяхъ, при катаррѣ желудка и 12-перстной кишки съ желтухой, слизистой рвотой и темной мочей; при водяночныхъ состояніяхъ, при золотушныхъ опуханіяхъ железъ, при воспаленіяхъ глазъ, при душевныхъ расстройствахъ, сопровождающихся малымъ, очень замедленнымъ и неправильнымъ пульсомъ; также при возбужденной половой сферѣ, поллюціяхъ и т. п.

Низшія дѣленія или вещественныя дозы, или настой листьевъ предпочтительны при бѣлой горячкѣ, неправильномъ пульсѣ и кровотеченіи изъ матки; среднія дѣленія — при тифѣ, пневмоніи, желчной коликѣ, сперматорреѣ, метроррагіи, водянкѣ, задержаніи мочи, пораженіяхъ ушей; высокія дѣленія — при желтухѣ, остромъ эндокардитѣ, Базедовой болѣзни, неврозахъ.

Длительность дѣйствія: нѣсколько дней до 6 недѣль; дѣйствія малыхъ вещественныхъ приемовъ накапливаются въ организмѣ, вслѣдствіе чего продолжительные приемы влекутъ за собою явленія отравленія (кумулятивное дѣйствіе).

Противосредства: *Камфора, Эвиръ, Уксусъ, Опій, Нуксъ вом.* Дигиталисъ съ своей стороны антидотъ вина.

№ 62. Кактусъ.

Cactus grandiflorus Кактусъ великоцвѣтный.

Эссенція готовится изъ молодыхъ стеблей и цвѣтовъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на сердце, вызывая ускоренную дѣятельность его; сильное сердцебіеніе, перебои пульса, ощущение спазма въ груди, сжиманіе сердца какъ бы желѣзной рукой. Къ симптомамъ Кактуса относятся еще: общая слабость, бессонница, угнетенное состояніе духа; головныя боли съ приливами къ головѣ; періодическое ослабленіе зрѣнія; приливы къ легкимъ (кровохарканіе); брюшные застои съ геморроемъ и запоромъ, и послѣдующимъ поносомъ; расстройства мочеотдѣленія: непроизвольное моченіе во время сна; пульсирующія боли въ маткѣ и яичникахъ, сопровождающіяся болью менструаціи, темная, смолистаго цвѣта, менструальная кровь.

Кактусъ находитъ свое примѣненіе главнымъ образомъ при болѣзняхъ сердца (см. стр. 372), а также и въ болѣзняхъ другихъ органовъ, при наличности особенно сердечныхъ его симптомовъ.

Дѣленія: преимущественно низкія и даже Θ — при органическихъ порокахъ сердца, высшія же — при нервномъ сердцебіеніи.

Противосредства: *Акон.*, *Камфора*, *Хина*.

№ 63. Кали іодатумъ см. подъ № 34.

№ 64. Кали карбоникумъ.

Kali carbonicum. Углекислый калий.

Употребляются какъ растиранія съ молочнымъ сахаромъ, такъ и разведенія, приче́мъ $\times 1$ и $\times 2$ суть водныя.

Кали карб. вызываетъ главнымъ образомъ чрезмѣрное раздраженіе слизистой оболочки дыхательныхъ органовъ, пищеварительнаго канала и женскихъ половыхъ органовъ. Характерные симптомы этого средства: колющія боли, мѣшкообразныя вздутія у глазъ, большая слабость въ крестцѣ, ухудшеніе страданій около 3—4 часовъ утра.

Характеристика Кали карбон. въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 201 (Хрон. катар. нѣба и глотки), 301 (Хрон. катар. носа и носоглотки), 353 (Чихотка легкихъ), 373, 377 (Бол. сердца), 416 (Менструальная колика), 440 (Головн. боль у беремен.), 442 (Кровотеч. изъ беремен. матки), 537 (Бол. кожи), 580 (Потливость).

Кали карб. примѣняется преимущественно въ хроническихъ болѣзненныхъ состояніяхъ у людей, склонныхъ къ венознымъ застоямъ, особенно при наличности пораженій кожи, головной боли съ летучимъ жаромъ и приливами крови съ біеніемъ въ сосудахъ; при кровотеченияхъ и застояхъ крови у людей, маланхолически или ипохондрически настроенныхъ, одержимыхъ повышенной раздражимостью или пугливостью.

Далѣе, при многихъ еще другихъ болѣзняхъ, кромѣ упомянутыхъ, особенно же — пищеварительныхъ органовъ; въ отношеніи послѣднихъ можно отмѣтить слѣдующіе симптомы: диспепсія у старыхъ людей; у слабыхъ и малокровныхъ, всегда усталыхъ и страдающихъ болью въ поясницѣ; передъ ѣдой чувство слабости, кислая отрыжка и жженіе подъ ложечкой, также особое нервное ощущеніе; во время приемовъ пищи больного одолеваетъ сонливость, и послѣ ѣды онъ чувствуетъ сильную вздутость; отрыжка гнилая, но облегчаетъ. Со стороны половой сферы состоянія раздраженія, жженія, зуда, боли.

Дѣленія: предпочтительно низкія, начиная съ $\times 1$ и $\times 2$, но не исключены и высокія.

Длительность дѣйствія: повторныхъ приемовъ около 6 недѣль.

Противосредства: *Камфора*, *Кофеа*, *Мосх.*, *Цинкъ*, *Опій*.

№ 65. Калькареа фосфорика см. подъ № 35.

№ 66. Камфора.

Camphora.

Примѣняется въ спиртномъ растворѣ.

Очищенная камфора полупрозрачна, бѣлоснѣжнаго цвѣта, зернистаго излома, очень летуча, горитъ красноватымъ пламенемъ съ густой копотью; въ водѣ нерастворима, развѣ лишь — въ очень ничтожномъ количествѣ; въ алкогольѣ же, въ эфирѣ, въ жирныхъ маслахъ и крѣпкихъ кислотахъ растворяется легко; отъ прибавленія же воды камфора изъ этихъ растворовъ выпадаетъ.

Запахъ камфоры очень пронизителенъ и, при продолжительномъ вліяніи, производитъ легкое раздраженіе глазъ. Вкусъ жгучій, ароматно-горьковатый, вначалѣ горячительный, а затѣмъ охлаждающій, какъ мята, и усиливающій отдѣленіе слюны. Камфора, приложенная къ кожѣ, производитъ вначалѣ ощущеніе пріятной прохлады, а затѣмъ жгучую боль, красноту и пузыри, при продолжительномъ же вліяніи разрушаетъ кожу и даже болѣе глубокія ткани; приложенная на свѣжую рану или язву, камфора производитъ сильное жженіе. Въ спиртномъ или масляномъ растворѣ производитъ на кожѣ вначалѣ ощущеніе прохлады, а затѣмъ—пріятной теплоты.

Отъ сравнительно небольшихъ пріемовъ, 2—3 гранъ, получается въ зѣвѣ и пищеводѣ ощущеніе прохлады, а затѣмъ теплоты, при чемъ отдѣленіе слюны немного увеличивается. Отъ большихъ же пріемовъ (5—8—10 гранъ) являются признаки воспаленія желудка: теряется аппетитъ, ощущается боль подъ ложечкой, жажда, сухость во рту, икота, тошнота, позывы на рвоту; со стороны кишечника—запоръ.

Дыханіе учащается, затѣмъ является удушье и мучительная тоска. Сердцебиеніе также учащается, затѣмъ является трепетаніе сердца и неравномѣрность его ударовъ.

Пульсъ учащается у слабыхъ субъектовъ съ увеличеніемъ или безъ увеличенія его полноты, а у полнокровныхъ пульсъ дѣлается еще полнѣе и тверже. Затѣмъ, и особенно отъ еще большихъ дозъ, получается замедленіе и ослабленіе пульса, съ пониженіемъ температуры, похолодѣніемъ тѣла.

• Къ симптомамъ Камфоры относятся еще: приливъ крови къ головѣ, шумъ въ ушахъ, искры передъ глазами; мышечныя движенія усилены; затѣмъ общая слабость, помраченіе сознанія, бредъ, судороги.

При поворотѣ къ выздоровленію отъ этихъ явленій отравленія является критическій сонъ съ равномѣрной по всему тѣлу испариной.

Со стороны мочевыхъ органовъ большіе пріемы вызываютъ усиленное выдѣленіе водянистой мочи, съ частыми позывами на испусканіе ея.

Камфора вліяетъ и на половую сферу: большіе пріемы усиливаютъ половое возбужденіе у мужчинъ и похотливость у женщинъ, но затѣмъ, или отъ еще большихъ пріемовъ, получается обратное состояніе, разслабленіе. У беременныхъ большіе, отравляющіе пріемы Камфоры могутъ вызвать выкидышъ.

Въ малыхъ дозахъ Камфора укрѣпляетъ сердечную дѣятельность, ускоряетъ пульсъ, повышаетъ пониженную теплоту тѣла, оживляетъ дѣятельность мышцъ и нервной системы и поддерживаетъ бодрость духа.

Благодаря своей необычайной летучести, Камфора проникаетъ всюду, куда только можетъ проникнуть воздухъ. Камфора необычайно быстро всасывается черезъ кожу, тѣмъ болѣе—черезъ слизистыя оболочки (рта, зѣва, желудка), и достигаетъ до самыхъ отдаленныхъ уголковъ въ организмѣ, не говоря уже о ближе лежащихъ; такой эффектъ получается всегда скорѣе отъ спиртнаго или эфирнаго раствора Камфоры, чѣмъ отъ порошкового или иного рода его примѣненія

Изъ болѣзней, при которыхъ Камфора является въ высокой степени цѣлебной, на первомъ планѣ надо считать азиатскую холеру, противъ которой Ганеманъ впервые предложилъ ее какъ главнѣйшее средство, а практика вполне подтвердила и по настоящее время продолжаетъ подтверждать основательность этого предложенія (См. ч. II статью о холерѣ, стр. 84)

Камфора полезна какъ предохранительное и цѣлебное средство и при другихъ инфекціонныхъ болѣзняхъ, протекающихъ при своихъ естественныхъ ей симптомахъ.

Характеристику Камфоры см. еще на слѣдующихъ страницахъ: 59 (Тифъ), 331 (Гриппъ, Инфлуэнца), 380 (Нервное сердцебіеніе), 538 (Бол. кожи), 549 (Рожа).

Нервное возбужденіе Камфора успокаиваетъ иной разъ лучше, чѣмъ *Имация*, *Коффеа* и т. п.

Камфора является противоядіемъ въ отношеніи большинства минеральныхъ и растительныхъ ядовъ, но не въ томъ смыслѣ, что уничтожаетъ дѣйствіе таковыхъ отъ отравляющихъ дозъ, а въ томъ, что она уничтожаетъ незначительныя разстройства, вызываемыя малыми приемами ядовитыхъ веществъ, замѣщая ихъ вліяніе на нервные центры своимъ вліяніемъ.

Подобныя Камфорѣ лѣкарства: по вліянію на кровообращеніе — *Аконитъ*, *Арсеник.* и *Вератрумъ альбумъ* — на мочевые пути: *Кантарисъ* и *Теребинтина*; — на слизистыя оболочки — *Гвалякумъ*, *Аммоніак. гумми.*

Отъ высушихъ дѣлений Камфоры нельзя ожидать никакого дѣйствія. Всего лучше употреблять насыщенный растворъ (*Камфора Рубини*), особенно при холерѣ, или *Камфора* X 1 — для прочихъ цѣлей, притомъ всегда въ спиртномъ растворѣ (на мелкоистолченномъ сахарѣ), а не въ порошокъ или таблеткахъ. Наружно — также лишь въ видѣ *камфорнаго спирта* или *камфорнаго масла*.

Антидотомъ Камфоры можно считать *Аса фетида* въ нисшемъ дѣленіи (въ смѣшеніи съ этимъ средствомъ Камфора теряетъ свой запахъ).

№ 67. Каустикумъ.

Causticum Hahnemanni. Каустикъ Ганемана.

Это вещество, представляющее, въ отношеніи химическаго анализа его, все еще нѣчто загадочное, готовится по прописи Ганемана слѣдующимъ

образомъ: кусокъ свѣжежеженной извести кладется на минуту въ дестил. воду и затѣмъ въ сухую чашку, гдѣ его превращаютъ въ порошокъ. 4 чч. этого порошка смѣшивается съ 4 чч. кислаго сѣрнокислаго кали (*Bisulphas calicus*), который предварительно выкаливается и расплавляется, а затѣмъ превращается въ порошокъ и растворяется въ 4 чч кипящей воды. Упомянутый известковый порошокъ смѣшивается съ этимъ растворомъ въ нагрѣтой фарфоровой чашкѣ до кашеобразной густоты, и эта смѣсь вводится въ стеклянную колбу, изъ которой, путемъ нагрѣванія, перегоняется вся жидкость. Получаемый такимъ способомъ, въ количествѣ около 3 чч. общей массы, дестиллатъ смѣшиваютъ со столькими же частями алкоголя и получаютъ основу для разведеній.

Многочисленные испытанія на здоровыхъ и больныхъ показали, что это на видъ невинное средство имѣетъ весьма сильное влияние на нервную систему и мозгъ, головной и спинной. Симптомы же являются во всѣхъ тканяхъ и органахъ и отличаются характеромъ слабости и состояніемъ раздраженія, сопровождающагося судорожными разстройствами или ощущеніемъ боли. Характерной для Каустика является большая чувствительность къ холодному воздуху и сквозняку, которыми вызываются давящія боли съ знобленіемъ; ухудшаются страданія въ утренніе и вечерніе часы, послѣ чего легко наступаетъ потъ. Очень мучительны боли въ костьяхъ и суставахъ. — Большая сонливость и спячка въ теченіе дня, ночью же сонъ беспокойный съ неприятными сновидѣніями и кошмарами. — Душевное настроеніе очень чувствительное, раздражительное, съ наклонностью къ гнѣву; капризное, недовольное, плаксивое, боязливое.

Примѣняется Каустикъ, въ подходящихъ случаяхъ, преимущественно въ хроническихъ заболѣваніяхъ и при разстройствахъ, не сопровождающихся лихорадочными явленіями.

Характеристика его въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 145 (Параличъ), 463 (Трипперъ), 520 (Хрон. ревмат. сустав.), 528 (Мышечн ревмат.), 538 (Болѣзни кожи), 600 (Катаракта).

Дѣленія: $\times 3$ и болѣе высокія.

Длительность дѣйствія: нѣсколько недѣль.

Противосредства: *Колоц.*, *Нуксъ вом.*; усиливается же дѣйствіе отъ *Корффеа* и *Фосфоръ*.

№ 68. Капсикумъ.

Capsicum annuum. Стручковый перецъ.

Тинктура готовится изъ плодовой оболочки, освобожденной отъ сѣмянъ, съ 5 чч. 90% алкоголя.

Основное дѣйтельное вещество есть Капсицинъ.

Обладаетъ больше раздражающими свойствами и поражаетъ главнымъ образомъ кожу и слизистыя оболочки, особенно—пищеварительнаго каѣнала. Подходить больше для людей вялаго и слабого сложенія. По новѣйшимъ наблюденіямъ, болѣе продолжительное упо-

требленіе стручкового перца, какъ пряности, ведетъ къ циррозу печени и почекъ.

Къ общимъ симптомамъ Капсик. относятся: нервныя боли, колющія и рвущія, въ разныхъ мѣстахъ тѣла; суставныя боли съ хрустомъ и щелканіемъ въ суставахъ, особенно въ колѣнѣ или голеностопномъ сгибѣ, тѣмъ болѣе въ началѣ движенія; большая слабость и чувство разбитости во всѣхъ членахъ съ боязнью движенія. Отвращеніе къ свѣжему воздуху: ухудшеніе нѣкоторыхъ страданій послѣ ѣды.

Примѣняется больше въ хроническихъ заболѣваніяхъ средняго возраста, особенно у женщинъ въ переходное время, отличающихся раздражительнымъ и капризнымъ настроеніемъ духа; при приливахъ крови къ мозгу и легкимъ, съ болями головы и лица, съ разстройствами зрѣнія; при катаррѣ желудка и кишекъ съ разстройствами мочеотдѣленія; при брюшномъ полнокровіи съ геморроидальными страданіями; при хроническомъ трипперѣ и половой слабости; при маляріи (стран. 65)

Дѣленія: при геморроѣ, дизентеріи и т. п. — $\times 3$ и болѣе низкія, до $\times 1$ — Θ (при маляріи); въ другихъ случаяхъ, особенно при явленіяхъ раздраженія мочевого пузыря, также при пораженіяхъ желудка слѣдуетъ начать съ болѣе высокихъ дѣленій, или къ нимъ перейти, если отъ низкихъ чувствуется ухудшеніе.

Длительность дѣйствія: около 7 дней; — малыхъ дозъ у больныхъ—до 12 часовъ.

Противосредство: *Камфора*.

№ 69. Клематись.

Clematis erecta. Ломоносъ (Жигунецъ) прямой.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ стеблей и листьевъ съ алкоголемъ. Сокъ изъ этихъ частей содержитъ острое эфирное масло, подобное Анемонину (въ Пульсатиллѣ).

Вліяетъ главнымъ образомъ на кожу и волокнистыя ткани; при этомъ наблюдаются слѣдующіе общіе симптомы: мышечныя подергиванія въ разныхъ мѣстахъ спины и членовъ; слабость мышцъ, ощущеніе дрожанія во всемъ тѣлѣ при попыткѣ лечь, боли въ костяхъ, большая усталость и сонливость въ теченіе дня; ночью же сонъ безпокойный или вовсе отсутствуетъ; вялость, склонность къ одиночеству. Большая чувствительность къ холодному воздуху при обнаженіи тѣла; болящіе гнойнички на лицѣ и всемъ тѣлѣ. Опуханіе и затвердѣніе железъ, особенно яичекъ.

Примѣняется при гнойничковыхъ и пузырьчатыхъ сыпяхъ, при пораженіи железъ, особенно яичекъ при трипперѣ, при ревматическихъ (и подагрическихъ) заболѣваніяхъ нервовъ и суставовъ, глазъ и ушей.

Дѣленія: низкія. — Длительность дѣйствія: большихъ пріемовъ — около 2 недѣль и больше. — Противосредства: *Бріонія*, *Камфора*. — Подобное средство: *Рододендронг*.

№ 70. Коккулюсь.

Cocculus indicus. Кукольвань индійскій.

Тинктура готовится изъ плодовъ Кукольвана съ виннымъ спиртомъ.—Главное основное дѣятельное начало—Пикротоксинъ.

Дѣйствуетъ на нервно-мозговую систему, вызывая цѣлый рядъ судорожныхъ и параличныхъ явленій, также состояніе, подобное морской болѣзни—тошноту, головокруженіе, обморочность, упадокъ силъ. Многія страданія (боли, подергиванія и проч.), являются на одной лишь сторонѣ тѣла и ухудшаются отъ ѣды, питья, отъ сна, разговора, куренія табака, отъ кофе, отъ умственнаго напряженія и отъ свѣжаго воздуха; также отъ качающихся движеній, отъ ѣзды въ экипажѣ. Равнымъ образомъ появляются боли и страданія часто во время покоя, достигая при этомъ наивысшей степени, и онѣ облегчаются отъ частаго раскачиванія пораженной части.

Характеристика Коккул. въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 127 (Судороги), 145 (Параличъ), 155 (Неврозы), 215 (Хрон. катар. желудка), 234 (Боль живота), 416 (Менструальн. колика), 454 (Рвота у новорожд.), 538 (Бол. кожи).

Дѣленія: чаще употребляются низкія и среднія.

Длительность дѣйствія: 8 дней и болѣе.

Противосредства: *Камфора*, *Нукъ вом.*, *Іод.*, *Имацил*.

№ 71. Кольхикумъ.

Colchicum autumnale. Безвременникъ.

Приготавливается эссенція изъ сока свѣжаго корня, смѣшиваемаго съ равной частью 90% алкоголя, или тинктура изъ высушенныхъ сѣмянъ съ 5 ч.ч: 90% алкоголя.

Основное дѣятельное начало—Кольхицинъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистую оболочку желудка и кишекъ, на сывороточную оболочку (плевры, брюшины, сердечной сумки), на волокнистую ткань (суставныхъ сумокъ и сухожилій, особенно—малыхъ суставовъ) и на мышцы (особенно—груди и грудобрюшной преграды), вызывая во всѣхъ этихъ тканяхъ явленія, подобныя воспалительнымъ.

Характеристика Кольх. въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 89 (Дизентерія), 122 (Бол. нервовъ), 509 (Ломота), 519 (Острый ревматизмъ суставовъ), 521 (Хронич. ревмат. суставовъ).

Дѣленія: низкія до 0. — Длительность дѣйствія: отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ дней, смотря по величинѣ и частотѣ пріемовъ.

Противосредства: уксусъ, медъ. *Коккул*, *Пульсат.*, *Аммон. кауст.*, *Нукъ вом.*

№ 72. Коніумъ.

Conium maculatum. Болиголовъ пятнистый.

Эссенція готовится изъ сока свѣжаго растенія.

Основное дѣятельное начало—Конинъ.

Общіе симптомы — слѣдующіе: чувство общей разбитости, боль какъ отъ усталости въ суставахъ, слабость мышцъ, засыпаніе членовъ, дрожаніе съ посинѣніемъ членовъ и холоднымъ потомъ; окоченѣлость и тугость членовъ; судороги верхнихъ членовъ при параличѣ нижнихъ, частичный или общій параличъ, обморочныя состоянія; боли разнаго рода въ разныхъ частяхъ тѣла; приливы крови и кровотеченія, разстройства въ разныхъ органахъ и тканяхъ. Ухудшеніе многихъ страданій въ покоѣ, на вольномъ воздухѣ, отъ холода, въ утренніе и вечерніе часы.

Характеристика Коніумъ въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 201 (Хрон. катар. неба), 333 (Коклюшъ), 445 (Грудница), 489 (Ракъ), 538 (Бол. кожи), 596 (Бленоррея глазъ), 600 (Катаракта).

Коніумъ надо имѣть въ виду также при душевныхъ болѣзняхъ и неврозахъ, особенно когда случается часто кровотеченіе изъ носа, вызываемое самыми ничтожными причинами; настроеніе духа подавленное, угнетенное, нелюдимость и вмѣстѣ съ тѣмъ боязнь одиночества; страданія печени и селезенки и вялость кишекъ.

Коніумъ умѣстенъ бываетъ не только при бленорреѣ глазъ и катарактѣ, но и при золотушныхъ пораженіяхъ ихъ, особенно при предрасположеніи къ ячменямъ.

Далѣе, при болѣзняхъ женскихъ половыхъ органовъ: запаздывающія или скудныя регулы, фиброидныя опухоли матки, затвердѣнія маточной шейки, воспаленіе яичниковъ съ рѣжущими болями, зудъ наружныхъ половыхъ частей, ѣдкія бѣлы.

У мужчинъ: половая слабость и ипохондрія вслѣдствіе онанизма, сѣмяистеченіе при малѣйшемъ поводѣ.

Дѣленія: низкія и среднія.

Длительность дѣйствія: низкихъ дѣленій—12—24 часа, высшихъ—нѣсколько недѣль.

Противосредство: *Коффеа*, уксусъ, лимонный сокъ, смородина.

№ 73. Крокусъ.

Crocus. Шафранъ.

Тинктура готовится изъ имѣющагося въ продажѣ шафрана съ 5 ч. алкоголя 90%.—Основныя дѣятельныя вещества: Полихроитъ (красящее вещество) и эфирное масло.

Большіе приемы вызываютъ наркотическія явленія, приливы крови, кровотеченіе, особенно изъ матки.

Въ патогенезъ Крокуса входятъ симптомы такіе, какіе имѣются при неврозахъ, особенно истерическіе; далѣе судорожные симптомы, также лихорадочные и проч. Характерными особенностями Крокуса можно считать: боли тупыя, ударающія, внезапно приходятъ, не долго держатся и повторяются приступами; скорое движеніе усиливаетъ и ухудшаетъ ихъ; боли особенно сильны раннимъ утромъ и проходятъ отъ медленнаго движенія на вольномъ воздухѣ; вялость и слабость, головокруженіе до обморока; быстрая перемежаемость душевныхъ настроеній противоположнаго характера; ощущеніе, какъ если бы что прыгало въ тѣлѣ (мышечныя подергиванія); чувство разбитости въ членахъ и разслабленности суставныхъ связокъ, съ целканіемъ въ суставахъ при движеніи; страданія глазъ, видѣніе искръ; заволакиваніе зрѣнія.

Крокусъ можетъ быть умѣстенъ при истеріи, при спазмѣ смѣха и плача, при пляскѣ св. Вита, при меланхоліи, при скрытой маляріи, тифѣ, при ломотѣ, при слабости зрѣнія; чаще всего онъ находитъ свое примѣненіе при маточныхъ кровотеченіяхъ, когда кровь темная, густая и легко свертывается.

Дѣленія: низкія при кровотеченіи, болѣе высокія при неврозахъ.

Длительность дѣйствія: нѣсколько часовъ до нѣсколькихъ дней, смотря по величинѣ и частотѣ пріемовъ.

Противосредства: *Аконитъ, Опій.*

Подобныя средства: *Рута, Белл., Сабина, Платина.*

№ 74. Лахезисъ.

Lachesis. Змѣиный ядъ изъ *Trigonocephalus Lachesis* (Ланцетогол. куфій).

Растиранія съ молочнымъ сахаромъ до 5 дѣл., затѣмъ разведенія.

Дѣйствуетъ разрушительнымъ образомъ на нервныя и кровяныя тѣльца и послѣдовательно на весь организмъ. Къ общимъ симптомамъ Лахезиса относятся слѣдующіе:

Боли разнаго рода и біеніе артерій въ разныхъ мѣстахъ тѣла, упадокъ тѣлесныхъ и душевныхъ силъ; тянеть лежать особенно передъ полуднемъ и послѣ обѣда; обморочныя состоянія, дрожаніе, подергиванія, судороги; болѣзненные разстройства преимущественно лѣвостороннія; ухудшеніе многихъ страданій въ весеннее время, также отъ ѣзды, отъ вина и куренія, равно какъ въ утренніе и вечерніе часы и непосредственно послѣ пробужденія со сна; улучшеніе — отъ свѣжаго воздуха. — Сонъ очень глубокой, безпокойный; позднее засыпаніе, не смотря на усталость и сонливость въ теченіе дня и вечеромъ; сновидѣнія веселыя, изъ явленій повседневной жизни, сладострастныя; сонъ сопровождается часто стѣсненіемъ въ груди, судорогами икръ, ощущеніемъ пустоты въ желудкѣ и тошнотой послѣ обильнаго, съ аппетитомъ съѣденнаго ужина; ночныя поллюціи. — Душевное состояніе приподнятое, съ болтливостью и хлопотливостью, крайне чувствительное, раздражительное, или придавленное, тоскливое, грустное, съ неохотой къ какому бы то ни было занятію.

Лахезисъ примѣняется преимущественно въ хроническихъ болѣз-

ненных состояніяхъ у людей средняго и болѣе стараго возраста, также въ переходное время у женщинъ Характеристика его въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ; 66 (Малярія), 155 (Неврозы), 162 (Манія), 163 (Меланхолія), 197 (Ангина), 279 (Хрон. воспал. печени), 373 (Бол. сердца), 539 (Бол. кожи), 551 (Нарывы).

Далѣе, онъ показанъ въ подходящихъ случаяхъ при эпилепсіи (послѣ Белл., Калькар., Гепар.), при застарѣлыхъ ревматизмахъ, при болѣзняхъ женскихъ половыхъ органовъ и проч.

Дѣленія: не ниже 6 сотеннаго и болѣе высокія.

Противосредства: *Кофеинъ*, *Ацид. фосф.*, *Алюмина*; эти — при пораженіяхъ горла; *Арсен.*, *капсик.*, *Хамомил.* — при лихорадкахъ; *Коккул.*, *Нуксъ вом.*, *Вератр.* — при неврозахъ; *Гепар.* — при болѣзняхъ гортани и дыхательнаго горла; *Натр. муриат.*, *Нуксъ вом.* — при пораженіяхъ желудка. — Кислоты мѣшаютъ дѣйствию Лахезиса; вино и спиртные напитки ухудшаютъ страданія.

Подобно Лахезису дѣйствуютъ и нѣкоторые другіе змѣиные яды и особенно: *Найя* и *Кроталусъ*.

Найя (*Naja tripudians*, Очковая змѣя) примѣняется особенно при сердечныхъ болѣзняхъ, именно при порокахъ сердца, сопровождающихся сухимъ щекочущимъ кашлемъ, при слабости сердца во время и послѣ дифтерита, при нервномъ сердцебіеніи и грудной жабѣ; далѣе, при нервальгіяхъ, особенно лѣваго яичника, сопровождающихся сердечными страданіями, и при нервныхъ расстройствахъ вообще, также въ случаяхъ сильнаго упадка жизнедѣятельности съ похолоднѣніемъ тѣла, исчезновеніемъ пульса и дыханія.

Дѣленія: 6 и болѣе высокія.

Кроталусъ (*Crotalus horridus*, Лютый гремучникъ).—Дѣйствуетъ особенно сильно на кровь и лимфу и поэтому умѣстенъ бываетъ въ тяжелыхъ случаяхъ такихъ болѣзней, какъ цынга, кровепятнистая болѣзнь, воспаленія железъ съ нагноеніемъ и т. п.; при тяжелыхъ заболѣваніяхъ печени, селезенки и почекъ, съ желтухой и водянкой; при тифозныхъ лихорадкахъ, при маляріи; при душевныхъ болѣзняхъ съ явленіями сильной испорченности крови и лимфы.—Дѣленія: 6 и болѣе высокія.

№ 75. Ледумъ.

Ledum pallustre. Багульникъ

Тинктура готовится изъ высушеннаго растенія.

Примѣняется въ острыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ съ преобладающимъ ощущеніемъ холода, ухудшеніемъ отъ постельной теплоты, онѣмнѣніемъ, тугоподвижностію и болѣзненностью членовъ; настроеніе мрачное, угрюмое, со вспышками гнѣва. Изъ отдѣльныхъ болѣзней, при которыхъ въ подходящихъ случаяхъ полезенъ бываетъ Ледумъ, можно привести слѣдующія: ревматическія и подагрическія боли нервовъ и суставовъ, болѣзни глазъ и ушей при одновременномъ пораженіи головы, болѣзни кожи, судорожныя страданія дыхательныхъ

органовъ, приливы крови къ легкимъ, колику съ кишечнымъ кровотеченіемъ, спазмъ мочевого пузыря, преждевременныя, обильныя и слишкомъ частыя кровотеченія изъ матки, параличи (стр. 146).

Дѣленія: низшія и болѣе высокія.—Наружное примѣненіе см. на стр. 46.

Длительность дѣйствія; повторныхъ пріемовъ—нѣсколько недѣль.
Противосредства: *Камфора, Русь.*

Подобныя средства: *Арника, Пульсат., Рута.*

№ 76. Мезереумъ.

Daphne Mezereum. Волчье лыко.

Эссенція готовится изъ свѣжей коры. Содержитъ въ себѣ Мезереинъ, который дѣйствуетъ на кожу такъ, какъ шпанская муха.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на кожу и слизистыя оболочки, вызывая въ нихъ явленія воспаленія, также на болѣе глубокія ткани, на суставныя и костныя и проч.

Къ общимъ симптомамъ этого средства принадлежатъ:

Необычайная слабость и тяжесть членовъ, упадокъ силъ и дрожаніе, обморочныя состоянія; подергиваніе отдѣльныхъ мышцъ, давящія и рвущія боли; ухудшеніе многихъ страданій по вечерамъ и ночью, также въ постельной теплотѣ и отъ холоднаго воздуха.—Настроеніе угнетенное съ отѣнкомъ раздражительности и склонностью къ плачу. Сонъ ночью беспокойный, неосвѣжающій. съ кошмарами и частыми пробужденіями.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 123 (Бол. нервовъ), 313 (Хронич. ларингитъ), 539 (Болѣзни кожи), 564 (Опоясывающій лишай).

Дѣленія: низкія.—Длительность дѣйствія: отъ 1—2 дней до нѣсколькихъ недѣль, въ зависимости отъ величины и частоты пріемовъ

Противосредства: *Камфора, Меркур., уксусъ;* съ своей стороны Мезер. противосредство *Меркурия, Ацид. нитр.*

Подобныя средства. *Анакардій, Гваяк., Русь, Фитолакка.*

№ 77. Миллефолій.

Millefolium (Achillea). Тысячелистникъ.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія. Содержитъ въ себѣ Ахиллеинъ и эфирное масло. -

На сосудистую систему дѣйствуетъ подобно Хаомиллѣ, Арникѣ и Русѣ, также Гамамелису, поэтому уже изстари примѣняется при ущемленіяхъ, подкожныхъ кровоподтекахъ, ранахъ и язвахъ. Миллеф. дѣйствуетъ благопріятно на условія кровообращенія въ брюшныхъ органахъ и на послѣдовательные застои крови въ легкихъ; поэтому средство это оказывается полезнымъ при геморроидальныхъ состояніяхъ,

при пораженіяхъ почекъ съ образованіемъ камней, при катаррахъ мочевого пузыря, при кровотеченіяхъ изъ прямой кишки, мочевого пузыря и легкихъ. Дѣленія: $\times 2$ — $\times 1$.

№ 78. Натрумъ муріатикумъ.

Natrum muriaticum (или *Natr. chlorat*). Солянокислый натръ. Поваренная соль.

Натр. муріатик. и)почти тождественное съ нимъ по дѣйствию Натр. Карбоник. (*Natrum carbonicum*, Углекислый натръ) вліяють глубоко на всѣ процессы въ организмѣ, на кровь и соки его; принимаемая болѣе продолжительное время, большія количества соли ведутъ къ развитію худосочія, о чемъ подробно сказано въ 3-й части. Привести весь патогенезъ, всѣ симптомы этихъ средствъ значило бы изобразить картину такихъ болѣзней, какъ малокровіе, блѣдная немочь, цынга и тому подобныя состоянія испорченности крови и лимфы.

Поэтому здѣсь приводятся лишь болѣе общіе отличительные признаки Натр. Муріат. (и Натр. Карбоник.): головокруженіе, головная боль, тошнота, ощущеніе слабости и обморочныя состоянія, сердцебиеніе. Покой или движеніе не имѣють особаго вліянія на улучшеніе или ухудшеніе страданій, но сплошь и рядомъ сухая и теплая погода дѣйствуютъ благотворно на такихъ больныхъ, влажная же и холодная погода ухудшаютъ ихъ страданія; болѣзненныя состоянія, особенно наиболѣе тяжелыя изъ нихъ, отличаются часто извѣстной періодичностью; наконецъ, замѣчается, въ отношеніи многихъ страданій, болѣе частое или болѣе сильное пораженіе лѣвой стороны тѣла, нежели правой.

Характеристика Натр. Муріат. въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 65 (Малярія), 156 (Неврозы), 216 (Хронич. катар. желудка). 636, 554, 578 (Бол. кожи). Кромѣ того, это средство упоминается во 2-ой части, да и вообще примѣняется еще при различныхъ другихъ болѣзняхъ.

Дѣленія: не ниже 3 сотеннаго, но еще цѣлительнѣе дѣйствуютъ болѣе высокія дѣленія. Натр. муріат. принадлежитъ къ тѣмъ средствамъ, болѣе глубокія и тонкія дѣйствія которыхъ возможны лишь тогда, когда они приведены въ состояніе потенцированно-динамическое (какъ при Калькареѣ, Графитѣ, Карбо и т. д.).

Длительность дѣйствія: болѣе частыхъ приѣмовъ до 6 недѣль, особенно при высокіхъ дѣленіяхъ.

Противосредства: *Карбо, Арсен., Камфора.*

№ 79. Нуксъ мосхата (или—мушата).

Nuxmoschata. Мускатный орѣхъ.

Приготавливается тинктура изъ освобожденныхъ отъ шелухи сѣмянъ съ виннымъ спиртомъ (также растиранія ихъ съ молочнымъ сахаромъ). Дѣятельныя начала: Миристины и эфирное масло.

Общіе симптомы: волнообразно нарастающія и спадающія боли

на ограниченно-малых частяхъ тѣла, при малѣйшей простудѣ; слабость и чувство разбитости, дрожаніе членовъ, безпокойство въ мысляхъ и невѣрность движеній, обморочныя состоянія; истерическіе припадки и судороги. Сонъ глубокій, крѣпкій, продолжительный, съ сладострастными сновидѣніями: сонливость и спячка въ теченіе дня; ночью сонъ безпокойный бываетъ отъ вздутія живота.

Настроеніе духа необычайно оживленное, смѣхъ по самому ничтожному поводу; измѣнчивость настроенія, быстрые переходы отъ шутокъ къ серьезу; молчаливость.

Явленія хроническаго катарра желудка съ преобладающимъ вздутиемъ живота газами, коликой: облегченіе страданій послѣ отхожденія обильныхъ вонючихъ газовъ. Разстройства въ другихъ органахъ, особенно въ мочеполовыхъ: состояніе раздраженія и слабости.

Нуксъ мосхата показана у истеричныхъ и ипохондричныхъ особъ при страданіяхъ, являющихся вслѣдствіе простуды.

Дѣленія: болѣе низкія. — Противосредства: *Камфора*, *Нуксъ вом.* — Подобныя средства: *Мосхусъ*, *Аса фетида*, *Амбра*.

№ 80. Платица (муріатика).

1) *Platina metallica*. Платина-металлъ (осадочная).

2) *Platina muriatica*. Платина солянокислая

Изъ 1) приготовляются растиранія съ молочнымъ сахаромъ до дѣленія и затѣмъ—разведенія.

Изъ 2)—водные растворы до $\times 4$ и затѣмъ спиртные.

По своему дѣйствію эти два препарата одинаковы; въ практикѣ чаще, однако, примѣняется *Платина муріатика*.

Примѣняется въ хроническихъ болѣзненныхъ состояніяхъ, также въ острыхъ, не сопровождающихся сколько нибудь значительными лихорадочными явленіями, когда преобладаютъ симптомы чрезмѣрнаго возбужденія со стороны нервовъ, исходящихъ изъ головного или спинного мозга, или состоянія разслабленія, раздражительной слабости, особенно въ области половой сферы и преимущественно у особи женскаго пола; въ послѣднемъ случаѣ менструація приходитъ раньше срока, она слишкомъ часта, сопровождается большой потерей крови и сильною болью въ маткѣ и яичникахъ.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 123 (Бол. нервовъ), 127 (Судороги), 156 (Неврозы), 167 (Сумасшествіе), 379 (Нервное сердцебіеніе).

Нѣкоторые общіе симптомы Платины: Ощущеніе дрожанія во всемъ тѣлѣ съ біеніемъ въ сосудахъ, общее познабливаніе при краснотѣ лица и холодѣ рукъ, слабость, усталость въ ногахъ, съ тошкливымъ въ нихъ чувствомъ и шатаніемъ во время стоянія; при ходьбѣ противъ вѣтра ощущеніе тошноты; улучшеніе въ страданіяхъ чувствуется въ комнатѣ при облокотившемся положеніи головы; состояніе помраченія при поднятіи головы изъ лежачаго положенія; ухудшеніе нѣ-

которыхъ припадковъ по вечерамъ. Склонность къ запору, особенно во время путешествія.

Дѣленія: Платина—не ниже 6-го, Платина муріатика—не ниже 3 сотеннаго дѣленія.

Длительность дѣйствія: въ болѣзняхъ—часами и днями; при испытаніи на здоровыхъ—до 4 недѣль.

Противосредства: *Пульсат.*, *Кольхикъ*. Съ своей стороны Платина антидотъ въ отношеніи *Плумбумъ*.

№ 81. Плумбумъ (ацетикумъ).

1) *Plumbum metallicum*. Свинецъ металлъ.

2) *Plumbum aceticum*. Уксуснокислый свинецъ, „свинцовый сахаръ“.

Изъ 1) приготавливаются растиранія съ молочнымъ сахаромъ и затѣмъ разведенія

Изъ 2)—водныя и спиртныя разведенія.

Болѣе или менѣе продолжительное воздѣйствіе даже небольшихъ количествъ свинцовыхъ соединений на организмъ вызываетъ въ послѣднемъ рядъ явленій отравленія, изъ которыхъ главныя суть слѣдующія: свинцовая колика, свинцовыя боли суставовъ, свинцовая анестезія (потеря чувствительности) и свинцовая слѣпота; кромѣ того, еще—разстройства со стороны мозга, параличи, тяжелыя пораненія почекъ и проч.

Характеристика Плумб. въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 146 (Параличъ), 230 (Запоръ), 235 (Боль живота), 300 (Хронич. катар. носа и глотки).

Примѣняется Плумб. преимущественно въ хроническихъ заболѣваніяхъ или, хотя и острыхъ, но протекающихъ безъ лихорадочнаго состоянія.

Суставныя боли, соответствующія Плумб., являются, большей частью, ночью; онѣ очень сильны и поражаютъ нижнія конечности, именно сгибаемые сухожилія, ощущаются въ суставахъ и костяхъ и облегчаются отъ умѣреннаго давленія.

Дѣленія: Плумб. — 3–6; Плумб. ацетик — ×3 и выше.

Длительность дѣйствія: смотря по частотѣ пріемовъ и дѣленіямъ—нѣсколько дней до нѣсколькихъ недѣль.

Противосредства: *Алюм.*, *Беллад.*, *Нуксѣ вом.*, *Платина*, *Сульф.* и сѣрные щелочи.

№ 82. Ранункулусъ.

1) *Ranunculus bulbosus*. Жабникъ или Лютикъ луковичный.

2) *Ranunculus sceleratus*. Жабникъ ядовитый.

Оба эти рода Лютика дѣйствуютъ въ общемъ одинаково. Приготавливается тинктура или эссенція изъ свѣжаго растенія. Основное дѣятельное вещество—Ранункулолъ, подобное Анемонину изъ Пульсатиллы.

Ранункулъ дѣйствуетъ на сывороточныя оболочки, особенно на

плевру, и вызываетъ явленія, какъ при воспаленіи (колотье въ боку), далѣе—на мышцы и чувствительные нервы, особенно на межреберные, и на верхнюю вѣтвь тройничнаго нерва, наконѣць—на мозгъ, головной и спинной, и на кожу.

Отличія между 1) и 2) Ранункул. заключаются въ слѣдующемъ: при 1-мъ слизистыя выдѣленія густыя, наприм. изъ носа, рта, влагалища, при 2-мъ же они болѣе водянистыя и менѣе острыя; Ранунк. 2-й сильнѣе дѣйствуетъ на кожу, печень и мочевые органы.

Къ общимъ симптомамъ Ранункула относятся: чувство разбитости во всѣхъ членахъ, сонливость, дрожаніе рукъ и ногъ; ощущеніе какъ бы изъязвленности въ болящемъ мѣстѣ; страданія ухудшаются въ сырую погоду и при переменѣхъ температуры, также при движеніи и отъ спиртныхъ напитковъ; наблюдается и періодичность нѣкоторыхъ симптомовъ.

Примѣняется преимущественно въ хроническихъ заболѣваніяхъ, сопровождающихся состояніемъ слабости и преобладающимъ ощущеніемъ холода; при ревматизмѣ мышцъ и суставовъ безъ опуханія тканей, при болѣзняхъ кожи (см. стр. 540, 564), при судорожныхъ разстройствахъ дыханія, при приливахъ крови къ легкимъ и сердцу, при хроническомъ плевритѣ, при водянкѣ почечнаго происхожденія; при катарахъ слизистыхъ оболочекъ (при катаррѣ носа и глотки см. стр. 301) при неѣдкихъ бѣляхъ и скудныхъ регулахъ; бѣли являются за недѣлю до и недѣлю спустя послѣ регуль.

Дѣленія: преимущественно низкія.

Длительность дѣйствія: при испытаніяхъ на здоровыхъ—нѣсколько недѣль.

Противосредства: *Бріонъ*, *Камфора*, *Пульсат.*, *Русъ*.

№ 83. Рододендронъ.

Rhododendrum chrysanthum. Горная роза золотоцвѣтная, Сибирская роза подснежная.

Тинктура готовится изъ высушенныхъ вѣтвей, листьевъ и цвѣтовъ.

Къ общимъ симптомамъ Рододендра относятся:

Боли въ суставахъ, рвущія и мѣняющія свое мѣсто, періодическія, исходящія какъ бы изъ небольшихъ, ограниченныхъ мѣстъ надкостницы и зависящія отъ переменъ погоды; ощущеніе ползанія мурашекъ и онѣмѣнія, подергиванія въ разныхъ мѣстахъ, особенно въ суставахъ, чувство разбитости, общая слабость, шатающаяся походка, большая чувствительность къ холоду и вѣтру.

Характеристику въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней см. стр.: 123 (Бол. нервовъ), 520 (Хронич. ревматизмъ сустава), 540 (Бол. кожи).

При наличности указанныхъ симптомовъ Рододендръ можетъ примѣняться и при остромъ ревматизмѣ, также при ломотѣ, при зубной боли (стихающей во время ѣды), при ревматическихъ воспаленіяхъ глазъ, при ушныхъ страданіяхъ, при нервной боли кишекъ, при вялыхъ

(мягкими массажами) испражненияхъ на низъ, при поносахъ отъ промокания и холода, при спазмѣ мочевого пузыря, при трипперѣ при водянкѣ и воспаленіи яичекъ, при нервной боли матки. Симптомы въ отношеніи яичекъ слѣдующіе: твердая опухоль съ склонностью къ атрофіи (сморщиванію) и ощущеніемъ какъ бы сдавливанія; тянущая и колющая боль въ сѣменномъ канатикѣ, простирающаяся до живота и до бедра.

Дѣленія: низкія.—Длительность дѣйствія: до 4 недѣль.

Противосредства: *Камф.*, *Клематисъ*, *Русъ* (послѣднія два средства также Ранукул. и подобны).

№ 84. Сабина.

Sabina juniperus. Казацкій можжевельникъ.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ.—Содержитъ въ себѣ эфирное масло, подобное терпентинному.

Дѣйствуетъ больше всего на мочеполовые органы, особенно же на матку, вызывая въ ней кровотеченіе. Къ симптомамъ Сабины относятся еще: боли въ суставахъ и костяхъ, слабость и усталость послѣ малѣйшихъ движеній, тяжесть въ членахъ и общая вялость, чувство общаго недомоганія, ощущеніе бѣній артерій во всемъ тѣлѣ съ ощущеніемъ въ немъ повышенной теплоты; улучшеніе чувствуется на свѣжемъ воздухѣ.

Къ болѣзнямъ, въ которыхъ Сабина примѣняется какъ цѣлебное средство, относятся: слишкомъ обильныя регулы; длящаяся дней 9, или кровотеченіе изъ матки въ необычное время; кровь красная, выдѣляется кусками; кровотечения съ потугообразными болями; угрожающій (въ 3-мъ мѣсяцѣ) выкидышъ; далѣе: болѣзненные пораженія костей и суставовъ, ломотныя боли (въ рукахъ и ногахъ); страданія мочевого пузыря и почекъ съ мочерѣзомъ, (моча содержитъ слизь, бѣлокъ и кровь); трипперъ у мужчинъ, съ опуханіемъ крайней плоти и сильными вообще воспалительными явленіями, также частыми, но безстрастными эрекціями.

Дѣленія: 3—6. При маточныхъ кровотеченияхъ можетъ пондобиться и дѣленіе ниже X3.

Длительность дѣйствія: при испытаніи на здоровыхъ—нѣсколько дней до 3 недѣль.

Противосредства: *Камфора*.—Подобныя: *Крокусъ*, *Рута*, *Беллад*

№ 85. Сангвинарія.

Sanguinaria canadensis. Кровавикъ канадскій.

Тинктура готовится изъ высушеннаго корня.

Сангв. дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистыя оболочки, особенно—дыхательныхъ органовъ. Она вызываетъ также разстройства

въ кровообращеніи. Больше и чаще поражается правая сторона тѣла, нежели лѣвая.

Сангв. надо имѣть въ виду при носовыхъ катаррахъ и полипахъ: очень обостренное обоняніе; запахи могутъ доводить больного до обморочнаго состоянія; жженіе и садненіе въ носу при текущемъ насморкѣ.

При мигрени: боли начинаются въ затылкѣ, идутъ черезъ всю голову и сосредоточиваются надъ правымъ глазомъ; боли настолько сильны, что больной не переноситъ свѣта и шума, зарывается головой въ подушки или упирается во что либо твердое, ища себѣ такъ облегченія; рвота во время болей; набуханіе венъ на вискахъ.

При ревматизмѣ: острья, колющія боли съ чувствомъ ободранности и тугости въ мышцахъ, ревматизмъ правой плечевой мышцы (также *Матезія карбоника*, *Феррумъ*, *Нуксъ моссата*) Зудъ кожи.

См. еще характеристику Сангвин. при неврозахъ (стр. 156) и при чахоткѣ легкихъ (стр. 354).

Сангв. умѣстна бываетъ въ перѣходное (климактерій) время у женщинъ: ощущеніе налетающаго жара со вздутіемъ желудка отъ скопленія газовъ. дурнопахнущія бѣли, обильныя съ запахомъ регулы, полипы матки, чувствительныя груди, угри на лицѣ, жженіе въ рукахъ и ногахъ.

Дѣленія. низкія и болѣе высокія.

№ 86. Селеній.

Selenium

Приготавливаются растиранія съ молочнымъ сахаромъ до 5 сотен. дѣленія и затѣмъ — разведенія.

Дѣйствуетъ на нервную систему, вызывая состояние общей слабости и быструю усталость при малѣйшемъ тѣлесномъ и умственномъ напряженіи; страданія ухудшаются въ жаркую погоду; больного тянетъ ко сну, но, поспавши, онъ чувствуетъ себя еще хуже. Потливость. Головные боли съ выпаденіемъ волосъ. Боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла. Явленія катарра дыхательныхъ путей. Половые симптомы; сперматорея; похотливость, но слабыя эрекціи; также отсутствіе полового влеченія; истеченіе сока предстательной железы при сидѣніи. Примѣняется въ практикѣ главнымъ образомъ только при такихъ состояніяхъ—быть можетъ, по той причинѣ, что средство это вообще еще недостаточно испытано.

Селеній при хроническомъ Ларингитѣ см. стр. 313, при болѣзняхъ кожи—стр. 540.

Дѣленія примѣняются съ успѣхомъ какъ болѣе низкія, такъ и высокія.

№ 87. Станнумъ.

Stannum praecipitatum. Олово осадочное.

Приготавливаются растиранія съ молочнымъ сахаромъ до 5 сотеннаго дѣленія, а далѣе—разведенія.

Примѣняется въ подострыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, особенно — нервной системы (см. стр. 124 и 157), съ постепеннымъ усиленіемъ страданій до высшей степени и съ постепеннымъ затѣмъ уменьшеніемъ ихъ; кромѣ того, съ улучшеніемъ отъ движенія и ухудшеніемъ въ спокойномъ положеніи, сопровождающими симптомами являются: головокруженіе, головная боль, явленія разстройства пищеваренія; также симптомы, наблюдаемые при глистахъ, поэтому Станнумъ часто замѣтно облегчаетъ страданія, причиняемые глистами. Есть, впрочемъ, основаніе предполагать, что онъ имѣетъ и прямое оглушающее вліяніе на глистовъ, и въ такомъ состояніи ихъ нетрудно вывести слабительнымъ средствомъ. — Показанія для Станнума при кашлѣ см. на стр. 354.—Станнумъ показанъ также при импотенціи съ сперматорреей. а у женщинъ—при боляхъ, сопровождающихся большой слабостію, и при опущеніи или выпаденіи матки.

Дѣленія: обычно низкія, но надо имѣть въ виду и высокія дѣленія, особенно при болѣзняхъ легкихъ.

Противосредство: *Цульсат*.—Подобныя: въ маточной сферѣ — *Сенн*, а въ нервной—*Арнит*, *Купрумъ* и *Цинкъ*.

№ 88. Стафизагрія.

Staphisagria. Соколка, Гридникъ.

Тинктура готовится изъ растертыхъ сѣмянъ этого растенія съ алкоголемъ.

Дѣйствуетъ преимущественно на нервную систему, на мочевые и половые органы, особенно на предстательную железу и на кожу.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 124 (Нервн. боли), 166 (Душевн. болѣзни), 188 (Зубная боль), 463 (Трипперъ), 476 (Полов. разстр. у мужчинъ), 541 (Болѣзни кожи).

Стафизагрія примѣняется еще и при другихъ болѣзненныхъ состояніяхъ, изъ которыхъ тутъ приводятся слѣдующія: ревматическія боли, также ломотныя, въ пальцахъ рукъ и ногъ; спазмы желудка со вздутіемъ отъ газовъ, боли кишекъ; слабость мочевого пузыря съ частымъ выдѣленіемъ малыхъ количествъ мочи, или послѣдовательнымъ отхожденіемъ ея каплями; болѣзни яичниковъ, болѣзненная чувствительность наружныхъ половыхъ частей у женщинъ, зудъ въ нихъ, какъ отъ ползанія насѣкомыхъ, жгучая боль (въ отношеніи послѣднихъ симптомовъ подобны *Анакардій* и *Мезереумъ*).

Дѣленія: преимущественно низкія

Длительность дѣйствія: до 3 недѣль.

Противосредство: *Камфора*.— Съ своей стороны Стаф.—антидотна къ Меркурію и Туѣ.

№ 89. Страмоній.

Datura Stramonium. Дурманъ.

Приготавливается эссенція изъ сока свѣжаго растенія или тинктура изъ растертыхъ въ порошокъ сѣмянъ съ 5 чч. виннаго спирта.

Основное дѣятельное вещество — Датуринъ (подобенъ Атропину изъ Белладонны, но дѣйствуетъ вдвое сильнѣе).

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на мозгъ, вызывая явленія маніи, неистовства. Въ другихъ отношеніяхъ Страмоній дѣйствуетъ подобно Беллад. и Гіосціамъ, отличаясь лишь тѣмъ, что вызываетъ болѣе сильныя разстройства въ области чувствъ. Приливы крови отъ Страмонія болѣе сильны, нежели отъ Белладонны, и явленія, имъ вызываемыя, не имѣютъ характера воспаленія, свойственнаго послѣдней.

Характеристика Страмонія въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 59 (Тифъ), 126 (Судороги), 139 (Астма), 161 (Манія), 167 (Сумасшествіе), 333 (Коклюшъ).

Дѣленія: 3 — 6.

Длительность дѣйствія: при испытаніи на здоровыхъ около 2 дней.

Противосредства: *Нуксъ вом.*, *Опій*, *Табакъ*, уксусъ, лимонъ; съ своей стороны Страмоній антидотенъ къ Меркур. и Плумб.— Подобныя средства: кромѣ Гіосціам. и Беллад., еще: *Агавикъ*, *Хамомилла* и *Ипация*.

№ 90. Туя.

Thuja occidentalis. Древо жизни.

Эссенція готовится изъ листьевъ съ виннымъ спиртомъ. Содержитъ въ себѣ острое эфирное масло.

Туя занимаетъ въ гомеопатіи первое мѣсто среди противосикозныхъ средствъ, т. е. она главное средство противъ послѣдствій конституціональнаго триппера (см. стр. 462), а также соотвѣтствуетъ многимъ страданіямъ, развивающимся на почвѣ лимфатическаго и смѣшаннаго тѣлосложенія (см. стр. 479), между прочимъ и раковому худосочию.

Главные симптомы Туи выражаются на кожѣ и со стороны мочевыхъ и половыхъ органовъ, и именно въ видѣ состояній раздраженія и измѣненныхъ выдѣленій. Характерны для Туи особенно бородавчатая разраженія (бородавки обыкновенныя и трипперныя кондиломы) на тѣлѣ.

Характеристика Туи въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 490 (Ракъ), 521 (Хрон. ревматизмъ сустава), 541, 580 (Бол. кожи).

Туя также одно изъ средствъ противъ вредныхъ послѣдствій оспенной прививки (стр. 76).

Патогенезъ Туи соотвѣтствуетъ, кромѣ указанныхъ болѣзней, еще многимъ другимъ болѣзненнымъ состояніямъ, при которыхъ имѣются явно выраженные нижеслѣдующіе общаго характера симптомы:

Ощущеніе сильной разбитости и усталости во всемъ тѣлѣ съ отвращеніемъ ко всякому движенію, слабость членовъ, особенно въ послѣбѣдненные часы; ощущение такое, какъ если бы отдѣльныя части тѣла были такъ рыхло между собою связаны, что онѣ какъ бы вотъ-вотъ готовы распасться; боли достигаютъ наивысшей степени часамъ къ тремъ утра или послѣ полудня. При этомъ страданію подвергается лишь одинъ органъ или одна какая-либо часть или ткань тѣла, и страданіе въ одномъ мѣстѣ прекращается, когда оно началось въ другомъ;

припадки страданія бывають часто періодическіе, приступами, являються большею частію въ покоѣ и проходятъ при движеніи (за исключеніемъ лишь боли въ суставахъ, при которой замѣчается обратное); боли на маленькихъ ограниченныхъ мѣстахъ исчезаютъ часто при надавливаніи и возвращаются, когда послѣднее прекращено. Поражается больше лѣвая сторона тѣла, нежели правая. Характерны для Туи большая переменчивость страданій и, какъ уже сказано, появленіе ихъ то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ тѣла.

Хорошіе результаты получаютъ какъ отъ низкихъ, такъ и отъ высокихъ дѣленій, въ случаяхъ же болѣе упорныхъ, застарѣлыхъ—высокія дѣленія предпочтительнѣе низкихъ.

Длительность дѣйствія: при испытаніяхъ на здоровыхъ около 6 недѣль.

Противосредства: *Камф.*, *Хамомила.*, *Сулф.*, *Меркур.*, *Пульсат.*, *Сабина.*, *Коккул.* Съ своей стороны Туя антидотъ Меркурія.—Подобныя средства—*Натр. сульфурик.* и *Аранеа діадема* (какъ противосикозныя).

№ 91. Ураніумъ нитрикумъ.

Uranium nitricum. Уранъ азотнокислый.

Примѣняется и солянокислый уранъ (*Uranium muriaticum*).

Растиранія съ молочнымъ сахаромъ и разведенія.

Изъ симптомовъ самые главные—со стороны мочеотдѣленія: очень обильное и частое мочеотдѣленіе, жженіе при этомъ въ мочевомъ каналѣ, боль въ области почекъ, бѣлокъ въ мочѣ. Кромѣ того: общая слабость, съ ощущеніемъ холода и головокруженіемъ; тяжесть головы, головная боль въ области лба и затылка, тупо-колющія боли въ вискахъ послѣ полудня или ночью; боль въ поясницѣ и крестцѣ; страданія глазъ; расстройства пищеваренія съ отвращеніемъ къ мясу, усиленная жажда, боль въ животѣ, съ скопленіемъ газовъ, запоръ.

Съ большимъ успѣхомъ примѣняется при заболѣваніяхъ почекъ съ чрезмѣрнымъ мочеотдѣленіемъ (сахарная болѣзнь стр. 503), или съ выдѣленіемъ бѣлка, особенно при наличности прочихъ подходящихъ симптомовъ,

Дѣленія: низшія — $\times 2$ — $\times 3$.

№ 92. Феррумъ и его препараты.

- 1) *Ferrum metallicum*, Желѣзо металлическое.
- 2) *Ferrum phosphoricum*, Феррумъ фосфорикумъ (фосфорокислая окись желѣза).
- 3) *Ferrum aceticum*, Феррумъ ацетикумъ (уксусно-кислая окись желѣза).
- 4) *Ferrum carbonicum*, Феррумъ карбоникумъ (углекислая окись желѣза).
- 5) *Ferrum citricum*, Феррумъ цитрикумъ (лимонокислая окись желѣза).
- 6) *Ferrum iodatum*, Феррумъ іодатумъ (іодистая окись желѣза).
- 7) *Ferrum sulfuricum*, Феррумъ сульфурикумъ (сѣрнистая окись желѣза).

Препараты желѣза примѣняются въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ; высшія дѣленія — также въ разведеніяхъ.

Въ составъ человѣческаго организма входитъ желѣзо въ количествѣ около 3 граммъ; ежедневно онъ извлекаетъ изъ пищевыхъ веществъ и выводитъ изъ себя черезъ кишечникъ (въ видѣ сѣрнистаго желѣза) около 5—6 сотыхъ грамма желѣза. Если принять это во вниманіе, равно какъ и то, что даже самые крѣпкіе желѣзистые ключи содержатъ также лишь мало желѣза (около 25 тысячныхъ частей грамма на литръ воды), то приходится признать, что для лѣчебныхъ цѣлей должны употребляться лишь малыя количества желѣза.

Желѣзо имѣетъ непосредственное дѣйствіе на кровоотворящіе органы, именно раздражающее, и въ этомъ отношеніи оно подобно Арсенику (мышьяку).

Явленія чрезмѣрныхъ продолжительныхъ пріемовъ желѣза выражаются со стороны всѣхъ органовъ тѣла; къ нимъ относятся: приливы крови къ мозгу съ зависящими отъ этого разстройствами; состоянія раздраженія въ спинномъ мозгу и въ исходящихъ отъ него нервахъ (особенно сѣдалищномъ), съ болями, онѣмѣніемъ и судорожными подергиваніями въ спинѣ и конечностяхъ; усиленіе сердечной дѣятельности; явленія катарра и прилива крови къ дыхательнымъ органамъ; разнаго рода разстройства въ пищеварительныхъ органахъ; также въ органахъ мочевыхъ и половыхъ. Приливъ крови въ одномъ мѣстѣ обусловливаетъ отливъ ея (обезкровленіе) въ другомъ мѣстѣ, а нарушеніе нормальныхъ условій обмѣна веществъ въ организмѣ влечетъ за собою малокровіе его и порчу крови (золотуху и проч.). — Многіе симптомы желѣза ухудшаются по вечерамъ и ночью, также въ покоѣ, улучшаются же отъ умѣреннаго движенія.

Характеристику желѣза въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней см. на стр. 124 (Невралгіи), 353 (Чахотка легкихъ), 379 (Нервное сердцебіеніе).

Кромѣ того, желѣзо показано при блѣдной немочи у молодыхъ дѣвушекъ въ періодъ формировація, со склонностію къ опуханію железъ; при приливахъ къ головѣ и кровотеченіяхъ изъ носа; при бѣлой горячкѣ; при ревматизмѣ плечевыхъ и бедренныхъ мышцъ, при кровепятнистой болѣзни, при водяночныхъ состояніяхъ, при хроническихъ носсахъ, при частыхъ поллюціяхъ съ сильнымъ возбужденіемъ половой сферы; при очень рѣдкихъ и скудныхъ регулахъ, съ большой чувствительностію половыхъ частей, при склонности къ выкидышамъ, при безплодіи, при маточныхъ кровотеченіяхъ и бѣляхъ. При всѣхъ подобныхъ состояніяхъ—у малокровныхъ субъектовъ.

Дѣйствіе приведенныхъ выше препаратовъ желѣза въ общемъ одинаково. Чаше всего въ практикѣ примѣняется *Феррумъ* (метал.). Дѣленія: 3 и болѣе низкія, также 6-е.—Длительность дѣйствія: нѣсколько часовъ до нѣсколькихъ недѣль, смотря по величинѣ и частотѣ пріемовъ.

Противосредства: *Аршика*, *Арсен.*, *Белл.*, *Гепар.* *Ипек.*, *Меркур.*, *Пульсат.*, *Вератр. альб.*

Подобныя средства: по дѣйствію на голову — *Белл.*, *Нуксъ вом.* *Хина*; на легкія — *Миллсфолій*; на мочевой пузырь — *Кантар.*, *Кюбаба*, *Эватор.*; на матку — *Сабина*.

О других препаратахъ желѣза можно сказать еще слѣдующее: **Феррумъ фосфорикумъ**, одно изъ 12-ти „тканевыхъ“ средствъ д-ра Шюслера, утверждающаго, что его 12 средствами, входящими и въ составъ организма, — разными минеральными солями (извести, желѣза, калия, натрія и магнезіи) и Силиціей — можно излѣчивать всѣ болѣзни *).

Это средство, по дѣйствию своему, подобно Нкониту и Гельземину и умѣстно въ первой стадіи воспаленій, у лицъ съ легко возбудимой сосудистой системой; по дѣйствию на дыхательные органы, оно приближается къ Фосфору. Примѣненіе при остромъ ревматизмѣ см. стр. 517. *Ферр. фосфорик.* полезно давать рядомъ съ *Калькар. фосфорика.*

Дѣленія: 3 — 6 (последнее рекомендуется д-ромъ Шюслеромъ).

Феррумъ ацетикумъ. При упорномъ малокровіи и сильной слабости. У дѣтей, быстро растущихъ и поэтому худощавыхъ, слабыхъ и блѣдныхъ. Дѣленія: низшія. — *Феррумъ ацетик.* *Θ* (Радемахера) рекомендуется при трихинахъ (стр. 293), также для малокровныхъ при выздоравливаніи послѣ острой болѣзни.

Феррумъ карбоникумъ. При блѣдной немочи съ расстройствами пищеваренія, кислой отрыжкой.

Феррумъ цитрикумъ. Въ такихъ же случаяхъ.

Феррумъ іодатумъ При золотухѣ, при воспаленіи мозга на почвѣ туберкулеза; при напирании матки книзу съ ощущеніемъ боли при сидѣніи.

Феррумъ сульфурикумъ При Базедовой болѣзни и блѣдной немочи.

Дѣленія вообще низкія.

№ 93. Филиксъ масъ.

Filix mas. Папоротникъ.

Эссенція готовится изъ корня. Для изгнанія ленточныхъ глистовъ примѣняется растертый въ порошокъ корень папоротника и вытяжка (экстрактъ) изъ него (см. стр. 286). Въ большихъ пріемахъ Филиксъ производитъ тошноту, рвоту и поносъ, и еще цѣлый рядъ явленій: ночное безпокойство и безсонницу, сильную тоску, обморочныя состоянія, вздутіе живота, боли въ животѣ, позывы на низъ безъ испражнений, повторныя кашицеобразныя испражненія; можетъ также вызвать кровотеченіе изъ матки, поэтому нельзя его брать въ изгоняющихъ дозахъ во время беременности. Папоротникъ изгоняетъ глистовъ (лентецовъ) тѣмъ, что умерщвляетъ ихъ, для чего онъ долженъ даваться въ достаточно крупныхъ дозахъ; въ малыхъ же, гомеопатическихъ дозахъ ($\times 1$ — $\times 3$) онъ устраняетъ нѣкоторыя расстройства, особенно нервныя, вызываемыя этими глистами.

*) Брошюра объ этихъ средствахъ д-ра Шюслера „Бюхимическая терапия“, составленная В. В. Борелемъ, стоитъ въ продажѣ 30 коп., съ перес. 41 коп.

№ 94. Фитолакка.

Phytolacca decandra Лаконоска, Американская кошениль.

Эссенция готовится изъ свѣжаго корня.

Основное дѣятельное вещество—Фитолактинъ.

Явленія отравленія отъ нѣсколькихъ граммъ корня или плодовъ этого растенія: тошнота, сильная рвота, поносы съ сильными болями въ животѣ, слюнотеченіе, воспаленіе слизистой оболочки рта и зѣва (миндалинъ), головная боль, помутнѣніе зрѣнія, головокруженіе, судороги и холодѣніе членовъ, холодный потъ.

Отъ не столь большихъ дозъ: общая слабость и разбитость, дрожаніе и подергиваніе членовъ, боли въ суставахъ, страданія, подобныя ревматическимъ, головныя боли. Бессонница ночью, большая сонливость днемъ; плачь во снѣ. Настроеніе апатичное, подавленное, вялое. Сердцебиеніе, неправильный съ перебоями пульсъ; малый, учащенный пульсъ. Явленія воспаленія и раздраженія слизистыхъ оболочекъ и кожи.

Ухудшеніе нѣкоторыхъ страданій отъ движенія и на свѣжѣмъ воздухѣ, за исключеніемъ головной боли, которая на вольномъ воздухѣ уменьшается; многія страданія сопровождаются ощущеніемъ жара.

Примѣняется съ пользой при гнилости рта, при свинкѣ, при ангинахъ, также при ревматическихъ боляхъ нервовъ и суставовъ; при ракѣ (стр. 490); изъ другихъ болѣзней, въ которыхъ надо имѣть въ виду Фитоллаку, надо упомянуть еще слѣдующія: воспаленіе грудныхъ железъ, яичекъ, боли матки съ бѣлями, трипперъ, геморрой съ болью въ заднемъ проходѣ, воспаленіе кишекъ, грудная жаба, охриплость

Дѣленія: низшія до Θ .

Противосредства: *Имач.*, *Сулф.*, *Опій*, кофе.

Подобныя средства: *Мезереумъ*, *Меркуръ*. *Нитри ацид.*, *Кали годат.* *Кали бихромъ*, *Русъ*.

№ 95. Хелидоній.

Chelidonium majus. Чистотѣль.

Эссенция готовится изъ свѣжаго корня.

Свѣжій сокъ изъ корня этого растенія вызываетъ на кожѣ воспалительную красноту и пузыри. Отъ большихъ дозъ появляется головокруженіе и обморочное состояніе, упадокъ мышечной силы и сердечной дѣятельности, одышка, сильное потѣніе.

При методическомъ испытаніи меньшихъ дозъ получаютъ слѣдующіе симптомы: общее недомоганіе съ потребностію лежать и отвращеніемъ къ движенію и всякой работѣ; большая усталость, тяжесть членовъ, общая разбитость, боли въ мышцахъ и суставахъ, дрожаніе головы и конечностей, приливы и волненіе крови; душевное безпокойство, угнетенное настроеніе; сонливость днемъ, безпокойный, полный сновидѣній, сонъ ночью.—Изъ внутреннихъ органовъ поражаются всего больше печень и вообще органы пищеваренія. Влеченіе къ горячему кофе, отвращеніе къ холоднымъ напиткамъ, къ мясу и вареной

пищѣ; запоры, но бываютъ и поносы, особенно ночью. — Ухудшеніе или появленіе многихъ страданій въ сырую, холодную погоду, улучшение— въ теплой комнатѣ.

Хелидоній чаще всего находитъ свое примѣненіе при болѣзняхъ печени, равно какъ вообще въ заболѣваніяхъ, сопровождающихся разстройствомъ этого органа; далѣе, онъ можетъ быть умѣстенъ въ тифозныхъ и перемежающихся лихорадкахъ, при воспаленіяхъ легкихъ и плевры, особенно правостороннихъ, при катаррѣ дыхательнаго горла съ выдѣленіемъ скудной слизистой мокроты; при ревматизмѣ и подагрѣ, при частыхъ головныхъ боляхъ съ головокруженіемъ, при неправильныхъ регулахъ съ обильными кровями, болями и состояніями слабости и проч. Характеристику при рахѣ см. стр. 489.

Дѣленія: низшія до Θ , также и высшія. Длительность дѣйствія: нѣсколько дней.

Противосредства: *Камфора, Бріонія, Фосфоръ*. Подобныя средства: *Меркуръ, Бріонія*.

№ 96. Цикута.

Cicuta virosa. Вехъ ядовитый.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня.

Къ симптомамъ ядовитаго веха относятся: приливы крови къ мозгу, головному и спинному, къ легкимъ и брюшнымъ органамъ, ощущеніе ползанія мурашекъ въ членахъ; жженіе, давленіе, ломота въ разныхъ частяхъ; судорожныя состоянія, съ потерей сознанія, своеобразными движеніями головы и туловища: блѣднымъ, синеватымъ лицомъ, выпячиваніемъ глазъ, пѣной у рта, малымъ и едва замѣтнымъ дыханіемъ. Такіе припадки случаются большей частью безъ всякихъ предвѣстниковъ. Сонъ крѣпкій и продолжительный, или часто прерывающійся, съ головными болями и потомъ. Настроеніе грустное, угнетенное, нелюдимое, тоскливое. Общая слабость, дрожаніе членовъ, ощущеніе какъ бы набряклости тѣла. Темныя, синеватыя пятна на кожѣ, всюду зудъ и жженіе, особенно на лицѣ и рукахъ, также боль, а спустя дней девять шелушеніе.

Средство это можетъ быть полезно при душевныхъ болѣзняхъ, при пораженіяхъ головного и спинного мозга съ судорогами, при спазмѣ желудка съ кровавой рвотой, при параличѣ мочевого пузыря, при наклонныхъ страданіяхъ съ значительнымъ нарушеніемъ нервной дѣятельности.

Дѣленія: X3—3. — Длительность дѣйствія: большихъ пріемовъ— 3—4 недѣли.

Противосредства: *Камфора, Арника*; съ своей стороны—антидотъ Опія.

Подобныя средства: *Аконитъ, Стригн*.

№ 97. Цимицифуга или Актеа рацемоза.

Cimicifuga или *Aktea racemosa*. Воронецъ высокий, Стручекъ гремучій.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня.

Основное дѣятельное вещество — Цимицифугинъ или Макротинъ.

Вызываетъ состояніе возбужденія и раздраженія мозговой и нервной системы съ послѣдующимъ разслабленіемъ, дрожаніемъ, обморочнымъ состояніемъ, и вліяетъ особенно еще на женскіе тазовые органы, вызывая въ нихъ ощущеніе напиранія книзу, приливъ крови, преждевременную менструацію, потугообразныя боли. Боль въ глазахъ, въ обоихъ одновременно, шумъ въ ушахъ. Боли, какъ при ревматизмѣ, въ туловищѣ и членахъ; онѣмѣніе и слабость рукъ и ногъ. Сердцебіеніе, съ тупой болью въ области сердца и тянущей болью въ лѣвой рукѣ; зябкость и холодный потъ. Сухой, отрывистый, щекочущій кашель. Разстройство пищеваренія съ дурнымъ запахомъ изо рта. Учащенные позывы на мочеиспусканіе съ обильнымъ выдѣленіемъ мочи.

Примѣняется съ пользой во многихъ болѣзняхъ, сопровождающихся подобными указанными выше симптомами, особенно же при невралгіяхъ (стр. № 124), душевныхъ болѣзняхъ (стр. 167), неврозахъ, при воспаленіи мозговыхъ оболочекъ, дыхательныхъ органовъ, при болѣзняхъ сердца (грудной жабѣ), при болѣзняхъ женскихъ половыхъ органовъ, при расстройствахъ зрѣнія отъ приливовъ крови къ глубокимъ тканямъ глазъ, при сильномъ шумѣ въ ушахъ нервного характера (въ тинктурѣ).

Дѣленія: низкія до 0. — Длительность дѣйствія: нѣсколько недѣль.

Противосредства: *Кафѳора*, *Беллад.*

Подобныя средства: *Каулоф.* и *Секале* (по дѣйствію на матку), *Акон.* (въ отношеніи ревматизма), *Пинац.* (на нервн. состояніе), *Дигитал. Колютик.* (сердце и мышцы).

№ 98. Цинкъ.

1) *Zincum metallicum praecipitatum* Цинкъ (металлъ) осадочный.

2) *Zincum sulfuricum*. Цинкъ сѣрноокислый.

3) *Zincum cyanatum*. Цинкъ ціанистый.

4) *Zincum valerianicum*. Цинкъ валеріановый.

Чаще въ практикѣ примѣняются 3) и 4) препараты; 1) больше при чистосудорожныхъ состояніяхъ, а 2) имѣетъ больше наружное примѣненіе — при воспаленіяхъ слизистыхъ оболочекъ.

Приготавливаются растиранія съ молочнымъ сахаромъ — изъ 1), 3), 4) — до 5 дѣленія и далѣе — разведенія.

Цинкъ есть выдающееся нервно-мозговое средство, и къ главнымъ его симптомамъ относятся: рвущія и дергающія боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла, ощущеніе распиранія въ стѣнкахъ грудной клѣтки, біеніе артерій во всемъ тѣлѣ, ощущеніе ползанія мурашекъ, чувство общей разбитости. Усталость, вялость и слабость съ дрожаніемъ членовъ и обморочнымъ состояніемъ. Тяжесть во всѣхъ членахъ, особенно въ нижнихъ конечностяхъ. Невыносливость къ малѣйшему шуму, нервная слабость. Ухудшеніе многихъ страданій послѣ обѣда и къ вечеру — также отъ вина. Отвращеніе къ теплымъ кушаньямъ, къ мясу и сладостямъ.

Характеристику въ отношении нѣкоторыхъ болѣзней см. на стр. 60. (Тифъ), 126 (Судороги), 157 (Неврозы), 166 (Душевн. бол.) Цинкъ умѣстенъ и при многихъ другихъ заболѣваняхъ, сопровождающихся рѣзкоповышенной нервной возбудимостію, между прочимъ и половой подобно Платинѣ, Сепи и Туѣ).

Дѣленія: 3—6 и болѣе высокія. Длительность дѣйствія: при испытаніяхъ на здоровыхъ—до 2 недѣль и больше.

Противосредства. *Камфора, Гепарь сульф., Итиция*; съ своей стороны — противъ *Барита карб* Дѣйствіе цинка усиливается отъ *Нукеъ вом*

№ 99. Эскулусъ.

Aesculus hippocastanum. Лжекаштанъ конскій.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ, очищенныхъ отъ шелухи сѣмянъ, также—растираніе всего плода съ молочнымъ сахаромъ Содержитъ въ себѣ дубильныя и горькія вещества.

Дѣйствуетъ особенно на прямую кишку, вызывая въ ней приливъ и застой крови, набуханіе ея венъ, съ ощущеніемъ въ ней какъ бы осколковъ дерева, и съ болью въ поясницѣ. Къ общимъ же симптомамъ Эскул. принадлежатъ: головокруженіе, тяжесть головы, трудное произношеніе словъ, помутненіе поля зрѣнія; тяжесть и параличная слабость спины, судорожное стягиваніе затылочныхъ мышцъ (одностороннее); тошнота, отвращеніе къ пищѣ, рвота, упорный запоръ, твердая, узловатая испражненія. Сильно болящія шишки у задняго прохода, темнокрасныя.

Дѣленія низкія: —×2—×3—3 и болѣе высокія

Подобныя средства *Нукеъ вом*, *Коммисонія*

№ 100. Этуза.

Aethusa cynapium. Собачья петрушка ядовитая

Эссенція готовится изъ свѣжаго (цвѣтушаго) растенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервную систему и на пищеварительныя органы, вызывая въ первой состояніи сильнаго ослабленія со склонностію къ судорогамъ и окоченѣлости членовъ, а въ послѣднихъ, т. е въ органахъ пищеваренія—явленія не ослабленія, а застою крови въ нихъ, развивающихся на почвѣ нервнаго разслабленія мельчайшихъ сосудовъ въ ихъ тканяхъ Нижнія конечности поражаются въ большей степени, нежели верхнія Улучшеніе страданій на вольномъ воздухѣ, ухудшеніе въ закрытомъ помѣщеніи Рядомъ съ явленіями диспепсіи наблюдается болѣзненное вздутие живота, а также набуханіе и болѣзненность печени. Жидкія съ желчью перемѣшанныя испражненія, сопровождающіяся болѣзненнымъ жиленіемъ. Синія подкожныя пятны на животѣ.

Примѣняется въ болѣзняхъ желудка и кишокъ, имѣющихъ нервное происхожденіе, а не воспалительное, съ преобладающимъ ощущеніемъ холода, частымъ мочеотдѣленіемъ, рвотой и коликой, боль-

шимъ упадкомъ силъ, слабостью ногъ, головокруженіемъ и обморочнымъ состояніемъ. При рвотѣ у маленькихъ дѣтей большими, иногда зеленоокрашенными кусками свернутого молока.

Дѣленія низкія Противосредства: *Камфора*, *Купр Конкумъ*, *Коффеа*.

№ 101. Агарикусъ.

Agaricus muscarius Мухоморъ.

Тинктура готовится изъ свѣжаго гриба (съ 2 ч.ч. спирта); растиранія съ молочнымъ сахаромъ по сотенной системѣ.

Основное дѣятельное вещество — Аманитинъ

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервныя центры и на сердце; На мозгъ дѣйствуетъ подобно алкоголю, но производитъ болѣе сильн. ное головокруженіе и бредъ и увеличиваетъ силу мышцъ

Къ симптомамъ его относятся:

Чрезмѣрная чувствительность всего тѣла, болѣзненность всѣхъ членовъ, особенно ногъ, съ облегченіемъ отъ умѣренного, медленнаго движенія но съ послѣдующимъ чувствомъ слабости и тяжести боли проявляются крестообразно, какъ, наприм., въ лѣвой рукѣ правой ногѣ. Большая чувствительность къ холодному воздуху. Мышечное дрожаніе, какъ при Страмони, подергиванія, судорожныя состоянія Сонливость днемъ, частыя пробужденія ночью. Настроение оживленное беззаботное, циническія выходки; экстазныя состоянія; все бы пѣлъ, декламировалъ и т. п.; такія состоянія смѣняются и явленіями пониженной энергии, вялостью, придавленностью, слабостью. Руки и ноги холодны и синеваты; сильный жгучій зудъ на разныхъ мѣстахъ тѣла.

Агарикъ можетъ быть умѣстенъ въ подходящихъ случаяхъ при судорогахъ, дрожаніи членовъ, зудящихъ накожныхъ сыпяхъ, венозныхъ застояхъ, при сильномъ половомъ возбужденіи съ ослабленной половой способностью и упадкомъ силъ послѣ удовлетворенія. Примѣняется вообще въ случаяхъ не острыхъ, а хроническихъ.

Дѣленія преимущественно низкія до Ө

Длительность дѣйствія смотря по величинѣ и частотѣ приѣмовъ, нѣсколько часовъ до нѣсколькихъ дней.

Противосредства: Камфора, вино, кофе. Отъ растительныхъ кислотъ дѣйствіе Агарика усиливается.

Подобныя средства: *Гюсси*, *Каннаб*, *Опій*, *Цимицифуга*.

№ 102. Алюмина, Алюмень и Алюминій.

Aluminium, Глини (Алюминій), основа глины, принадлежитъ къ наиболѣе распространеннымъ въ природѣ элементамъ (металламъ)

Alumina или *Aluminium oxydatum* (Алюмина) водная окись алюминія, чистый глиноземъ.

Alumen (Алюмень), калиносоѣрное соединеніе алюминія, квасцы, при нагрѣваніи теряетъ свою кристаллизационную воду* и превращается въ рыхлый бѣлый труд орастворимый порошокъ, въ „жженныя квасцы“),

Изъ этихъ препаратовъ больше всего испытана **Алюмина**, дѣй-

ствующая главнымъ образомъ на нервы, исходящiе изъ спинного мозга, и на толстыя кишки, но также и на прочiе органы, равно какъ на кожу и слизистыя оболочки. Для дѣйствiя на нервномозговую систему предпочитается **Алюминiй**, а на прочiе органы—*Алюмина*; также, но рѣже—*Алюменъ*, особенно при болѣзняхъ слизистыхъ оболочекъ.

Къ симптомамъ Алюмина относятся:

Приливы къ головѣ, ослабленiе мозговой дѣятельности, нервныя боли, особенно въ спинѣ и конечностяхъ; чувство сильной слабости во всемъ тѣлѣ, особенно въ ногахъ, съ дрожанiемъ послѣднихъ и судорожными подергиванiями. Спазмъ или параличъ вѣкъ, ослабленiе зрѣнiя. Шумъ въ ушахъ. Явленiя катарра (сухого) дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ и проч.

Страданiя появляются или ухудшаются послѣ обѣда, также вечеромъ, особенно въ покоѣ и въ закрытомъ помѣщенiи, улучшаются же или проходятъ отъ умѣреннаго движенiя на свѣжемъ воздухѣ. Общая слабость; больного тянетъ все лежать, между тѣмъ при лежанiи слабость еще больше ощущается, и чувствуется безпокойство въ членахъ

Примѣняется вообще въ хроническихъ случаяхъ.

Характеристика въ отношенiи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 200 (Хрон. катарръ нѣба и глотки), 230 (Запоръ), 300 (Хрон. катар. носа), 535 (Бол. кожи). Кроме того, Алюмина примѣняется еще и при другихъ болѣзняхъ: при неврозахъ, при спинной сухоткѣ (Алюминiй); при упорныхъ болѣзняхъ глазъ и ушей; при чрезмѣрной половой возбудимости съ частыми поллюцiями; при упорныхъ воспалительныхъ состоянiяхъ половыхъ органовъ.

Дѣленiя: 3—6 и болѣе высокiя. Длительность дѣйствiя: 3—4 нед.

Противосредства: *Брионъ*, *Игнация*, *Хамомилла*, *Камфора*. Совмѣстимо особенно съ *Лаксз.* и *Сульф.*

Подобныя средства. *Барита*, *Конюмъ*, *Шлужб.*

№ 103. Амбра.

Ambra grisea. Амбра сѣрая.

* Получается изъ внутренностей и выдѣленiй потъ-рыбы. Сильно пахучее вещество.

Приготавливаются растиранiя съ молочнымъ сахаромъ и тинктура

Основные дѣятельныя вещества: Амбринъ, Бензойная кислота и летучiя ароматическiя вещества.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервную систему, вызывая рядъ истерическихъ симптомовъ. Улучшенiе страданiй при умѣренномъ движенiи на свѣжемъ воздухѣ. Забывчивость и поспѣшность въ движенiяхъ; время кажется слишкомъ медленно протекающимъ. Сонъ безпокойный, съ частыми пробужденiями, трудное и позднее засыпанiе вслѣдствiе дѣловыхъ заботъ и т. п.; возбуждающiя, сладострастныя сновидѣнiя. Сухость слизистыхъ оболочекъ. Судорожный кашель; кашель усиливается, когда присутствуютъ чужiе; стѣсненiе въ груди. Раз-

стройство пищеварения, съ болями въ животѣ; геморрой съ колющей болью и зудомъ въ заднемъ проходѣ. Мутная моча съ осадкомъ и рѣзкимъ запахомъ. Зудъ половыхъ частей.

Примѣняется въ хроническихъ случаяхъ болѣзней, при отсутствіи воспалительныхъ явленій, но съ преобладаніемъ нервозности, особенно у худощавыхъ женщинъ, и при наличности указанныхъ симптомовъ. Между прочимъ при болѣзняхъ кожи (стр. 535).

Дѣленія: 3-ье и болѣе высокія.

Длительность дѣйствія. 4—6 недѣль.

Противосредства: *Камф.*, *Нуксъ vom.*, *Пульсат.*, *Стафизаурия*.

Подобныя средства *Аса. фет.*, *Мосхусъ*, *Валериана*.

№ 104. Аммоній броматъ см. подъ № 49.

№ 105. Аса (или Аза) фетида.

Asa foetida. Вонючая камедь.

Получается изъ востока (Персіи) въ видѣ высушеннаго смолистаго вещества, крайне непріятнаго запаха, и изъ него готовится тинктура (также растиранія съ молочнымъ сахаромъ).

Дѣйствуетъ не такъ на мозгъ, головной и спинной, какъ на нервныя сплетенія брюшной и тазовой полости; отсюда—состоянія раздраженія органовъ этихъ полостей, желудка, кишекъ и проч., съ приливами и застоями крови. Въмѣстѣ съ тѣмъ повышается дѣятельность и другихъ органовъ и тканей; у кормящихъ женщинъ, наприм., увеличивается отдѣленіе молока; гноящіяся мягкія ткани и кости съ жидкимъ, гниlostнымъ выдѣленіемъ получаютъ болѣе доброкачественный характеръ.

По симптомамъ своимъ Аса фетида соотвѣтствуетъ неврозамъ, при которыхъ чаще всего и примѣняется (характеристику см. на стр 154). Кромѣ того она примѣняется съ пользою при язвахъ и костоѣдѣ указаннаго характера.

Дѣленія: при неврозахъ—низкія, 3 до 1; при язвахъ и болѣзняхъ костей—среднія и болѣе высокія дѣленія предпочтительнѣе.

Длительность дѣйствія: большихъ пріемовъ—до 14 дней, меньшихъ—нѣсколько часовъ.

Противосредства: *Камфора*, *Хина*, *Кауст.*, *Пульсат.*

Подобныя средства; въ отношеніи нервовъ—*Амбра*, *Мосхусъ*, *Валериана*; въ отношеніи язвъ и костей: *Аурумъ*, *Меркуръ*, *Фосфоръ*, *Силиц.*, *Ацид. флуоръ*.

№ 106. Берберисъ.

Berberis vulgaris. Барбарисъ обыкновенный.

Тинктура готовится изъ корневой ~~кору~~ коры.

Основное дѣятельное вещество—Берберинъ.

Дѣйствуетъ преимущественно на почки, мочевой пузырь и печень. Къ общимъ симптомамъ относятся: общая слабость, замедленный пульсъ, чувство разбитости въ членахъ; боли въ костяхъ и суставахъ, съ припуханіемъ тканей; расстройства и боли ухудшаются отъ движенія, въ послѣобѣденные часы, и выступаютъ они чаще на лѣвой сторонѣ тѣла. Колотье и зудъ въ кожѣ, особенно — волосистой части головы и лица. Приливы къ головѣ. Боль въ поясницѣ, простирающаяся въ разныя стороны. Расстройства пищеваренія. Боль въ области почекъ и явленія раздраженія мочевого пузыря. Половая слабость, съ непріятными и болѣзненными ощущеніями въ половомъ органѣ.

Берб. умѣстенъ въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣются воспалительныя (не высокой степени) явленія и приливы съ застоями въ нѣсколькихъ органахъ полости живота и таза, при наличности указанныхъ симптомовъ.

Дѣленія: $\times 1$. Длительность дѣйствія; 1—2 дня.

Противосредство: *Камфора*. Подобныя средства: *Капсик.*, *Нукъ вом.*

№ 107. Бисмутъ.

Bismuthum nitricum praecipitatum. Азотнокислый висмутъ. Бѣлила.

Приготавливаются растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

Отъ большихъ приѣмовъ получаютъ: рвота, поносъ, колика, головокруженіе, расстройства въ органахъ чувствъ, бредъ, подергиванія, спазмъ сердца и легкихъ; испражненія принимаютъ темносѣрый видъ или черный. Продолжительное употребленіе бѣлилъ, съ косметической цѣлью, вызываетъ нерѣдко лицевою боль, подергиванія лицевыхъ мышцъ и даже параличи ихъ.—Отъ меньшихъ приѣмовъ: слабость ногъ, чувство разбитости, мышечная боль и дрожаніе рукъ и ногъ.

Поэтому въ малыхъ дозахъ Бисмутъ можетъ быть цѣлительнымъ средствомъ, въ подходящихъ случаяхъ, при судорогахъ лицевыхъ мышцъ, при тикѣ, при частичномъ параличѣ ихъ, особенно же при спазматической боли въ желудкѣ (съ усиленнымъ выдѣленіемъ слюны и отрыжкой), при воспаленіи желудка и кишекъ; при слабости, вродѣ параличной, ногъ и дрожаніи рукъ; при страданіяхъ сердца съ стѣсненіемъ въ груди.

Дѣленія: $\times 2$ — $\times 1$, также болѣе крупныя (грановыя) дозы.

Длительность дѣйствія: нѣсколько часовъ до нѣсколькихъ дней, смотря по величинѣ и частотѣ приѣмовъ.

Противосредства: *Нукъ вом.*, *Капсик.*, *Калькар. карб.*

№ 108. Вакцининъ.

Vaccinium. Оспенный ядъ. Коровья оспенная лимфа.

Вакцининъ, для гомеопатическихъ цѣлей, примѣняется въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ или въ спиртныхъ разведеніяхъ.

О вакцининѣ, какъ о средствѣ, излѣчивающемъ и предупреждающемъ вредныя послѣдствія оспенной прививки, сказано на стр. 76. Къ этимъ вреднымъ послѣдствіямъ относятся: упорныя назожныя сыпи, частое познабливаніе, невральгическія боли. Прививка оспы можетъ вызвать взрывъ туберкулеза въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ дотолѣ находился въ скрытомъ, дремлющемъ состояніи.

На основаніи такихъ фактовъ, нѣкоторые врачи-гомеопаты считаютъ Вакцининъ, въ отношеніи указанныхъ разстройствъ, гомеопатическимъ средствомъ и помимо прививки, когда они подобны вызываемымъ имъ явленіямъ въ организмѣ и имѣютъ въ основѣ своей испорченность крови и соковъ (дискразію).

Дѣленія: 3 и болѣе высокія. Противосредство: *Туя*.

Подобное средство: *Вариолинъ*, т. е. лимфа изъ человѣческой оспенной пусулы. О *Вариолинѣ* можно сказать вообще то же, что о *Вакцининѣ*.

№ 109. Геллеборусъ.

Helleborus niger. Зимняя роза.

Тинктура готовится изъ высушеннаго корня.

Основныя дѣятельныя вещества: Геллеборейнъ (наркотическое) и Геллеборинъ (ѣдкое)

Имѣетъ мѣстное раздражающее дѣйствіе на слизистыя оболочки и вначалѣ возбуждающее, а затѣмъ парализующее дѣйствіе на центральную нервную систему, особенно на солнечное сплетеніе и сердечныя нервы.

Симптомы Геллебора таковы, что дѣлаютъ его умѣстнымъ при такихъ болѣзняхъ, какъ: душевныя разстройства, особенно когда они сопровождаются жестокими головными болями и приливами къ мозгу; воспаленіе мозга, съ водянкой головы и выдѣленіемъ лишь малыхъ количествъ темной и мутной мочи; судорожныя состоянія; пораженія сердца, грозящія параличемъ его; холероподобныя или дизентерическаго рода пораженія кишокъ, воспаленіе почекъ и слабость мочевого пузыря; упорныя назожныя сыпи, злокачественная малярія, скарлатинная водянка.

Дѣленія: низшія до Θ (чистая тинктура часто предпочтительнѣе бываетъ, особенно при скарлатинной водянкѣ, также мозговой).

Длительность дѣйствія: 3—4 недѣли.

Противосредства: *Камфора*, *Хина*.

Подобныя средства: *Аписъ*, *Каммисъ*, *Апоцин*.

№ 110. Діоскореа.

Dioscorea villosa. Іамсъ.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня.

Основныя дѣятельныя вещества: Сапонинъ и Діоскорейнъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на органы пищеваренія и нервную систему. Въ Америкѣ Діоскор. считается въ ряду главнѣйшихъ гомеопатическихъ лѣкарствъ.

Боли, соотвѣтствующія этому средству, имѣютъ перемежающійся характеръ и являются приступами; ухудшаются отъ движенія, отъ стоянія, отъ надавливанія и на вольномъ воздухѣ; ухудшаются вечеромъ и ночью, при лежаніи скорчившись. Боли особенно въ животѣ, коликообразныя; боли и въ другихъ частяхъ тѣла, особенно въ поясницѣ и конечностяхъ.

Диоскореа соотвѣтствуетъ особенно такимъ больнымъ, которые страдаютъ, между прочимъ, слабой пищеварительной силой и обильнымъ образованіемъ газовъ въ кишкахъ. На основаніи еще другихъ своихъ симптомовъ, Диоскореа съ большой пользой примѣняется при пораженіяхъ печени и желчнаго пузыря, для облегченія болей въ нихъ, равно какъ для болѣе легкаго прохожденія желчныхъ камней; также при почечной коликѣ. Далѣе, Диоскореа очень полезна бываетъ при поносѣ, гоняющемъ утромъ изъ постели, при холеринѣ и дизентеріи, при тифлитѣ и аппендицитѣ; также при ревматическихъ и невралгическихъ страданіяхъ, при ишіасѣ; наконецъ, при геморроѣ и при сперматорреѣ вслѣдствіе половой слабости, при частыхъ поллюціяхъ съ слѣдующей слабостью, особенно въ колѣнахъ

Дѣленія: низкія, $\times 3$ и ниже до Θ .

Подобныя средства; *Колоцитъ*, *Нуксъ вом.*, *Хамомил*, *Русь*, *Сульфуръ*

№ III. Кардуусъ маріанусъ.

Carduus marianus. Марвинъ татарникъ.

Тинктура готовится изъ сѣмянъ и корня.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на печень. Симптомы этого средства — слѣдующіе:

Бѣловатый налетъ на языкѣ, горькій вкусъ, изжога, отсутствие аппетита, тошнота и рвота кислымъ и желчнымъ; пустая отрыжка послѣ приѣма пищи, боль въ желудкѣ, ослабленное пищевареніе. Боль въ правой сторонѣ груди, въ области нижнихъ реберъ, гдѣ печень; рѣзь и урчаніе въ животѣ, запоръ по нѣскольку дней, или жидкія испраженія, темныя, зеленоватыя или свѣтложелтыя. Моча вначалѣ очень свѣтлая, затѣмъ все болѣе темная. Общая слабость и разбитость, настроеніе удрученное, раздражительное. Тупая головная боль, особенно на правой сторонѣ.

Примѣняется при пораженіяхъ печени съ поносомъ или запоромъ, при желчныхъ камняхъ; Кардуусъ оказывался полезнымъ также при другихъ болѣзняхъ, при кашлѣ съ колотьемъ въ боку, при пораженіяхъ плевры, при приливахъ къ маткѣ, но болѣе точныхъ показаній для послѣднихъ случаевъ пока не имѣется.

Длительность дѣйствія: нѣсколько часовъ.

Дѣленія: $\times 1$; предпочтительнѣе, однако, бываетъ чистая тинктура (Θ).

№ 112. Кали бромать.

Kalium bromatum. Бромистый калий.

Примѣняется въ водныхъ или водноспиртныхъ растворахъ

Отъ большихъ дозъ бромистаго калия получается слабость и притупленность, тѣлесная и душевная; чувство онѣмнѣнія въ кожѣ тѣла, съ высыпаніемъ вродѣ угрей или прыщей, разслабленность мышцъ и дрожаніе членовъ, судорожныя состоянія; слабость памяти и соображенія, затрудненность рѣчи. тяжесть и боль головы и головокруженіе; ослабленіе зрѣнія и слуха; ослабленіе сердца; явленія раздраженія слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ; усиленное мочеотдѣленіе; ослабленіе половой силы и полового влеченія.

Несмотря на такого рода патогенезъ, бромистый калий до сей поры пока очень мало примѣняется въ практикѣ для цѣлей чисто гомеопатическихъ и считается больше палліативнымъ, чѣмъ излѣчивающимъ средствомъ, и именно въ случаяхъ необычайно сильной нервно-мозговой возбудимости, какъ манія (161), судорожныя болѣзни (паду-чая) и т. п., въ каковыхъ болѣзняхъ онъ можетъ дѣйствовать временно успокаивающе только въ болѣе крупныхъ дозахъ.

Въ малыхъ дозахъ Кали бромат. можетъ быть умѣстенъ при нѣкоторыхъ накожныхъ сыпяхъ. какъ, наприм., при красныхъ угряхъ (стр. 554).

Дѣленія: $\times 2$ — $\times 1$ до грановыхъ дозъ.

№ 113. Коллинсонія.

Collinsonia canadensis. Коллинсонія Канадская

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

Американское народное средство противъ поврежденій (какъ Арника). также противъ болѣзней мочевого пузыря и мочевыхъ камней, пострѣла, коклюша.

При методическомъ испытаніи Коллинсоніи получаютъ слѣдующіе симптомы;

Тупыя боли въ головѣ и во лбу, боли въ лѣвомъ вискѣ, стучаніе въ головѣ съ ощущеніемъ распиранія; желтый цвѣтъ кожи у глазъ; боли, какъ при ревматизмѣ, въ рукахъ и ногахъ, Учащенное сердцебиеніе при малѣйшемъ движеніи или возбужденіи; кровохарканіе съ отрывистымъ, короткимъ кашлемъ; боль и стѣсненіе въ груди. Языкъ желтообложенъ, горькій вкусъ, усиленный аппетитъ, тошнота, рвота, боль въ надбрюшіи во время и послѣ испражненія; боль въ области печени, приливы крови къ тазовымъ органамъ, геморрой; ощущеніе въ заднемъ проходѣ какъ отъ маленькихъ осколковъ дерева или отъ камушковъ; поносъ съ кровью, слизью и болѣзненными натугами, также запоръ

На основаніи этихъ и еще другихъ симптомовъ, Коллинсонія умѣстна бываетъ при геморроѣ (рядомъ съ *Нуксѣ вол.*, *Алоэ*, *Сульф.*), при дизентероподобныхъ заболѣваніяхъ, при выпаденіи прямой кишки, при дисменорреѣ съ неправильнымъ положеніемъ матки, при варикозе, при сперматорреѣ у страдающихъ геморроемъ.

Дѣленія: $\times 2$ — 1 до Θ .

№ 114. Литій карбоникъ.

Lithium carbonicum. Литій углекислый.

Приготавливаются растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

Къ симптомамъ Литія относятся главнымъ образомъ: давящіе боли въ мочевомъ пузырь, напирание на мочу послѣ мочеенія, затрудненное или болѣзненное мочеотдѣленіе, шекотаніе въ мочевомъ каналѣ, мочерѣзъ; темная, насыщенная моча съ осадкомъ. Катарральныя явленія со стороны зѣва, желудка и кишекъ. Приступы сухого кашля съ шекотаніемъ въ гортани, очень сильныя и ослабляющіе, и съ болью въ груди. Гиперемія слизистой оболочки глазъ съ ослабленіемъ зрѣнія или половиннымъ зрѣніемъ (предметы видятся лишь въ лѣвой половинѣ поля зрѣнія).

Средство это надо имѣть въ виду въ хроническихъ случаяхъ подагры и ревматизма, сопровождающихся страданіями почекъ и мочевого пузыря, при мочевыхъ камняхъ, при соотвѣтствующей слабости зрѣнія, при чрезмѣрной чувствительности глазъ и т. д.

Дѣленія: низшія.

№ 115. Подофиллумъ.

Podophyllum peltatum. Майское яблоко.

Эссенція приготавливается изъ свѣжаго корня. Изъ эссенціи получается путемъ осажденія **Подофиллинъ**, употребляющійся въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ.

Подофиллинъ въ $\times 1$ — 1 дѣленіи дѣйствуетъ легко послабляющимъ образомъ на кишечникъ; въ большихъ же дозахъ не только Подофиллинъ, но и *Подофиллумъ* дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ на желудокъ и кишки, вызывая въ нихъ явленія остраго воспаленія, также— на мочевые органы, вызывая расстройства мочеотдѣленія съ болью въ области почекъ. Кромѣ того, Подофиллинъ вызываетъ рядъ расстройствъ и въ другихъ органахъ, особенно въ печени и маткѣ.

Показаніями къ примѣненію на практикѣ служатъ слѣдующіе симптомы со стороны кишечника и печени: не сопровождающійся болью утренній поносъ водянистыми, желтыми выдѣленіями, подобно *Аписъ*, *Румексъ* и *Нуфаръ*, обильными и вырывающимися сильной струей, съ предшествующей тошнотой и рвотой и послѣдующимъ расслабленіемъ, особенно въ прямой кишкѣ. Испражненія хуже бываютъ послѣ ѣды и питья, и случается, что позднѣе днемъ является еще и нормальный стулъ. — Подофиллумъ часто хорошее средство для дѣтей во время прорѣзыванія зубовъ при зеленыхъ водянистыхъ испражненіяхъ, съ скрежетаніемъ зубовъ и стenanіемъ во снѣ, а также при выпаденіи прямой кишки во время испражненія. — Симптомы со стороны печени: хроническое набуханіе ея, желтизна лица и бѣлковъ глазъ, скверный вкусъ во рту, отпечатки зубовъ на языкѣ; при этомъ могутъ быть запоръ и глинистаго цвѣта испражненія.

Дѣленія: $\times 2$ — $\times 3$. Подобныя средства: кромѣ вышеуказанныхъ, по общему дѣйствию—*Меркуръ*, *Ирисъ*, *Кольчикъ*, *Лентандра*.

№ 116. Румексъ.

Rumex crispus. Щавель курчавый.

Эссенція готовится изъ свѣжаго, весною выкопаннаго корня.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на кожу, лимфатическія железы, особенно на слизистыя оболочки дыхательныхъ органовъ, именно—гортани и дыхательнаго горла, раздражая слизистыя оболочки и уменьшая выдѣленіе изъ нихъ. Ухудшеніе симптомовъ вечеромъ, отъ малѣйшаго холоднаго сквозняка, отъ обнаженія, отъ давленія, отъ глубокаго вдыханія, отъ движенія.

Примѣняется часто съ успѣхомъ при катаррѣ гортани и дыхательнаго горла, при бронхитѣ, съ мучительнымъ, сухимъ, щекочущимъ кашлемъ, ухудшающимся отъ указанныхъ условій, при разстройствахъ дыхания у эмфизематиковъ и чахоточныхъ, при охриплости и безголосьи; далѣе, при катаррѣ желудка или кишекъ (между прочими симптомами—отвращеніе къ мясу, которое вызываетъ отрыжку и кожный зудъ, а также—утренніе поносы, не терпящіе отлагательства); также при ревматическихъ блуждающихъ боляхъ и при зудящихъ болѣзняхъ кожи (пруритъ, пруриго, уртикарія).

Дѣленія: X1—X3 и болѣе высокія.

Подобныя средства: *Беллад.*, *Кауст.*, *Сульф.*, *Пододфил.*

№ 117. Секале.

Scalé cornutum. Маточные рожки. Спорынья.

Приготавливаются растиранія съ молочнымъ сахаромъ и тинктура съ виннымъ спиртомъ.

Основное дѣятельное вещество: Эрготинъ.

При остромъ отравленіи большими приемами маточныхъ рожковъ (или Эрготины) являются симптомы разстройства желудка и кишекъ: блѣдность, синюха, ощущеніе ползанія мурашекъ, малый и напряженный пульсъ, мышечная слабость; также—головная боль, головокруженіе, упадокъ силъ, замедленіе пульса, бредъ, помраченіе, коматозное состояніе и, если нѣтъ поворота къ выздоровленію, смерть. У беременныхъ—выкидышъ или преждевременные роды.

Хроническое отравленіе, отъ хлѣба со спорыньей, выражается въ двухъ формахъ: судорожной (злая корча) и гангренозной. При первой формѣ преобладаютъ нервные симптомы: слабость, головокруженіе, ползаніе мурашекъ (особенно въ нижнихъ конечностяхъ), судорожныя явленія, позднѣе—параличныя, и слѣпота; при второй формѣ преобладаютъ явленія омертвѣнія, преимущественно въ ногахъ, также и въ рукахъ и въ носу, рядомъ съ волчьимъ голодомъ, холодѣніемъ тѣла и потерей чувствительности.

Характеристика въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 224 (Кровотеченіе изъ желудка), 245 (Воспал. толст. кишки), 442 (Кровотеченіе изъ матки), 540 (Бол. кожи). Кромѣ того, Секале можетъ пригодиться при кровотеченіяхъ изъ другихъ органовъ, при судорожныхъ и параличныхъ состояніяхъ, особенно—ниж-

ихъ конечностей, при ослабленіи зрѣнія, при изнуряющихъ поносахъ (холера), при потеряхъ сѣмени и половомъ безсиліи, при слабости мочевого пузыря съ частыми позывами на мочу и проч.

Дѣленія: низшія; при нервныхъ явленіяхъ болѣе высокія дѣленія предпочтительнѣе.

Противосредства: *Камфора, Опій.*

№ 118 Сенеціо.

Senecio aureus. Крестовникъ.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

Къ общимъ симптомамъ Сенеціо относятся:

Общая слабость, сонливость днемъ, переходящая какъ-бы ревматическія боли, около полудня, въ пахахъ, нижней челюсти, плечахъ, вискахъ и предплечьяхъ, также вообще въ рукахъ, груди и лицѣ. Сонъ безпокойный, сладострастные сны съ поллюціями. — Изъ отдѣльныхъ органовъ поражаются особенно почки, мочевого пузыря, матка, также слизистыя оболочки дыхательныхъ органовъ. Сенеціо можно имѣть въ виду, какъ полезное средство, при пораженіяхъ почекъ и мочевого пузыря съ мочерѣзомъ и кровотеченіемъ, при легочныхъ болѣзняхъ у особъ женскаго пола, если притомъ имѣются разстройства менструаціи, при неправильной и болѣзненной менструаціи, при бѣляхъ. Характеристику при болѣзняхъ кожи см. на стр. 540.

Дѣленія: $\times 2$ до Θ .

Подобныя средства: по дѣйствию на органы дыханія—*Самбуинарія*, вообще же—*Гелоніасъ, Пульсатилла*.

№ 119. Теревинтина.

Terebinthinae oleum. Терпентинное масло, Скипидаръ.

Примѣняется въ спиртныхъ разведеніяхъ.

Къ симптомамъ отравленія относятся:

Чувство общей слабости и вялости, отяжелѣніе членовъ съ тугою въсѣхъ суставовъ, головокруженіе, сильная боль въ животѣ, съ урчаніемъ, рвота, суженіе зрачковъ, воспаленіе мочевого пузыря и почекъ, воспаленіе дыхательныхъ путей, удушье; также нервные припадки и кожные сыпи.

Теребинтину слѣдуетъ имѣть въ виду преимущественно при ревматическихъ страданіяхъ, исходящихъ изъ отдѣльныхъ областей спинномозговой нервной системы съ тугою и разслабленіемъ конечностей, особенно нижнихъ: при хроническихъ катаррахъ дыхательныхъ путей, сопровождающихся мучительнымъ кашлемъ, при хроническомъ воспаленіи легкихъ съ склонностію къ кровотечениямъ, при воспаленіяхъ почекъ, особенно при почечномъ пескѣ и мочевыхъ камняхъ, при кровавой мочѣ, при катаррѣ мочевого пузыря съ тягостными разстройствами мочеотдѣленія.

Дѣленія: $\times 3$ до $\times 1$.—Противосредства: *Беллад., Камфора.*

Подобныя средства: *Кактарисъ, Копайба.*

№ 120. Элантъ.

Ailanthus glandulosa. Китайскій ясенъ.

Тинктура готовится изъ высушенныхъ сѣмянъ.

Дѣйствуетъ на центральную нервную систему, на кровь, на кожу. Симптомы, какъ при тифахъ, сопровождающихся большой слабостью, кожные же измѣненія, какъ при тяжелыхъ формахъ скарлатины. Большой упадокъ силъ уже въ началѣ острой болѣзни можетъ служить показаніемъ для примѣненія Эланта, особенно у чувствительныхъ, нервныхъ субъектовъ.

Хуже чувствуетъ себя больной при лежаніи на правой сторонѣ; когда сидеть (изъ сидячаго положенія), то являются головокруженіе и рвота.

Элантъ оказывался очень полезнымъ въ злокачественныхъ формахъ дифтерита, кори, скарлатины, дизентеріи, брюшного тифа и т. п. болѣзней. Въ Америкѣ славится, какъ средство противъ сѣнной лихорадки.

Дѣленія: 3 до $\times 1$

Подобныя средства: *Батизія*, *Гельзем.*, *Ацид. муріат.*, *Русъ*, *Аммон. карбон.*, *Лазез.*, *Арука*.

№ 121. Абіесъ.

1) *Abies canadensis*. Омеговая ель (Канадская).

2) *Abies nigra*. Обыкновенная ель.

Эти два растенія сходны вообще по дѣйствию, но Абіесъ нигра лучше испытана, нежели Абіесъ канадензисъ.

Эссенція готовится изъ кончиковъ вѣтвей съ листьями.

Дѣйствіе Абіеса простирается главнымъ образомъ на слизистыя оболочки (катарральныя явленія), особенно—пищеварительныхъ органовъ; Абіесъ нигра дѣйствуетъ еще замѣтнымъ образомъ на сердце.

Абіесъ можетъ пригодиться при всякой болѣзни, если имѣются между прочимъ слѣдующіе симптомы, особенно характерные для этого средства:

Абіесъ канад.: волчій голодъ и охота съѣдать больше, чѣмъ переноситъ желудокъ, грызущее ощущеніе въ желудкѣ и познабливаніе съ гусиной кожей. Особенно показанъ при хроническихъ заболѣваніяхъ желудка и печени, а также при неправильныхъ положеніяхъ матки, зависящихъ отъ общей тѣлесной слабости.

Абіесъ нигра: ощущеніе, какъ еслибы во входѣ въ желудокъ находился твердый предметъ, котораго не удастся сдвинуть съ мѣста. Ухудшеніе страданій послѣ приѣма пищи. Особенно показано при заболѣваніяхъ желудка и легкихъ: при желудочныхъ страданіяхъ вслѣдствіе чрезмѣрнаго употребленія табака, кофе и чая; также при ипохондріи съ запоромъ и при истерическомъ шарѣ.

Дѣленія: $\times 3$ до $\times 1$.

Подобныя средства: *Игнація*, *Сетія*, *Туя*—для Абіесъ канад.; *Бріонія*, *Нуксъ вом.*, *Кали карбон.*—для Абіесъ нигра.

№ 122. Абсинтъ.

Absinthium (или *Artemisia absinthium*). Полынь

Тинктура готовится изъ свѣжаго растенія (съ 5 ч.ч. спирта).

Основныя дѣятельныя начала: полынное масло и Абсинтинъ

Явленія отравленія большими дозами (у животныхъ) Дрожаніе мышцъ, судорога челюстей, столбнякъ, спираніе дыханія, пѣна у рта и непроизвольное выдѣленіе кала, мочи и сѣмени У людей, пьющихъ много полынной водки, наблюдаются подобныя же явленія, а также, и раньше всего, отуманиваніе мозга, бредъ, галлюцинаціи и припадки, подобныя падучей болѣзни. Обильное выдѣленіе мочи и лихорадочное состояние.

На основаніи такого дѣйствія Абсинта, его можно имѣть въ виду при тифозныхъ болѣзняхъ, сопровождающихся упорной безсонницей и приливами къ мозгу, также при маниакальныхъ состояніяхъ, въ которыхъ больной, полный страха, то и дѣло порывается ходить и бѣгать взадъ и впередъ, также при судорожныхъ состояніяхъ.

Дѣленія: низкія и болѣе высокія.

Подобное средство: *Артемизія вульгарисъ*.

№ 123. Агнусъ кастусъ.

Agnus castus. Прутнякъ.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ зрѣлыхъ плодовъ

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на мочевые и половые органы, въ которыхъ вызываетъ: у мужчинъ — вялость частей съ сильно пониженнымъ влеченіемъ; необычайно повышенное влеченіе съ постоянными эрекціями, постоянное отхожденіе выдѣленія изъ предстательной железы; желтоватое выдѣленіе изъ мочевого канала; чувство давленія въ сѣменномъ канатикѣ и яичкахъ;— у женщинъ же — перерывъ мѣсячныхъ съ тянущей болью въ животѣ; уменьшенное выдѣленіе молока у кормящихъ грудью.

Къ сопутствующимъ симптомамъ относятся: общая слабость и вялость, съ временными состояніями душевнаго возбужденія; угнетенность духа съ разговорами о смерти и умираніи; нервное щекотаніе въ лицѣ и въ кожѣ головы; шумъ въ ушахъ, съ ослабленіемъ слуха; ощущеніе то озноба, то жара, при холодѣ рукъ; усиленный аппетитъ и голодъ; непріятныя ощущенія въ желудкѣ; мягкія, но трудныя испраженія, или твердыя, съ задержками.

Агнусъ можно имѣть въ виду: при меланхоліи или ипохондріи у субъектовъ съ половой слабостью или, наоборотъ, съ необычайно повышенной половой страстью; при заглушенномъ трипперѣ или при маломъ истеченіи съ опуханіемъ яичка; при остановкѣ мѣсячныхъ съ приливами и болью въ маткѣ; при уменьшенномъ выдѣленіи молока у кормящихъ женщинъ.

Дѣленія: ХЗ и болѣе высокія.

Подобныя средства: *Ацид. фосфорик., Коніумъ, Пуффаръ, Кали бромат.*
Противосредства: *Камфора*, растительныя кислоты.

№ 124. Азарумъ.

Asarum europaeum. Копытень европейскій. Подлѣсникъ.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ.

Къ общимъ симптомамъ относятся: преобладающая зябкость, холодныя руки и ноги при ощущеніи жара въ остальныхъ частяхъ тѣла; усталость и слабость, особенно послѣ обѣда, съ временной тошнотой, ощущение легкости во всемъ тѣлѣ, ощущение какъ бы витанія въ воздухѣ; ухудшеніе страданій на свѣжемъ воздухѣ; они чувствуются больше на лѣвой сторонѣ. — Сонъ безпокойный, не каждую ночь, а въ одну черезъ другую; досадныя сновидѣнія; большая сонливость днемъ. Настроеніе измѣнчивое, больше раздражительное — Тяжесть головы, пульсирующія головныя боли, такія же боли въ глазахъ. — Явленія, какъ при катаррѣ дыхательныхъ путей. — Разстройства пищеваренія, съ болью и коликой въ животѣ, тошнотой и рвотой слизью и желчью; вялость кишечника и скудныя испраженія желгослизистыми массами. — Давленіе въ мочевомъ пузырьѣ съ частыми позывами на мочу, преждевременныя регулы съ потугообразными болями въ животѣ.

Это средство показано въ легкихъ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ съ волненіемъ и приливами крови, длительной зябкостію, при пульсирующихъ ревматическихъ боляхъ, при катаррахъ желудка, тонкихъ и толстыхъ кишекъ, при коликахъ и спазмѣ мочевого пузыря и проч.

Дѣленія: низкія и болѣе высокія.

Длительность дѣйствія: до 8 дней.

Противосредства: *Камфора*, уксусъ, лимонъ.

№ 125. Акалифа.

Acalypha indica. Индійское растеніе (изъ рода молочайныхъ)

Тинктура готовится изъ свѣжаго растенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на сосуды кровообращенія, особенно — дыхательныхъ органовъ, и на слизистыя оболочки послѣднихъ.

Характерны для этого средства: сухой кашель съ послѣдующимъ кровохарканіемъ; по утрамъ кровь красная и жидкая, по вечерамъ же темная, густая и свернувшаяся; ощущение стиснутости кругомъ въ груди. Средство это полезно бываетъ при кровохарканіи вслѣдствіе туберкулеза легкихъ, вообще же оно еще недостаточно испытано.

Дѣленія: среднія, 2—6.

№ 126. Алоэ.

Aloë socotrina. Сабуръ.

Тинктура есть растворъ отвердѣвшаго сока (изъ листьевъ) Алоэ въ 5 чч. спирта; готовятся и растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

Основное начало: Алоинъ, отъ котораго и зависитъ слабительное дѣйствіе этого средства.

Дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ на слизистую оболочку

желудка и кишекъ, также на печень и кишечныя железы, вызываетъ усиленный приливъ крови къ брюшнымъ и тазовымъ органамъ, также къ груди и головѣ.

Симптомы: усиленный аппетитъ, чувство давленія въ области печени, вздутіе живота съ коликой, повторное кашеобразное испражненіе съ болѣзненнымъ жиленіемъ, выпирание венъ прямой кишки; также жидкослизистыя испражненія, перемѣшанныя съ кровью; боль въ области почекъ; скудная, горячая моча, иногда съ кровью и жженіемъ при мочеиспусканіи; повышенная половая страсть; усиленная менструація.

Примѣняется въ соответствующихъ болѣзняхъ, особенно же при выпираніи геморроидальныхъ узловъ, съ жженіемъ и съ повторными испражненіями упомянутого вида

Дѣленіе 3 до 1, также — высокая

Длительность дѣйствія: отъ малыхъ приѣмовъ — нѣсколько часовъ, отъ болѣшихъ — нѣсколько дней.

Подобныя средства: *Нуксъ вом.*, *Эскул.*, *Коллинсонія*, *Сульфуръ*

Противосредство: растительныя кислоты.

№ 127. Алюминій. См. подь № 102.

№ 128. Аммоніакумъ гумми.

Ammoniacum gummi (изъ растенія азіатскаго — *Dorema ammoniacum*), смолистое вещество, заключающее въ себѣ камедь и эфирное масло. Изъ него готовятъ растиранія съ молочнымъ сахаромъ до 5 сотеннаго дѣленія, а затѣмъ разведенія.

Дѣйствуетъ особенно на пищеварительныя и дыхательныя органы, на ихъ слизистыя оболочки. Симптомы со стороны пищеварительныхъ органовъ: увеличенное слюотдѣленіе, непріятный и горькій вкусъ, отсутствіе аппетита, отрыжка, изжога, тошнота съ отвращеніемъ къ пищѣ; рѣзь въ животѣ, мягкія, кашеобразныя испражненія съ отхожденіемъ газовъ, слизистый поносъ. — Со стороны дыхательныхъ органовъ: явленія катарра верхнихъ путей съ обильнымъ слизистымъ выдѣленіемъ; стѣсненіе въ груди, временами съ колотьемъ.

Аммоніакумъ вызываетъ также раздраженіе слѣзчатой оболочки глаза, такія, именно, явленія, какъ при глаукомѣ; затемненіе поля зрѣнія, особенно по утрамъ; поражается преимущественно лѣвый глазъ — Шумъ въ ушахъ съ тугостію слуха. — Тяжесть или боль головы, особенно надъ глазами. — Тяжесть и усталость рукъ и ногъ, тянущія боли въ нихъ. — Мочетдѣленіе усилено; жженіе въ кончикѣ ствола

На основаніи сказаннаго, Аммоніакумъ можетъ пригодиться, какъ цѣлебное средство, при катаррѣ желудка и кишекъ съ хроническимъ несвареніемъ, при хроническомъ катаррѣ дыхательнаго горла, при ревматизмѣ мышцъ и суставовъ болѣе легкой степени, верхнихъ и нижнихъ конечностей, при начинающейся слѣпотѣ (амаврозѣ).

Дѣленія: преимущественно низкія, при болѣзни глазъ — болѣе высокія.

№ 129. Аммоній муріатикъ. См. подъ № 49.

№ 130. Аммоній фосфорикъ. См. подъ № 49.

№ 131. Ангустура.

Angustura vera. Прибрежникъ.

Тинктура готовится изъ коры.

Основное начало — Куспаринъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на головной и спинной мозгъ, вызывая судорожныя страданія въ разныхъ частяхъ тѣла, особенно на головѣ и спинѣ; тугость затылка; боли въ членахъ съ щелканіемъ въ суставахъ; слабость ногъ. — Далѣе, разстройства пищеваренія, съ отсутствіемъ аппетита, но чувствомъ голода; тошнота, боли въ животѣ, съ скопленіемъ газовъ. — Легкій катарръ дыхательнаго горла съ упорнымъ щекочущимъ раздраженіемъ въ гортани; толчкообразное вдыханіе, стѣсненіе въ груди, особенно при движеніи. — Явленія раздраженія со стороны мочевого пузыря

Средство это можетъ пригодиться, какъ цѣлебное средство, при ревматическихъ пораженіяхъ, при болѣзненно-раздражительныхъ разстройствахъ пищеваренія съ судорожными болями въ кишкахъ и мочевомъ пузырьѣ; при стѣсненіяхъ въ груди вслѣдствіе раздраженія отъ спинного мозга.

Дѣленія: $\times 1$ и болѣе высокія. — Противосредство: *Камфора*.

№ 132. Апоморфинъ. См. подъ № 44.

№ 133. Апоцинумъ каннабинумъ.

Aprocynit cannabinum. Коноплянообразный лускачъ. Канадская конопля.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на почки, усиливая дѣятельность ихъ эпителія; ослабляетъ сердечную дѣятельность, и въ этомъ отношеніи Апоцинъ схожъ съ Дигиталисомъ, Адонисомъ и Строфантомъ, но не имѣетъ накопляющихся (кумулятивныхъ) побочныхъ дѣйствій Дигиталиса. По характеру своего дѣйствія на почки, Апоцинъ умѣстенъ прежде всего при водянкахъ почечнаго происхожденія, но въ этихъ случаяхъ надо брать не высокія дѣленія, а первыя десятичныя или даже чистую тинктуру, а если послѣдняя не даетъ ожидаемаго результата (увеличеннаго выдѣленія мочи), то берется настой изъ свѣжаго корня, по чайной ложкѣ. Дѣйствіе его въ такомъ видѣ больше фізіологическое чѣмъ чисто гомеопатическое, хотя надо сказать, что при испытаніи его на здоровыхъ наблюдалось уменьшенное выдѣленіе мочи; стало быть, до нѣкоторой степени Апоцинъ гомеопатиченъ въ отношеніи водянки отъ почекъ. При водянкѣ же отъ другихъ причинъ (отъ сердца, почекъ и проч.), Апоцинъ не дѣйствителенъ. — Далѣе, Апоцинъ показанъ при меноррагіи и при насморкѣ съ обильной слизью, а также

при диспепсии со вздутиемъ желудка и тошнотой послѣ ѣды, и при туберкулезѣ легкихъ съ кровохарканіемъ.

Дѣленія: низкія до Θ (или настой изъ 1 драхмы корня на 6 унцій воды).

Подобныя средства *Аписъ, Геллеборусъ.*

№ 134, Аранеа.

Aranea diadema Кресговикъ (паукъ). Крыжакъ.

Дѣйствуетъ на кровь и нервную систему. Вызываемыя имъ страданія появляются больше періодически, какъ при перемежающейся лихорадкѣ, но съ той особенностію, что лихорадочный припадокъ выражается только въ ознобѣ, за которымъ лишь рѣдко слѣдуютъ жаръ и потъ. Нервное состояніе при этомъ очень ослабленное, сонъ очень безпокоенъ и съ частыми пробужденіями, также съ ощущеніемъ, какъ будто предплечья и руки увеличились и отяжелѣли. Приступы лихорадки являются больше по вечерамъ и сопровождаются жаждой

Къ общимъ симптомамъ принадлежатъ: тянущія боли вдоль туловища; сильная боль и тяжесть головы; чувство дрожанія въ глазахъ при чтеніи и писаніи, съ ощущеніемъ жара въ головѣ и глазахъ. Дрожаніе мышцъ верхней конечности. Горькій вкусъ, колика живота съ чувствомъ зноба, поносныя испражненія.

Аранеа слѣдуетъ имѣть въ виду при маляріи соответствующей формы, при малярійной кахексии съ значительно увеличенной селезенкой. Также—въ другихъ подходящихъ страданіяхъ.

Дѣленія: 3—6.

Длительность дѣйствія: нѣсколько часовъ до нѣсколькихъ дней и недѣль, смотря по величинѣ и частотѣ пріемовъ.

Въ гомеопатіи примѣняются какъ лѣкарства еще и другого рода пауки, а именно: Тарангула, Теридіонъ, Мигале.

Тарангула (*Tarentula*). Главная характерная особенность — сильнѣйшее безпокойство съ потребностью быть постоянно въ движеніи, несмотря на то, что послѣднее ухудшаетъ страданія. Симптомъ этотъ можетъ служить показаніемъ для примѣненія Тарантулы (6 дѣл.) при неврозахъ и т. п. болѣзняхъ. Другіе руководящіе симптомы: упадокъ силъ, нервныя боли, затрудненіе кровообращенія и дыханія, охлажденіе, обморочное состояніе. Тарангула показана и при гангренозномъ карбункулѣ съ большимъ упадкомъ силъ.

Теридіонъ (*Theridion*), оранжевый паукъ изъ Вестъ-Индіи, показанъ при періодической головной боли подъ лѣвымъ глазомъ, съ ухудшеніемъ отъ пригрѣва солнца и отъ всякаго шума; боль сопровождается головокруженіемъ и сильной тошнотой, съ ухудшеніемъ при смыканіи вѣкъ и малѣйшемъ движеніи и сотрясеніи. При быстротечной чахоткѣ Теридіонъ показанъ, когда колющія боли пронизываютъ грудь до спины и когда боли въ лѣвой сторонѣ груди сопровождаются сильной сердечной тоской. Дѣленіе: 6.

Мигале (*Mygale*, черный паукъ съ Кубы). Примѣняется при хорѣхъ, при неправильныхъ судорожныхъ движенияхъ одной половины тѣла, прекращающихся во снѣ, но сильнѣе возобновляющихся утромъ при пробужденіи. Дѣленіе: 6.

№ 135. Артемизія.

Artemisia vulgaris. Чернобыльникъ.

Эссенція готовится съ виннымъ спиртомъ

Дѣйствуетъ подобно Абсенту (№ 122) и умѣстна особенно при той формѣ эпилепсіи, которая является вслѣдствіе сильныхъ душевныхъ потрясеній, особенно вслѣдствіе испуга; припадки являются по нѣсколько въ теченіе короткаго времени, и на болѣе долгое время прекращаются, чтобы затѣмъ возобновиться попрежнему Далѣе, при болѣе легкой формѣ этой болѣзни, — „le petit mal“, — когда сознаніе теряется лишь на моментъ, и больной, придя въ себя, не знаетъ ничего о происшедшемъ съ нимъ и чувствуетъ себя опять, какъ бы ничего и не случилось съ нимъ

Артемизія вліяетъ и на глаза, вызывая въ нихъ боль при малѣйшемъ ихъ напряженіи и расплывчивость предметовъ въ полѣ зрѣнія, также головокруженіе при разглядываніи цвѣтнаго предмета или при смотрѣніи черезъ пестроокрашенное стекло На этомъ основаніи Артемизія съ пользою примѣняется при астеноніи, при упомянутой боли въ глазахъ.

Дѣленія: $\times 3 - 3$.

№ 136. Арумъ трифиллумъ.

Arum triphyllum. Корень сухотный. Аронникъ (Не смѣшивать съ Арумъ—№ 26). *Патчирикс*

Эссенція готовится изъ корня этого растенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистую оболочку носа, глотки, гортани и бронховъ, вызывая въ нихъ явленія катарра, также на кожу, вызывая въ ней сухость и измѣненія, какъ при scarlatinѣ (покраснѣніе и шелушеніе); кромѣ того, Арумъ производитъ еще другіе симптомы: ощущеніе внутренняго жара, усиленіе сердечной дѣятельности, безпокойный сонъ, раздражительность, разсѣянность и забывчивость; наконецъ, катарральныя явленія со стороны желудка и кишекъ.

Поэтому Арумъ примѣняется съ пользою при катаррѣ носа и носоглотки (характеристику см. на стр. 301), не только хроническомъ, но и болѣе остромъ; далѣе, его надо имѣть въ виду при катаррѣ гортани и дыхательнаго горла, при охриплости (особенно у тѣхъ, которымъ приходится много говорить), при scarlatinѣ, при воспаленіи въ полости рта и зѣва.

Дѣленія: 3 и болѣе высокія. Примѣняется также для полосканія рта и горла въ подходящихъ случаяхъ (нѣсколько капель Θ на рюмку воды).

№ 137. Ацидумъ пикриникумъ.

Acidum picrinicum или *picronitricum*. Пикриноазотная кислота.

Желтоватаго цвѣта кристаллы; одна часть ихъ, разведенная въ 99 частяхъ дистиллированной воды, образуетъ 1 сотен. дѣленіе, изъ котораго дѣлаются дальнѣйшія разведенія со спиртомъ; легко растворяются и сряду въ спирту.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервную систему, вызывая явленія, какъ при неврастеніи, также явленія раздраженія въ половой сферѣ.

Къ симптомамъ Ацид. пикриник. относятся особенно слѣдующіе: угнетенность духа, общая тѣлесная слабость, усталость отъ малѣйшей работы, слабая память, трудное соображеніе, равнодушіе ко всему, больной все бы лежалъ. Въ области же половой имѣется состояніе усиленной возбужденности. болѣзненные и продолжительныя эрекціи, особенно ночью не дающія больному покоя, съ обильными изверженіями; при этомъ тяжесть въ ногахъ и упадокъ силъ отъ малѣйшаго напряженія.

Подобные симптомы могутъ служить показаніями для примѣненія этого средства при неврозахъ и т. п. болѣзненныхъ состояніяхъ.

Дѣленія: не низкія, а болѣе высокія, съ 6-го сотеннаго начиная. Подобныя средства: *Фосфоръ*, *Арѣнт. нитрик.*

№ 138. Бовиста.

Bovista officinalis. Дождевикъ.

Растиранія съ молочнымъ сахаромъ до 5 сотен. дѣленія, а да-лѣе—разведенія съ виннымъ спиртомъ.

Дѣйствіе Бовисты на кожу см. на стр. 536. Вообще же она дѣйствуетъ въ значительной степени на кровь и лимфу, и черезъ нихъ—на разные органы тѣла, главнымъ образомъ, кромѣ кожи, на слизистыя оболочки, вызывая въ нихъ явленія катарра.

Бовиста примѣняется преимущественно въ хроническихъ болѣзненныхъ состояніяхъ, сопровождающихся лишь временной лихорадкой, или при лихорадкахъ съ длительнымъ ознобомъ и слѣдующимъ за нимъ потомъ (въ утренніе часы) безъ промежуточнаго жара. Она умѣстна особенно у молодыхъ особъ, раздражительныхъ, слабыхъ, золотушныхъ. Воспалительныя, катарральныя явленія (носа, глазъ, ушей, верхнихъ дыхательныхъ путей и проч.) имѣютъ затяжное теченіе; частое, хотя и небольшое кровотеченіе изъ носа, изъязвленія въ полости рта, воспаление зѣва съ припуханіемъ железъ; волчій голодь, съ тошнотой, неправильными испражненіями на низъ и пученіемъ живота отъ газовъ; расстройства мочеотдѣленія у дѣтей, катарръ мочевого пузыря, желтовато-зеленоватая моча съ красноватымъ осадомъ; усиленное половое влеченіе; сперматоррея съ нервной слабостью.

Общіе нервные симптомы: чувство общей разбитости, чувство холода, особенно въ желудкѣ и животѣ; тяжесть, онѣмѣніе и большая

слабость въ рукахъ и ногахъ; быстро мѣняющіяся краснота и блѣдность лица. Нервные и мышечныя боли.

Дѣленія: XЗ и болѣе высокія.

Подобныя средства: *Сульфуръ*, *Цикута*.

№ 139. Бораксъ.

Borax veneta или *Natrum boracicum*. Венеціанская бура.

Приготавливаются растиранія съ молочнымъ сахаромъ и разведенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на кожу и слизистыя оболочки, производя на нихъ воспалительныя и катарральныя явленія. Бораксъ подходит особенно при подобныхъ заболѣваніяхъ у женщинъ и дѣтей, а именно: при упорныхъ припуханіяхъ кожи, сопровождающихся сильнымъ зудомъ и лишаеобразными сыпями; предрасположеніе къ склочиванію волосъ головы; при воспаленіяхъ глазъ и ушей, съ припуханіемъ вѣкъ или наружнаго слухового канала; при хроническомъ насморкѣ съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи и изъязвленіемъ у ноздрей; при изъязвленіи губъ, при афтахъ во рту, при несильномъ катаррѣ желудка съ обильнымъ образованіемъ слизи; при катаррѣ кишекъ съ коликой отъ газовъ; при геморроидальныхъ страданіяхъ; при катаррѣ мочевого пузыря; при ранѣе срока являющейся и слишкомъ долго продолжающейся менструаціи съ послѣдующими слизистыми бѣлями.

Къ общимъ симптомамъ относятся: ощущеніе пульсаціи въ головѣ и другихъ частяхъ тѣла, общая слабость, наклонность къ обморокамъ, безпокойство въ тѣлѣ, не дающее долго сидѣть на мѣстѣ, боли въ поясницѣ и крестцѣ, и въ другихъ мѣстахъ тѣла; характерна боязнь движенія внизъ, напримѣръ, схожденія съ лѣсницы, или у дѣтей—спусканія съ рукъ на полъ, причемъ они боязнь свою выражаютъ крикомъ и т. п. Ухудшеніе многихъ страданій отъ движенія, улучшеніе на свѣжемъ воздухѣ

Дѣленія: низкія; также пріемы до 1--5 гранъ.

№ 140. Буфо.

Rana bufo Жаба, родъ лягушки, живущей въ Европѣ, Азіи и Америкѣ.

Какъ лѣкарство, въ растираніи съ молочнымъ сахаромъ, примѣняется ядъ, выдѣляемый этой жабой подъ вліяніемъ испытываемаго ею раздраженія. На человѣка этотъ ядъ дѣйствуетъ раздражающимъ и возбуждающимъ образомъ, особенно—на половую сферу; онъ вызываетъ и судорожныя явленія, съ послѣдующимъ расслабленіемъ и глубокимъ сномъ. Усиленная половая возбудимость, наклонность къ онанизму. Далѣе, этотъ ядъ вызываетъ воспалительныя состоянія съ дурнопахнущими испареніями и выдѣленіями. Ухудшеніе страданій въ теплой комнатѣ, при пробужденіи со сна, улучшеніе послѣ купанья и на холодномъ воздухѣ.

Буфо, какъ цѣлебное средство. примѣняется чаще всего при лѣченіи эпилепсіи, особенно когда припадки являются ночью и находятся въ связи съ половыми возбужденіями, также при судорогахъ у слабоумныхъ дѣтей, и, въ подходящихъ случаяхъ, противъ послѣдствій онанизма и половыхъ излишествъ вообще.—Дѣленія: среднія и болѣе высокія

№ 141. Вератрумъ вириде.

Veratrum viride, Чемерица зеленая.

Тинктура готовится изъ корня.

Вератрумъ вириде надо отличать отъ Вератрумъ альбумъ (№ 7). Оба рода Вератра дѣйствуютъ на головной и спинной мозгъ и на мышцы, оба вызываютъ слабость сердца съ холоднымъ потомъ, холодомъ вообще и упадкомъ силъ, но зеленый Вератр. дѣйствуетъ больше на желудокъ, вызывая сильную рвоту, бѣлый же Вератръ—больше на кишечникъ, вызывая поносъ. Вератр. вириде вызываетъ также приливъ къ мозгу, съ явленіями воспаленія и артеріальнымъ возбужденіемъ; характеренъ для этого средства видъ языка: красная полоска, идущая вдоль середины послѣдняго. Характеристику его въ отношеніи болѣзней сердца см. на стр. 372.

Какъ цѣлебное средство, Вератр вириде надо имѣть въ виду больше при острыхъ заболѣваніяхъ, особенно при инфекціонныхъ лихорадкахъ и крупозномъ воспаленіи легкихъ, при спинномозговомъ менингитѣ, при мозговыхъ раздраженіяхъ у дѣтей и при дѣтскихъ судорогахъ, и вообще при нервныхъ страданіяхъ.

Дѣленія: X1 — Θ; надо имѣть въ виду и болѣе высокія дѣленія, наприм.—при остромъ катаррѣ желудка и гастральгіи.

№ 142. Вербаскумъ.

Verbascum thapsus. Царская роза.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервную систему, вызывая въ разныхъ мѣстахъ тѣла, особенно же въ области головы, боли — стучащія, давящія, колющія и щиплющія. Къ симптомамъ Вербаска принадлежать также: рвущая боль въ ухѣ (въ лѣвомъ), съ ощущеніемъ точно его что-то закупориваетъ (сначала лѣвое, затѣмъ правое ухо), тугость слуха; колотье въ груди и конечностяхъ; охриплость при напряженіи голоса; глухой жесткій кашель (у дѣтей и женщинъ); частые позывы на мочу съ небольшими выдѣленіями, или постоянное недержание ея; симптомы катарра желудка съ запоромъ.

Примѣняется у больныхъ въ соотвѣствующихъ случаяхъ.

Дѣленія: X3 до Θ. Примѣняется и наружно (въ Θ).

Противосредство: *Камфора*.

№ 143. Вискумъ альбумъ.

Viscum album. Омела.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ ягодъ и листьевъ.

Дѣйствуетъ на нервную систему, особенно на большіе нервные стволы и на спинной мозгъ. Вызываемая этимъ средствомъ боли имѣютъ тянущій характеръ и ухудшаются въ постели, также зимою въ бурную погоду. Вискумъ, въ силу этихъ, а также еще другихъ своихъ симптомовъ, оказывался полезнымъ при такихъ болѣзняхъ, какъ: ишіасъ и другія невралгіи; тугость слуха вслѣдствіе простуды; спинныя боли у женщинъ вслѣдствіе маточныхъ заболѣваній; маточныя кровотеченія, сопровождающіяся колющими болями внизу живота: колющія боли въ яичникахъ, съ ухудшеніемъ по утрамъ въ постели; хорей, эпилепсія; спазматическая астма у страдающихъ подагрой или ревматизмомъ; постоянное подергиваніе лицевыхъ мышцъ; головокруженіе съ стучащей головной болью или съ ощущеніемъ, какъ будто весь черепъ поднимается высоко.

Дѣленія: низкія до Ө.

Подобныя средства: въ отношеніи эпилепсіи — *Беллад.*, *Страмон.*; въ отношеніи ревматизма — *Гирокія*, *Рододендр.*, *Пульсат.*; въ отношеніи матки — *Секале коркуш.*

№ 144. Вибурнумъ.

Viburnum opulus. Калина.

Эссенція готовится изъ свѣжей корневой коры.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на матку и на брюшныя органы, вызывая, рядомъ съ ихъ разстройствами, и общее сильное недомоганіе: возбужденность съ послѣдующей угнетенностью духа, желаніе оставаться въ одиночествѣ, помраченность, головокруженіе, общую слабость и разбитость, безпокойный сонъ, ознобъ отъ сильной головной боли.

На основаніи симптомовъ, вызываемыхъ Вибурномъ въ женскихъ половыхъ органахъ, предлагаются слѣдующія показанія къ примѣненію его на практикѣ: 1) спазматическая дисменоррея, 3 раза въ день по нѣсколько капель тинктуры, въ теченіе недѣли до ожидаемыхъ регулъ; а какъ только регулы наступили, или же при сильныхъ боляхъ, ихъ сопровождающихъ, черезъ каждыя 15 минутъ; 2) при ложныхъ потугахъ; 3) при послѣродовыхъ боляхъ (послѣ каждой боли 1 приѣмъ); 4) при болѣзненныхъ судорогахъ въ животѣ и въ ногахъ у беременныхъ; 5) при угрожающемъ выкидышѣ.

№ 145. Винка миноръ.

Vinca minor Барвинокъ малый.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на кожу и слизистыя оболочки. Къ симптомамъ этого средства относятся именно: нестерпимый зудъ

кожи, вынуждающій къ расчесамъ, мокнущія высыпи на кожѣ головы, склочиваніе волосъ на головѣ;—жгучій зудъ вѣкъ съ краснотой; звонъ и свистъ въ ушахъ, съ ошущеніемъ, какъ еслибы вѣтеръ дулъ изъ уха, особенно изъ лѣваго; сухость, жаръ и зудъ въ носу, съ высыпаніемъ пузырьковъ на перегородкѣ носа; катарральныя явленія со стороны гортани съ судорожнымъ кашлемъ; опуханіе губъ съ зудомъ, катарральныя явленія со стороны слизистой оболочки рта и зѣва, также и кишекъ.

Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ имѣть въ виду Винка миноръ, особенно при сыпяхъ на головѣ (молочной коростѣ) и при колтунѣ, также при кровотеченияхъ изъ матки, не поддающихся обычнымъ средствамъ.

Дѣленія: $\times 1$ — Θ . Длительность дѣйствія: 8 дней и болѣе.

Противосредства: растительныя кислоты и пряности.

№ 146. Гваякумъ.

Guaiaacum (Resina guaiacae). Гваякова смола (изъ гваяковаго дерева, растущаго въ Индіи).

Приготавливаются спиртные растворы.

Ревматическія боли, колющія и рвущія, въ разныхъ частяхъ тѣла, чувство общаго недомоганія, чувство ослабленности въ плечахъ и бедрахъ, лихорадочное состояніе, приливъ крови къ головѣ, груди и брюшнымъ органамъ; ухудшеніе страданій въ утренніе и вечерніе часы и при движеніи; сонливость днемъ, безпокойный сонъ или бессонница ночью; настроеніе мрачное, угрюмое, молчаливое; жгучій зудъ кожи съ ухудшеніемъ отъ расчесовъ.

Средство это слѣдуетъ имѣть въ виду при хронической ломотѣ (подагрѣ) и при ревматизмѣ суставовъ и мышцъ. Примѣняется въ Θ — $\times 1$.

№ 147. Геліантъ.

Helianthus annuus. Подсолнечникъ.

Тинктура готовится изъ всего растенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на кожу и слизистыя оболочки. Къ симптомамъ Геліанта относятся: просовидная сыпь на разныхъ мѣстахъ тѣла, особенно на рукахъ и ногахъ; лишайныя пятна на срединѣ живота; воспаленіе вѣкъ съ зудомъ во внутреннемъ углу глаза; катарральныя явленія со стороны верхнихъ дыхательныхъ путей, съ отдѣленіемъ густой тягучей мокроты, особенно утромъ; приливъ крови къ головѣ, съ головокруженіемъ и болью, приливы къ брюшнымъ органамъ; геморроидальныя узлы; твердыя, черныя съ слизью испражненія, бывающія разъ въ два-три дня; частые позывы на мочу, особенно ночью; ревматическія боли въ суставахъ, особенно въ лѣвомъ колѣнѣ, періодическаго характера; уменьшаетъ выдѣленіе молока у кормящихъ женщинъ.

Средство это оказывалось полезнымъ особенно при чрезмѣрномъ и длительномъ истеченіи молока у кормилицъ послѣ отнятія ребенка.

Дѣленія: низкія и Θ .

№ 148. Гелоніасъ.

Helonias dioica (американское растеніе).

Эссенція готовится изъ корня.

Дѣйствуетъ особенно на нервную систему, на мочевые и половые органы.

Общая слабость, усталость, раздражительность, угнетенность духа, головокруженіе, головная боль, давящая и пульсирующая; судорожная боль вдоль позвоночника, тяжесть въ поясницѣ и крестцѣ, боль спины, особенно ночью. Болѣзненные позывы на мочу; моча содержитъ бѣлокъ; очень обильное выдѣленіе, также непроизвольное; частыя и сильныя эрекции (ночныя), впослѣдствіи импотенція; — у женщинъ: потугообразныя боли по направленію отъ крестца въ матку, маточныя кровотеченія; воспалительныя явленія половыхъ частей безъ половой возбудимости; припуханіе грудныхъ железъ съ усиленной чувствительностію грудныхъ сосковъ.

Гелоніасъ рекомендуется американскими врачами при состояніяхъ нервной слабости, при раздражительности спинного мозга, при пораженіяхъ почекъ и мочевого пузыря, при сахарной болѣзни, при воспаленіяхъ женскихъ половыхъ органовъ, при разстройствахъ менструаціи и проч.

Дѣленіе: $\times 1—\Theta$.

Подобныя средства: *Фосфоръ ацид.* и *Феррумъ*; *Станнуъ* (въ отношеніи матки)!

№ 149. Гидрокотиле азіатика.

Hydrocotyle asiatica. Пуповникъ азіатскій.

Тинктура готовится изъ высушеннаго растенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на кожу и на слизистыя оболочки. Симптомы: краснота съ зудомъ на лицѣ, шеѣ, груди и проч., высыпаніе гнойничковъ и пузырьковъ съ образованіемъ струпьевъ и шелушеніемъ; бугорковыя образованія и изъязвленія; явленія воспаления, катарра верхнихъ дыхательныхъ путей, съ незначительнымъ слизистымъ выдѣленіемъ; разстройства пищеваренія; непріятныя ощущенія въ области почекъ; явленія раздраженія мочевого пузыря съ увеличеннымъ отдѣленіемъ мочи; тупыя боли въ области матки и яичниковъ, съ приливами крови къ этимъ органамъ, съ зудомъ, колотьемъ и жаромъ во влагалищѣ, съ досрочнымъ появленіемъ регулъ и бѣлями; общая слабость и тянущія боли въ разныхъ мышцахъ тѣла.

Примѣняется, въ подходящихъ случаяхъ, при хроническихъ пораженіяхъ кожи, особенно при волчанкѣ, также при хроническихъ заболѣваніяхъ почекъ и при воспаленіяхъ женскихъ половыхъ органовъ.

Дѣленія: $\times 3—6$.—Подобныя средства: *Силиція*, *Ликопод.*, *Дулькамара*.

№ 150. Гринделія.

Grindelia robusta. Камедное растеніе (въ Калифорніи).

Тинктура готовится изъ цвѣтовъ и листьевъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистыя оболочки и нервную систему, также на глаза. Это средство слѣдуетъ имѣть въ виду при одышкѣ съ обильной, но трудноотходящей мокротой, и сопровождающейся разстройствами пищеваренія; боль въ лѣвомъ боку, въ области селезенки, просиравшаяся внизъ до таза; селезенка увеличена и болѣзненна при надавливаніи; далѣе при хроническомъ бронхитѣ и эмфиземѣ; при спазмѣ сердца; характерно, что удушье усиливается или является особенно въ тотъ моментъ, когда больной засыпаетъ; Гринделія приносила пользу также при коклюшѣ, при воспаленіи радужной оболочки глаза, при зудящихъ накожныхъ сыпяхъ (наружное примѣненіе изъ 1 части Θ на 10 чч. воды или масла и т. п.)

Дѣленіе: $\times 1-3$

Подобныя средства: *Самивинария*, *Лактезисъ*. Съ своей стороны Гринделія—противъ *Ругъ*

№ 151. Гвако.

Guaco. Гордовикъ (растетъ въ Америкѣ).

Тинктура готовится изъ высушенныхъ листьевъ

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервную систему, на животъ и на женскіе половые органы

Въ Южной Америкѣ Гвако славится какъ противоядіе противъ укуса змѣй и противъ собачьяго бѣшенства: тамъ свѣжевыжатый изъ растенія сокъ вводится въ расширенную рану и принимается также внутрь; кромѣ того прикладываются наружно раздавленные листья.

Къ симптомамъ этого средства относятся:

Сильная тянущая, рвущая или колющая боль позвоночника, особенно въ поясничной и крестцовой части; жженіе или жгучая боль въ затылкѣ и межъ лопатками, отдающая въ руку; тянущая боль въ плечевой мышцѣ, съ чувствомъ разслабленности; боль, какъ отъ разбитости, въ бедренныхъ суставахъ, тянущія боли во всей ногѣ, съ жженіемъ, особенно въ подошвахъ. Приливы къ головѣ, съ чувствомъ жара въ ней, сильная боль въ затылкѣ. Тугость слуха Тугоподвижность языка.—Потеря голоса съ чувствомъ сжатія гортани.—Боль въ животѣ, съ чувствомъ пульсаци въ немъ, сопровождающаяся водянистымъ поносомъ. — Обильныя, ѣдкія, ослабляющія бѣли; ночное подергиваніе и жженіе въ половыхъ частяхъ.—Обильное мочеотдѣленіе, обиліе фосфорнокислыхъ солей въ мочѣ.—Страданія ухудшаются отъ движенія и ночью.

Гвако примѣняется съ пользой при параличахъ, особенно—языка и нижнихъ конечностей, при пораженіяхъ спинного мозга, при мышечномъ ревматизмѣ и проч.

Дѣленіе: $\times 3-6$. Наружное примѣненіе см. на стр. 46

Подобныя средства: *Веллад.*, *Каустик.*

№ 152. Даміана.

Damiana. Мексиканское растеніе.

Тинктура готовится изъ высушенныхъ листьевъ.

Даміана дѣйствуетъ укрѣпляющимъ образомъ на мужскіе и женскіе половые органы, когда они ослаблены. Даетъ поэтому часто хорошіе результаты при импотенціи, проистекающей отъ недостатка полового побужденія; въ такихъ случаяхъ принимаютъ 15—30 капель въ день въ теченіе одной недѣли.

Далѣе, Даміана рекомендуется какъ полезное средство при сперматорреѣ, при болѣзняхъ предстательной железы, при состояніяхъ нервной слабости, при зависящей отъ послѣдней безсонницѣ и при мигрени. Въ этихъ случаяхъ примѣняется $\times 1$ дѣленіе.

№ 153. Ирисъ.

Iris versicolor. Ирѣ разноцвѣтная. Сабельная лилія.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня.

Къ симптомамъ Ирисъ относятся: головная или лицевая боль, правосторонняя; катарръ глазъ, звонъ и шумъ въ ушахъ; боль, какъ отъ ревматизма, въ затылкѣ, поясницѣ и крестцѣ, боли въ суставахъ, съ дрожаніемъ и слабостью колѣнъ; катарральныя явленія дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ, сухой кашель съ колотьемъ въ груди, судорожныя боли въ желудкѣ и кишкахъ, частыя, водянистыя испражненія, съ жиленьемъ, выпаденіе прямой кишки; явленія раздраженія со стороны мочевыхъ и половыхъ органовъ. Предрасположеніе къ накожнымъ сыпямъ.

Ирисъ можно поэтому имѣть въ виду при пораженіяхъ ревматическихъ, при мигреніи, при невралгіяхъ, при воспалительныхъ состояніяхъ дыхательныхъ, пищеварительныхъ и мочевыхъ органовъ; примѣненіе при трипперѣ—стр. 463.

Соотвѣтствующія Ирису страданія являются преимущественно на правой сторонѣ тѣла.

Дѣленія: $\times 3$ —6. Подобныя средства: *Меркур.*, *Іод.*, *Кольчик.*, *Ипек.*, *Пододифл.*, *Тартар.* змет.

№ 154. Кадмій сульфурикъ.

Cadmium sulphuricum. Сѣрнокислый кадмій.

По дѣйствию своему, Кадмій занимаетъ середину между Арсеникомъ и Бріоніей и умѣстенъ въ такихъ болѣзненныхъ состояніяхъ желудка и кишекъ, въ которыхъ имѣются симптомы Арсеника и вмѣстѣ съ тѣмъ свойственный Бріоніи симптомъ — желаніе больного сохранять полный покой; при Арсеникѣ больной очень безпокоенъ и мечется съ мѣста на мѣсто, несмотря на боли. Характеристика для Кадмія: рвота желтоватыми или черными массами, соленовато-прогорклая отрыжка, холодный потъ лица, жженіе и рѣзь въ желудкѣ и животѣ;

вонючія, кровянистыя, шоколаднаго цвѣта испражненія, какъ при дизентеріи. Кадмію соотвѣтствуетъ бронхіальный катарръ съ одышкой и чувствомъ сильнаго стягиванія въ груди (подобно Кактусу); улучшение больной испытываетъ лишь тогда, когда онъ получилъ возможность выхаркивать мокроты.

Дѣленія: 3—6.

№ 155. Каладій.

Caladium seguinum. Стрѣлолистъ ядовитый.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корневища.

Каладій извѣстенъ какъ средство противъ половой слабости, но онъ можетъ примѣняться, въ подходящихъ случаяхъ, и при беспокойномъ снѣ, сопровождающемся кошмарами, также при желудочныхъ боляхъ у слабонервныхъ больныхъ и т. п.

Къ симптомамъ Каладія относятся, именно, кромѣ упомянутой половой слабости, еще слѣдующіе: пульсирующія и спазматическія боли, облегчающіяся отъ потѣнія или кратковременнаго сна; больной избѣгаетъ движенія и все бы лежалъ; при лежаніи испытываетъ ощущеніе, какъ если бы его укачивали; большая чувствительность къ шумамъ; головокруженіе при вставаніи изъ лежачаго положенія; сильная раздражительность и мнительность о своемъ здоровьи; сонъ очень безпокойный и тревожный;—головная боль съ ощущеніемъ жара въ головѣ;—сухость во рту, безъ жажды и съ отвращеніемъ къ свѣжей водѣ, также при мигрени; въ этихъ случаяхъ примѣняется $\times 1$ дѣленіе.

№ 156. Калькареа флуорика, см. подъ № 35.

№ 157. Кальмія.

Kalmia latifolia. Кальмія широколистая.

Тинктура готовится изъ свѣжихъ листьевъ.

Кальмія имѣетъ то общее съ Дигиталисомъ, что, данная въ большихъ дозахъ, уменьшаетъ значительно частоту пульса (до 31 въ минуту); она вліяетъ кромѣ того на чувствительныя клѣтки и волокна спинного и головного мозга, слѣдствіемъ чего являются боли, распространяющіяся по разнымъ мѣстамъ тѣла въ направленіи отъ центра къ периферіи.

Сердечные симптомы Кальміи см. на стр. 373. Изъ прочихъ же симптомовъ главными являются еще слѣдующіе: частое головокруженіе, особенно при движеніи, съ ослабленіемъ зрѣнія; тяжесть головы, головная боль утромъ при пробужденіи; лицевая боль; боль въ ушахъ, звонъ и другія подобныя ощущенія въ нихъ.

Кадмію надо имѣть въ виду главнымъ образомъ при самостоятельныхъ сердечныхъ болѣзняхъ и при ревматизмѣ, острымъ и хроническомъ, суставовъ, мышцъ и нервовъ, осложненномъ пораженіемъ сердца.

Дѣленія: $\times 3 - 3$

№ 158. Карбо анималисъ см. подъ № 38.

№ 159. Каулофиллумъ.

Caulophyllum thalictroides. Женскій корень.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на женскую половую сферу, особенно на матку (подобно Секале). Общія же симптомы являются по большей части слѣдствіемъ заболѣваній половыхъ органовъ. Каулофил. славится какъ средство, облегчающее роды и предупреждающее выкидышъ и ослабленіе родовыхъ потугъ. Кромѣ того, Каулофил. имѣетъ выдающееся вліяніе на суставы, особенно на малые суставы рукъ и ногъ.

Симптомы со стороны женскихъ половыхъ органовъ: ощущеніе какъ бы прилива къ маткѣ съ ощущеніемъ тяжести, полноты и напряженія въ подвздоши; разстройства менструаціи со спазмами въ мочевомъ пузырь и прямой кишкѣ и съ ощущеніемъ болѣзненнаго напиранія книзу; спазматическая боль влагалища; бѣли, особенно у маленькихъ дѣвочекъ; угрожающій выкидышъ; предрасположеніе къ выкидышамъ; болѣзненные послѣродовыя боли; ложныя потуги въ послѣдніе мѣсяцы беременности.

Характерны для ревматическихъ симптомовъ: боль тупая, тянущая, то въ одномъ, то въ другомъ суставѣ, часто съ шелканіемъ при движеніи, особенно въ малыхъ суставахъ ногъ и пальцевъ, съ ухудшеніемъ ночью; чувство слабости колѣнъ при движеніи; часто боль на внутренней сторонѣ лѣваго бедра.

Примѣненіе на практикѣ явствуетъ уже изъ описанія главныхъ симптомовъ.

Дѣленія: низкія до $\times 6$.

Подобныя средства: *Актеа*, *Пульсат.*, *Сабина*, *Секале*.

№ 160. Коккусъ какти.

Coccus cacti. Червецъ, Кошениль.

Приготавливаются какъ тинктура, такъ и растиранія съ молочнымъ сахаромъ. Основное дѣятельное начало—Тирозинъ. Изъ Коккусъ какти получается краска Карминъ. Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на почки и на слизистыя оболочки дыхательныхъ и другихъ органовъ.

Симптомы со стороны мочевыхъ органовъ: тупая, давящая, колющая боль въ области почекъ и вдоль мочеточника, усиливающаяся при движеніи и при надавливаніи; боль въ мочевомъ пузырь, отдающая въ мочевой каналъ; зудъ и покалываніе въ мочевомъ каналѣ; частые позывы на мочу съ жженіемъ; темная мутная моча съ обильнымъ осадкомъ мочекислыхъ солей.

Симптомы со стороны дыхательныхъ органовъ: катарръ дыхательнаго горла, съ щекотаніемъ въ немъ, сухимъ, отрывистымъ или судорожнымъ кашлемъ; кашель съ густослизистой мокротой. Приливъ крови къ легкимъ, съ чувствомъ усиленной теплоты въ груди, съ колотьемъ и стѣсненіемъ въ ней. Страданія усиливаются вообще отъ движенія и тепла, облегчаются же отъ покоя и холода.

Примѣняется при болѣзняхъ почекъ, при болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ, когда имѣются указанная выше характерныя особенности мочи, также, въ подходящихъ случаяхъ, при коклюшѣ, при гриппѣ, при сердечныхъ болѣзняхъ, при ревматизмѣ и подагрѣ, при пораженіяхъ кожи (сухость кожи, съ зудомъ, жженіемъ и колотьемъ, то тутъ, то тамъ, съ высыпаніемъ красныхъ узелковъ и гнойныхъ пузырьковъ).

Коккусъ какти примѣняется обыкновенно не въ дѣленіяхъ, а въ болѣе значительныхъ дозахъ: 5—10 капель Θ или по грану растиранія 1 ч. съ 5 чч молочнаго сахара — болѣе частые приемы. Надо, однако, имѣть въ виду и дѣленія, особенно при коклюшѣ, при которомъ 6-е и болѣе высокое дѣленіе можетъ дать лучшіе результаты.

№ 161. Кротонъ.

Croton tiglium.

Тинктура готовится изъ сѣмянъ Кротона. Растиранія (низшія) послѣднихъ съ молочнымъ сахаромъ нецѣлесообразны, такъ какъ скоро портятся (разлагаются). Изъ сѣмянъ же получается кротоновое масло, которое дѣйствуетъ сильно раздражающимъ, воспаляющимъ образомъ на кожу.

Сѣмена Кротона или нѣсколько капель кротоноваго масла вызываютъ сильный поносъ, воспаленіе желудка и кишекъ, также воспалительныя явленія въ слизистыхъ оболочкахъ другихъ органовъ, равно какъ цѣлый рядъ общихъ разстройствъ.

Характеристику въ отношеніи болѣзней кожи см. на стр. 538 и 569. Кромѣ того, Кротонъ примѣнялся съ пользою при сильныхъ воспаленіяхъ слизистой оболочки глазъ, также при воспаленіи роговицы, особенно же при поносѣ, желтомъ, водянистомъ, какъ изъ шприца, съ тошнотой и рвотой; поносъ является при каждой попыткѣ ѣсть или пить; имѣющаяся при этомъ колика облегчается отъ теплаго питья. Еще рекомендуется Кротонъ при сильной боли сосковъ у кормящихъ женщинъ, которая является при каждомъ прикладываніи ребенка къ груди и простирается до спины, съ ощущеніемъ какъ-бы натянутой туда веревки.

Дѣленія: $\times 3 - 6$.

Подобныя средства: по дѣйствию на кишечникъ — *Вератр.*, *Коль-жик.*; по дѣйствию на кожу — *Русъ*, *Мезереумъ*, *Аписъ*.

№ 162. Копаиба.

Copaiba Копайскій бальзамъ.

Добывается посредствомъ надрѣзовъ коры копайносныхъ деревьевъ, растущихъ въ Бразиліи и Вестъ-Индіи, и представляетъ собою блѣдножелтое, съ непріятнымъ запахомъ, густое масло. Растворъ этого масла въ чистомъ алкогольѣ служитъ основой для разведеній.

Копаиба сходна съ Терпентиномъ, но гораздо сильнѣе дѣйствуетъ на слизистыя оболочки пищеварительныхъ и мочевыхъ путей, особенно — послѣднихъ, вызывая явленія раздраженія и воспаленія.

Съ лѣчебной цѣлю, Копайба примѣняется преимущественно при трипперѣ; она можетъ пригодиться и при катаррѣ гортани и бронховъ, когда имѣется сухой раздражительный кашель, или съ желтоватой или зеленоватой мокротой противнаго запаха; умѣстна вообще больше въ хроническихъ случаяхъ, не сопровождающихся лихорадкой. Копайба рекомендуется также при раздраженіи мочевого канала и шейки пузыря у старыхъ женщинъ и при нѣкоторыхъ кожныхъ болѣзняхъ, пузырчатыхъ сыпяхъ, при крапивницѣ у дѣтей, при псоріазѣ.

Дѣленія: $\times 1 - \Theta$.

Подобныя средства: *Каннаб. сат.*, *Калтар.*, *Теребинтина*.

№ 163. Калькареа ацетика см. подъ № 35.

№ 164. Калькареа іодата см. подъ № 35.

№ 165. Ланисъ альбусъ.

Lapis albus Бѣлый камень.

Вещество это открыто было (д-ромъ Грауфоглемъ) въ минеральныхъ источникахъ Гаштейна и заключаетъ въ себѣ известь, кремнеземъ и фторъ, изъ этого вещества приготовляются растиранія съ молочнымъ сахаромъ для цѣлей лѣченія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на железы и соединительную тканьъ.

Симптомы: жгучія, колющія боли въ грудныхъ железахъ, въ маткѣ, въ желудкѣ и сердцѣ, необычайно сильный аппетитъ, жестокой зудъ кожи и опуханіе и затвердѣніе шейныхъ и затылочныхъ железъ.

Примѣняется при золотушныхъ опухоляхъ железъ, при зобѣ и при опухоляхъ грудныхъ железъ. Средствомъ этимъ излѣчивались: опухоли губъ (липома, эпителиома), начинающаяся катаракта, саркома и ракъ. Кромѣ того, его можно имѣть въ виду при пруритѣ и дисменорее и проч.

Дѣленія: $\times 3 - 3$ и болѣе высокія.

Подобныя средства: *Силиція*, *Арсен. іодат.*, *Кали іодат.*

№ 166. Лауроцеразусъ.

Laurocerasus. Лавровая вишня.

Приготавливается тинктура изъ листьевъ съ виннымъ спиртомъ, также водный препаратъ (*Aqua laurocerasi*), получаемый путемъ перегонки.

Заключаетъ въ себѣ въ очень маломъ количествѣ синильную кислоту (*Acidum hydrocyanicum*), отъ которой и зависитъ дѣйствіе. Синильная кислота есть сильнѣйшій ядъ, быстро парализующій мозгъ, легкія и сердце, настолько быстро, что даже немедленно данное противоядіе является при отравленіи уже запоздалымъ.

Явленія отравленія не смертельными дозами ціанистой кислоты или ея препаратовъ суть слѣдующія: упадокъ общей жизнѣдѣтельности организма, потеря сознанія съ судорожными состояніями, параличъ чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ. Раньше же того — головокруженіе, тупая головная боль, подергиванія въ отдѣльныхъ лицевыхъ мышцахъ, звонъ и шумъ въ ушахъ, тугость слуха; неправильная дѣятельность сердца; чувство скребленія въ гортани и дыхательномъ горлѣ, приступъ кашля, стѣсненное дыханіе; скребленіе въ глоткѣ, чувство теплоты и боль въ желудкѣ и кишкахъ, произвольныя жидкія испражненія; разстройства мочеотдѣленія, усиленное половое возбужденіе, жгучая боль въ мочевомъ каналѣ.

Лауроцеразъ примѣняется съ пользой, въ подходящихъ случаяхъ, при болѣзняхъ желудка, сердца и дыхательныхъ органовъ, при болѣзняхъ (особенно у дѣтей), сопровождающихся синюхой и одышкой, также при судорожныхъ состояніяхъ. Ощущеніе бульканія въ пищеводѣ считается показаніемъ для этого средства при болѣзняхъ желудка.

Дѣленія: низкія; лавровишневою воду принимаютъ по нѣскольکو капель на пріемъ.

Длительность дѣйствія: въ зависимости отъ величины и частоты пріемовъ—нѣсколько часовъ до двухъ дней.

Противосредства. *Камфора, Опій, Ипекакуана.*

№ 167. Лептандра.

Leptandra virginica. Лептандра виргинская.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня. Содержитъ смолистое вещество —Пептандринъ.

Симптомы со стороны пищеварительныхъ органовъ:

Языкъ желто-обложенъ: тошнота, волчій голодъ, кислая отрыжка, болѣзненность желудка, боль въ области печени, сильная рвота съ поносомъ; сильная рѣзь въ животѣ, тулая боль въ правой паховой области, отдающая въ яичко, вздутіе живота газами; испражненія черныя, жидкія, слизистыя, очень вонючія, также съ кровью перемѣшанныя, или отхожденіе чистой крови при испражненіи.

Далѣе, общая слабость, головокруженіе, сонливость; послѣ полуночи сонъ безпокойный и часто прерывается. Сильныя головныя боли, во лбу, въ глазахъ, съ ухудшеніемъ отъ движенія; ощущеніе, какъ если бы тянули за волосы. Тупыя боли въ поясницѣ и крестцѣ.

Лѣчебное примѣненіе Лептандра находитъ при воспалительныхъ состояніяхъ печени, желудка и кишекъ, съ желтухой или безъ таковой, при хроническомъ поносѣ, при дизентеріи.

Дѣленія: низкія.

Подобныя средства: *Подофил., Броння, Ирисъ.*

№ 168. Лиліумъ тигринумъ.

Lilium tigrinum Лилія тигровая.

Эссенція готовится изъ всего растенія

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на женскіе половые органы. Симптомы: сильное половое возбужденіе; ощущеніе жженія и зуда въ наружныхъ половыхъ частяхъ и во влагалищѣ; ощущеніе тяжести и давленія въ послѣднемъ, съ болью въ крестцѣ, также въ глубинѣ таза въ маткѣ; ощущеніе напиранія матки книзу, съ потребностію больной посредствомъ надавливанія руками на низъ живота этому какъ бы противодействовать; наклоненіе матки впередъ; разѣдающія бѣли, при испытаніи на здоровыхъ наблюдалось появленіе регулъ послѣ двухлѣтняго перерыва; сильныя, рвущія боли въ грудныхъ железахъ. Кромѣ того наблюдались при испытаніи явленія усиленной дѣятельности сердца, боль и стѣсненіе въ груди и разнаго рода другія разстройства; у мужчинъ — усиленіе полового возбужденія, сладострастные сны съ поллюціями къ утру, съ послѣдующимъ тѣлеснымъ и душевнымъ ослабленіемъ. Страданія имѣютъ характеръ періодичности, ухудшаются отъ тепла воздуха въ закрытомъ помѣщеніи, улучшаются же отъ свѣжаго, прохладнаго воздуха.

Лѣчебное примѣненіе Лиліумъ можетъ имѣть, въ подходящихъ случаяхъ, при воспаленіяхъ женскихъ половыхъ органовъ, при измѣненныхъ положеніяхъ матки, при маточной коликѣ и кровотеченіяхъ изъ матки; далѣе, при пораженіяхъ сердца, при мигрени, при утреннихъ поносахъ съ болью въ прямой кишкѣ и напираніемъ на мочу, и проч.

Дѣленія: низкія, X 3 до 0.

Подобныя средства: *Платина*, *Гелоніасъ*, *Сенія*, *Пумсатъ*, *Пододифилл*.

№ 169. Лобелія.

Lobelia inflata. Индѣйскій табакъ.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

Основное дѣятельное вещество — Лобелинъ (подобное Коніину).

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистыя оболочки, вызывая въ нихъ катарральныя явленія. Въ случаяхъ отравленія Лобеліей наблюдаются сильныя, какъ бы ревматическія боли въ разныхъ мѣстахъ тѣла, судорожныя разстройства, общее дрожаніе, упадокъ силъ и смерть.

Лобелія бываетъ полезна при хроническихъ катаррахъ зѣва, глотки и верхнихъ дыхательныхъ путей съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи, кашлемъ и одышкой, также при спазматической астмѣ съ обильнымъ мочеотдѣленіемъ, при спазмѣ глотки, пищевода, желудка, при коликѣ живота и т. п.

Руководящими указаніями для выбора Лобеліи съ лѣчебной цѣлью могутъ быть еще слѣдующіе ея симптомы: ощущеніе жара и полноты въ головѣ, беспокойный сонъ съ кошмарами, половинное зрѣніе (предметы видны лишь на половину), царапанье, жженіе и сухость въ гор-

лѣ, боль подѣ ложечкой, какъ бы отъ гвоздя, до спины и въ стороны, вздутіе живота газами, розоватый осадокъ въ мочѣ, ощущеніе покалыванія во всемъ тѣлѣ до пальцевъ рукъ и ногъ, слабость и тяжесть въ мужскихъ половыхъ частяхъ.

Дѣленія: низкія до Θ .—Подобныя средства: *Табакумъ*, *Дигиталисъ*, *Ипеакауана*, *Тарт. змет.*

№ 170. Меніантесъ.

Menyanthes trifoliata. Трифоль болотный.

Тинктура готовится изъ свѣжаго растенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервную систему, вызывая боли, подобныя невралгическимъ, и подергиванія мышцъ, также раздражительную слабость при общемъ упадкѣ тѣлесныхъ силъ.

Примѣняется преимущественно въ хроническихъ случаяхъ болѣзней, въ которыхъ нервные симптомы преобладаютъ надъ всѣми прочими и сопровождаются состояніемъ общей слабости. Такъ, это средство можно имѣть въ виду не только при неврозахъ, но и при пораженіяхъ нервовъ вслѣдствіе злоупотребленія хининомъ, при нервномъ разстройствѣ зрѣнія, слуха; при судорожныхъ подергиваніяхъ отдѣльныхъ мышцъ (наприм., лицевыхъ), при спазмахъ желудка, кишекъ (съ запоромъ), мочевого пузыря, при нервныхъ боляхъ въ яичкахъ и сѣменныхъ канатикахъ съ повышеннымъ половымъ возбужденіемъ. Меніантесъ при маляріи см. на стр. 66.

Дѣленія: низкія до Θ . — Противосредства: *Камфора*, *Валериана*

№ 171. Мосхусъ или Мошусъ

Moschus. Мускусъ.

Тинктура готовится съ 5 чч. алкоголя. Употребляется также въ растираніяхъ съ молочнымъ сахаромъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервно-мозговую систему. Характеристика Мосхуса въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣзней приведена на слѣдующихъ страницахъ: 59 (Тифъ), 127 (Судороги), 139 (Астма), 156 (Неврозы).

Дѣленія: $\times 2 - \times 3 - 3$ — Противосредства: *Камфора*, *Коффеа*.

Подобныя средства: *Амбра*, *Аса фет.*, *Валериана*, *Нуксъ мостата*.

№ 172. Мурексъ.

Murex purpurea. Багрянка

Приготавливаются растиранія сока съ молочнымъ сахаромъ до 5 дѣленія и затѣмъ разведенія.

Средство это пока еще мало испытано. Несомнѣнно лишь специфическое дѣйствіе его на матку; главные симптомы: обильныя водянистыя бѣли, равно какъ и регулы, съ ощущеніемъ спазматически стя-

гивающей боли въ маткѣ; также давящая, напиральная боль въ наружныхъ половыхъ частяхъ, усиленная похотливость; колющія боли въ грудныхъ железахъ; обильное мочеиспусканіе, особенно ночью; моча свѣтлая съ бѣловатымъ осадкомъ.—Со стороны нервной системы: большая усталость, сонливость, грустное настроеніе, особенно по вечерамъ; безпокойный сонъ съ страшными сновидѣніями. Страданія появляются или усиливаются въ покоѣ и проходятъ или уменьшаются при движеніи.

Дѣленія: $\times 3-3$.—Подобное средство: *Стил*, отличающаяся отъ Мурекса недостаточными регулами и отсутствіемъ усиленной половой возбудимости.

№ 173. Найя. См. подъ № 74

№ 174. Нуфаръ.

Nuphar luteum. Желтая кувшинка

Тинктура готовится изъ всего растенія.

Дѣйствуетъ на пищеварительный каналъ, особенно на нижнюю часть его, и на половые органы. Симптомы: жидкія испражненія, желтаго цвѣта, особенно раннимъ утромъ, между 4—6 часами, также послѣ малѣйшаго напряженія; сладковатый вкусъ во рту, бѣлообложенный языкъ, боль въ желудкѣ, медленное пищевареніе.—Симптомы со стороны половыхъ органовъ: полное отсутствіе полового влеченія; стволъ сильно втянутъ. мощонка вялая; отсутствіе эрекцій. Импотенція съ сперматорреей.

Примѣняется въ соотвѣствующихъ болѣзненныхъ состояніяхъ.

Дѣленія: $\times 1-3$ — Подобныя средства: при поносѣ: *Хемидоній*, *Сулфуръ*; при слабости половыхъ органовъ: *Хина*, *Селен.*, *Анусъ кастусъ*, *Румексъ*.

№ 175. Олеандръ.

Oleander Nerium.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ, собранныхъ во время цвѣтенія.

Олеандръ, на основаніи свойственныхъ ему симптомовъ, можетъ примѣняться съ пользой при пораженіяхъ головного и спинного мозга, сопровождающихся судорожными явленіями, нервными болями и состояніями разслабленности, съ невозможностью сосредоточивать свои мысли и отвлекающею отъ дѣла мечтательностію; при головокруженіи съ разстройствами зрѣнія; при ночныхъ зубныхъ боляхъ (вслѣдствіе постельной теплоты и лежанія); при усиленномъ аппетитѣ, но слабомъ пищевареніи, съ тошнотой, гнилой отрыжкой и жаждой на холодную воду; при спазмѣ и раздражительности кишечника съ частыми жидкими испражненіями, сопровождающимися коликой и урчаніемъ въ животѣ и содержащими непереваренные остатки пищи; при сильномъ,

особенно ночью, зудъ тѣла съ высыпаніемъ на кожѣ головы маленькихъ узелковъ и пузырьковъ; при вообще чувствительной кожѣ, которая раздражается и осадняется уже отъ прикосновенія платья.

Дѣленія: 3—6.

Противосредства: *Анакард.*, *Нукъ вом.*, *Коккул.*, *Камфора.*

Подобныя средства: въ отношеніи кишокъ—*Хина*, *Фосфоръ.*

№ 176. Палладій.

Palladium metallicum. Металлъ Палладій.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на женскую половую сферу (подобно Платинѣ), также на кожу. По своимъ симптомамъ, Палладій показанъ особенно при болѣзняхъ матки и яичниковъ у нервныхъ, истеричныхъ женщинъ, также при нервныхъ головныхъ боляхъ, простирающихся надъ теменемъ отъ уха къ уху, и при зудѣ тѣла. Страданія облегчаются отъ нажатія на больное мѣсто. Изъ многихъ душевныхъ симптомовъ выдаются особенно: плаксивость, крайняя обидчивость; больной кажется, что ее недостаточно цѣнять, и все жаждетъ похвалы; хорошее настроеніе вечеромъ въ обществѣ смѣняется на слѣдующій день тѣмъ большей угнетенностію духа.

Дѣленія: 3 и болѣе высокія.

Подобныя средства: *Платина*, *Аргент.*

№ 177. Паулинія.

Paullinia sorbilis. Бразильское растеніе.

Тинктура готовится изъ зрѣлаго плода, доставляемаго въ видѣ гуарановой пасты, основное дѣятельное начало которой есть Кофеинъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на симпатическую нервную систему.

Изъ симптомовъ выдаются особенно: нервное истощеніе, головныя боли (мигрень), являющіяся или ухудшающіяся отъ чая, кофе или спиртныхъ напитковъ, или отъ діететической погрѣшности, или отъ душевнаго угнетенія; сонливость, тяжесть въ головѣ, съ приливомъ крови къ лицу, послѣ ѣды; подергиваніе глазныхъ вѣкъ.

Средство это можетъ примѣняться съ пользою въ упомянутыхъ случаяхъ у неврастеничныхъ субъектовъ; оно оказывалось полезнымъ также при зеленыхъ и обильныхъ, но безъ запаха, испражненіяхъ.

Дѣленія: низкія до 0.—Подобныя средства: *Кофеа*, *Ипация*, *Нукъ вомика.*

№ 178. Плантаго.

Plantago major. Подорожникъ.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

Раздавленные листья подорожника, приложенные къ кожѣ, произ-

водять въ ней воспаленіе, довольно глубокое, но и при испытаніи его внутренними приемами получается общій зудъ кожи, съ жженіемъ послѣ расчесовъ, и съ высыпаніемъ мелкихъ узелковъ и пузырьковъ, ссыхающихся въ струя.

Къ внутреннимъ симптомамъ подорожника относятся: колющія и прострѣливающія головныя боли, также боли въ ушахъ, глазахъ, зубахъ; сердцебіеніе, колики въ животѣ; жидкія испражненія на низъ; выпаденіе прямой кишки; боли вдоль всей спины и въ членахъ, отяжелѣніе ногъ, съ потребностію лежать.

Средство это можно имѣть въ виду въ подобнаго рода болѣзненныхъ состояніяхъ.

Дѣленія: X2—Θ.—Наружно примѣняются листья въ свѣжемъ ихъ видѣ или растворъ тинктуры въ водѣ (1—2 чайн. ложки на стаканъ воды), также для полосканія при зубной боли.

№ 179. Реумъ.

Rheum. Ревень

Тинктура готовится изъ корня; также растиранія съ молочнымъ сахаромъ.

Характеристику въ отношеніи катарра толстой кишки см на стр. 243. Добавочными симптомами являются слѣдующіе: беспокоящія ощущенія въ членахъ, тяжесть и слабость во всемъ тѣлѣ, судорожныя подергиванія (у дѣтей) глазныхъ вѣкъ, лицевыхъ мышцъ; беспокойство, закидываніе головы кзади во время сна (у дѣтей).

Дѣленія: X2—3.—Подобныя средства: *Хамомил*, *Беллад*.

Противосредства: *Камфора*, *Коффеа*, также *Хамомил*.

№ 180. Сабадилла.

Sabadilla. Мексиканская чемерица.

Тинктура готовится изъ сѣмянъ Сабадиллы.

Основное дѣятельное начало—Сабадиллинъ, подобный Вератрину не только химически, но и въ отношеніи дѣйствія на организмъ. Сабадилла можетъ предпочтительно (предъ Вератриномъ) выбираться въ тѣхъ случаяхъ, когда прежде всего поражается нервная система, когда періодическіе приступы болей въ мышцахъ, суставахъ, костяхъ и на ограниченныхъ участкахъ нервовъ доходятъ до наивысшей степени, когда имѣются притомъ же головокруженіе и обморочное состояніе, тяжесть членовъ, судороги и дрожаніе рукъ, и параличныя состоянія; далѣе, при слабости зрѣнія и тугости слуха, при боляхъ лица и зубовъ, при воспаленіяхъ зѣва и глотки со спазмами при глотаніи, при желудочно-кишечныхъ страданіяхъ, при глистахъ, при разстройствахъ мочеотдѣленія спазматическаго характера, при тянущихъ, періодически являющихся боляхъ въ мужскихъ половыхъ органахъ, съ ослабленіемъ половой возбуди-

мости; у женщинъ же: уменьшеніе, остановка или запозданіе регуль, съ давящей болью въ глубинѣ таза.

Дѣленія: $\times 3-3$.—Противосредства: *Камфора, Пульсат.* Подобныя: *Вератр. альб., Стафизарія.*

Наружно Сабадилла примѣняется съ успѣхомъ для уничтоженія головныхъ вшей.

№ 181. Сабаль серрулата.

Sabal serrulata. Сагоносная пальма.

Тинктура готовится изъ свѣжихъ плодовъ.

Дѣйствуетъ на мочевые и половые органы. Количество выделяемой мочи значительно увеличено; повышень и удѣльный вѣсъ ея; моча содержитъ значительное количество кристалловъ мочевой кислоты. Половое возбужденіе чаще ослаблено, нежели усилено; женщины испытываютъ мучительныя боли въ маткѣ, въ яичникахъ, въ области мочевого пузыря и въ грудныхъ железахъ.

Болѣзни, въ которыхъ можно имѣть въ виду Сабаль, суть слѣдующія: у мужчинъ—гипертрофія простаты, выдѣленіе сока этой железы, половая слабость, воспаленіе яичекъ и ихъ придатковъ; у женщинъ—увеличеніе и воспалительная припухлость яичниковъ, смѣщенія матки, катарръ мочевого канала, воспаленіе грудной железы.—Также при трипперѣ у обоихъ половъ, при катаррѣ мочевого пузыря и ночью недержаніи мочи.

Дѣленія: $\times 1-\Theta$.

№ 182. Самбукусъ.

Sambucus nigra. Бузина черная.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ и цвѣтовъ (Тинктура изъ бузиновой коры менѣе употребительна.)

Къ симптомамъ Самбукусъ относятся особенно: охриплость съ накопленіемъ густой слизи въ верхнихъ дыхательныхъ путяхъ, стѣсненіе въ груди, удушливый кашель; ощущеніе сухости въ зѣвѣ безъ жажды, или жажда, не утоляемая питьемъ, тошнота, боли въ животѣ, рвота; ощущеніе общаго жгучаго жара, съ холодными ногами; не смотря на жаръ, нежеланіе раскрыться; обильный потъ ночью при пробужденіи, при засыпаніи же потъ исчезаетъ и кожа становится опять сухой и горячей; боли, какъ при ревматизмѣ въ разныхъ мѣстахъ тѣла, особенно въ суставахъ.

Самбукусъ примѣнялся съ пользой въ подобныхъ болѣзненныхъ состояніяхъ. Его надо имѣть въ виду, именно—тинктуру изъ корня, при сильной рвотѣ, при рвотѣ каломъ вслѣдствіе закрытія кишекъ.

Принимается внутрь чистая эссенція или тинктура, также— $\times 1$.

Противосредства: *Камфора, Арсен.*

Подобныя средства: *Акон., Ипекакуана.*

№ 183. Сарраценія.

Sarracenia purpurea. Сарраценія багряная.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

У Индѣйцевъ Сѣв. Америки Саррац. пользуется славой противоясненнаго средства и принимается ими для этой цѣли въ видѣ воднаго настоя, черезъ 3—4 часа по рюмкѣ. И дѣйствительно, гомеопатическое испытаніе показало въ ней способность вызывать лихорадочное состояніе съ болью въ костяхъ и разбитостью во всѣхъ членахъ, похожими на бывающія при оспѣ, а примѣненная при этой болѣзни обнаруживала замѣтное влияніе на ходъ болѣзни. Вообще же средство это нуждается въ дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ.

Дѣленія: $\times$ 1—3.

№ 184. Сенега.

Senega Polygala. Многомлечникъ.

Тинктура готовится изъ высушеннаго корня.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистыя оболочки, вызывая въ нихъ явленія катарра съ увеличеннымъ отдѣленіемъ густой слизи. Сопутствующими симптомами являются: боль въ суставахъ, общая слабость и усталость, головная боль, стѣсненіе въ груди, съ колотьемъ, горькій и вообще непріятный вкусъ во рту и разстройства пищеваренія, увеличенное выдѣленіе мочи, осадокъ въ мочѣ изъ слизи и известковыхъ и мочекислыхъ солей, также цѣлый рядъ нервныхъ и душевныхъ разстройствъ.

Сенега, въ подходящихъ случаяхъ, можетъ быть полезной въ подострыхъ и хроническихъ болѣзняхъ, когда имѣются катарральныя и ревматическія пораженія съ ипохондріей или меланхоліей, воспалительныя пораженія глазъ съ ослабленіемъ зрѣнія, разстройства со стороны желудка и кишекъ, разстройства мочеотдѣленія, особенно же при катаррѣ верхнихъ дыхательныхъ путей съ мучительнымъ кашлемъ и разстройствами дыханія, при воспаленіи легкихъ и плевры съ сывороточнымъ выпотомъ, при перикардитѣ, при эмфиземѣ.

Дѣленія: $\times$ 2 чаще, чѣмъ болѣе высокія.

Противосредства: *Арника*, *Беллад.*, *Камфора*.

Подобныя средства: *Гепарь*, *Бріонія*.

№ 185. Сизигій.

Syzygium jambolanum. Ямбулъ.

Сизигій получается изъ Индіи въ видѣ плодовъ, величиною въ глубинное яйцо. Кора растенія примѣняется, какъ вяжущее средство, при разстройствахъ желудка и кишекъ и при кровотеченіи, плоды же, благодаря содержанію въ нихъ дубильной кислоты, для полосканій.

Въ новѣйшее время плоды Ямбула примѣняются съ большою

пользой при сахарной болѣзни и часто помогаетъ еще въ тѣхъ случаяхъ, когда другія средства, какъ Ураній нитр., Фосфори. ацид., Гелоніасъ, остаются безъ результатовъ. Въ литературѣ имѣются сообщенія объ исчезновеніи сахара въ мочѣ у диабетиковъ подѣ влияніемъ болѣе или менѣе продолжительныхъ пріемовъ Сизигіи; въ одномъ случаѣ этотъ результатъ полученъ былъ отъ $\times 2$ (по 5 капель въ день въ течение 6 недѣль); въ другомъ случаѣ—отъ растертой въ порошокъ коры (3 раза въ день по 5 гранъ); въ третьемъ—отъ тинктуры Сизигіи (съ 3 чч. алкоголя), 4 раза въ день по 2 капли

Подробныя испытанія этого средства, по гомеопатическому методу, пока еще не были сдѣланы.

№ 186. Стикта пульмонарія.

Sicta pulmonaria. Плющникъ, Легочный мохъ.

Эссенція готовится изъ свѣжаго мха, растущаго на сахарномъ кленѣ.

Дѣйствуетъ на слизистыя оболочки верхнихъ дыхательныхъ путей, вызывая явленія сильнаго катарра, также общее недомоганіе и отяжелѣніе головы и членовъ, и пронизывающія боли въ членахъ, съ припуханіемъ ихъ, особенно подкожной сумки.

Средство это показано при сухомъ насморкѣ, лишь съ очень скуднымъ слизистымъ выдѣленіемъ; при жесткомъ, сухомъ, лающемъ кашлѣ, похожемъ на крупозный, хуже вечеромъ и ночью, со скудной или вовсе отсутствующей мокротой; также при сѣнной лихорадкѣ и гриппѣ, при нелихорадочномъ ревматизмѣ и простомъ воспаленіи колѣнной сумки (гигрома).

Дѣленія: $\times 1 - \times 2$.

№ 187. Стиллингія.

Stillingia silvatica. Американское растеніе.

Тинктура готовится изъ высушеннаго корня.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на надкостницу и костную ткань, также на железы, вызывая явленія, подобныя сифилитическимъ и золотушнымъ. Ухудшеніе страданій отъ движенія, къ вечеру, въ сырую погоду, улучшеніе по утрамъ, въ сухую погоду.

Въ Америкѣ Стиллингія считается однимъ изъ лучшихъ средствъ противъ сифилиса; она умѣстна, именно, во вторичномъ и третичномъ періодѣ, особенно при пораженіяхъ трубчатыхъ костей (бедренной, берцовой); далѣе, при костныхъ боляхъ разнаго рода и вообще при болѣзняхъ костей, при золотушныхъ опуханіяхъ железъ, при пораженіяхъ гортани и печени и въ застарѣлыхъ накожныхъ болѣзняхъ, особенно при безболѣзненныхъ язвахъ, при хроническомъ ревматизмѣ.

Дѣленія: $\times 1 - 3$.

Подобныя средства: Аурумъ, Калі йодат., Меркур., Фитолакка.

№ 188. Стронцій карбоникъ.

Strontiana carbonica. Углекислый стронцій.

Приготавливаются: до 5 сотен. дѣленія—растиранія съ молочнымъ сахаромъ, дальше—разведенія съ виннымъ спиртомъ.

Примѣняется при болѣзненныхъ страданіяхъ костей, суставовъ и нервовъ, преимущественно—правой стороны тѣла; улучшение страданій на вольномъ воздухѣ, особенно подъ теплыми лучами солнца; {при одностороннихъ параличахъ, при судорожныхъ состояніяхъ членовъ, при подергиваніяхъ во всемъ тѣлѣ, при головокруженіи со вспыльчивой раздражительностью, при мельканіи пятенъ передъ глазами, при боляхъ лица, зубныхъ корней, при спазмѣ желудка, при запорѣ со вздутіемъ живота отъ газовъ, при частомъ напорѣ на мочу, при неправильныхъ регулахъ съ болями въ животѣ, при чувствѣ онѣмѣнія въ рукахъ и ногахъ.

Дѣленія: 3 - 6.—Противосредство: *Камфора*.

№ 189. Табакъ.

Tabacum nicotiana. Табакъ.

Тинктура готовится изъ сушеныхъ листьевъ гаванскаго табака. Основное дѣятельное начало—Никотинъ.

Симптомы отравленія Никотиномъ: большая усталость, слабость и чувство разбитости въ членахъ, дрожаніе рукъ и ногъ, и головы, особенно при малѣйшемъ волненіи, сильная тоска, обморочное состояніе, похолоднѣніе кожи съ холоднымъ пѣтомъ; тошнота, рвота, ослабленіе сердца съ сильнымъ стѣсненіемъ въ груди и проч.

При правильномъ умѣренномъ куреніи табака до такихъ симптомовъ дѣйствіе его, какъ извѣстно, не доходитъ, и оно является повидимому даже слегка возбуждающимъ, оживляющимъ. Сказано „повидимому“, такъ какъ мнѣніе о такомъ дѣйствіи табака основано на недоразумѣніи: кратковременное возбужденіе отъ куренія смѣняется состояніемъ угнетенія, которое и есть настоящее послѣдовательное дѣйствіе Никотина; этимъ объясняется безпрестанная потребность въ повторныхъ, посредствомъ куренія, возбужденійхъ у курильщиковъ (то же соображеніе примѣнимо и къ привычному употребленію вина, кофе и чая).

Подъ вліяніемъ такого хроническаго отравленія табакомъ развиваются явленія хроническаго катарра слизистой оболочки дыхательныхъ путей, отчасти и желудка и кишекъ, также ослабленіе зрѣнія и половая слабость.

Нерѣдко разнаго рода болѣзненные состоянія проходятъ у курильщиковъ, послѣ того какъ они прекратили курить, что, къ сожалѣнію, лишь рѣдко удается, да и то лишь съ большимъ усиленіемъ воли.

Средствомъ для отученія отъ куренія считается *Плантаго*.

Противосредства: *Камфора*, *вино*, *Ипек.*, *Нуксъ оом.*, *Натр. muriat.* и, какъ уже сказано, *Плантаго*.

Противъ диспепсіи отъ табака: *Сенія и Инація*, противъ половой слабости отъ табака: *Ликоподій*.

№ 190 Тевкріумъ.

Teucrium scorodoma (иначе еще *Marum verum*) Дубровникъ.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія.

Средство это примѣнялось съ хорошимъ успѣхомъ при туберкулезѣ легкихъ и яичекъ, также при хроническихъ бронхитахъ съ очень обильной мокротой, причемъ оно давалось въ видѣ эссенціи, по 5—10 капель повторно каждый день; также съ хорошими результатами примѣнялись и разведенія—до $\times 6$, именно при туберкулезѣ яичекъ.

Тевкріумъ извѣстно также какъ средство противъ полипа въ носу и дается для этой цѣли внутрь, а также противъ аскаридъ, на которыхъ дѣйствуетъ какъ Цина.

№ 191. Ува урси.

Uva ursi. Медвѣжья толокнянка.

Эссенція готовится изъ свѣжихъ листьевъ,

Примѣняется съ пользой при болѣзняхъ мочевыхъ органовъ: при хроническомъ катаррѣ мочевого пузыря и мочеиспускательнаго канала, при венозныхъ застояхъ крови въ почкахъ и мочевомъ пузырьѣ, при воспаленіяхъ почечной лоханки вслѣдствіе мочевого песка и мочевыхъ камней, при произвольномъ мочеотдѣленіи.

Принимается внутрь въ Θ или въ водномъ настоѣ листьевъ.

№ 192. Фелландріумъ.

Phellandrium aquaticum. Укропъ водяной,

Тинктура готовится изъ высушенныхъ плодовъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на нервно-мозговую систему, на дыхательные и пищеварительные органы. Къ общимъ симптомамъ относятся: общая вялость, чувство слабости въ ногахъ и затѣмъ во всемъ тѣлѣ; чувство трепетанія, проходящаго черезъ все тѣло. Страданія появляются большею частію во время сидѣнія, лежанія и стоянія и уменьшаются на свѣжемъ воздухѣ и при движеніи. Пробужденіе ночью съ тошнотой и послѣдующимъ поносомъ. Сонливость днемъ и позднее ночью засыпаніе. Зудъ по всему тѣлу, особенно въ ушныхъ раковинахъ и плечевыхъ суставахъ.

Характерны для Фелландрія: головныя боли, съ болѣзненностію нервовъ, идущихъ къ глазамъ; боли въ грудныхъ железахъ, являющіяся во время кормленія.

Средство это можно имѣть въ виду при разстройствахъ пищеваренія съ тошнотами и пученіемъ живота отъ газовъ, при упомянутыхъ

Боляхъ въ грудяхъ у кормящихъ женщинъ, при кашлѣ съ зловонной мокротой и стѣсненіемъ въ груди (у чахоточныхъ).

Дѣленія: низкія до Θ.

№ 193. Фукусъ везикулозусъ.

Fucus vesiculosus. Водоросль пузырчатая.

Тинктура готовится изъ высушенной водоросли.

Испытаній этого средства на здоровыхъ не имѣется, извѣстно лишь изъ опыта, что оно уменьшаетъ жиръ у тучныхъ особъ. Не выяснено еще, чему приписать такое дѣйствіе: содержанію ли въ немъ значительнаго количества іода или другимъ, не изслѣдованнымъ еще составнымъ частямъ. Въ обугленномъ состояніи, подъ названіемъ *Aethiops vegetabilis*, оно уже въ 17 столѣтіи извѣстно было какъ средство противъ зоба и золотушныхъ железъ. Принимается внутрь тинктура 2—3 раза въ день по 20 капель и больше

№ 194. Цепя.

Allium Cera. Лукъ.

Тинктура готовится изъ зрѣлой мякоти луковицы.

По дѣйствию своему на слизистую оболочку, Цепя соответствуетъ насморку, когда выдѣленіе изъ носа водянистое и ѣдкое, слезотеченіе лишь незначительное; ощущеніе садности въ горлѣ и кашель вслѣдствіе постояннаго щекотанія въ гортани. Когда катарръ изъ носа, при пріемахъ Цепы, опускается ниже на дыхательные пути, слѣдуетъ давать Фосфоръ, какъ антидотъ Цепы. Она вліяетъ раздражающимъ образомъ и на слизистыя оболочки другихъ органовъ, не только дыхательныхъ, также на кожу. Отсюда польза, приписываемая луку, при цынгѣ и при изъязвленіи кожи, особенно на ступняхъ ногъ, напримѣръ на пяткѣ, вслѣдствіе натиранія сапогомъ и т. п.—Лукъ вызываетъ также тошноту, рвоту, боль въ животѣ и поносъ.—Подробныхъ методическихъ испытаній Цепы не имѣется, и пока неизвѣстно, не могло ли бы это простое средство служить полезнымъ лѣкарствомъ въ болѣе широкомъ кругѣ болѣзней.—Дѣленія: неопредѣленны; слѣдуетъ испытывать и низкія до Θ и болѣе высокія.

№ 195. Цикламень.

Cyclamen europeum. Фіалка альпійская.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня

Къ симптомамъ этого средства относятся главнымъ образомъ тяжесть въ членахъ, мышечная слабость; боли какъ бы ревматическія въ разныхъ мѣстахъ тѣла, какъ въ мышцахъ, такъ и въ суставахъ; головокруженіе, боль головы, какъ при мигрени или въ затылкѣ, постоянная, или лишь съ короткими перерывами, въ теченіе дней или не

дѣль; сердцебіеніе съ чувствомъ давящей боли въ груди, лихорадочное состояніе съ холоднымъ потомъ; разстройства пищеваренія съ ухудшеніемъ отъ жирнаго, съ жаждой, поносъ съ послѣдующимъ запоромъ, геморроидальное кровотеченіе; частые позывы на мочу, съ колотьемъ въ мочевоомъ каналѣ.

Средство это можно имѣть въ виду при подагрическихъ и ревматическихъ состояніяхъ, при коликахъ въ правой сторонѣ живста съ запоромъ, при спазмѣ мочевого пузыря съ геморройными явленіями, при перемежающейся лихорадкѣ, при сердечныхъ невросахъ и невросахъ вообще.

Дѣленія: X3—6

Подобныя средства: *Пульсангилла*, *Русъ*, *Крокусъ*. Отъ Пульсат. отличается тѣмъ, что страданія ухудшаются въ тепломъ помѣщеніи (при первой—наоборотъ).

№ 196. Химафила.

Chimaphila umbellata. Зимняя зелень.

Эссенція готовится изъ свѣжаго растенія, или тинктура — изъ высушеннаго корня.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на мочевые органы, особенно на мочевой пузырь. Химафила — энергичное мочегонное средство при отекахъ вслѣдствіе болѣзни сердца. Она имѣетъ также вліяніе на грудныя железы. Въ литературѣ имѣется сообщеніе о случаѣ рака груди у 26-лѣтней женщины, въ которомъ опухоль исчезла отъ приѣмовъ эссенціи Химафилы (3 раза въ день по 40 капель), но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе чѣмъ на половину уменьшились груди и онѣ остались вялыми.

Симптомы Химафилы со стороны мочевыхъ органовъ имѣютъ катаральный характеръ, съ ощущеніемъ въ промежности, какъ если бы больной сидѣлъ на шарообразномъ предметѣ. На кожѣ и слизистыхъ оболочкахъ имѣются явленія, подобныя золотушнымъ, также опуханіе железъ.

Страданія ухудшаются отъ сырой погоды, отъ холодныхъ обмываній и отъ сидѣнія на холодныхъ камняхъ. Наклонность къ упорному запору и къ геморрою.

Можетъ пригодиться въ соответствующихъ болѣзняхъ, особенно у золотушныхъ и ослабленныхъ особъ.

Дѣленія: 3 до Ө.

Подобныя средства: *Каннаб. сат.*, *Ува урси*.

№ 197. Эвкалиптъ.

Eucalyptus globulus. Австралійская камедь.

Объ эвкалиптовомъ деревѣ извѣстно, что оно имѣетъ уничтожающее вліяніе на развитіе мѣзмовъ въ тѣхъ болотистыхъ мѣстахъ, гдѣ оно разводится; это дало поводъ примѣнять тинктуру Эвкалипта при болотныхъ лихорадкахъ, при которыхъ она дѣйствительно оказывается

полезной, также и при другихъ подобнаго рода заболѣваніяхъ, главнымъ же образомъ при маляріи.

Къ симптомамъ Эвкалипта относятся: общее состояніе возбужденія, ускоренное дыханіе, бессонница, или упадокъ силъ, сонливость; лишаеобразныя сыпи и опуханіе лимфатическихъ железъ; приливы крови и лихорадочное состояніе; боли и колотья въ мышцахъ и суставахъ, особенно ночью; головокруженіе, головныя боли, особенно во лбу, помутнѣніе зрѣнія; сильная жажда, жженіе въ желудкѣ и животѣ, ощущеніе жара въ прямой кишкѣ, поносъ, съ жиленьемъ и кровью.

Принимается, какъ сказано, въ чистой Θ при болотной лихорадкѣ; въ другихъ же подобныхъ случаяхъ—также въ дѣленіяхъ, болѣе низкихъ.

№ 198. Эвфорбій.

Euphorbium resiniiferum. Молочай.

Тинктура — изъ смолы этого растенія.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на слизистыя оболочки и на кожу, подобно Кротону, вызывая явленія катарра и воспаленія; при этомъ — слабость во всемъ тѣлѣ, жгучія и какъ бы ревматическія боли, помраченіе, судорожныя явленія, приливы къ головѣ и проч. Ухудшеніе страданій въ покоѣ и отъ дотрагиванія до больныхъ частей, ухудшеніе ночью.

Средство это можно имѣть въ виду при хроническихъ катаррахъ слизистыхъ оболочекъ, при хроническихъ катаррахъ глазъ (см. стр. 595) и помутнѣніи зрѣнія, при разстройствахъ слуха съ катарромъ Евстахиейвой трубы и проч.; при воспаленіяхъ кожи, особенно при рожистомъ, при боли желудка со рвотой, при поносѣ, при разнаго рода спазмахъ и невральгіяхъ, особенно при жестокой зубной боли, съ ощущеніемъ, какъ если бы зубы были ввинчены.

Дѣленія; неопредѣленны, 3 — $\times$ 3 и ниже.

Подобныя средства: *Вератр.*, *Кольх.*, *Тарт. эмет*

№ 199. Эвпаторій.

Eupatorium purpureum. Конопельникъ пурпуровый.

Эссенція готовится изъ свѣжаго корня.

Примѣняется главнымъ образомъ при перемежающейся лихорадкѣ, когда приступъ болѣзни начинается съ утра ознобомъ въ спинѣ, съ жаждой и сильными болями во всѣхъ костяхъ, которыя какъ бы сломаны; затѣмъ слѣдуетъ жаръ съ усиленіемъ костныхъ болей, и наконецъ потъ; или же послѣ озноба является рвота водою и пищей, принятыми передъ тѣмъ, или желчью. — Далѣе, Эвпаторій умѣстенъ при инфлюэнцѣ (гриппѣ), когда имѣется сильная боль во всемъ тѣлѣ, охриплость и кашель съ чувствомъ сильнаго садненія въ груди, сильный текучій насморкъ съ жаждой, приче́мъ питье воды вызываетъ рвоту; кашель вызываетъ сильную боль въ головѣ и груди.

Эваторій имѣть замѣтное вліяніе также на мочевые, равно какъ на женскіе половые органы и его можно имѣть въ виду при упорныхъ воспаленіяхъ этихъ органовъ, особенно у особъ ослабленныхъ, истощенныхъ.

Дѣленія низкія.

Подобныя средства: *Гельзем.*, *Брионя*, *Хина*, *Хелидоній*.

№ 200. Юглансъ цинереа и Юглансъ регія.

Juglans cinerea. Американскій (сѣрый) грецкій орѣхъ.

Juglans regia. Обыкновенный грецкій орѣхъ.

Юглансъ цинереа испытана лучше и имѣетъ болѣе широкое примѣненіе, нежели Юглансъ регія, дѣйствія же этихъ двухъ родовъ грецкаго орѣха въ общемъ одинаковы.

Эссенція Юглансъ цинереа готовится изъ свѣжей коры вѣтвей, ствола и корня; изъ листьевъ же и корки созрѣваго плода Юглансъ регіи готовится тинктура.

Юглансъ дѣйствуетъ на кровь, на печень, на кожу и мышцы. Въ большихъ дозахъ Юглансъ цинереа вызываетъ сильныя стрѣляющія боли въ затылочной части головы, съ головокруженіемъ, тошнотой и тупой болью въ области печени, съ явленіями разстройствъ въ этомъ органѣ. Къ симптомамъ этого средства относятся еще: тугость и боль затылка, тянущія боли въ спинѣ и членахъ; колютъ въ области сердца и боль подъ грудиной съ чувствомъ угрожающаго удушья, насморкъ съ густымъ слизистымъ выдѣленіемъ, хроническій кашель съ исхуданіемъ; желудочно-кишечныя разстройства, желтовато-зеленыя испражненія съ болѣзненнымъ жиленіемъ и жженіемъ въ заднемъ проходѣ; зудъ, жженіе въ кожѣ съ образованіемъ узелковъ и гнойничковъ; улучшеніе кожныхъ симптомовъ отъ чесанія и утромъ при вставаніи, ухудшеніе во время прогулки.

Примѣняется въ соответствующихъ случаяхъ болѣзней, также при дизентерии, если другія средства недостаточно дѣйствуютъ.

Дѣленія: X3 — X1.

Подобныя средства: *Хелидоній*, *Брионя*, *Нуксъ вом*

Ацид. флуорик. или Флуор. ацид.

Acidum fluoricum или *Fluoris acidum*. Фтористая кислота

(Калькареа флуорика—см. подъ № 35).

До 3 дѣленія примѣняется въ водныхъ растворахъ.

Дѣйствуетъ главнымъ образомъ на кости и кожу, до нѣкоторой степени также на железы.

Флуор. ацид. показанъ бываетъ при воспалительныхъ пораженіяхъ кожи съ образованіемъ пузырьковъ, при выпаденіи волосъ и ломкости ногтей, при потѣни ладоней съ ощущеніемъ жара въ нихъ. Далѣе, при болѣзняхъ костной ткани, рядомъ съ *Силиція*, *Фосфоръ*, *Калькар. карб.*, *Сульфуръ*; при нервныхъ разстройствахъ съ приливами и волненіями крови, разстройствами пищеваренія, вздутіемъ живота отъ

газовъ, раздражительностію половой сферы; при ѣдкихъ бѣляхъ, при хроническомъ ревматизмѣ. Флуор. ацид. показанъ особенно при недостаткѣ зубной эмали и зависящей отъ этого порчи зубовъ.

Дѣленія: X3—3 и болѣе высокія.

Подобныя средства: *Силиція, Калькар, карб.*

Адреналинъ.

Adrenalinum

Принадлежить къ органovýmъ средствамъ (см. стр. 18) и представляетъ собою дѣятельное начало вытяжки изъ надпочечныхъ желёзъ.

Въ аллопатіи Адреналинъ извѣстенъ какъ энергичное кровоостанавливающее средство и примѣняется въ растворѣ 1⁰/₀₀ противъ кровотеченій, особенно маточныхъ, противъ гемофилии, а также (въ растворѣ 1 на 10.000) противъ насморка (сѣннаго), астмы, эмфиземы атоніи желудка и кишокъ.

Въ гомеопатіи Адреналинъ началъ входить въ практику въ послѣднее время, послѣ того, какъ подробнѣе выяснены были фізіологическія дѣйствія его, среди которыхъ главныя суть слѣдующія: сильная раздражительность, безпокойство, общее ослабленіе, кровавый поносъ, съ послѣдующей вялостію кишечника, уменьшенное мочеотдѣленіе, появленіе сахара въ мочѣ, спазмъ бронховъ, усиленіе кровяного давленія въ артеріяхъ, съ перерожденіемъ сосудистыхъ стѣнокъ кровотеченія, измѣненія въ сердечной мышцѣ.

Въ гомеопатическихъ дѣленіяхъ (3—6) Адреналинъ оказывался очень полезнымъ, какъ о томъ имѣются сообщенія въ литературѣ, при артеріосклерозѣ, при неврастеніи, при Базедовой болѣзни, при общемъ пруритѣ, при хронической уртикаріи, при мигрени, при Аддисоновои болѣзни.

Характерными для Адреналина симптомами являются: малый, слабый, ускоренный пульсъ, неправильная дѣятельность сердца, наклонность къ головокруженію, къ обморокамъ, большая усталость до степени полного изнеможенія; красный слѣдъ на кожѣ живота, появляющийся вскорѣ послѣ проведенія по ней пальцемъ и держащійся довольно долго.—Дѣленія указаны выше.

Кромѣ послѣднихъ двухъ лѣкарствъ, превышающихъ № 200-ый, въ этомъ „Лѣкарствовѣдніи“ приведено еще нѣсколько лѣкарствъ, не упомянутыхъ въ списокѣ на стр. 35—39, а именно:

Атропинъ—подъ № 5.

Калькар. ацетика, -іодата, -сульфурика—подъ № 35.

Апоморфинъ, Кодеинъ, Морфій—подъ № 44.

Аммоній муриат., -фосфорик., -бромат., -іодат., -кауст.—подъ № 49.

Найя, Кроталусъ—подъ № 74.

Мигале, Теридіонъ—подъ № 134.

Къ страницамъ 35—40 и 41—47.

ЦѢНЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ ЛѢКАРСТВЪ И ДОМАШНИХЪ АПТЕЧЕКЪ.

Цѣны гомеопатическихъ лѣкарствъ, въ отдѣльности и въ видѣ домашнихъ аптекъ, въ общемъ одинаковы во всѣхъ гомеопатическихъ аптекахъ Россіи и приведены здѣсь по преисъ-курантамъ 1910 года. Адреса гомеопатическихъ аптекъ см. стр. 34.

I. Цѣны отдѣльныхъ лѣкарствъ.

Въ капляхъ, порошкахъ или пилюляхъ:

За 1 драхму	25 коп.
„ 2 драхмы	30 „
„ 4 драхмы	40 „
„ 8 драхмъ	55 „

и т. д.

Въ крупинкахъ:

За $1\frac{1}{2}$ драхмы	20 коп.
„ 1 драхму	30 „
„ 2 драхмы	40 „
„ 4 драхмы	60 „

и т. д.

Въ таблеткахъ (пастилкахъ).

20 таблетокъ	40 коп.
50 „	75 „
100 „	1 р. 25 „

и т. д.

II. Домашнія гомеопатическія аптечки

въ деревянныхъ ящикахъ.

Изъ 24 лѣкарствъ:

въ сткл. по $1\frac{1}{2}$ драхмы 5 р.
„ „ „ 2 „ 7 „

Изъ 48 лѣкарствъ:

въ сткл. по $1\frac{1}{2}$ драхм. 10 р. 50 к.
„ „ „ 2 „ 12 „ 50 „

Изъ 100 лѣкарствъ:

въ сткл. по $1\frac{1}{2}$ драхмы	22 руб.
„ „ „ 2 „	27 „

и т. д. (Аптечки могутъ быть заказаны и изъ меньшаго, чѣмъ 24, и большаго, чѣмъ 100, лѣкарствъ).

Тинктуры и эссенціи для наружнаго употребленія:

за 1 унцію (или 8 драхмъ) отъ 20 до 50 коп.

Ополдѣльдоки лѣкарственныя:

за 1 банку въ 2 унціи 40 к.

Мази или масла лѣкарственные:

за 1 унцію 35—50 к.

Алфавитный указатель болѣзней,

изложенныхъ во второй части.

А.

	Стр.
Абортъ или Выкидышъ	442
Абсцессъ или Нарывъ	549
Аддисонова болѣзнь	404
Азиатская холера	82
Акнѣ	552
Алкоголизмъ	168
Амаврозъ и Амблиопія	601
Аменоррея	413
Ангина или воспаление зѣва	193
Ангина Людовичи	181
Ангина пекторисъ или грудная жаба	137
Англійская болѣзнь	505
Аневризмы	383
Анемія и хлорозъ	480
Апоплексія	107
Аппендицитъ	245
Аппетитъ и его расстройства	205
Артеритъ	381
Артериосклерозъ	381
Артритъ	507
Аскарида	289
Астма нервная	138
Астма бронхальная	325
Атероматозъ артерій	381
Атрофія мышцъ	530
Афты	176

Б.

Базедова болѣзнь	364
Бедренная боль	121
Безсонница	102
Безсонница у дѣтей	103
Бленоррея глазъ	592
Блѣдная немочь	480
Боль подъ ложечкой	209
Болѣзни артерій	380
" беременныхъ и роженицъ	436
" бронховъ	320
" венъ	385
" верхней кожицы	542
" влагалища	430
" влагалища, не устранимыя лѣ-	
карствъ, путемъ	433
" грудной железы	445
" внутреннихъ частей глаза	598
" волосъ	547
" въѣкъ	583
" глазъ	582

Болѣзни	Стр.
глотки	193
" головного мозга	98
" гортани	309
" губъ, полости рта и слюн-	
ныхъ железъ	435
" душевные	159
" дыхательнаго горла	320
" желудка	204
" женскихъ половыхъ орга-	
новъ	409
" живота	233
" зобной железы	361
" зубовъ	184
" кожи	533
" крови	480
" лимфы	490
" кишекъ	228
" костей	522
" легкихъ	335
" лимфатическихъ железъ	389
" " сосудовъ	387
" лихорадочная	53
" матки	409
" мочевого пузыря	404
" мужскихъ половыхъ орга-	
новъ	456
" мягкаго нѣба	192
" мышцъ	528
" нервовъ	119
" новорожденныхъ	446
" ногтей	546
" носа и носоглотки	297
" обмѣна веществъ	490
" плевры	357
" печени	266
" поджелудочной железы	281
" пищевода	202
" полости рта	170
" почекъ	392
" предстательной железы	461, 473
" роговицы	598
" рта	175
" селезенки	266
" сердца	366
" слѣзнаго аппарата	587
" слизистыхъ сумокъ	533
" слюнныхъ железъ	179
" спинного мозга	113
" суставовъ	510

Болѣзни сухожилий и сухожильныхъ	
влагалищъ	531
„ сѣменного канатика	473
„ ушей	602
„ щитовидной железы	361
„ языка	172
„ яичниковъ	429
„ яичекъ	461, 473
Бородавки	542
Брайтова болѣзнь	400
Бредъ	102
Бронзовая болѣзнь	404
Бронхитъ	320
Бронхобленоррея	324
Бронхоррея сывороточная	325
Бронхиальная астма	325
Бугорчатка	495
Бугорковый лишай	558
Бѣли—см. Болѣзни матки.	

В.

Варикозъ	386
Вариоцеле	474
Влажный бронхитъ	324
Вередъ обыкновенный	549
Верлгофа болѣзнь	483
Веснушки	545
Вздутіе желудка	207
Вздутіе живота газами	236
Вкусъ, его ненормальности	182
Водобоязнь	95
Водянка головы острая	111
„ хроническая	112
Водянка груди	359
Водяная грыжа	473
Водянка сердца	378
Водянка общая	401
Возвратная малярія	63
Возвратный тифъ	62
Волчанка	499
Воспаленіе артерій	381
„ бронховъ	320
„ венъ	385
„ влагалища	430
„ вѣкъ	583
„ глазъ	482
„ глазъ у новорожденныхъ	451
„ горла	193
„ гортани	309
„ грудной железы	445
„ желудка	211
„ зѣва	193
„ кишекъ	237
Воспаления кожи	549
Воспаленіе костей	522
„ легкихъ	338
„ лимфатическ. железъ	389
„ лимфатическ. сосудовъ	388
„ матки	
„ миндалевидн. железъ	195

Воспаленіе мозга	112
„ мозговыхъ оболочекъ	110
„ мочевого пузыря	404
„ мочепускающ. канала	458
„ мышщъ	526
„ мышечной ткани матки	421
„ надкостницы	522
„ печени	273
„ пищевода	202
„ почекъ	398
„ плевры	357
„ предстательн. железы	461
„ роговой оболочки,	598
„ рожистое	548
„ рта	175
„ селезенки	280
„ сердца	368
„ слезнаго мѣшка	589
„ слезной железы	588
„ слѣпой кишки	245
„ спинного мозга	115
„ среднего уха	603
„ суставовъ	510
„ тонкой кишки	241
„ толстой кишки	242
„ червеобразнаго отростка	245
„ щитовидной железы	362
„ языка	174
„ яичниковъ	429
„ яичекъ	461
Врожденное слабоуміе	159
Вшивость	571
Вѣтряная колика	236
Вѣтряная оспа	78
Выворотъ вѣкъ	587
Выпаденіе прямой кишки	251

Г.

Ганглий,	533
Гангрена при сибирской язвѣ у лю-	
дей	93
Гангрена щеки	178
Гангренозный шанкръ	465
Геморрой	256
Гемофиія	482
Герпесъ	562
Гигрома	533
Гидротораксъ	359
Гидроцеле	473
Гиперемія конъюнктивы	590
„ легкихъ	335
„ мозга	
„ печени	271
Гипертрофія губъ	171
„ миндалинъ	199
„ мышщъ	531
„ печени	274
„ простаты	473
„ сердца	373

Глаукома	600
Глистныя болѣзни	281
Глотка, зѣвъ и небо, болѣзни ихъ	192
Гоноррея	458
Гнилостный бронхитъ	325
Гнилость рта	178
Гнилостная послѣродовая лихорадка	68
Гнойный плевритъ	358
Голова, болѣзни мозга	98
„ острая водянка	111
„ хроническая водянка	112
Головная боль	98
Головная боль у беременныхъ	440
Головокруженіе	100
Гортань, болѣзни ея	309
Грудница	445
Грудная жаба	137
Гриппъ	330
Грыжа	264
Грыжа водяная	473
Грыжа сѣменныхъ протоковъ	473
Губной лишай	170

Д.

Дизентерія	87
Дисменоррея	415
Диспепсія	211
Дифтеритъ	78
Диабетъ	502
Дурной запахъ изо рта	182
Душевные болѣзни	159
Дыхательное горло, его болѣзни	296
Дѣтскій спинной параличъ	118
Дѣтская холера	85

Ж.

Жаба	193
Жаба грудная	137
Жажда	208
Желтуха	267
Желтуха у новорожденныхъ	451
Желудокъ, его болѣзни	204
Желчная колика, желчныя камни	269
Женскія болѣзни	409
Жидкій плевритъ	357
Жировое перерожденіе сердца	375
Жирная печень	275

З.

Заворотъ вѣкъ	586
Заворотъ кишекъ	262
Заиканіе	142
Закрытіе кишечнаго канала	262
Закупорка артерій	384
Запахъ дурной изо рта	182
Запоръ	229
Запоръ у новорожденныхъ	454

Зараженіе гнойное крови	68, 388
Застои брюшныя	256
Заушница	180
Злокачественная малярія	63
Зобъ обыкновенный	362
Зобъ Базедовскій	364
Золотуха	490
Зубная боль	180
Зубная боль у беременныхъ	441, 185
Зубная фистула	185
Зубы, уходъ за зубами	191
Зудъ кожи, нервный	559
Зѣвъ или небо, болѣзни его	192
Звонъ и шумъ въ ушахъ	604
Зеленая вода	600
Зернистость вѣкъ	593
Злокачественный карбункулъ	93
Злокачественныя опухоли, см. при органахъ.	

И.

Идіотизмъ	159
Изжога	207
Икота нервная	142
Икота у новорожденныхъ	455
Икры—судорога икръ	125
Иктерусъ	267
Импотенція	477
Инфуэнца	330
Ипохондрія	151
Ирритация спинного мозга	112
Искривленіе позвоночника	527
Искусственное дыханіе	105
Истерія	152
Исхуданіе мышцъ у дѣтей	111
Ихтиозъ	542
Ишіасъ	120

К.

Камни—желчныя	266
„ мочевые, почечныя	402
Капиллярный бронхитъ	30
Карбункулъ	55
Кардiальгія	20
Карцинома (ракъ). См. при отдѣльныхъ органахъ и	48
Каталепсія	13
Катаракта	59
Катарральное воспаленіе или Катарръ см. подъ буквой „В“—„Воспаленіе“	6
Кахексія малярiйная	30
Кашель	60
Кашель у новорожденныхъ	45
Кератитъ	59
Киста (водянка) яичника	42
Кишечное кровотеченіе	25
Кишки—болѣзни ихъ	22
Кожа, болѣзни ея	53

Соклюшь	332
Сокситъ или воспаленіе тазобедреннаго сустава см. при „воспаленіяхъ суставовъ“	510, 526
Солика—см. кишечная, печеноч., желчная, почечная колика.	
Солика и боль въ боку—см. Невральгіи и Плевритъ.	
Солика вѣтрная	136
Сонвульсіи	125
Сонвульсіи у дѣтей	129
Сондиллома	458, 462
Соръ	70
Сомаръ, тревожный сонъ	103
Срапивница	560
Сраснуха	72
Сретинизмъ	159
Сроваая моча	402
Сроваая рвота	222
Сровепятнистая болѣзнь Верлгофа	483
Сровотеченіе изъ беременной матки	442
„ „ желудка	222
„ „ кишекъ	255
„ „ легкиехъ	336
„ „ матки	414
„ „ мочевого пузыря	402
„ „ наружныхъ ранъ	381
„ „ носа	304
Сровохарканье	336
Сровоточивость	482
Сруглые глисты	289
Срупъ	315
Срупозное воспаленіе легкиехъ	339

Л.

Ларингитъ	309
Легкія, ихъ болѣзни	335
Ленточный глистъ	282
Лепра	498
Лимфангитъ	388
Лимфаденитъ	389
Лихорадочныя болѣзни	53
Лихорадка у новорожденныхъ	453
Лихень	558
Лицевая боль	119
Лишай бугорковый	558
„ губной	170
„ кольцевидный	563
„ мокнуцій	565
„ опоясывающій	563
„ отрубевидный	543
„ половой	562
„ пузырьчатый	562
„ стригущій	572
„ чешуйчатый	543
„ пузырьчатый	562
Ложный крупъ	309
Лютная болѣзнь	507

Лумбаго	120
Лупусъ	499
Лягушечья опухоль	181

М.

Малокровіе и блѣдная немочь	480
Малокровіе мозга	109
Маларія: возвратная, злокачественная, хахектическая и скрытная	62—63
Манія	161
Маточное кровотеченіе	414
Меланхолія	162
Мелкая аскарида	291
Менингитъ эпидемическій	110
Менструація и ея неправильности	411
Менструальная колика	415
Мигрень	98
Мизерере	263
Милларія	562
Милларова одышка	141
Мнимая смерть новорожденныхъ	450
Мнимая смерть	104
Мозгъ, его болѣзни	106
Мозговой ударъ	107
Мозоли и ороговѣлости	542
Мокнуцій лишай	565
Молочная короста	567
„ лихорадка	443
Молочница у дѣтей	176
Мочевой каналъ, его болѣзни	458
Мочевой пузырь, его болѣзни	404
Мочеизнуреніе сахарное	502

Н.

Набуханіе печени	271
Нарывная ангина	194
Нарывы кожи	549
Насморкъ	297
Насморкъ у новорожденныхъ	452
Наслѣдственный сифилисъ	471
Натужный кровавый поносъ	87
Натуральная оспа	75
Невральгіи	119
Невральгія желудка	209
„ кишекъ	237
Невральгія матки	417
Невенерическія болѣзни предстательной железы, яичекъ и сѣменного канатика	473
Неврастенія	147
Неврозы влагалища	431
„ гортани	319
Недержаніе мочи у дѣтей	408
Неистовство	161
Ненормальности со стороны жировыхъ и потовыхъ железъ кожи	576
Неправильныя положенія, искривленія и опушенія матки	425

Нервная боль груди	121
" " грудной железы	436
" " желудка	209
" " кишечъ	237
" зубная боль	184
Нервный зудъ кожи	559
Нервная диспепсія	211
Нервная икота	142
Надрывы, ссадины, трещины	545
Нервное разстройство въкъ	586
Нервная слабость	147
Нервное сердцебіеніе	378
Неправильныя положенія, искривленіе и опущеніе матки	425
Новообразованія и опухоли грудной железы	435
Новообразованія и опухоли матки	426
Нома	178

О.

Обморокъ	104
Обопрълость	544
Обопрълость у новорожденныхъ	455
Общие невроты	147
Одышка см. Астма. Болѣзни легкихъ и сердца	
Озена	299
Ожирѣніе сердца	375
Оанизмъ	474
Опухоли въкъ	585
" гортани	319
" языка	175
Опухоль на головѣ у новорожденныхъ (см. еще опухоли при отдѣльныхъ органахъ)	456
Опуханіе грудныхъ сосочковъ у ново- рожденныхъ	451
Ожирѣніе или ложная гипертрофія мышцъ	531
Ожирѣніе или тучность	500
Ожоги и отмороженія	574
Осложненія триппера	461
Острое воспаленіе — см. „Воспаленіе“	
Острый катаръ — см. при отдѣльныхъ органахъ	
Оспа вѣтряная	78
" натуральная	75
" черная	76
Острый суставн. ревматизмъ	515
Остеомалія	506
Остеоміэлитъ	523
Острица мелкая	291
Отеки	401
Отекъ гортани	317
Отмороженія и ожоги	574
Отравленія	605
Отрыжка	207

Отсутствіе аппетита	203
" вкуса	183

П.

Падучая болѣзнь	131
Пальпитация сердца	378
Паразитныя пораженія кожи	576
Параличъ въкъ	586
" гортани	319
" мочевого пузыря	407
Параличи	147
Параличъ прогрессиивный	167
Параоія	164
Парафимозъ	458
Парезы	147
Паротитъ	186
Парша	57
Паховая грыжа	264
Перелой	451
Перемежающаяся ангина	194
" лихорадка	67
Перикардитъ	361
Периметритъ	424
Перитифлитъ	243
Періоститъ	527
Песыкъ или ячмень	588
Печень. Болѣзни ея	277
Плача и смѣха спазмъ	147
Плевра. Болѣзни ея	297
Плевритъ	357
Плѣсневка	17
Пляска Св. Вита	137
Пневмонія	331
Пневмотораксъ	361
Подагра	50
Полипы носа	307
Поллюціи	477
Половое слабосиліе	477
Половой лишай	567
Половыя разстройства у мужчинъ	477
Помраченіе бредовое	10
Понось	23
Понось кровавый, натужный	8
Понось у новорожденныхъ	457
Пороки сердца	377
Послѣродовая гнилостная лихорадка	67
Пострѣлъ	127
Потница	567
Почесуха	557
Почечные камни	407
Почечуй	257
Почки. Болѣзни ихъ	397
Приливы крови, см. при отдѣльныхъ органахъ	
Приращеніе языка у новорожденныхъ	457
Прогрессиивный параличъ	167
Проказа	497
Проктитъ	247

Гростая лихорадка	55
Гростудная зубная боль	185
Гростая язва желудка	219
Гроръзываніе зубовъ	188
Грорессіональный судороги	143
Груриго	557
Груриуть	559
Гсоріазъ	543
Гузырчатый лишай	562
Гульсь	54
Гупочная грыжа у новорожденныхъ	452
Гученіе живота	236
Гьянство	168

Р.

Ракъовая болѣзнь	485
Ракъ—см. при отдѣльныхъ органахъ	
Раздражительность спинного мозга	113
Размягченіе костей	506
Разстройства аппетита	205
" менструаций	412
" мочеиспусканія у новорожденныхъ	455
Разстройства пищеваренія	205
Ранула	181
Расширеніе артерій	383
" венъ	386
" " у беременныхъ	441
" сѣменного канатика	474
" желудка	226
" легкихъ	343
" сердца	373
Ракитъ	505
Рвота кровавая	222
" и тошнота	206
" у новорожденныхъ	453
Ревматизмъ мышцъ	528
" острый суставный	515
" хроническій	520
Ревматическая ангина	194
Регулы	411
Родимчикъ	129
Рожъ	548
Ротъ, болѣзнь его	170
Рублоблудіе	474
Рубная чешуя	542
Рубницы (заворотъ и выворотъ ихъ)	586

С.

Сажъ у людей	94
Сахарная болѣзнь	502
Сажинка	180
Сажоррея	576
Сажеленка, болѣзнь ея	280
Сажеліе, болѣзнь его	368
спазмъ его	137

Сибирская язва у людей	93
Сифились	466
Скабесъ	570
Скарлатина	73
Скорбуть	484
Скоропреходящая лихорадка	55
Скрытая малярія	63
Скоротечная чахотка	349
Слабоуміе паралитическое	167
Смѣхъ и плачь (спазматич.)	142
Слюнотеченіе	179
Собачье бѣшенство	95
Солитеръ	283
Сонъ; разстройства его, кошмаръ	102, 103
Сопутствующая ангина	194
Сотрясеніе мозга	113
Спазмъ гортани	140—320
" грудобрюшной преграды	142
Спазмы	125
Спазмы внутренн. органовъ	136
Спазмъ сердца	137—380
Сперматоцеле	473
Старческая диспепсія	211
Столбнякъ	133
Стоматитъ	175
Стригушій лишай	572
Стриктуръ	462
Струнecъ обыкнов.	289
Судороги	125
Судорога вѣкъ	586
" мочевого пузыря	407
" профессиональная	143
" у беременныхъ (Эклампсія)	130
Сумасшествіе	164
Сухой бронхитъ	324
" плевритъ	357
Сухотка спинного мозга	116
Съуженіе и закрытіе носовой полости	302
Съуженіе пищевода	203

Т.

Табесъ дорзались	116
Твердый шанкръ	466
Темная вода	601
Температура тѣла	54
Тетанусъ	133
Тикъ болевой	119
Тифъ	57
" возвратный	62
Тифлитъ и аппендицитъ	245
Тонзилитъ	195
Тошнота и рвота	206
Трахома	593
Тревожный сонъ	103
Трещины губъ	171
Тризмъ, столбнякъ, тетанусъ	133
Трипперъ	458

Шихина	293
Шомбъ	384
Туберкулезъ	495
Туберкулезъ гортани	318
Туберкулезъ легкихъ	346
Туберкулезъ костей и суставовъ	526
Туберкулезный менингитъ	110
Тугоухость слуха	604
Тягучность	500

У.

Увеличение печени	274
У сердца	373
У щитовидной железы	361
У миндалинъ	199
У блѣлые	552
У красные	552
У мозговой	107
Ушье—см. Астма, Крупъ.	
Ушное насѣкомыхъ	97
У ядовитой змѣи	608
Ушная	398
Ушная	560
Ушная болѣзнь	602
Ушная боль	603
Ушная течь	604

Ф.

Фитазированіе бредовое	102
Финкель или воспаленіе глотки	192
Фрома	426
Фрома—см. при отдѣльн. органахъ.	
Фотъ	458
Ф, ла зубная	185
Фотъ	385
Фотъ	385
Фотъ	194
Фотъ	185
Фотъ	549

Х.

Хансонъ	585
Хансонъ кровью	336
Хансонъ	545
Хансонъ	480
Хансонъ азіатская	82

Холерина	88
Хорея	134
Хроническое воспаленіе — см. при отдѣльныхъ органахъ.	
Хрусталикъ, его помутнѣніе, катаракта	599
Худощавость	501

Ц.

Циррозъ печени	274
Цынга	484

Ч.

Чихотка гортанная	519
Чихотка легочная	346
Черная оспа	76
Чесотка	570
Чешуйчатый лишай	541
Чума у людей	93

Ш.

Шанкръ мягкій	464
Шанкръ твердый	465
Широкий лентецъ	284
Шумъ и звонъ въ ушахъ	604

Щ.

Щитовидная железа, ея болѣзни	361
---	-----

Э.

Экзема	565
Эклампсія у беременныхъ	130
Эклампсія у дѣтей	125
Эмболія	384
Эмфизема легкихъ	343
Эндокардитъ	368
Энтеральгія	231
Энцефалитъ	112
Эпидемическій менингитъ	117
Эпилепсія	134
Эхинококкъ печени	29

Я.

Языкъ—см. при отдѣльныхъ органахъ.	
Языкъ. Болѣзни его	172
Ячмень или песьякъ	585